

全国初级护师考试

初级护师考试 章节真题及精解

第二篇 内科护理学

一.绪论

1. 模拟题 尿培养标本留取的尿量为()

- A. 3~5ml
- B. 5~10ml
- C. 30~50ml
- D. 50~100ml
- E. 100~150ml

2. 模拟题 血液常规生化检查应选()

- A. 干燥试管
- B. 抗凝试管
- C. 血培养瓶
- D. 普通玻璃瓶
- E. 无菌培养盒

3. 模拟题 痰细菌培养时应选()

- A. 干燥试管
- B. 抗凝试管
- C. 血培养瓶
- D. 普通玻璃瓶
- E. 无菌培养盒

4. 模拟题 患者,男,35岁。拟诊为慢性肾炎10年,发热、咽痛1周,鼻出血3天入院。体检:血压150/90mmHg,血红蛋白70g/L,尿蛋白(++),小便潜血(+),血清肌酐801 μ mol/L。对诊断最有帮助的是()

- A. 肾脏B超
- B. 肾脏CT
- C. 肾脏MRI
- D. 肾脏放射性核素检查
- E. 排泄性尿路造影

5. 模拟题 诊断脑血栓形成应选用的检查是()

- A. 脑电图检查
- B. CT
- C. CT或核磁共振
- D. 脑血管造影
- E. 肌肉或组织检查

6. 真题 2018-X005 奇脉见于()

- A. 心包积液
- B. 胸腔积液
- C. 胸腔积气
- D. 肺气肿
- E. 肺淤血

7. 模拟题 诊断脑出血应选用的检查是()

- A. 脑电图检查
- B. CT
- C. CT或核磁共振
- D. 脑血管造影
- E. 肌肉或组织检查

8. 模拟题 采集亚急性细菌性心内膜炎患者血培养标本时,最适宜的时间应在()

- A. 发热时,抗生素应用前
- B. 发热后,抗生素应用后
- C. 发热时,抗生素应用后
- D. 发热前,抗生素应用后
- E. 任何时间均可

9. 模拟题 口腔溃疡病人采取分泌物做口腔真菌培养时,采集部位宜在()

- A. 两侧腭弓
- B. 扁桃体
- C. 舌面
- D. 溃疡面
- E. 硬腭

10. 模拟题 护士为患者同时抽取不同类型的血标本时,注入盛放血标本容器的正确顺序是()

- A. 血培养瓶、抗凝管、干燥管
- B. 血培养瓶、干燥管、抗凝管
- C. 干燥管、血培养瓶、抗凝管
- D. 抗凝管、血培养瓶、干燥管
- E. 干燥管、抗凝管、血培养瓶

11. 真题 2013-X002 淋巴细胞增多见于()

- A. 支气管哮喘
- B. 寄生虫病
- C. 病毒感染
- D. 皮肤病
- E. 化脓菌感染

12. 真题 2013-X003 查血见白细胞核左移应考虑的是()

- A. 病情好转
- B. 病已痊愈
- C. 转向白血病
- D. 缺氧严重
- E. 感染严重

13. 真题 2014-J005 长期无保护地接触X线可引起()

- A. 表皮灼伤
- B. 骨脱钙
- C. 骨髓受抑制
- D. 营养不良
- E. 肺结核

14. 真题 2015-X051 做尿常规检查,应留取()

- A. 清晨新鲜尿液
- B. 12小时尿液
- C. 12小时尿液,检查前低蛋白饮食1天
- D. 24小时尿液,加入防腐剂
- E. 24小时尿液,检查前低蛋白饮食1天

15. 真题 2018-X013 胸廓饱满,前后径与横径约相等,肋间隙加宽是属于()

- A. 胸廓膨隆
- B. 扁平胸
- C. 桶状胸
- D. 鸡胸
- E. 漏斗胸

16. 模拟题 尿液生化检查留取尿标本的方法是()

- A. 新鲜晨尿
- B. 中段尿
- C. 导出尿液
- D. 24 小时尿液
- E. 尿沉渣

17. 模拟题 收集 24 小时尿液测定肌酐、肌酸需加的防腐剂是()

- A. 乙醇
- B. 新洁尔灭
- C. 甲醛
- D. 浓盐酸
- E. 甲苯

18. 模拟题 采集血标本时防止溶血的操作错误的是()

- A. 注射器、针头及试管必须干燥
- B. 避免振荡
- C. 采血后去针头沿管壁将血液和泡沫缓慢注入
- D. 标本应及时送检
- E. 需全血标本时, 应采用抗凝管

19. 真题 2018-S016 鉴别深浅昏迷最可靠的指征是()

- A. 神志
- B. 生命体征
- C. 对疼痛的反应
- D. 瞳孔对光反射
- E. 肌张力

20. 真题 2016-S021 需要采血清标本的是()

- A. 测定血沉
- B. 测定血氨
- C. 测定血清酶
- D. 检测血氧分压
- E. 测定血尿素氮

21. 真题 2011-X014 大便隐血试验前 3 天可以摄取()

- A. 动物血
- B. 大量绿叶蔬菜
- C. 牛奶
- D. 瘦肉
- E. 动物内脏

22. 真题 2018-S019 双侧瞳孔散大见于()

- A. 吗啡中毒
- B. 氯丙嗪中毒
- C. 阿托品中毒
- D. 脑疝早期

E. 脑出血

23. 真题 2016-X020 血小板正常值为()

- A. $(10-30) \times 10^9/L$
- B. $(40-60) \times 10^9/L$
- C. $(50-100) \times 10^9/L$
- D. $(100-300) \times 10^9/L$
- E. $(300-500) \times 10^9/L$

24. 真题 2014-S067 在给肝功能不全的患者做特殊口腔护理时发现患者出现肝臭味, 提示()

- A. 肝功能逐渐好转
- B. 患者出现消化不良
- C. 病情无变化
- D. 肝性脑病前兆
- E. 合并其他腹腔疾病

25. 真题 2016-Z002 有机磷农药中毒后患者呼出的气体气味是()

- A. 蒜臭味
- B. 烂苹果味
- C. 苦杏仁味
- D. 酒味
- E. 粪臭味

26. 真题 2018-Z022 某甲亢患者因自觉心悸, 发现心率比脉率多, 这种情况称为()

- A. 奇脉
- B. 水冲脉
- C. 速脉
- D. 交替脉
- E. 短绌脉

27. 真题 2014-X025 粒细胞核左移提示()

- A. 过敏
- B. 脱水
- C. 失血
- D. 感染严重
- E. 酸中毒

28. 真题 2018-X051 尿液呈酱油色见于()

- A. 高热尿浓缩
- B. 输异型血溶血
- C. 输液过多
- D. 尿中胆红素增加
- E. 尿道感染出血

29. 真题 2017-X051 做冠状动脉造影术检查前, 必须做好()

- A. 凝血试验
- B. 抗生素过敏试验
- C. 造影剂过敏试验
- D. 心电图监测
- E. 血压监测

30. 真题 2017-X071 血清白蛋白显著降低应考虑()

- A. 肝硬化
- B. 肺炎
- C. 支气管炎
- D. 哮喘
- E. 贫血

31. 真题 2017-X079 血肌酐增高应考虑的是()

- A. 肺功能不全
- B. 心功能不全
- C. 肾功能不全
- D. 甲亢
- E. 类风湿

32. 真题 2018-Z084 患者女, 27 岁。心慌气短 8 年, 反复咯血 2 年, 近 2 日咯血加重而就诊。查体: 双颊紫红, 唇发绀, 呼吸困难, 双肺底现在湿啰音较多。脉搏一强一弱, 心率 126 次/min, 律齐。心尖区第一心音前有隆隆样杂音, 颈静脉无怒张, 肝未触及。腹无移动性浊音。下肢不肿。心尖区第一心音前隆隆样杂音提示()

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 心包炎
- D. 二尖瓣关闭不全
- E. 主动脉瓣狭窄

33. 真题 2018-X085 肠性氮质血症, 血尿素氮值达到高峰的时间是()

- A. 12~24 小时
- B. 16~32 小时
- C. 8~16 小时
- D. 20~40 小时
- E. 24~48 小时

34. 真题 2018-Z085 患者女, 27 岁。心慌气短 8 年, 反复咯血 2 年, 近 2 日咯血加重而就诊。查体: 双颊紫红, 唇发绀, 呼吸困难, 双肺底现在湿啰音较多。脉搏一强一弱, 心率 126 次/min, 律齐。心尖区第一心音前有隆隆样杂音, 颈静脉无怒张, 肝未触及。腹无移动性浊音。下肢不肿。该患者脉搏一强一弱提示()

- A. 右室功能衰竭
- B. 左房功能衰竭
- C. 左室功能衰竭
- D. 右房功能衰竭
- E. 全心功能衰竭

35. 真题 2017-X086 行胃肠钡餐检查至少需禁食()

- A. 检查前 6 小时
- B. 检查前 8 小时
- C. 检查前 10 小时
- D. 检查前 12 小时
- E. 检查前 14 小时

36. 真题 2017-X090 具有软组织分辨率高、直接多平面成像等优点的检查是()

- A. B 超
- B. 多排螺旋 CT
- C. 磁共振层显像
- D. X 线胸片
- E. 正电子发射体层显像

37. 真题 2017-X091 具有更高的扫描速度和图像分辨率的检查是()

- A. B 超
- B. 多排螺旋 CT
- C. 磁共振层显像
- D. X 线胸片
- E. 正电子发射体层显像

38. 真题 2017-X092 可以客观描述人脑生理和病理代谢活动图像的检查是()

- A. B 超
- B. 多排螺旋 CT
- C. 磁共振层显像
- D. X 线胸片
- E. 正电子发射体层显像

39. 真题 2019-X054 腹部触诊有“腹壁柔韧感”提示()

- A. 急性胃穿孔
- B. 肝硬化腹水
- C. 结核性腹膜炎
- D. 急性胰腺炎
- E. 急性胃扩张

40. 真题 2019-Z023 有机磷农药中毒后患者呼出的气体气味是()

- A. 蒜臭味
- B. 烂苹果味
- C. 苦杏仁味
- D. 酒味
- E. 粪臭味

41. 真题 2019-J016 长期无保护地接触 X 线可引起()

- A. 表皮灼伤
- B. 骨脱钙
- C. 骨髓受抑制
- D. 营养不良
- E. 肺结核

42. 真题 2019-X033 尿液呈酱油色主要见于()

- A. 阻塞性黄疸
- B. 肾性肿瘤
- C. 泌尿系感染
- D. 急性溶血
- E. 晚期丝虫病

二. 呼吸系统疾病病人的护理

1. 真题 2010-J040 引起慢性呼吸衰竭最常见的病因是()
- A. 肺血管病变
B. 支气管-肺疾病
C. 神经肌肉疾病
D. 气道阻塞性病变
E. 胸廓与胸膜病变
2. 真题 2010-J063 无高危因素的社区获得性肺炎, 最常见的病原体是()
- A. 支原体
B. 肺炎链球菌
C. 铜绿假单胞菌
D. 葡萄球菌
E. 流感病毒
3. 真题 2010-J073 两侧胸廓呼吸运动减弱见于()
- A. 肺气肿
B. 肺不张
C. 肺炎
D. 胸膜粘连
E. 气胸
4. 模拟题 患者, 男, 59 岁。胸闷气短, 杵状指、桶状胸, 叩诊过清音, 听诊呼吸音减弱、P2 亢进, 胸透见右心室大。最佳的吸氧方式是()
- A. 持续高流量吸氧
B. 持续低流量吸氧
C. 加压给氧
D. 间断高流量吸氧
E. 间断低流量吸氧
5. 真题 2018-Z004 大咯血患者发生窒息时, 首要的护理措施是()
- A. 给予输血
B. 保持气道通畅
C. 给予吸氧
D. 给予止血
E. 应用呼吸机
6. 真题 2010-J084 患者, 男, 春游回家后出现胸闷、气促, 诊断为支气管哮喘, 其发病的原因最可能的是()
- A. 感染
B. 剧烈运动
C. 精神因素
D. 气候变化
E. 吸入过敏原
7. 真题 2010-X011 诊断肺结核的方法中最可靠的是()
- A. 胃液分析
B. 胸部 X 线片
C. 结核菌素试验
D. 红细胞沉降率检查
E. 肺结核菌检查
8. 真题 2010-X022 对阻塞性肺气肿的诊断, 最有价值的是()
- A. 肺活量多于正常
B. 潮气量低于正常
C. PaO_2 下降
D. $PaCO_2$ 升高
E. 残气量占肺总量百分比增加
9. 真题 2010-X026 应用 β_2 受体激动剂控制哮喘发作时, 首选的给药方法是()
- A. 口服法
B. 静脉滴注法
C. 吸入法
D. 肌内注射法
E. 舌下含化法
10. 真题 2018-J008 引起细菌性肺炎最常见的病原菌是()
- A. 肺炎杆菌
B. 肺炎球菌
C. 葡萄球菌
D. 肺炎克雷伯杆菌
E. 白色念珠菌
11. 真题 2010-X030 早期非小细胞肺癌首选的治疗是()
- A. 放疗
B. 化疗
C. 对症治疗
D. 手术治疗
E. 中医中药治疗
12. 真题 2010-X033 下列符合 II 型呼吸衰竭的是()
- A. $PAO_2 > 60\text{mmHg}$, $PACO_2 > 50\text{mmHg}$
B. $PAO_2 > 60\text{mmHg}$, $PACO_2 < 50\text{mmHg}$
C. $PAO_2 < 60\text{mmHg}$, $PACO_2 < 50\text{mmHg}$
D. $PAO_2 < 60\text{mmHg}$, $PACO_2 > 50\text{mmHg}$
E. $PAO_2 = 60\text{mmHg}$, $PACO_2 = 50\text{mmHg}$
13. 真题 2010-X034 肺癌早期诊断简单有效的检查方法是()
- A. X 线检查
B. 痰脱落癌细胞检查
C. 纤维支气管镜检查
D. 淋巴结活组织检查
E. CT 检查
14. 真题 2018-X011 患儿女, 10 岁。由背痛引起脓血症, 血细菌培养, 取血应在()
- A. 任何时间
B. 退烧后
C. 用过抗生素后
D. 出现新转移脓肿时
E. 寒战高热时

15. 真题 2010-X046 痰静置后分三层见于()

- A. 细菌性肺炎
- B. 慢性支气管炎
- C. 支气管扩张
- D. 浸润性肺结核
- E. 支气管肺癌

16. 真题 2018-X012 关于 II 型呼吸衰竭的叙述, 正确的是()

- A. 二氧化碳潴留为主
- B. 低氧血症伴高碳酸血症
- C. 仅仅表现为氧耗量增加
- D. 表现为低氧血症
- E. 缺氧为主

17. 真题 2010-Z004 II 型呼吸衰竭患者的给氧方式应是()

- A. 高压给氧
- B. 间歇给氧
- C. 酒精湿化给氧
- D. 长期给氧
- E. 低浓度持续给氧

18. 真题 2010-Z029 支气管扩张患者咳嗽、咳痰加重多见于()

- A. 傍晚
- B. 白天
- C. 变换体位时
- D. 深夜
- E. 进餐时

19. 真题 2010-Z041 缩唇呼吸的训练目的是()

- A. 加强呼吸运动
- B. 减少呼吸困难
- C. 避免小气道塌陷
- D. 减轻呼吸肌劳累
- E. 减少胸痛

20. 真题 2010-Z047 患者, 男, 72 岁。寒战、高热、咳嗽、咳脓痰 1 周, 阻塞性肺气肿病史 20 年。血气分析: $PAO_2 < 56\text{mmHg}$, $PACO_2 > 60\text{mmHg}$ 。吸氧宜采用()

- A. 呼吸机给氧
- B. 高浓度高流量持续吸氧
- C. 高浓度高流量间歇吸氧
- D. 低浓度低流量持续吸氧
- E. 低浓度低流量间歇吸氧

21. 真题 2010-Z070 患者, 男, 50 岁。肺癌术后化疗, 化疗期间, 白细胞降至 $3 \times 10^9/L$ ($3000/mm^3$) 时。首要的处理是()

- A. 加强营养
- B. 减少化疗药量
- C. 少量输血
- D. 服生血药

E. 暂停化疗

22. 真题 2010-Z078 患者, 男, 18 岁。既往体健, 突然感到右侧胸痛, 胸闷, 呼吸困难不能平卧。查体: 口唇发绀, 右侧胸部膨隆, 肋间隙增宽, 听诊呼吸音减弱, 叩诊呈鼓音。胸片示: 右侧透光度增强。此患者应考虑诊断为()

- A. 肺结核
- B. 自发性气胸
- C. 肺炎球菌肺炎
- D. 原发性支气管肺癌
- E. 慢性支气管炎急性发作期

23. 真题 2010-Z079 患者, 男, 18 岁。既往体健, 突然感到右侧胸痛, 胸闷, 呼吸困难不能平卧。查体: 口唇发绀, 右侧胸部膨隆, 肋间隙增宽, 听诊呼吸音减弱, 叩诊呈鼓音。胸片示: 右侧透光度增强。该患者目前最重要的护理措施是()

- A. 预防感染
- B. 持续低流量吸氧
- C. 遵医嘱使用镇痛药物
- D. 协助进行排气治疗
- E. 指导患者绝对卧床休息

24. 真题 2011-J001 呼吸衰竭的常见诱因是()

- A. 肺部感染
- B. 高热
- C. 心率加快
- D. 血压升高
- E. 进食过多

25. 真题 2017-X020 成人结核最常见的类型是()

- A. 原发型肺结核
- B. 血行播散型肺结核
- C. 继发型肺结核
- D. 结核性胸膜炎
- E. 肺外结核

26. 真题 2018-X020 对体弱的老年慢性阻塞性肺气肿患者的治疗中, 不恰当的是()

- A. 剧烈咳嗽者可用强镇咳剂缓解痛苦
- B. 应给予高蛋白、高维生素饮食
- C. 痰液粘稠者可雾化吸入
- D. 急性发作期要积极抗感染
- E. 病情缓解期可作全身锻炼和呼吸肌锻炼

27. 真题 2011-J011 关于阻塞性肺气肿的病因及发病机制的叙述, 不正确的是()

- A. 由慢性支气管炎演变
- B. 慢性感染
- C. 大气污染
- D. 长期吸烟
- E. 抗蛋白酶增多

28. 真题 2011-J023 大叶性肺炎常见的致病菌是()

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 肺炎球菌
- C. 大肠杆菌
- D. 绿脓杆菌
- E. 克雷白杆菌

29. 真题 2017-J023 急性上呼吸道感染最常见的病菌是()

- A. 病毒
- B. 细菌
- C. 衣原体
- D. 真菌
- E. 支原体

30. 真题 2018-X038 关于结核病药物的治疗原则, 不正确的叙述是()

- A. 规律用药
- B. 早期治疗
- C. 酌情停药
- D. 联合用药
- E. 剂量适宜

31. 真题 2011-J047 关于急性上呼吸道感染的描述, 错误的是()

- A. 普通感冒常有高热、畏寒
- B. 普通感冒以鼻咽部症状为主
- C. 急性病毒性咽炎时以咽部发痒和烧灼感为主
- D. 急性病毒性喉炎时以声音嘶哑为主
- E. 细菌性咽-扁桃体炎时扁桃体常有脓性渗出物

32. 真题 2011-J065 患者, 女, 10 岁。给宠物犬洗澡后即出现咳嗽、咳痰伴喘息发作, 诊断为哮喘。引起该患者哮喘发作最可能的过敏原是()

- A. 花粉
- B. 尘螨
- C. 毛屑
- D. 病毒感染
- E. 细菌感染

33. 真题 2017-X025 协助拍背的手法是()

- A. 五指握拳, 用力叩打
- B. 五指并拢, 稍向内合拳, 由上向下, 由外向内的轻拍背部
- C. 五指并拢, 稍向内合拳, 由下向上, 由外向内的轻拍背部
- D. 五指并拢, 稍向内合拳, 由下向上, 由内向外的轻拍背部
- E. 五指握拳, 稍向内合拳, 由上向下, 由内向外的轻拍背部

34. 真题 2017-S025 气管内吸痰一次吸引时间不宜超过 15s, 其主要原因是()

- A. 引起病人缺氧和发绀
- B. 吸痰器工作时间过长易损坏
- C. 吸痰管通过痰液过多易阻塞

- D. 引起病人刺激性呛咳造成不适
- E. 吸痰用托盘暴露时间过久造成细菌感染

35. 真题 2011-J082 患者, 男, 67 岁。以慢性支气管并发慢性阻塞性肺气肿入院。于一阵干咳后突感左上胸剧烈刺痛, 出现明显呼吸困难, 不能平卧。听诊左肺呼吸音明显减弱。应考虑为()

- A. 自发性气胸
- B. 急性心肌梗死
- C. 急性肺炎
- D. 渗出性胸膜炎
- E. 肺栓塞

36. 真题 2017-J026 引起疱疹性咽峡炎的病原体是()

- A. 轮状病毒
- B. 埃可病毒
- C. 柯萨奇病毒 A 组
- D. 腺病毒 3 型、7 型
- E. 合胞病毒

37. 真题 2018-J026 支气管哮喘反复发作的关键因素是()

- A. 气道变应性炎症
- B. 缺氧
- C. 感染
- D. 免疫缺陷
- E. 精神紧张

38. 真题 2011-X017 对放射疗法最敏感的肺癌类型是()

- A. 鳞癌
- B. 腺癌
- C. 小细胞癌
- D. 大细胞癌
- E. 黏液癌

39. 真题 2011-X024 结核菌素试验结果观察的时间是注射后()

- A. 20 分钟
- B. 1 小时
- C. 6-12 小时
- D. 24-36 小时
- E. 48-72 小时

40. 模拟题 右上胸叩诊呈实音多考虑()

- A. 气胸
- B. 轻度胸膜炎
- C. 大空洞
- D. 肺部炎症
- E. 正常

41. 真题 2018-J060 自发性气胸常继发于()

- A. 原发性支气管肺癌
- B. 支气管扩张症
- C. 慢性阻塞性肺疾病

- D. 肺炎球菌肺炎
- E. 支气管哮喘

42. 真题 2018-X029 支气管肺炎的 X 线表现特点是()

- A. 多发小脓肿
- B. 小玻璃片状阴影
- C. 网状结节样阴影
- D. 粟粒状阴影
- E. 斑片状阴影

43. 真题 2011-X025 诊断呼吸衰竭最主要的依据是()

- A. 原发病史
- B. 呼吸困难的临床症状
- C. 缺氧和二氧化碳潴留的体征
- D. 排除引起呼吸困难的有关疾病
- E. 血气分析

44. 真题 2011-X027 肺炎链球菌肺炎首选的治疗药物是()

- A. 头孢霉素
- B. 可待因
- C. 青霉素 G
- D. 安痛定
- E. 红霉素

45. 真题 2011-X032 符合 II 型呼吸衰竭血气分析的结果是()

- A. $\text{PaO}_2 > 60\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 < 50\text{mmHg}$
- B. $\text{PaO}_2 > 60\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$
- C. $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$
- D. $\text{PaO}_2 > 60\text{mmHg}$, 动脉血氧饱和度 $> 75\%$
- E. $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$, 动脉血氧饱和度 $> 75\%$

46. 真题 2011-X038 确诊肺结核最特异的方法是()

- A. CT 检查
- B. X 线检查
- C. 结核菌素试验
- D. 痰结核分枝杆菌检查
- E. 纤维支气管镜检查

47. 真题 2011-Z010 治疗阻塞性肺气肿时强调低流量吸氧的理由主要是()

- A. 流量高低一样
- B. 高流量氧对肺实质有毒性作用
- C. 高流量氧抑制黏膜细胞纤毛运动
- D. 高流量氧抑制呼吸中枢
- E. 高流量氧引起支气管痉挛

48. 真题 2017-Z034 患者男, 50 岁。肺癌术后化疗, 化疗期间, 白细胞降至 $3 \times 10^9/\text{L}$ 时, 首要的处理是()

- A. 加强营养
- B. 减少化疗药量
- C. 少量输血
- D. 服生血药

E. 暂停化疗, 通知医生

49. 真题 2018-X034 关于支气管扩张症, 错误的叙述是()

- A. 大多数支气管扩张症患者咳黄绿色痰, 痰液静置后可分层
- B. 干性支气管扩张症主要为反复咯血, 可无慢性咳嗽、咳痰
- C. 支气管扩张症并非一种独立的疾病, 其病因可为一种或多种病因同时存在
- D. 纤维支气管镜可以有助于明确诊断支气管扩张症
- E. 支气管扩张症好发部位以左肺多于右肺

50. 真题 2011-Z015 支气管哮喘发作时的呼吸形态是()

- A. 潮式呼吸
- B. 吸气性呼吸困难
- C. 呼气性呼吸困难
- D. 混合性呼吸困难
- E. 间歇呼吸

51. 真题 2017-J035 患者男, 64 岁。慢性支气管炎 8 年, 高血压 3 年。今晨排便时, 突感右胸刀割样疼痛, 随即胸闷、呼吸困难, 最可能的原因是()

- A. 低血压
- B. 急性胸膜炎
- C. 急性心包炎
- D. 自发性气胸
- E. 心脏神经官能症

52. 真题 2011-Z024 引起慢性肺源性心脏病患者死亡的首要原因是()

- A. 肺性脑病
- B. 心力衰竭
- C. 消化道出血
- D. 电解质紊乱
- E. 弥散性血管内凝血

53. 真题 2016-J058 呼气性呼吸困难的病因是()

- A. 气管异物
- B. 大气管肿瘤
- C. 大片肺实变
- D. 小支气管痉挛
- E. 大量胸腔积液

54. 真题 2011-Z031 肺炎链球菌肺炎的体征是()

- A. 急性病容、呼吸浅快、口唇青紫
- B. 慢性病容、呼吸浅慢、口唇苍白
- C. 急性病容、呼吸急促、面色潮红
- D. 慢性病容、呼吸深慢、口唇青紫
- E. 慢性病容、呼吸缓慢、面色潮红

55. 真题 2017-Z038 应用异烟肼进行预防性化疗的疗程是()

- A. 1~3 个月

- B. 3~6个月
- C. 6~9个月
- D. 9~12个月
- E. 12~18个月

56. 真题 2011-Z077 患者,男,30岁。长期咳嗽、咳痰8年,心悸气急2年,3天前受凉咳嗽、咳痰加重,咳脓性痰,呼吸困难不能平卧,伴发热、烦躁。查体:神志模糊,嗜睡,明显发绀,颈静脉充盈,桶状胸,双下肢轻度水肿,肝颈静脉回流征阳性,三尖瓣区收缩期杂音,双肺广泛湿啰音。血气分析: pH7.56, PaCO₂ 60mmHg, PaO₂ 49mmHg。此患者最可疑的诊断是()

- A. 慢性支气管炎
- B. 肺炎球菌肺炎
- C. 支气管扩张
- D. 支气管哮喘
- E. 慢性肺源性心脏病

57. 真题 2013-X006 咯血窒息处理首先应()

- A. 加压吸氧
- B. 输血
- C. 注射止血剂
- D. 清除呼吸道内血块
- E. 进行人工呼吸

58. 真题 2011-Z078 患者,男,30岁。长期咳嗽、咳痰8年,心悸气急2年,3天前受凉咳嗽、咳痰加重,咳脓性痰,呼吸困难不能平卧,伴发热、烦躁。查体:神志模糊,嗜睡,明显发绀,颈静脉充盈,桶状胸,双下肢轻度水肿,肝颈静脉回流征阳性,三尖瓣区收缩期杂音,双肺广泛湿啰音。血气分析: pH7.56, PaCO₂ 60mmHg, PaO₂ 49mmHg。此时患者出现的并发症是()

- A. 休克
- B. 肺性脑病
- C. 脑血管意外
- D. 感染中毒性脑病
- E. 弥散性血管内凝血

59. 真题 2011-Z079 患者,男,30岁。长期咳嗽、咳痰8年,心悸气急2年,3天前受凉咳嗽、咳痰加重,咳脓性痰,呼吸困难不能平卧,伴发热、烦躁。查体:神志模糊,嗜睡,明显发绀,颈静脉充盈,桶状胸,双下肢轻度水肿,肝颈静脉回流征阳性,三尖瓣区收缩期杂音,双肺广泛湿啰音。血气分析: pH7.56, PaCO₂ 60mmHg, PaO₂ 49mmHg。此患者目前最重要的护理措施是()

- A. 改善通气和低流量吸氧
- B. 遵医嘱正确给予抗感染治疗
- C. 注重患者的营养摄入
- D. 协助患者呼吸训练
- E. 注重患者的心理护理

60. 真题 2011-Z099 肺炎球菌肺炎患者其痰液呈()

- A. 黏液痰
- B. 铁锈色痰

- C. 大量脓痰分三层
- D. 痰恶臭
- E. 大量粉红色泡沫痰

61. 真题 2017-X043 吸气性呼吸困难见于()

- A. 气胸
- B. 肺气肿
- C. 气管异物
- D. 胸腔积液
- E. 支气管哮喘

62. 真题 2011-Z100 支气管扩张患者其痰液呈()

- A. 黏液痰
- B. 铁锈色痰
- C. 大量脓痰分三层
- D. 痰恶臭
- E. 大量粉红色泡沫痰

63. 真题 2013-J022 自发性气胸常继发于()

- A. 大叶性肺炎
- B. 肺癌
- C. 肺结核
- D. 支气管哮喘
- E. 肺脓肿

64. 真题 2013-J026 急性上呼吸道感染最常见的病因是()

- A. 病毒
- B. 细菌
- C. 衣原体
- D. 真菌
- E. 支原体

65. 真题 2017-Z046 患者男,45岁。慢性咳嗽、咳痰3年多,冬重夏轻,3天前咳嗽加重,咳黄痰。查体:双肺散在干、湿啰音,心脏正常。实验室检查: WBC11×10⁹/L。胸片示:双肺中下肺野纹理增强,最可能的诊断是()

- A. 支气管哮喘
- B. 慢性支气管炎
- C. 支气管扩张
- D. 细菌性肺炎
- E. 支气管肺癌

66. 真题 2013-J044 慢性肺心病发病的关键环节是()

- A. 气管阻塞
- B. 肺泡膨大
- C. 右室肥大
- D. 肺动脉高压
- E. 右房肥大

67. 真题 2017-Z047 患者男,45岁。慢性咳嗽、咳痰3年多,冬重夏轻,3天前咳嗽加重,咳黄痰。查体:双肺散在干、湿啰音,心脏正常。实验室检查: WBC11×10⁹/L。胸片示:双肺中下肺野纹理增强,目前最重要的

护理措施是()

- A. 有效控制呼吸道感染
- B. 合理用氧
- C. 协助患者呼吸训练
- D. 注重患者营养摄入
- E. 注意患者的心理护理

68. 真题 2015-Z042 金属音调咳嗽提示的疾病是()

- A. 支气管哮喘
- B. 慢性支气管炎
- C. 肺气肿
- D. 肺癌
- E. 心脏病

69. 真题 2017-X048 患者女, 29 岁。患支气管扩张 10 年, 咳嗽、咳脓性痰, 痰量 50ml/d。下列处理不正确的是()

- A. 体位引流
- B. 加强营养
- C. 长期应用抗生素
- D. 给予祛痰剂
- E. 给予雾化吸入

70. 真题 2017-Z048 患者男, 45 岁。慢性咳嗽、咳痰 3 年多, 冬重夏轻, 3 天前咳嗽加重, 咳黄痰。查体: 双肺散在干、湿啰音, 心脏正常。实验室检查: WBC $11 \times 10^9/L$ 。胸片示: 双肺中下肺野纹理增强, 最常发生的并发症是()

- A. 呼吸功能衰竭
- B. 支气管扩张
- C. 慢性肺源性心脏病
- D. 慢性阻塞性肺气肿
- E. 肺间质纤维化

71. 真题 2013-J050 支气管哮喘反复发作的因素是()

- A. 缺氧
- B. 感染
- C. 免疫缺陷
- D. 精神紧张
- E. 气道变应性炎症

72. 真题 2017-J049 引起 2 型呼衰最常见的诱因是()

- A. 过度劳累
- B. 精神紧张
- C. 呼吸道感染
- D. 营养不良
- E. 长期吸烟

73. 真题 2015-Z043 不属于肺癌的肺外表现的是()

- A. 女性闭经
- B. 重症肌无力
- C. 库欣综合征
- D. 骨关节病综合征
- E. 多发性肌肉神经痛

74. 真题 2013-X055 支气管肺炎区别于支气管炎的关键是()

- A. 咳嗽、气促
- B. 发热、频咳
- C. 呼吸音减弱
- D. 白细胞增高
- E. 两肺细湿性啰音

75. 真题 2018-J051 社区获得性肺炎中常见的是()

- A. 军团菌肺炎
- B. 肺炎球菌肺炎
- C. 衣原体肺炎
- D. 支原体肺炎
- E. 革兰阴性杆菌肺炎

76. 真题 2013-Z003 符合慢性阻塞性肺气肿的体征是()

- A. 叩诊呈鼓音
- B. 单侧语颤减弱
- C. 单侧呼吸运动减弱
- D. 气管偏移
- E. 呼吸时间延长

77. 真题 2013-Z006 支气管扩张患者痰的特点是()

- A. 黄果冻样
- B. 大量浓痰久置分 3 层
- C. 铁锈色
- D. 绿色
- E. 粉红色

78. 真题 2017-J053 结核菌素试验过注射部位应在前臂掌侧面()

- A. 中上 1/3 交界处皮内注射
- B. 中下 1/3 交界处皮内注射
- C. 中上 1/3 交界处皮下注射
- D. 中下 1/3 交界处皮下注射
- E. 中上 1/3 交界处肌内注射

79. 真题 2011-S051 患者, 女, 66 岁。患者因胸闷气短, 杵状指, 桶状胸, 叩诊过清音, 听诊呼吸音减弱, P2 亢进, 胸透见右心室大。最佳的吸氧方式是()

- A. 持续高流量吸氧
- B. 间断中流量吸氧
- C. 持续低流量吸氧
- D. 间断高流量吸氧
- E. 间断低流量吸氧

80. 真题 2013-Z008 对改善早期肺气肿症状具有重要意义的措施是()

- A. 预防呼吸道感染
- B. 戒烟
- C. 去除外界刺激因素
- D. 呼吸功能锻炼
- E. 体位引流

81. 真题 2017-J055 肺源性心脏病肺动脉高压形成的最主要因素是()

- A. 肺部毛细血管床减少
- B. 血液粘稠度增加
- C. 血容量增加
- D. 肺部毛细血管网微小栓子形成
- E. 肺小血管收缩痉挛

82. 真题 2013-Z009 支气管哮喘发作时以下护理措施不妥的是()

- A. 限制水摄入
- B. 半坐位
- C. 专人护理
- D. 遵医嘱给予解痉药物
- E. 吸氧

83. 真题 2017-J056 患者男, 37 岁, 平素体健, 淋雨后突发寒战高热咳嗽, 咳铁锈色痰。X 线胸片示右肺中叶呈均匀一致的致密阴影。引发患者肺部病变最可能的病原体是()

- A. 病毒
- B. 细菌
- C. 真菌
- D. 衣原体
- E. 支原体

84. 真题 2018-J056 导致急性呼吸衰竭的病因不包括()

- A. 气胸
- B. 脑出血
- C. 阻塞性肺气肿
- D. 重症肌无力
- E. 大量胸腔积液

85. 真题 2013-Z010 一老年患者以肺气肿、II 型呼吸衰竭收入院, 入院第一天晚上, 因咳嗽、痰多、呼吸困难, 并对医院环境不适应而不能入睡, 不正确的护理措施是()

- A. 给镇咳和镇静药, 帮助入睡
- B. 减少夜间操作, 保证患者睡眠
- C. 给低流量持续吸氧
- D. 减少白天睡眠时间和次数
- E. 和患者一同制定白天活动计划

86. 真题 2013-Z092 肺炎链球菌肺炎患者其痰液呈()

- A. 黏液痰
- B. 铁锈色痰
- C. 大量浓痰分 3 层
- D. 痰恶臭
- E. 大量粉红色泡沫痰

87. 真题 2013-Z093 气管扩张症患者其痰液呈()

- A. 黏液痰
- B. 铁锈色痰
- C. 大量浓痰分 3 层

- D. 痰恶臭
- E. 大量粉红色泡沫痰

88. 真题 2014-J020 呼吸系统疾病最常见的症状是()

- A. 咳嗽、咳痰
- B. 呼吸困难
- C. 咯血
- D. 胸痛
- E. 水肿

89. 真题 2014-J023 关于阻塞性肺气肿的病因及发病机制, 不正确的是()

- A. 由慢性支气管炎演变
- B. 慢性感染
- C. 大气污染
- D. 长期抽烟
- E. 抗胰蛋白酶增多

90. 真题 2018-J061 患儿女, 10 岁。给宠物犬洗澡后即出现咳嗽、咳痰伴喘息发作, 诊断为哮喘。引起该患儿哮喘发作最可能的过敏原是()

- A. 毛屑
- B. 细菌感染
- C. 病毒感染
- D. 尘螨
- E. 花粉

91. 真题 2014-J032 咳大量浓痰静置后分 3 层的疾病是()

- A. 支气管扩张
- B. 肺结核
- C. 肺炎球菌肺炎
- D. 渗出性胸膜炎
- E. 支气管哮喘

92. 真题 2017-X062 属于一线抗结核药物的是()

- A. 氨硫脲
- B. 吡嗪酰胺
- C. 卡那霉素
- D. 乙胺丁醇
- E. 对氨基水杨酸钠

93. 真题 2014-J064 支气管哮喘的发生与气道的变态反应性炎症有关, 参与此过程的细胞不包括()

- A. 肥大细胞
- B. 嗜酸性粒细胞
- C. 红细胞
- D. 中性粒细胞
- E. 巨噬细胞

94. 真题 2014-J065 患者, 男, 37 岁, 平素体健。淋雨后突发寒战、高热、咳嗽、咳铁锈色痰。X 胸片示右肺中叶呈均匀一致的致密阴影, 引发患者肺部病变最可能的病原体是()

- A. 病毒

- B. 细菌
- C. 真菌
- D. 衣原体
- E. 支原体

95. 真题 2018-Z064 慢性肺源性心脏病患者发生右心衰水肿时, 运用利尿药物正确的是()

- A. 宜用速效排钾利尿药
- B. 全程全量使用
- C. 短疗程、小剂量使用
- D. 绝对禁忌使用排钾利尿药
- E. 不能使用

96. 真题 2014-J088 患者, 男, 58 岁。因屏气用力提物而突发胸部剧烈疼痛, 继而出现呼吸困难, 诊断为自发性气胸, 而自发性气胸常继发于()

- A. 支气管哮喘
- B. 支气管扩张症
- C. 肺炎球菌性肺炎
- D. 原发性支气管肺癌
- E. 慢性阻塞性肺疾病

97. 真题 2017-J065 患者男, 42 岁。吸烟 15 年, 咳嗽, 咳痰 8 个月, 近一个月来加重并伴痰中带血 1 周, 胸部 X 线示: 右肺块状阴影, 边缘不清, 周围有毛刺。患者最可能的临床诊断是()

- A. 肺结核
- B. 支气管扩张
- C. 肺癌
- D. 纵膈肿瘤
- E. 肺部炎症

98. 真题 2014-X026 测定人体是否感染过结核菌, 最有效的方法是()

- A. 纤维支气管镜检查
- B. PPD 试验
- C. X 线检查
- D. CT 检查
- E. 痰结核菌检查

99. 真题 2014-X078 男, 28 岁。自感低热、乏力、食欲不振, 有盗汗、体重下降、呼吸困难、胸痛等表现, 就医诊断为浸润型肺结核, 收入院抗结核治疗。关于疾病防治及护理措施不妥的是()

- A. 患者痰液用 20% 漂白粉溶液搅拌静置 2 小时后倒掉
- B. 护士在病室里不密切接触患者时, 可不戴口罩
- C. 病室每日用紫外线照射进行空气消毒
- D. 给予异烟肼、链霉素治疗
- E. 病室通向走廊的窗子需关闭

100. 真题 2014-X079 男, 28 岁。自感低热、乏力、食欲不振, 有盗汗、体重下降、呼吸困难、胸痛等表现, 就医诊断为浸润型肺结核, 收入院抗结核治疗。经何种检查可确定患者具有传染性()

- A. PPD 试验强阳性
- B. 痰涂片找到结核菌
- C. 胸腔穿刺抽出 1000ml 胸腔积液
- D. X 线检查示片絮状阴影
- E. 红细胞沉降率 30mm/h

101. 真题 2018-Z068 肺癌早期最常见的症状是()

- A. 反复咯血
- B. 呼吸困难
- C. 胸痛
- D. 刺激性干咳
- E. 发热

102. 真题 2014-Z005 普通感冒的主要临床表现是()

- A. 喉炎症
- B. 肺泡炎症
- C. 胸膜炎症
- D. 支气管炎
- E. 鼻咽部炎症

103. 真题 2018-X069 应用 β_2 受体激动剂控制哮喘发作时首选的给药方法是()

- A. 肌注法
- B. 口服法
- C. 舌下含化法
- D. 静滴法
- E. 吸入法

104. 真题 2018-Z069 患者男, 24 岁。瘦高体型。于傍晚打篮球后一阵剧烈咳嗽。突感左侧胸部针刺样疼痛, 随即感到胸闷、呼吸困难, 诊断为自发性气胸。该患者适合采取的体位为()

- A. 健侧卧位
- B. 患侧卧位
- C. 仰卧位
- D. 半坐位
- E. 平卧位

105. 真题 2014-Z026 II 型呼吸衰竭患者维持呼吸中枢的兴奋主要依靠()

- A. CO_2 对呼吸中枢的刺激
- B. CO_2 对外周化学感受器的刺激
- C. 缺氧对呼吸中枢的刺激
- D. 缺氧对外周化学感受器的刺激
- E. 缺氧和 CO_2 对呼吸中枢的刺激

106. 真题 2014-Z028 中枢性呼吸衰竭的突出症状是()

- A. 呼吸频率加快
- B. 鼻翼扇动
- C. 三凹征阳性
- D. 呼吸节律紊乱
- E. 呼吸表浅

107. 真题 2017-J071 支气管哮喘的发生与气道的变态反应性炎症有关, 参与此过程的细胞不包括()

- A. 肥大细胞
- B. 嗜酸性粒细胞
- C. 红细胞
- D. 中性粒细胞
- E. 巨噬细胞

108. 真题 2014-Z035 慢性支气管炎发展为阻塞性肺气肿突出的症状为()

- A. 反复咳嗽, 进行性加剧
- B. 反复感染, 咯血
- C. 发热、咳嗽、咳脓痰
- D. 呼吸困难、咳大量脓痰
- E. 逐渐加重的呼吸困难

109. 真题 2014-Z037 左下肺叶支气管扩张患者, 体位引流时应采取的体位是()

- A. 平卧位
- B. 头低俯卧位
- C. 头低仰卧位
- D. 头低左侧卧位
- E. 头低右侧卧位

110. 真题 2017-X073 慢性支气管炎急性发作期病人的主要治疗是()

- A. 吸氧
- B. 控制感染
- C. 卧床休息
- D. 祛痰
- E. 镇咳

111. 真题 2014-Z040 按吸气性呼吸困难的轻重, 临床上将喉梗阻分为()

- A. 2 度
- B. 3 度
- C. 4 度
- D. 5 度
- E. 6 度

112. 真题 2018-J074 慢性肺心病最常见的病因是()

- A. 支气管哮喘
- B. 慢性纤维空洞型肺结核
- C. 尘肺
- D. 慢性阻塞性肺疾病
- E. 弥漫性支气管扩张

113. 真题 2014-Z048 目前控制哮喘最有效的药物是()

- A. β_2 受体激动剂
- B. 糖皮质激素
- C. 抗胆碱能药物
- D. 茶碱类
- E. 肥大细胞膜稳定剂

114. 真题 2014-Z059 男性, 58 岁, 20 年吸烟史。刺激性咳嗽并痰中带血丝 6 个月。胸片示左肺中央型块影, 右肺上叶不张, 左胸腔中量积液, 右纵隔阴影增宽, 轮

廓呈波浪形。为确诊, 进一步检查首选()

- A. 胸部 CT
- B. 剖胸探查
- C. 胸腔镜检查
- D. 支气管镜检查
- E. E. 经胸壁穿刺活组织检查

115. 模拟题 急性肺水肿患者吸氧时应给予的湿化液是()

- A. 冷开水
- B. 温开水
- C. 20%~30%的乙醇
- D. 75%的乙醇
- E. 95%的乙醇

116. 真题 2014-Z071 患者, 男性, 60 岁。咳嗽 2 个月, 以干咳为主, 有午后低热, 今上午突然咯血 400ml 来院急诊。咯血时, 患者应采取的体位是()

- A. 端坐位
- B. 仰卧位
- C. 俯卧位
- D. 健侧卧位
- E. 患侧卧位

117. 真题 2014-Z072 患者, 男性, 60 岁。咳嗽 2 个月, 以干咳为主, 有午后低热, 今上午突然咯血 400ml 来院急诊。对此患者的病情观察, 尤其要密切注意()

- A. 体温变化
- B. 脉搏变化
- C. 呼吸变化
- D. 有无窒息先兆
- E. 有无休克早期表现

118. 真题 2014-Z073 患者, 男性, 60 岁。咳嗽 2 个月, 以干咳为主, 有午后低热, 今上午突然咯血 400ml 来院急诊。止血处理首选()

- A. 输血
- B. 建立人工气道
- C. 垂体后叶素静脉滴注
- D. 安络血
- E. 云南白药+安络血

119. 真题 2014-Z074 患者, 男性, 60 岁。咳嗽 2 个月, 以干咳为主, 有午后低热, 今上午突然咯血 400ml 来院急诊。观察此患者, 如果出现下列哪种情况, 提示病情严重, 应加强护理()

- A. 低热、盗汗
- B. 疲乏无力
- C. 食欲不振
- D. 脉搏快速、呼吸急促
- E. 胸闷、胸痛、咳嗽

120. 真题 2015-X015 应用 β_2 受体激动剂控制哮喘发作时, 首选的给药方法是()

- A. 口服法

- B. 静脉滴注法
- C. 吸入法
- D. 肌内注射法
- E. 舌下含化法

121. 真题 2015-X019 结核菌素试验强阳性 (+++) 的表现是()

- A. 平均直径在 0~5mm
- B. 红硬, 平均直径在 5~9mm
- C. 红硬, 平均直径在 10~19mm
- D. 红硬, 平均直径在 ≥20mm
- E. 红硬, 平均直径在 7~13mm

122. 真题 2015-X020 关于结核病药物的治疗原则, 不正确的叙述是()

- A. 早期治疗
- B. 剂量适宜
- C. 联合用药
- D. 酌情停药
- E. 规律用药

123. 真题 2015-X024 触觉语颤增强见于()

- A. 大叶性肺炎
- B. 阻塞性肺不张
- C. 肺气肿
- D. 气胸
- E. 大量胸膜腔积液

124. 真题 2015-X060 符合阻塞性肺气肿的肺功能检查结果是()

- A. 潮气量增加
- B. 肺活量增加
- C. 肺总量减少
- D. 残气量增加
- E. 第 1 秒用力呼气量增加

125. 真题 2015-X075 患者, 男, 21 岁。淋雨后突然寒战、高热, 咳嗽。查血 WBC 总数 $18 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 90%, 其原因是()

- A. 病毒感染
- B. 阿米巴感染
- C. 结核菌感染
- D. 细菌感染
- E. 幽门螺杆菌感染

126. 真题 2015-X082 患者, 男, 65 岁。慢性支气管肺炎 10 余年, 近 1 个月来出现进行性呼吸困难, 晨起咳嗽严重, 痰量较多, 呈脓性。查体: 肺部可闻及啰音, 呼吸音减弱。为进一步明确诊断, 辅助检查不包括()

- A. 血象检查
- B. 胸部 X 线
- C. 胃肠钡餐
- D. 痰液检查
- E. 肺功能检查

127. 真题 2015-X086 患者, 男, 18 岁。自儿童时期起哮喘即反复发作, 昨天上午因受凉感冒而致哮喘再次发作, 目前控制哮喘发作最有效的抗炎药是()

- A. 茶碱类
- B. 色甘酸钠
- C. 抗胆碱能药
- D. 糖皮质激素
- E. β_2 受体激动剂

128. 真题 2015-X088 患者, 女, 38 岁。咳嗽、咳痰 5 年余。近 1 个月来咳嗽、咳痰加重, 伴有多次咯血, 咳嗽在晨起或夜间卧床时加重, 痰量多时可达 400ml, 静置后可分为三层。该患者典型的 X 线表现为()

- A. 两肺透亮度增加
- B. 肺纹理增多、紊乱
- C. 边界毛糙的结节状阴影
- D. 肺段或肺叶淡薄、均匀阴影
- E. 不规则蜂窝状透亮阴影或沿支气管的卷发状阴影

129. 真题 2017-S090 超声波雾化吸入器连续使用时, 中间需间隔的时间是()

- A. 0.5 小时
- B. 1 小时
- C. 1.5 小时
- D. 2 小时
- E. 3 小时

130. 真题 2015-J006 可杀灭结核分枝杆菌的条件是()

- A. 放在阴湿处 2 小时
- B. 烈日暴晒 2 小时
- C. 水浸泡数分钟
- D. 放在通风处 2 小时
- E. 放在阴凉干燥处 2 小时

131. 真题 2017-S091 手压式雾化吸入治疗, 两次用药间隔的时间不少于()

- A. 0.5 小时
- B. 1 小时
- C. 1.5 小时
- D. 2 小时
- E. 3 小时

132. 真题 2015-J014 引起 II 型呼吸衰竭最常见的诱因是()

- A. 过度劳累
- B. 精神紧张
- C. 呼吸道感染
- D. 营养不良
- E. 消化道出血

133. 真题 2015-J016 急性上呼吸道感染最常见的病因是()

- A. 病毒
- B. 细菌
- C. 衣原体

- D. 真菌
- E. 支原体

134. 真题 2015-J030 慢性肺心病发病的关键环节是()

- A. 气管阻塞
- B. 肺泡膨大
- C. 右心室肥大
- D. 肺动脉高压
- E. 右心房肥大

135. 真题 2015-J036 痰呈黄色提示肺部感染的病原菌是()

- A. 肺炎球菌
- B. 军团菌
- C. 铜绿假单胞菌
- D. 葡萄球菌
- E. 厌氧菌

136. 真题 2015-J057 提示哮喘患者病情严重的情况是()

- A. 大汗淋漓
- B. 张口呼吸
- C. 出现奇脉
- D. 发绀
- E. 哮鸣音减弱或消失

137. 真题 2015-J075 患者,男,67岁。以慢性支气管炎并发慢性阻塞性肺气肿入院。于一阵干咳后突感左上胸剧烈刺痛,出现明显呼吸困难,不能平卧,听诊左肺呼吸音明显减弱。应考虑为()

- A. 自发性气胸
- B. 急性心肌梗死
- C. 急性肺炎
- D. 渗出性胸膜炎
- E. 肺栓塞

138. 真题 2015-J078 患者,男,52岁。因为“胸痛、痰中带血1个月”入院。X线检查显示右肺上叶有一个不规则肿块。为明确诊断最可能的检查是()

- A. CT检查
- B. 核磁共振检查
- C. 痰细胞学检查
- D. 癌相关抗原检查
- E. 纤维支气管镜检查

139. 真题 2015-Z023 支气管扩张患者的痰液是()

- A. 白黏痰
- B. 铁锈色痰
- C. 黄绿色痰
- D. 分层痰
- E. 暗红色胶冻样痰

140. 真题 2015-Z044 易合并脓胸的肺炎是()

- A. 支原体肺炎

- B. 腺病毒肺炎
- C. 白色假丝酵母菌肺炎
- D. 呼吸道合胞病毒肺炎
- E. 金黄色葡萄球菌肺炎

141. 真题 2015-Z048 患者,男,32岁。咳嗽、咳脓痰1年,间断咯血,量少。查体:背部可闻及湿性啰音,有杵状指。首先考虑的诊断应是()

- A. 肺结核
- B. 支气管扩张
- C. 肺癌
- D. COPD
- E. 肺脓肿

142. 真题 2016-J003 呼吸衰竭的常见诱因是()

- A. 肺部感染
- B. 高热
- C. 心率加快
- D. 血压升高
- E. 进食过多

143. 真题 2016-J026 社区获得性肺炎中常见的是()

- A. 支原体肺炎
- B. 肺炎球菌肺炎
- C. 军团菌肺炎
- D. 衣原体肺炎
- E. 革兰阴性杆菌肺炎

144. 真题 2016-J053 慢性呼吸衰竭对机体的影响不包括()

- A. 肺性脑病
- B. 上消化道出血
- C. 心律失常
- D. 左心衰竭
- E. 脑水肿

145. 真题 2016-J066 患儿女,10岁。给宠物犬洗澡后即出现咳嗽、咳痰伴喘息发作,诊断为哮喘。引起该患儿哮喘发作最后可能的过敏原是()

- A. 花粉
- B. 尘螨
- C. 毛屑
- D. 病毒感染
- E. 细菌感染

146. 真题 2016-X016 预防运动和过敏原诱发的哮喘最有效的药物是()

- A. 氨茶碱
- B. 异丙基阿托品
- C. 沙丁胺醇
- D. 乙胺丁醇
- E. 色甘酸钠

147. 真题 2016-X021 支气管扩张合并咯血时治疗一般不主张应用()

- A. 抗生素
- B. 止血药
- C. 镇咳药
- D. 镇静药
- E. 支气管舒张药

148. 真题 2016-X028 慢性呼吸衰竭患者出现的最早最突出的症状是()

- A. 发绀
- B. 呼吸困难
- C. 精神神经症状
- D. 其他器官损害
- E. 心血管系统症状

149. 真题 2016-Z009 支气管肺癌最常见的早期症状是()

- A. 阵发性刺激性干咳
- B. 发热
- C. 持续性痰中带血
- D. 血性胸水形成
- E. 胸痛

150. 真题 2016-Z023 阻塞性肺气肿的并发症不包括()

- A. 自发性气胸
- B. 肺部急性感染
- C. 慢性肺源性心脏病
- D. 呼吸衰竭
- E. 急性左心衰竭

151. 真题 2016-Z024 自发性气胸典型的临床表现是()

- A. 咳嗽, 咳痰, 咯血
- B. 胸痛, 干咳, 呼吸困难
- C. 胸痛, 干咳, 咯血
- D. 咳痰, 咯血, 呼吸困难
- E. 伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难

152. 真题 2016-Z029 发生大咯血时病人应当()

- A. 咳嗽
- B. 屏气
- C. 少量流质饮食
- D. 绝对卧床
- E. 多交谈

153. 真题 2016-Z061 患者女, 40岁。咳嗽10余年, 经常于感冒后加重, 咳大量脓痰, 3天前突然咯血150ml, 查体: 心肺无明显阳性体征, X线胸片示双肺下野肺纹理增多。最可能的诊断是()

- A. 慢性支气管炎
- B. 慢性肺脓肿
- C. 支气管肺癌
- D. 支气管内膜结核
- E. 支气管扩张症

154. 模拟题 吸气性呼吸困难发生的机制是()

- A. 上呼吸道狭窄
- B. 细小支气管狭窄
- C. 呼吸面积减少
- D. 肺纤维化
- E. 呼吸中枢受损

155. 模拟题 胸部触觉语颤增强见于()

- A. 肺水肿
- B. 肺淤血
- C. 气胸
- D. 肺空洞
- E. 肺实变

156. 模拟题 大量咯血指()

- A. 24小时咯血量大于100ml
- B. 24小时咯血量大于200ml
- C. 24小时咯血量大于300ml
- D. 24小时咯血量大于400ml
- E. 24小时咯血量大于500ml

157. 模拟题 大咯血时最危险的并发症是()

- A. 出血性休克
- B. 贫血
- C. 肺不张
- D. 肺部感染
- E. 窒息

158. 模拟题 下列各种心脏病中红细胞绝对增多的是()

- A. 病毒性心肌炎
- B. 贫血性心脏病
- C. 急性心肌梗死
- D. 肺源性心脏病
- E. 心律失常

159. 模拟题 静脉注射氨茶碱速度过快可能会出现()

- A. 呼吸减慢
- B. 心律失常、血压下降
- C. 尿量减少
- D. 胃肠道不适
- E. 皮疹

160. 模拟题 患者, 男, 28岁。以突然畏寒、高热、咳嗽1天就诊。体检: 右下肺呼吸音低, 可闻及湿性啰音, 胸片示右下肺有大片炎性阴影, 拟诊为肺炎链球菌肺炎, 首选的药物为()

- A. 头孢菌素
- B. 林可霉素
- C. 链霉素
- D. 青霉素
- E. 氯霉素

161. 模拟题 某慢性肺源性心脏病患者, 喘憋明显, 略有烦躁, 在治疗过程中应慎用镇静剂, 以避免()

- A. 洋地黄中毒

- B. 双重感染
- C. 脱水、低血钾
- D. 诱发肺性脑病
- E. 加重心力衰竭

162. 模拟题 关于支气管扩张咳嗽、咳痰的特点,描述错误的是()

- A. 与体位无关
- B. 咳大量浓痰
- C. 痰液静止后有分层现象
- D. 常在晨起或夜间卧床时加重
- E. 痰量每天可达数百毫升

163. 模拟题 呼气延长,双肺闻及广泛的干啰音常见于()

- A. 支气管哮喘
- B. 肺结核
- C. 支气管肺癌
- D. 支气管扩张
- E. 阻塞性肺气肿

164. 模拟题 患侧呼吸运动减弱,语颤增强,叩诊呈浊音常见于()

- A. 支气管哮喘
- B. 肺结核
- C. 支气管肺癌
- D. 支气管扩张
- E. 阻塞性肺气肿

165. 模拟题 胸部呼吸运动减弱,语颤减弱,叩诊呈过清音见于()

- A. 支气管哮喘
- B. 肺结核
- C. 支气管肺癌
- D. 支气管扩张
- E. 阻塞性肺气肿

166. 模拟题 继发性肺结核中最常见的类型为()

- A. 原发型肺结核
- B. 血行播散型肺结核
- C. 浸润型肺结核
- D. 慢性纤维空洞型肺结核
- E. 结核性胸膜炎

167. 模拟题 哮喘持续状态指哮喘严重发作至少应超过()

- A. 6小时
- B. 12小时
- C. 24小时
- D. 36小时
- E. 48小时

168. 模拟题 肺癌空洞、肺结核空洞和肺脓肿空洞最主要的鉴别是()

- A. 病史、症状、体征

- B. 胸部X线检查
- C. 病理检查及痰细胞检查
- D. 放射性核素扫描
- E. 血沉检查

169. 模拟题 COPD患者胸廓呈()

- A. 漏斗胸
- B. 扁平胸
- C. 鸡胸
- D. 桶状胸
- E. 胸廓膨隆

170. 模拟题 患者,女,36岁。因气胸行胸膜腔闭式引流时,发现胸瓶长玻璃管内水柱无波动,嘱患者做深呼吸后,水柱仍无波动,提示()

- A. 胸膜腔内负压尚未恢复
- B. 胸膜腔内负压已恢复
- C. 胸膜腔内负压过大
- D. 胸膜腔内负压过小
- E. 引流管阻塞

171. 模拟题 急性肺脓肿表现为()

- A. 高热、胸痛,咳铁锈色痰
- B. 高热、咳嗽,发病后10~14天咳大量脓性或臭味痰
- C. 刺激性咳嗽,痰中带血
- D. 反复咯血
- E. 慢性咳嗽,咳白色泡沫样痰

172. 模拟题 支气管扩张症表现为()

- A. 高热、胸痛,咳铁锈色痰
- B. 高热、咳嗽,发病后10~14天咳大量脓性或臭味痰
- C. 刺激性咳嗽,痰中带血
- D. 反复咯血
- E. 慢性咳嗽,咳白色泡沫样痰

173. 模拟题 氧中毒的特点是()

- A. 肺实质的改变
- B. 肺间质改变
- C. 肺纤维化改变
- D. 肺间质水肿
- E. 肺泡破裂

174. 模拟题 下列提示上呼吸道有链球菌感染的表现是()

- A. 吞咽疼痛
- B. 咽部发痒
- C. 鼻塞流涕
- D. 声音嘶哑
- E. 口腔溃疡

175. 模拟题 吸气性呼吸困难多见于()

- A. 支气管哮喘
- B. 慢性阻塞性肺气肿
- C. 气胸

- D. 气管异物
- E. 重症肺炎

176. 模拟题 细菌性肺炎最常见的病原菌是()

- A. 葡萄球菌
- B. 肺炎球菌
- C. 肺炎杆菌
- D. 大肠埃希菌
- E. 乙型链球菌

177. 模拟题 支气管扩张患者的典型 X 线表现为()

- A. 肺纹理增粗、紊乱
- B. 大片均匀致密阴影
- C. 肺透亮度增加
- D. 肺纹理增多, 紊乱透亮增加
- E. 不规则蜂窝状或卷发样阴影

178. 模拟题 为防止哮喘患者痰液黏稠不易咳出, 应采取()

- A. 体位引流
- B. 低盐饮食
- C. 多饮水
- D. 持续吸氧
- E. 多运动

179. 模拟题 慢性支气管炎急性加重的主要原因是()

- A. 吸烟
- B. 感染
- C. 大气污染
- D. 气温下降
- E. 过敏

180. 模拟题 下列关于急性肺水肿的护理措施不正确的是()

- A. 按医嘱静脉注射西地兰
- B. 取坐位, 两腿下垂
- C. 持续低流量吸氧
- D. 遵医嘱静脉注射吗啡
- E. 遵医嘱静脉注射氨茶碱

181. 模拟题 早期发现肺结核的最主要方法是()

- A. 询问病史
- B. 胸部 X 线检查
- C. 痰菌检查
- D. 血沉检查
- E. 结核菌素试验

182. 模拟题 患者, 男, 62 岁。患肺结核, 咳血痰 2 天, 今晚突然大咯血, 鲜血从口鼻涌出, 患者担心出血过多而用力屏气, 随后出现极度呼吸困难、面色青紫、烦躁不安、表情恐怖、大汗淋漓、张口瞪目。此时可能发生的并发症是()

- A. 气胸
- B. 心力衰竭
- C. 肺栓塞
- D. 窒息
- E. 休克

183. 模拟题 肺功能检查时, 患者平静呼气后留在肺内的气体量是()

- A. 残气量
- B. 功能残气量
- C. 潮气量
- D. 有效肺活量
- E. 第 1 秒呼出肺活量

184. 模拟题 引起呼气性呼吸困难最常见的病因是()

- A. 气管异物
- B. 大支气管肿瘤
- C. 重症肺炎
- D. 大量胸腔积液
- E. 小支气管痉挛

185. 模拟题 甲亢伴哮喘患者禁用的治疗药物是()

- A. 安定
- B. 他巴唑
- C. 甲亢平
- D. 普萘洛尔
- E. 甲状腺素片

186. 模拟题 肺气肿胸部叩诊音为()

- A. 清音
- B. 鼓音
- C. 实音
- D. 浊音
- E. 过清音

187. 模拟题 患者, 女, 27 岁。因寒战、高热、咳嗽、胸痛入急诊。胸部 X 线显示左上肺有云絮状阴影, 查痰肺炎球菌(+), 护士为其抽血检查血象, 其结果可能是()

- A. 嗜酸性粒细胞增加
- B. 淋巴细胞减少
- C. 中性粒细胞增加
- D. 单核细胞增加
- E. 嗜碱性粒细胞增加

188. 模拟题 患者, 女, 57 岁。因肠梗阻呼吸深快、面部潮红拟急诊手术。实验室检查示 pH7.20, CO₂CP 降低, 诊断代谢性酸中毒, 应采用的治疗药物是()

- A. 5%碳酸氢钠
- B. 1.2%乳酸钠
- C. 3.6%羟甲基氨基甲烷
- D. 平衡盐溶液
- E. 林格液

189. 模拟题 控制支气管哮喘症状的首选药是()

- A. β_2 受体激动剂
- B. 糖皮质激素
- C. 抗胆碱能药物
- D. 茶碱类
- E. 肥大细胞膜稳定剂

190. 模拟题 夜间阵发性呼吸困难常见于()

- A. 右心功能不全
- B. 左心功能不全导致肺瘀血
- C. 肺炎
- D. 成人呼吸窘迫综合征
- E. 房间隔缺损

191. 模拟题 血常规嗜酸性粒细胞增多见于()

- A. 缺铁性贫血
- B. 支气管扩张
- C. 支气管哮喘
- D. 空洞型肺结核
- E. 肺炎链球菌肺炎

192. 模拟题 外源性哮喘主要的临床表现是()

- A. 鼻咽痒、打喷嚏
- B. 咳嗽、咯黏痰
- C. 带哮鸣音的呼气性呼吸困难
- D. 带哮鸣音的吸气性呼吸困难
- E. 口唇发绀

193. 模拟题 下列关于结核分枝杆菌的描述错误的是()

- A. 染色呈抗酸性
- B. 具有多形性
- C. 太阳光直射 1 小时可被杀死
- D. 70%酒精接触 2 分钟可杀菌
- E. 适宜生长温度为 37℃左右

194. 模拟题 混合性呼吸困难多见于()

- A. 喉头水肿
- B. 哮喘
- C. 喉头异物
- D. 肺部感染
- E. 呼吸衰竭

195. 模拟题 慢性肺源性心脏病导致的的心脏形态改变是()

- A. 左心室扩大
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 肺动脉关闭不全
- D. 主动脉扩大
- E. 右心室扩大

196. 模拟题 慢性肾衰竭最早出现的消化系统症状是()

- A. 恶心
- B. 腹胀

- C. 腹泻
- D. 溃疡
- E. 食欲不振

197. 模拟题 治疗支原体肺炎应选择哪种抗生素更合适()

- A. 青霉素
- B. 红霉素
- C. 庆大霉素
- D. 头孢噻肟
- E. 氨苄青霉素

198. 模拟题 患者,女,20岁。扁桃体肿大超过咽腭弓,其分度为()

- A. I度
- B. II度
- C. III度
- D. 轻度
- E. 重度

199. 模拟题 患者,女,58岁。咳嗽、咳痰、喘息10年。近日咳大量脓痰,呼吸困难,食欲下降,诊断为慢性阻塞性肺疾病。对此种呼吸困难最有效的护理措施是()

- A. 祛痰药
- B. 指导患者有效咳嗽
- C. 超声雾化吸入
- D. 气管插管,呼吸机辅助呼吸
- E. 指导患者缩唇腹式呼吸

200. 模拟题 患者,女,58岁。咳嗽、咳痰、喘息10年。近日咳大量脓痰,呼吸困难,食欲下降,诊断为慢性阻塞性肺疾病。为防止并发慢性肺心病及II型呼吸衰竭,护理中应特别注意的问题是()

- A. 给予低盐饮食
- B. 避免肺部感染
- C. 注意稀释痰液
- D. 避免粉尘和有害气体吸入
- E. 适当活动

201. 模拟题 诱发肺心病心功能失代偿的最常见原因是()

- A. 过度劳累
- B. 补液过快
- C. 呼吸道感染
- D. 摄盐过多
- E. 心律失常

202. 模拟题 细菌性咽扁桃体炎多由何引起()

- A. 溶血性链球菌
- B. 流感嗜血杆菌
- C. 肺炎球菌
- D. 葡萄球菌
- E. 呼吸道合胞病毒

203. 模拟题 砖红色胶冻状痰多见于下列哪些细菌感染()

- A. 肺炎链球菌
- B. 肺炎克雷伯杆菌
- C. 铜绿假单胞菌
- D. 支原体
- E. 厌氧菌

204. 模拟题 慢性肺源性心脏病急性加重期患者应慎用()

- A. 镇静剂
- B. 祛痰剂
- C. 解痉平喘药
- D. 呼吸兴奋剂
- E. 抗感染药物

205. 模拟题 异烟肼的主要毒性反应是()

- A. 肾损坏
- B. 周围神经炎
- C. 白细胞下降
- D. 球后视神经炎
- E. 血小板下降

206. 模拟题 支气管与心源性哮喘鉴别如有困难时忌用()

- A. 沙丁胺醇
- B. 氨茶碱
- C. 异丙嗪
- D. 泼尼松
- E. 吗啡

207. 模拟题 肺心病死亡的首要原因是()

- A. 呼吸性酸中毒
- B. 呼吸性酸中毒并发代谢性酸中毒
- C. 消化道出血
- D. 肺性脑病
- E. 呼吸道感染

208. 模拟题 患者,男,23岁。因近期感冒出现咳嗽,并有少量咯血,来医院就诊,经检查诊断为支气管扩张症。此疾病最常见的病因是()

- A. 支气管-肺组织感染和支气管阻塞
- B. 先天性支气管发育缺陷
- C. 慢性阻塞性肺疾病
- D. 重症肺炎
- E. 肺结核

209. 模拟题 患者,男,23岁。因近期感冒出现咳嗽,并有少量咯血,来医院就诊,经检查诊断为支气管扩张症。支气管扩张症的发病年龄最多见于()

- A. 老、中年期
- B. 儿童、青年期
- C. 幼儿、儿童期
- D. 婴幼儿期
- E. 婴儿期

210. 模拟题 患者,男,23岁。因近期感冒出现咳嗽,并有少量咯血,来医院就诊,经检查诊断为支气管扩张症。支气管扩张症的病理表现是()

- A. 炎症损坏支气管内血管
- B. 病毒感染引起免疫紊乱
- C. 支气管畸形造成管内血管损坏
- D. 机体免疫调节功能障碍引起肺内血管性增生
- E. 慢性炎症损坏支气管,以致管腔扩张、变形

211. 模拟题 呼吸增快常见于()

- A. 高热
- B. 颅内疾病
- C. 安眠药中毒
- D. 呼吸中枢衰竭
- E. 老年人

212. 模拟题 患者,男,62岁。患慢性支气管炎、肺气肿,近几天咳嗽加剧,痰液黏稠,不易咳出,医嘱要求为其超声雾化吸入。首选的药物是()

- A. 氨茶碱
- B. 沙丁胺醇(舒喘灵)
- C. α -糜蛋白酶
- D. 地塞米松
- E. 庆大霉素

213. 模拟题 预防术后肺部感染的因素是()

- A. 术前戒烟
- B. 术后早期活动
- C. 痰稠可给祛痰药
- D. 鼓励患者深呼吸
- E. 应用镇咳药

214. 模拟题 患者,男,53岁。饮酒后出现下腹部胀痛,排尿困难、查体可见耻骨上膨隆,扪及囊样包块,有压痛,叩诊呈实音,该患者最可能出现的是()

- A. 尿失禁
- B. 膀胱刺激征
- C. 尿潴留
- D. 膀胱炎
- E. 尿路感染

215. 真题 2019-J045 50岁以上男性易患的肺癌类型是()

- A. 腺癌
- B. 鳞癌
- C. 髓样癌
- D. 小细胞癌
- E. 大细胞癌

216. 真题 2019-J058 患者,男,64岁。慢性支气管炎8年,高血压3年。今晨排便时,突感右胸刀割样疼痛,随即胸闷、呼吸困难,最可能的原因是()

- A. 低血压
- B. 急性胸膜炎

- C. 急性心包炎
- D. 自发性气胸
- E. 心脏神经官能症

217. 真题 2019-J067 肺炎发热的类型是()

- A. 稽留热
- B. 弛张热
- C. 间歇热
- D. 不规则热
- E. 以上都是

218. 真题 2019-J073 支气管哮喘反复发作的关键因素()

- A. 缺氧
- B. 感染
- C. 免疫缺陷
- D. 精神紧张
- E. 气道变应性炎症

219. 真题 2019-X009 患者男, 74 岁。因肺部感染出现咳嗽、咳痰入院。既往 COPD 病史 6 年。血气分析: PaO₂50mmHg, PaCO₂55mmHg。最可能的入院诊断是()

- A. 支气管肺炎
- B. 支气管哮喘
- C. 支气管扩张
- D. I 型呼吸衰竭
- E. II 型呼吸衰竭

220. 真题 2019-X010 慢性呼吸衰竭患者出现的最早最突出的症状是()

- A. 发绀
- B. 呼吸困难
- C. 精神神经症状
- D. 其他器官损害
- E. 心血管系统症状

221. 真题 2019-X047 某患者患肺结核病一年, 现仍有发热、咳嗽、咳血等症状。为明确病因, 相关的辅助检查是()

- A. CT
- B. 磁共振
- C. X 线胸片
- D. 结核菌素试验
- E. B 超

222. 真题 2019-X050 一般不会引发咯血的疾病是()

- A. 上消化道出血
- B. 支气管扩张
- C. 肺癌
- D. 左心衰
- E. 肺结核

223. 真题 2019-X061 慢性支气管炎常可发展为()

- A. 肺出血
- B. 支气管扩张

- C. 肺栓塞
- D. 小叶性肺炎
- E. 阻塞性肺气肿

224. 真题 2019-X069 当前控制哮喘患者气道抗炎最有效的药物是()

- A. β_2 受体激动剂
- B. 茶碱类药物
- C. 糖皮质激素
- D. 大环内酯类药物
- E. 头孢菌素

225. 真题 2019-Z006 引起慢性肺源性心脏病病人死亡的首要原因是()

- A. 肺性脑病
- B. 心力衰竭
- C. 消化道出血
- D. 电解质紊乱
- E. 弥散性血管内凝血

226. 真题 2019-Z022 患者, 男, 20 岁。剧烈运动后出现胸痛、干咳、呼吸困难。查体: 患者极度烦躁, 右肺外侧呼吸音消失。不恰当的处理措施是()

- A. 立即手术
- B. 绝对卧床休息
- C. 如出现支气管痉挛可静脉滴注氨茶碱
- D. 如有剧烈咳嗽可使用可待因
- E. 予以鼻导管吸氧, 氧流量控制在 2~5L/min

227. 真题 2019-Z037 治疗代谢性酸中毒首选()

- A. 5%碳酸氢钠
- B. 11.2%乳酸钠
- C. 3.6%三羟甲基氨基甲烷
- D. 5%糖盐水
- E. 林格液

228. 真题 2019-Z040 肺气肿患者的胸廓呈()

- A. 鸡胸
- B. 漏斗
- C. 扁平
- D. 桶状
- E. 一侧胸廓局限性膨隆

229. 真题 2019-Z047 肺心病患者死亡的首要原因是()

- A. 呼吸衰竭
- B. 心力衰竭
- C. 消化道出血
- D. DIC
- E. 肺性脑病

230. 真题 2019-Z049 患者发生呼吸困难时, 最适宜的体位是()

- A. 半坐卧位
- B. 暂无
- C. 右侧卧位

- D. 左侧卧位
- E. 俯卧位

231. 真题 2019-Z052 支气管肺癌最常见的早期症状是()

- A. 阵发性刺激性干咳
- B. 发热
- C. 持续性痰中带血
- D. 血性胸水形成
- E. 胸痛

232. 真题 2019-Z057 肺结核患者的护理措施, 不正确的是()

- A. 高蛋白、高热量、高维生素饮食
- B. 注意隔离与消毒
- C. 绝对卧床休息
- D. 观察药物的不良反应
- E. 做好卫生宣教工作

233. 真题 2019-Z059 患者, 女, 55 岁。患支气管扩张多年反复咯血。此次住院中因剧烈运动致大量咯血, 在观察中突然发现咯血停止, 患者表情恐怖, 张口瞪眼, 双手乱抓, 该患者最可能发生了()

- A. 休克
- B. 窒息
- C. 呼吸衰竭
- D. 心力衰竭
- E. 肺梗死

三. 循环系统疾病病人的护理

1. 真题 2010-J026 引起风湿性心瓣膜病的细菌是()

- A. 大肠埃希菌
- B. A 组乙型溶血性链球菌
- C. 肺炎链球菌
- D. 葡萄球菌
- E. 流感嗜血杆菌

2. 模拟题 下列适用于急性心肌梗死伴心力衰竭患者的药物是()

- A. 森福罗
- B. 地高辛
- C. 毛花苷 C
- D. 多巴酚丁胺
- E. 阿拉明

3. 真题 2017-J002 慢性心功能不全的诱因不包括()

- A. 感染
- B. 心肌炎
- C. 分娩
- D. 中重度贫血
- E. 剧烈运动

4. 真题 2010-J017 心脏冲动的起源部位是()

- A. 房室结

- B. 窦房结
- C. 浦氏纤维
- D. 心室
- E. 心房

5. 真题 2010-J030 不符合稳定型心绞痛特点的是()

- A. 疼痛位于胸骨体中或上段之后
- B. 疼痛可伴有濒死感
- C. 疼痛多数持续在 15 分钟以上
- D. 休息可缓解疼痛
- E. 常有诱发因素

6. 真题 2010-J035 心前区疼痛发生的机制是()

- A. 各种因素刺激支配心脏、主动脉或肋间神经的传入纤维
- B. 各种因素刺激心肌细胞
- C. 各种因素刺激引起迷走神经张力亢进
- D. 各种因素刺激引起恐惧、焦虑加剧
- E. 各种因素刺激胸膜壁层

7. 真题 2016-S085 患者男, 30 岁。患“化脓性扁桃体炎”, 医嘱青霉素皮试, 护士在做青霉素皮试后约五分钟, 患者突感胸闷, 面色苍白, 出冷汗, 脉细速, 血压下降, 呼之不应。抢救过程中, 该患者发生了室颤, 护士采取的处理措施中正确的是()

- A. 同步电复律
- B. 非同步电复律
- C. 心内注射利多卡因
- D. 立即肌注阿托品
- E. 立即给予患者心脏按压

8. 模拟题 下列哪项不属于引起充血性心力衰竭的诱发因素()

- A. 呼吸道感染
- B. 输液过多过快
- C. 情绪激动
- D. 摄入钠盐过多
- E. 重度二尖瓣狭窄

9. 真题 2010-J071 窦性心动过缓不发生于()

- A. 病态窦房结综合征者
- B. 甲状腺功能亢进症者
- C. 运动员
- D. 洋地黄中毒者
- E. 甲状腺功能减退症者

10. 真题 2018-X008 关于老年高血压患者的用药, 正确的是()

- A. 大剂量开始
- B. 可联合用药
- C. 降压宜快
- D. 间断用药
- E. 可自行调整剂量

11. 真题 2010-J090 患者, 男, 64 岁。身高 171cm,

体重 90kg。近 1 月来头晕、心悸、眼花、失眠，查血压 150/100mmHg，血脂增高，葡萄糖耐量异常。患者血压升高的机制最可能是（）

- A. 肾素-血管紧张素-醛固酮系统失调
- B. 高级神经中枢功能失调
- C. 细胞膜离子转运异常
- D. 肾性水钠潴留
- E. 胰岛素抵抗

12. 真题 2010-X008 血清总胆固醇增高见于（）

- A. 肺心病
- B. 风心病
- C. 冠心病
- D. 心肌炎
- E. 心包炎

13. 真题 2010-X039 病毒性心肌炎患者急性期最需要的治疗是（）

- A. 补充营养
- B. 绝对卧床休息
- C. 静脉滴注大剂量维生素 C
- D. 静脉滴注复方丹参注射液
- E. 抗心律失常治疗

14. 真题 2010-J043 急性心力衰竭的病因不包括（）

- A. 广泛心肌梗死
- B. 进食蛋白过多
- C. 高血压急症
- D. 严重心律失常
- E. 输液过多过快

15. 真题 2010-X045 治疗充血性心力衰竭药物中，具有改善心肌收缩功能的药物是（）

- A. 呋塞米
- B. 地西洋
- C. 地高辛
- D. 硝普钠
- E. 卡托普利

16. 真题 2010-J038 风湿性心瓣膜病并发心律失常，最常见的是（）

- A. 窦性期前收缩
- B. 房性期前收缩
- C. 心室颤动
- D. 心房颤动
- E. 房室传导阻滞

17. 真题 2010-X048 急性心肌梗死患者特有的心肌酶变化是（）

- A. 磷酸肌酸激酶
- B. 丙氨酸氨基转移酶
- C. 乳酸脱氢酶
- D. 转肽酶
- E. 胆碱酯酶

18. 真题 2018-X015 患者女，35 岁。因觉心悸到医院行心电图检查，心电图结果为窦性心律、心率 125 次/分，诊断为心律失常，此患者的心律失常是（）

- A. 房性期前收缩
- B. 窦性心动过速
- C. 窦性心动过缓
- D. 窦性心律不齐
- E. 室性期前收缩

19. 真题 2010-X075 患者，女，30 岁。经常出现劳力性呼吸困难、晕厥等症状。体检：胸骨右缘第二肋间可闻及响亮、粗糙的收缩期吹风样杂音。为明确诊断，最有价值的检查是（）

- A. CT 检查
- B. X 线检查
- C. 心电图检查
- D. 心肌酶学检查
- E. 超声心动图检查

20. 真题 2010-Z006 对原发性高血压健康教育的内容不正确的是（）

- A. 注意休息，避免过劳
- B. 缓解期适当活动，控制体重
- C. 定期测量血压
- D. 宜低盐、低脂、低胆固醇、低热量饮食
- E. 血压高时服药，血压不高时可暂不服药

21. 模拟题 下列因素除哪项外，均可使血压值升高（）

- A. 睡眠不佳
- B. 寒冷环境
- C. 高热环境
- D. 兴奋
- E. 精神紧张

22. 真题 2010-Z016 能迅速终止心绞痛发作的药物是（）

- A. 美托洛尔（倍他乐克）
- B. 硝酸异山梨酯（消心痛）
- C. 硝苯地平（心痛定）
- D. 阿司匹林
- E. 卡托普利（开博通）

23. 真题 2010-Z039 感冒后出现与体温不成比例的心动过速应考虑（）

- A. 窦性心动过速
- B. 病窦综合征
- C. 甲亢
- D. 心肌炎
- E. 心肌病

24. 真题 2010-Z054 老年慢性支气管炎患者感冒 3 天，今日不能平卧，咳嗽，咳粉红色泡沫痰，双肺底有湿性啰音。应考虑（）

- A. 慢性支气管炎
- B. 大叶性肺炎

- C. 左心衰竭
- D. 阻塞性肺气肿
- E. 支气管扩张

25. 真题 2010-Z062 患者, 男, 58 岁。原有高血压、糖尿病、高脂血症病史, 近日有右侧肢体麻木及活动无力, 昨夜睡眠好, 但今晨起床时突然跌倒, 家人扶起后发现患者口眼歪斜, 右侧上下肢瘫痪, 但神志清醒, 应考虑是()

- A. 脑血栓形成
- B. 脑出血
- C. 脑梗死
- D. 蛛网膜下隙出血
- E. 短暂性脑缺血

26. 真题 2010-Z065 患者, 女, 27 岁。心脏病病史 8 年, 妊娠 37 周, 剖宫产一活男婴。现术后 2 小时, 产妇心率 126 次/分, 床上翻身即感胸闷、气促。护理措施中不正确的是()

- A. 严密监测生命体征
- B. 限制静脉输液滴速
- C. 吸氧
- D. 无盐半流质饮食
- E. 及时回乳

27. 真题 2010-Z094 容易引起血栓栓塞的是()

- A. 窦性心动过速
- B. 窦性心动过缓
- C. 心房颤动
- D. 预激综合征
- E. 病态窦房结综合征

28. 真题 2010-Z095 可见于运动员的是()

- A. 窦性心动过速
- B. 窦性心动过缓
- C. 心房颤动
- D. 预激综合征
- E. 病态窦房结综合征

29. 真题 2018-J025 窦性心动过缓不发生于()

- A. 运动员
- B. 甲状腺功能亢进者
- C. 病态窦房结综合征者
- D. 洋地黄中毒者
- E. 甲状腺机能减退者

30. 真题 2011-J021 急性心肌梗死主要由于()

- A. 肺动脉栓塞
- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 冠状动脉粥样硬化
- D. 上腔静脉受压
- E. 肾动脉狭窄

31. 真题 2011-J034 高血压脑病指的是()

- A. 脑小动脉严重痉挛致脑水肿

- B. 血黏稠致脑血栓形成
- C. 脑血管内压高而破裂
- D. 脑肿瘤
- E. 外来血栓堵塞脑动脉

32. 真题 2017-J027 引起慢性风湿性心脏瓣膜病的病原菌是()

- A. 军团菌
- B. 厌氧菌
- C. 肺炎链球菌
- D. 流感病毒
- E. 溶血性链球菌

33. 真题 2017-X027 长期高血压易导致脏器出现相关并发症, 常累及的脏器是()

- A. 心、脑、肾
- B. 心、肺、脑
- C. 心、肝、肾
- D. 肝、肾、脑
- E. 肝、肾、肺

34. 真题 2018-X027 心肌梗死的典型心电图异常不包括()

- A. 高耸状 T 波
- B. ST 段升高
- C. T 波倒置
- D. ST 段水平压低
- E. 病理性 Q 波

35. 真题 2018-Z027 能迅速终止心绞痛发作的药物是()

- A. 硝酸异山梨醇酯(消心痛)
- B. 硝苯地平(心痛定)
- C. 卡托普利(开博通)
- D. 阿司匹林
- E. 美托洛尔(倍他乐克)

36. 真题 2011-J039 房颤心电图的典型表现是()

- A. 大小、形态及规律不一的 f 波替代窦性 P 波, QRS 波形态正常, R-R 间歇不等
- B. QRS 波群与 T 波消失, 呈现完全不规律的波浪状曲线
- C. QRS 波群与 T 波消失, 呈现相对规律快速大幅波动
- D. 规律的锯齿状 f 波消失, QRS 波形态正常
- E. QRS 波提前出现, T 波与 QRS 波方向相反, 随之出现完全代偿间歇

37. 真题 2018-X028 鼓励长期卧床的心衰患者在床上下肢活动的主要目的是()

- A. 预防压疮
- B. 预防肌肉萎缩
- C. 预防下肢静脉血栓形成
- D. 保持机体活动力
- E. 减少回心血量

38. 真题 2013-Z011 急性心肌梗死患者由急诊室送到心电监护室应采用的方式是()

- A. 由护士陪步行
- B. 由担架车护送
- C. 患者自己快步行进
- D. 患者自己慢步行进
- E. 由家人搀扶步行

39. 真题 2017-X029 血清总胆固醇增高见于()

- A. 肺心病
- B. 风心病
- C. 冠心病
- D. 心肌炎
- E. 心包炎

40. 真题 2011-J064 关于心肌细胞动作电位的主要传导途径, 下列叙述中正确的是()

- A. 窦房结-心房肌-房室交界-房室束及左右束支-浦肯野纤维-心室肌
- B. 窦房结-房室交界-房室束及左右束支-心房肌-浦肯野纤维-心室肌
- C. 窦房结-房室束及左右束支-浦肯野纤维-心房肌-房室交界-心室肌
- D. 窦房结-浦肯野纤维-房室束及左右束支-心房肌-房室交界-心室肌
- E. 窦房结-心房肌-房室束及左右束支-房室交界-浦肯野纤维-心室肌

41. 真题 2017-Z030 急性病毒性心肌炎患者, 最重要的护理措施是()

- A. 保证患者绝对卧床休息
- B. 保证蛋白质的供给
- C. 给予易消化的饮食
- D. 给予多种维生素
- E. 严格记录每日出入液量

42. 真题 2013-Z012 下列哪项表现不是洋地黄中毒症状()

- A. 心动过缓
- B. 心律失常
- C. 恶心、呕吐
- D. 头晕、嗜睡
- E. 激惹、惊厥

43. 真题 2011-J085 患者, 女, 45 岁。风湿性心脏病二尖瓣狭窄 2 年。1 周前出现食欲下降, 恶心, 腹胀。查体: 颈静脉怒张, 肝脏增大、压痛明显, 下肢水肿。患者出现上述表现的原因最主要是()

- A. 原发性心肌损害
- B. 左室前负荷加重
- C. 右室前负荷加重
- D. 左室后负荷加重
- E. 右室后负荷加重

44. 真题 2017-Z032 急性左心衰发生时, 病人需采取()

- A. 半卧位
- B. 坐位、双腿下垂
- C. 头低脚高位
- D. 平卧位
- E. 俯卧位

45. 真题 2013-Z013 女, 16 岁。平素体健, 学校体检时心率 80 次/分, 律齐, 心尖区闻及舒张期隆隆样杂音, 心界增大不明显, 下列何项处理较宜()

- A. 卧床休息
- B. 应用洋地黄
- C. 口服利尿剂
- D. 避免重体力劳动, 预防感染
- E. 如常人活动

46. 真题 2011-X008 心搏骤停患者最重要的诊断依据是()

- A. 无呼吸动作
- B. 意识突然丧失
- C. 颈动脉搏动消失
- D. 血压下降
- E. 两侧瞳孔不等大

47. 真题 2011-X030 急性心肌梗死最早发生变化的酶是()

- A. 谷丙转氨酶
- B. 肌酸磷酸激酶
- C. 淀粉酶
- D. 转肌酶
- E. 碱性磷酸酶

48. 真题 2011-X095 长期服用可引起胫前水肿的药物是()

- A. 哌唑嗪
- B. 卡托普利
- C. 硝苯地平
- D. 阿替洛尔
- E. 氢氯噻嗪

49. 真题 2011-X096 高血压伴哮喘时禁用的降压药物是()

- A. 哌唑嗪
- B. 卡托普利
- C. 硝苯地平
- D. 阿替洛尔
- E. 氢氯噻嗪

50. 真题 2018-J037 导致心脏压力负荷过重的病因是()

- A. 高血压
- B. 甲状腺功能亢进
- C. 二尖瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 慢性贫血

51. 真题 2011-X097 急性心肌梗死时发生室颤应尽快应用()

- A. 同步直流电复律
- B. 非同步直流电复律
- C. 体外反搏术
- D. 起搏器临时起搏
- E. 射频消融术

52. 真题 2011-J036 反复感染引起风湿性心脏瓣膜病的病原菌是()

- A. A 族乙型溶血性链球菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 肺炎链球菌
- D. 流感嗜血杆菌
- E. 绿脓杆菌

53. 真题 2018-X039 患者男, 68 岁。患心脏瓣膜病、房颤 20 年, 服用地高辛 5 年。近 3 天突然出现恶心、呕吐, 同时伴有心悸、头痛、头晕、视物模糊。心电图示室性早搏二联律。患者可能出现了()

- A. 洋地黄类药物中毒
- B. 高血压
- C. 消化性溃疡
- D. 心力衰竭
- E. 低血压

54. 真题 2011-X098 急性心肌梗死时发生三度房室传导阻滞宜用()

- A. 同步直流电复律
- B. 非同步直流电复律
- C. 体外反搏术
- D. 起搏器临时起搏
- E. 射频消融术

55. 真题 2011-Z002 急性心肌梗死时最早最突出的症状是()

- A. 疼痛
- B. 心悸
- C. 呕吐
- D. 呃逆
- E. 气促

56. 真题 2017-X041 心力衰竭病人长期服用噻嗪类利尿剂最易出现的是()

- A. 低血钙
- B. 低血糖
- C. 高尿酸
- D. 低血钾
- E. 高血镁

57. 真题 2011-Z013 端坐位可减轻左心衰竭引起呼吸困难的原因是()

- A. 减轻上腔静脉淤血
- B. 减轻下腔静脉淤血

C. 减轻肠系膜静脉淤血

- D. 减轻门静脉淤血
- E. 减轻肺淤血

58. 真题 2017-Z042 典型急性心梗与典型心绞痛病人在症状上最大的区别是()

- A. 疼痛的放射部位
- B. 疼痛的部位
- C. 疼痛的持续时间
- D. 疼痛的性质
- E. 伴随症状

59. 真题 2011-Z023 发生洋地黄中毒的原因不包括()

- A. 心肌严重受损时
- B. 低血钾或缺氧时
- C. 肝肾功能下降时
- D. 洋地黄治疗量接近中毒量
- E. 机体代谢率明显增高时

60. 真题 2011-Z029 原发性高血压护理措施正确的是()

- A. 保证充足睡眠
- B. 限制体力活动
- C. 头痛时给予平卧位
- D. 头晕时给予半卧位
- E. 给予高蛋白、高热量饮食

61. 真题 2011-Z032 对心肌梗死急性期患者的护理不妥的是()

- A. 绝对卧床休息
- B. 预防压疮每小时翻身 1 次
- C. 持续心电监护
- D. 保持大便通畅
- E. 少食多餐, 不宜过饱

62. 真题 2018-Z045 冠状动脉粥样硬化性心脏病猝死最主要的原因是()

- A. 窒息
- B. 严重心律失常
- C. 心脏破裂
- D. 脑梗死
- E. 肺梗死

63. 真题 2013-J012 心脏冲动的起源部位是()

- A. 房室结
- B. 窦房结
- C. 浦肯野纤维
- D. 心室
- E. 心房

64. 真题 2013-J028 左心功能不全所致呼吸困难是由于()

- A. 上腔静脉淤血
- B. 体静脉淤血
- C. 门静脉淤血

- D. 下腔静脉淤血
- E. 肺循环淤血

65. 真题 2013-J077 二尖瓣狭窄并发栓塞的患者最常见的栓塞部位是()

- A. 肺动脉
- B. 脾动脉
- C. 肾动脉
- D. 脑动脉
- E. 四肢动脉

66. 真题 2013-J078 急性心肌梗死发生休克的主要原因是()

- A. 心脏前负荷加重
- B. 心脏后负荷加重
- C. 心脏前后负荷加重
- D. 左心室输出量增加
- E. 左心室输出量下降

67. 真题 2013-X005 心电图检查不能反映的是()

- A. 心律失常
- B. 心肌供血不足
- C. 心肌坏死
- D. 心肌受损
- E. 瓣膜病变

68. 真题 2013-X007 最有效缓解心绞痛的药物是()

- A. 硝酸甘油
- B. 硝苯地平
- C. 复方丹参滴丸
- D. 地西洋
- E. 阿司匹林肠溶片

69. 真题 2013-X008 在诊断心肌梗死时, 不作为血清酶辅助诊断的是()

- A. 肌酸磷酸激酶
- B. 天冬氨酸氨基转移酶
- C. 乳酸脱氢酶
- D. 碱性磷酸酶
- E. 肌酸磷酸激酶同工酶

70. 真题 2018-X052 心室颤动首选的治疗措施是()

- A. 非同步电复律
- B. 心内注射肾上腺素
- C. 胺碘酮静注
- D. 同步电复律
- E. 静脉注射苯妥英钠

71. 真题 2018-Z052 长期高血压容易引起哪些脏器受损()

- A. 心、脑、肺
- B. 脑、肾、心
- C. 心、肝、肾
- D. 心、脑、脾

E. 肺、肾、肝

72. 真题 2013-X016 地高辛中毒, 心率 50 次/分, 首选的治疗药物是()

- A. 苯妥英钠
- B. 利多卡因
- C. 氯化钾
- D. 阿托品
- E. 其他药物

73. 真题 2013-X017 女性, 60 岁。自述突然心慌胸闷。急诊检查: 心率 120 次/分, 脉率 110 次/分, 且心律不齐, 心音强弱不等。考虑为()

- A. 室性心动过速
- B. 室上性心动过速
- C. 窦性心动过速
- D. 心室颤动
- E. 心房颤动

74. 真题 2013-S078 患者, 男, 60 岁。心绞痛史 5 年, 未规律用药。2 小时前劳累时出现心前区压榨性疼痛, 伴濒死感, 舌下含化硝酸甘油, 疼痛未缓解, 诊断为急性心肌梗死。给予吸氧, 重症监护, 绝对卧床休息等措施, 3 小时后病情稳定。确定该护理诊断的主要依据是()

- A. 有濒死感
- B. 心肌缺血缺氧
- C. 未规律用药
- D. 绝对卧床休息
- E. 心前区压榨性疼痛

75. 真题 2010-S001 对老年人运动的要求正确的是()

- A. 老年患者应停止活动
- B. 可随意活动
- C. 健康老年人可随意活动
- D. 健康老年人运动前不用进行评估
- E. 老年患者根据身体状况选择活动

76. 真题 2013-Z004 颈静脉怒张及肝颈静脉回流征(+) 提示()

- A. 左心衰竭
- B. 心肌炎
- C. 全心衰竭
- D. 右心衰竭
- E. 心肌病

77. 真题 2013-Z073 男, 60 岁。因夜间突然呼吸困难、咳嗽、咳白色泡沫痰而坐起, 查体: 心率 120 次/分, 律齐, 双肺底有湿啰音, 两肺哮鸣音。该患者可能发生了什么病情变化()

- A. 支气管阻塞
- B. 肺炎
- C. 支气管哮喘
- D. 右心衰竭
- E. 急性左心衰竭

78. 真题 2017-J058 心脏正常的起搏点是()

- A. 房室结
- B. 房室束
- C. 左束支
- D. 右束支
- E. 窦房结

79. 真题 2018-J058 慢性心力衰竭常见的诱因是()

- A. 呼吸道感染
- B. 严重贫血
- C. 心律失常
- D. 妊娠
- E. 情绪激动

80. 真题 2013-Z074 男, 60 岁。因夜间突然呼吸困难、咳嗽、咳白色泡沫痰而坐起, 查体: 心率 120 次/分, 律齐, 双肺底有湿啰音, 两肺哮鸣音。护士应立即采取何种措施()

- A. 皮下注射吗啡 5mg
- B. 西地兰 0.4mg 缓慢静脉注射
- C. 安置患者两腿下垂坐位或半坐位 6-8L/min 氧气吸入
- D. 立即给予心电监护
- E. 立即通知值班医师处理

81. 真题 2014-J044 高血压脑病指的是()

- A. 脑毛细血管压力过高致脑水肿
- B. 血黏稠致脑血栓形成
- C. 脑血管内压高而破裂
- D. 脑肿瘤
- E. 外来血栓堵塞脑动脉

82. 真题 2014-J045 高血压病导致心脏负荷增加的类型是()

- A. 全心负荷
- B. 左心室前负荷
- C. 右心室前负荷
- D. 左心室后负荷
- E. 右心室后负荷

83. 真题 2014-J050 不符合心绞痛特点的是()

- A. 疼痛位于胸骨体中与上段之后
- B. 疼痛可伴有濒死感
- C. 疼痛多数持续在 15 分钟以上
- D. 休息可缓解疼痛
- E. 常有诱发因素

84. 真题 2014-J053 频发室性期前收缩至少每分钟超过()

- A. 3 个
- B. 5 个
- C. 8 个
- D. 10 个
- E. 15 个

85. 真题 2017-J063 患者男, 65 岁, 突发急性广泛心肌梗死, 咳大量粉红色泡沫痰, 其咳痰病因是()

- A. 急性气胸
- B. 急性肺气肿
- C. 肺囊肿
- D. 急性肺水肿
- E. 肺不张

86. 真题 2014-J078 患者, 女, 30 岁, 有风湿性心脏病 6 年。护理检查: 双颊紫红, 口唇发绀, 心尖部闻及舒张期隆隆样杂音。考虑该患者为()

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 联合瓣膜病变

87. 真题 2014-X003 治疗心绞痛作用最快、最有效的药物是()

- A. 吗啡
- B. 哌替啶
- C. 硝酸甘油
- D. 普萘洛尔
- E. 硝苯地平

88. 真题 2014-X018 诊断感染性心内膜炎最重要的辅助检查是()

- A. 心电图
- B. 超声心动图
- C. X 线检查
- D. 血培养
- E. 免疫学检查

89. 真题 2014-X019 房颤患者的异位心律失常, 护士在进行电复律治疗时错误的操作是()

- A. 绝对卧床、保暖
- B. 电极放置位置正确
- C. 放电时抢救人员离开床沿
- D. 电极涂抹足够的导电糊
- E. 非同步电除颤

90. 真题 2017-J067 冠心病最常见的病因是()

- A. 重度主动脉瓣病变
- B. 冠状动脉栓塞
- C. 冠状动脉粥样硬化
- D. 肥厚型心肌病
- E. 冠脉痉挛

91. 真题 2014-X023 洋地黄中毒的主要表现不包括()

- A. 恶心、呕吐
- B. 室性早搏
- C. 水肿, 蛋白尿
- D. 黄视或绿视
- E. 视物模糊

92. 真题 2014-X038 室性期前收缩首选的治疗药物是 ()

- A. 洋地黄
- B. 异丙肾上腺素
- C. 麻黄素
- D. 阿托品
- E. 利多卡因

93. 真题 2014-X069 下列洋地黄类药物中毒后的处理措施中, 不正确的是 ()

- A. 停用排钾利尿剂
- B. 停用洋地黄类药物
- C. 补充钾盐
- D. 纠正心律失常
- E. 对快速性心律失常可用阿托品治疗

94. 真题 2018-J070 风湿性心脏病最易受累的瓣膜是 ()

- A. 三尖瓣
- B. 联合瓣膜
- C. 主动脉瓣
- D. 二尖瓣
- E. 肺动脉瓣

95. 真题 2014-S066 脉搏短绌常见于 ()

- A. 甲状腺功能亢进的患者
- B. 甲状腺功能减退的患者
- C. 主动脉狭窄的患者
- D. 主动脉瓣关闭不全的患者
- E. 心房纤维性颤动的患者

96. 真题 2014-Z008 对风湿性心脏病患者作健康指导的关键点是 ()

- A. 加强体育锻炼
- B. 积极防治链球菌感染
- C. 育龄女患者妊娠前应咨询医生
- D. 低盐饮食
- E. 绝对卧床休息

97. 真题 2014-Z010 急性左心衰竭患者端坐位的目的是 ()

- A. 减轻体循环淤血
- B. 减轻肺淤血
- C. 减轻下肢水肿
- D. 避免腹水发生
- E. 避免血压升高

98. 真题 2014-Z021 心功能评估的依据是 ()

- A. 病程长短
- B. 活动耐力
- C. 有无并发症
- D. 心脏体征
- E. 辅助检查资料

99. 真题 2014-Z046 室颤先兆的心律失常是 ()

- A. 房性期前收缩
- B. 窦性心动过速
- C. 多源性室性期前收缩
- D. 室性期前收缩 2 次/分
- E. 阵发性室上性心动过速

100. 真题 2014-Z047 风湿性心脏病主动脉瓣关闭不全患者最主要的体征是 ()

- A. 主动脉瓣区收缩期杂音
- B. 主动脉瓣区舒张期叹息样杂音
- C. 水冲脉
- D. 心尖区有抬举性搏动
- E. 脉压差增大

101. 真题 2014-Z050 病毒性心肌炎患儿卧床休息至热退后 ()

- A. 1-2 周
- B. 3-4 周
- C. 5-6 周
- D. 7-8 周
- E. 9-10 周

102. 真题 2018-J077 冠状动脉粥样硬化性心脏病发生心绞痛的原因是 ()

- A. 酶的活性增高
- B. 低血压
- C. 坏死心肌刺激
- D. 心肌缺氧
- E. 神经功能失调

103. 真题 2014-Z051 患者, 75 岁。患冠心病, 出现全心衰竭, 在治疗期间出现恶心, 视物模糊, 黄绿视, 应及时向医生报告, 并考虑原因是 ()

- A. 心力衰竭加重, 胃肠道淤血
- B. 脑血管意外
- C. 扩血管药物引起的低血压
- D. 利尿药物引起的电解质紊乱
- E. 洋地黄药物中毒

104. 真题 2014-Z066 下列哪一种为风湿性心脏病最常见的并发症 ()

- A. 二尖瓣闭锁
- B. 充血性心力衰竭
- C. 房室传导阻滞
- D. 室性心动过速
- E. 主动脉瘤

105. 真题 2014-Z067 患者, 男, 60 岁。1 周来因心源性晕厥发作 2 次来诊, 下列哪项心律失常最易引起此征 ()

- A. 心房纤颤

- B. 三度房室传导阻滞
- C. 左前分支阻滞合并右束支阻滞
- D. 阵发性室上性心动过速
- E. 频发性期前收缩

106. 真题 2014-Z089 心功能 I 级患者()

- A. 可照常活动, 但应避免体力劳动和重体力劳动
- B. 限制活动, 多卧床休息
- C. 加强锻炼, 提高耐力
- D. 绝对卧床休息, 限制探望
- E. 逐步离床, 在室内缓步走动

107. 真题 2014-Z090 急性心肌梗死第 1 周内患者应()

- A. 可照常活动, 但应避免体力劳动和重体力劳动
- B. 限制活动, 多卧床休息
- C. 加强锻炼, 提高耐力
- D. 绝对卧床休息, 限制探望
- E. 逐步离床, 在室内缓步走动

108. 真题 2017-S082 患者男, 52 岁, 右心功能不全伴双下肢轻度水肿。该患者应选用的饮食是()

- A. 高热量饮食
- B. 高蛋白饮食
- C. 低盐饮食
- D. 低脂肪饮食
- E. 无盐低钠饮食

109. 真题 2015-X036 对心室颤动患者进行心肺复苏术的首选药物是()

- A. 碳酸氢钠
- B. 阿托品
- C. 利多卡因
- D. 异丙肾上腺素
- E. 氯化钙

110. 真题 2017-S083 患者男, 52 岁, 右心功能不全伴双下肢轻度水肿。对该饮食要求描述正确的是()

- A. 食盐的总量限制在小于 2g/d
- B. 可以少量食用腌制品
- C. 摄入的蛋白质总量为 1.5~2.0g(kg·d)
- D. 脂肪总量小于 50g/d
- E. 除食物中自然含钠量外, 不放食盐烹调

111. 真题 2018-X083 急性心肌梗死最早发生变化的酶是()

- A. 肌酸磷酸酶
- B. 淀粉酶
- C. 转氨酶
- D. 谷丙转氨酶
- E. 碱性磷酸酶

112. 真题 2015-X038 诊断急性心肌梗死特异性最高的心肌酶是()

- A. CPK-MM 和 LDH-1
- B. CPK-MM 和 LDH-2

- C. CPK-MB 和 LDH-1
- D. CPK-MB 和 LDH-2
- E. CPK-BB 和 LDH-1

113. 真题 2017-S084 患者男, 52 岁, 右心功能不全伴双下肢轻度水肿。该患者禁食的食物为()

- A. 豆制品
- B. 鸡蛋
- C. 香肠
- D. 牛奶
- E. 鱼

114. 真题 2015-X042 长期高血压易导致脏器出现相关并发症, 常累及的脏器是()

- A. 心、脑、肾
- B. 心、肺、脑
- C. 心、肝、肾
- D. 肝、肾、脑
- E. 肝、肾、肺

115. 真题 2017-S085 患者男, 52 岁, 右心功能不全伴双下肢轻度水肿。半月后, 患者双下肢水肿严重, 该患者应禁食的食物不包括()

- A. 油条
- B. 挂面
- C. 皮蛋
- D. 馒头
- E. 汽水

116. 真题 2015-X043 维持正常循环功能的三个因素是()

- A. 血容量、脉压、周围血管张力
- B. 周围血管张力、血容量、心功能
- C. 血容量、肾功能、心功能
- D. 心功能、肾功能、脉压差
- E. 心功能、周围血管张力、血压

117. 真题 2015-X066 患者, 女, 35 岁。因觉心悸到医院行心电图检查。心电图结果为窦性心律、心率 125 次/分。诊断为心律失常。此患者的心律失常为()

- A. 窦性心动过缓
- B. 窦性心动过速
- C. 窦性心律不齐
- D. 室性期前收缩
- E. 房性期前收缩

118. 真题 2015-X087 患者, 男, 51 岁。体检发现血压脉压差增大。可能的疾病是()

- A. 缩窄性心包炎
- B. 心包积液
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 低血压
- E. 主动脉瓣狭窄

119. 真题 2015-J012 心脏冲动的起源部位是()

- A. 房室结
- B. 窦房结
- C. 浦肯野纤维
- D. 心室
- E. 心房

120. 真题 2015-J023 左心功能不全所致呼吸困难是由于()

- A. 上腔静脉淤血
- B. 体循环淤血
- C. 门静脉淤血
- D. 下腔静脉淤血
- E. 肺循环淤血

121. 真题 2015-J026 发生心绞痛的最主要原因是()

- A. 主动脉瓣狭窄
- B. 主动脉痉挛
- C. 全身小动脉痉挛
- D. 冠状动脉粥样硬化
- E. 肺动脉痉挛

122. 真题 2015-J040 慢性心力衰竭的诱因不包括()

- A. 感染
- B. 呼吸道感染
- C. 分娩
- D. 中重度贫血
- E. 气候急剧变化

123. 真题 2015-S074 患者,男,64岁。突然出现胸骨后压榨性疼痛并放射到左肩和左侧小指,不能忍受,面色苍白、出冷汗、心率快,心电图可见ST段压低、T波倒置,使用消心痛5分钟后疼痛缓解。对患者进行健康指导,错误的是()

- A. 宜摄入低脂肪低胆固醇食物
- B. 不宜饮浓茶避免刺激性食物
- C. 病情缓解期可适当参加活动
- D. 食物中宜高糖,适量纤维素
- E. 宜平时携带保健盒以备急用

124. 真题 2016-X004 有关老年高血压病人用药,正确的是()

- A. 大剂量开始
- B. 可联合用药
- C. 降压宜快
- D. 间断用药
- E. 可自行调整剂量

125. 真题 2015-S075 患者,男,64岁。突然出现胸骨后压榨性疼痛并放射到左肩和左侧小指,不能忍受,面色苍白、出冷汗、心率快,心电图可见ST段压低、T波倒置,使用消心痛5分钟后疼痛缓解。引起患者疼痛的原因是()

- A. 温度刺激
- B. 物理损伤
- C. 化学损伤

- D. 病理改变
- E. 心理因素

126. 真题 2015-Z011 急性左心衰竭患者采取端坐位的目的是()

- A. 减轻体循环淤血
- B. 减轻肺淤血
- C. 减轻下肢水肿
- D. 避免腹水发生
- E. 避免血压升高

127. 真题 2015-Z018 长期卧床的心力衰竭患者,其水肿最易出现的部位是()

- A. 腹部
- B. 踝部
- C. 胫前部
- D. 腰骶部
- E. 眼睑部

128. 真题 2015-Z037 二尖瓣狭窄患者最重要的体征是()

- A. 肺动脉瓣第二音亢进
- B. 心尖区舒张期杂音
- C. 主动脉瓣区舒张期杂音
- D. 主动脉瓣第二音亢进
- E. 心尖区舒张期奔马律

129. 真题 2015-Z086 患者,女,30岁。心脏瓣膜病二尖瓣狭窄4年,头晕、心悸、心前区不适1小时。查体:脉搏90次/分,心率110次/分,第一心音强弱不等,心率极不规则。心电图示P波消失,代之以大小形态不等及规律不一的f波,QRS波群形态正常。患者的脉搏呈()

- A. 奇脉
- B. 水冲脉
- C. 交替脉
- D. 短绌脉
- E. 脉搏减小

130. 真题 2015-Z087 患者,女,30岁。心脏瓣膜病二尖瓣狭窄4年,头晕、心悸、心前区不适1小时。查体:脉搏90次/分,心率110次/分,第一心音强弱不等,心率极不规则。心电图示P波消失,代之以大小形态不等及规律不一的f波,QRS波群形态正常。该患者可能发生了()

- A. 心房纤颤
- B. 心室颤动
- C. 房性期前收缩
- D. 室性期前收缩
- E. 窦性心律不齐

131. 真题 2016-J019 风湿性心脏病最易受累的瓣膜是()

- A. 三尖瓣
- B. 主动脉瓣

- C. 二尖瓣
- D. 肺动脉瓣
- E. 联合瓣膜

132. 真题 2016-J035 冠状动脉粥样硬化性心脏病发生心绞痛的原因是()

- A. 坏死心肌刺激
- B. 酶的活性增高
- C. 心肌缺氧
- D. 低血压
- E. 神经功能失调

133. 真题 2016-J055 高血压脑病指的是()

- A. 脑小动脉严重痉挛致脑水肿
- B. 血黏稠致脑血栓形成
- C. 脑血管内压高而破裂
- D. 脑肿瘤
- E. 外来血栓堵塞脑动脉

134. 真题 2016-J073 患者女, 35 岁。有风湿性心脏病史多年, 近日出现胸闷、气促伴下肢浮肿, 诊断为慢性心力衰竭。引起慢性心力衰竭最常见的诱因是()

- A. 严重脱水
- B. 呼吸道感染
- C. 严重心律失常
- D. 输液过多过快
- E. 精神过度紧张

135. 真题 2016-J082 患者男, 61 岁。风心病伴二尖瓣狭窄 6 年, 伴心房颤动 5 年。1 小时前无明显原因突然出现意识障碍来诊。最可能的原因是()

- A. 心脏骤停
- B. 发生室颤
- C. 心排出量减少, 脑供血不足
- D. 心房血栓脱落, 脑栓塞
- E. 脑血栓形成

136. 真题 2016-X034 最严重的心律失常是()

- A. 窦性心律失常
- B. 室性二联律
- C. 心房颤动
- D. 心室颤动
- E. 室性三联律

137. 真题 2016-X076 患者男, 68 岁。患心脏瓣膜病、房颤 20 年, 服用地高辛 5 年。近 3 天突然出现恶心、呕吐, 同时伴有心悸、头痛、头晕、视物模糊。心电图示室性早搏二联律。患者可能出现了()

- A. 消化性溃疡
- B. 心力衰竭
- C. 低血压
- D. 高血压
- E. 洋地黄类药物中毒

138. 真题 2016-X088 乙胺碘呋酮抗心律失常的作用机理是()

- A. 钙通道阻滞剂
- B. β 受体阻滞剂
- C. 膜稳定作用为主的药物
- D. 延长动作电位时程为主的药物
- E. 兴奋迷走神经药物

139. 真题 2016-X089 维拉帕米抗心律失常的作用机理是()

- A. 钙通道阻滞剂
- B. β 受体阻滞剂
- C. 膜稳定作用为主的药物
- D. 延长动作电位时程为主的药物
- E. 兴奋迷走神经药物

140. 真题 2016-Z030 原发性高血压最严重的并发症是()

- A. 脑出血
- B. 充血性心力衰竭
- C. 肾功能衰竭
- D. 冠心病
- E. 糖尿病

141. 真题 2016-Z031 心律失常患者中最易发生脉搏短绌的类型是()

- A. 心房扑动
- B. 心房颤动
- C. 心室颤动
- D. 室性期前收缩
- E. 窦性心律不齐

142. 真题 2016-Z047 引起风湿性心瓣膜病患者死亡的主要原因是()

- A. 栓塞
- B. 心律失常
- C. 心源性休克
- D. 充血性心力衰竭
- E. 亚急性感染性心内膜炎

143. 模拟题 急性下壁心肌梗死患者最常见的心律失常是()

- A. 心房颤动
- B. 室上性期前收缩
- C. 窦性心动过速
- D. 心室颤动
- E. 房室传导阻滞

144. 模拟题 主动脉瓣关闭不全可致()

- A. 水冲脉
- B. 绌脉
- C. 奇脉
- D. 缓脉
- E. 交替脉

145. 模拟题 主动脉瓣狭窄最重要的体征是()

- A. 细迟脉
- B. 主动脉瓣第一听诊区喷射状全收缩期杂音
- C. 主动脉瓣区响亮、粗糙的收缩期吹风样杂音
- D. 主动脉瓣区舒张早期叹气样杂音
- E. 主动脉瓣第二听诊区舒张早期叹气样杂音

146. 模拟题 患者,男,70岁。高血压病史30年,于家中如厕时突然感到头晕,随即倒地而入院,诊断为脑出血。护理查体:昏迷,左侧偏瘫,BP190/110mmHg。患者安静卧床的时间应控制至()

- A. 呼吸平稳
- B. 2~4周
- C. 血压正常
- D. 1个月以上
- E. 神志清醒

147. 模拟-J078 患者,男,38岁。胸痛伴发热、乏力5天,胸痛随深呼吸及变换体位而加重,查体可闻及心包摩擦音。该患者最可能的原因是()

- A. 急性心肌梗死
- B. 病毒性心肌炎
- C. 急性肺栓塞
- D. 感染性心内膜炎、
- E. 急性心包炎

148. 模拟题 急性心肌梗死患者吸氧的目的是()

- A. 改善心肌缺氧,减轻疼痛
- B. 预防心源性休克
- C. 减少心律失常
- D. 防止心力衰竭
- E. 促进坏死组织吸收

149. 模拟题 预防慢性风湿性心脏瓣膜病患者风湿活动复发的根本措施是()

- A. 积极锻炼身体
- B. 较长时间的卧床休息
- C. 积极预防和治疗链球菌感染
- D. 积极治疗心功能不全
- E. 合理饮食,保持良好的情绪

150. 模拟题 患者,女,35岁。活动后有呼吸困难,近半年有进行性加重,并伴有咳嗽,声音嘶哑,既往患者有风湿热10年,常有扁桃体炎发生,考虑为慢性风湿性心脏病二尖瓣狭窄。明确诊断风湿性心脏病二尖瓣狭窄的检查是()

- A. 心电图
- B. 血管造影
- C. 超声心动图
- D. 胸部X线片
- E. 磁共振

151. 模拟题 患者,女,35岁。活动后有呼吸困难,近半年有进行性加重,并伴有咳嗽,声音嘶哑,既往患

者有风湿热10年,常有扁桃体炎发生,考虑为慢性风湿性心脏病二尖瓣狭窄。风湿性心脏病二尖瓣狭窄心电图表现正确的是()

- A. P波消失,代之以大小、形态不一的f波
- B. P波消失,代之以锯齿状f波
- C. P波消失,P波宽度<0.12秒
- D. 二尖瓣型P波,P波宽度>0.12秒
- E. P波提早出现,形态与窦性不同

152. 模拟题 心包积液时可出现()

- A. 交替脉
- B. 缓脉
- C. 奇脉
- D. 水冲脉
- E. 绀脉

153. 模拟题 洋地黄中毒最常见的心律失常是()

- A. 室性期前收缩二联律
- B. 窦性心动过缓
- C. 室性心动过速
- D. 室上性心动过速
- E. 房室传导阻滞

154. 模拟题 临床上急性心肌梗死患者发生左心衰竭的主要原因是()

- A. 肺部感染
- B. 心脏前负荷加重
- C. 房室传导阻滞
- D. 不良因素刺激
- E. 心肌收缩力减弱和不协调

155. 模拟题 继发性扩张型心肌病最重要的原因是()

- A. 病毒感染
- B. 遗传
- C. 中毒
- D. 代谢异常药物作用
- E. 劳累

156. 模拟题 左心功能不全最主要的表现是()

- A. 心悸、气短
- B. 咳嗽、咳痰增多
- C. 疲倦乏力
- D. 呼吸困难
- E. 心律失常

157. 模拟题 下列属于左向右分流型先天性心脏病的是()

- A. 右位心
- B. 主动脉狭窄
- C. 肺动脉狭窄
- D. 法洛四联症
- E. 室间隔缺损

158. 模拟题 患者,男,60岁。长期卧床,为预防下

肢静脉血栓形成，主要的措施是()

- A. 多饮水
- B. 被动肢体运动
- C. 高纤维素饮食
- D. 绝对卧床休息
- E. 关节活动

159. 模拟题 冠心病的基本病因是()

- A. 重度主动脉瓣病变
- B. 冠状动脉栓塞
- C. 冠状动脉粥样硬化
- D. 肥厚型心肌病
- E. 冠脉痉挛

160. 模拟题 常见的青紫型先天性心脏病是()

- A. 室间隔缺损
- B. 房间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 动脉瓣狭窄

161. 模拟题 下列首选利多卡因治疗的疾病是()

- A. 急性心绞痛
- B. 高血压
- C. 窦性心动过速
- D. 室性心动过速
- E. 肺源性心脏病

162. 模拟题 尼莫地平的不良反应是()

- A. 干咳
- B. 嗜睡
- C. 白细胞下降
- D. 头晕、面红
- E. 心动过缓

163. 模拟题 心肌梗死患者使用极化液的目的是()

- A. 镇痛
- B. 增加血氧饱和度
- C. 增加血容量
- D. 抗心律失常
- E. 增加心肌兴奋性

164. 模拟题 二尖瓣关闭不全最有意义的体征是()

- A. 心尖部舒张期隆隆样杂音
- B. 心尖部全收缩期吹风样杂音
- C. 第一心音减弱
- D. 第一心音增强
- E. 心尖部舒张期叹气样杂音

165. 模拟题 患者，女，24岁。突发心悸2小时，心脏听诊：心率168次/分，节律规则。心电图诊断为阵发性室上性心动过速。终止该患者心动过速的药物是()

- A. 毛花苷C
- B. 硝酸甘油

- C. 速尿
- D. 维拉帕米
- E. 普萘洛尔

166. 模拟题 患者，女，28岁。风湿性心脏病二尖瓣狭窄病史3年，平时不用药，爬至三楼无明显不适。孕5个月起活动时常有轻度心慌、气促。现孕38周，因心悸、咳嗽，夜间不能平卧，心功能II级而急诊入院。在制订治疗计划时，最佳的方案是()

- A. 积极控制心力衰竭后终止妊娠
- B. 积极控制心力衰竭，同时行剖宫产术
- C. 积极控制心力衰竭，同时行引产术
- D. 适量应用抗生素后继续妊娠
- E. 纠正心功能，等待自然临产

167. 模拟题 患儿，男，1岁。诊断为室间隔缺损8个月。3天前，发热、咳嗽，近1天来，咳嗽、呼吸急促，三凹征明显，尿少，急诊入院。查体：T38℃，P160次/分，R45次/分，肝肋下5cm，诊断室间隔缺损合并心力衰竭，服用强心苷时正确的护理措施是()

- A. 服药前数脉搏
- B. 服药后数脉搏
- C. 药物饭中服用
- D. 药物饭后服用
- E. 与果汁同时服用

168. 模拟题 非同步电复律适用于()

- A. 心房扑动
- B. 心房纤颤
- C. 心室纤颤
- D. 室上性心动过速
- E. 室性心动过速

169. 模拟题 风湿性心脏病患者需要预防的首要潜在并发症是()

- A. 充血性心力衰竭
- B. 感染
- C. 栓塞
- D. 亚急性心内膜炎
- E. 心律失常

170. 模拟题 端坐呼吸提示()

- A. 左心衰竭
- B. 右心衰竭
- C. 心包炎
- D. 哮喘
- E. 肺炎

171. 模拟题 患者，男，54岁。患原发性高血压未认真治疗。近半个月感到左侧上、下肢活动乏力，未在意。今晨起床时不小心跌于地上，发现口斜眼歪，左侧上、下肢不能自主运动，但意识清醒，所患的疾病是()

- A. 脑栓塞
- B. 脑出血
- C. 脑血栓形成

- D. 腔隙性脑梗死
- E. 短暂脑缺血发作

172. 模拟题 患者,女,65岁。有高血压病史10年。最近稍事活动即出现胸闷、心悸、气急症状,休息一段时间方可缓解,该患者的心功能为()

- A. I级
- B. II级
- C. III级
- D. IV级
- E. V级

173. 模拟题 内脏性疼痛的特点为()

- A. 对牵拉、痉挛、缺血等压力性刺激敏感
- B. 对刺、割、灼刺激敏感
- C. 突发性绞痛,呈间歇性
- D. 痛感弥散,定位不准确
- E. 常伴有牵涉性疼痛

174. 模拟题 导致脑血栓形成最常见的病因是()

- A. 风湿性心脏病
- B. 脑动脉粥样硬化
- C. 高血压
- D. 长骨骨折
- E. 脑动脉畸形

175. 模拟题 属于主动脉瓣关闭不全体征的是()

- A. 水冲脉
- B. 绀脉
- C. 奇脉
- D. 缓脉
- E. 弦脉

176. 模拟题 心室纤颤最常见的病因是()

- A. 休克
- B. 急性心肌梗死
- C. 心肌病
- D. 心脏瓣膜病
- E. 预激综合征

177. 模拟题 急性心肌梗死患者临床最常出现的心律失常是()

- A. 室性期前收缩
- B. 心房扑动
- C. 心房颤动
- D. 室性心动过速
- E. 预激综合征

178. 模拟题 变异型心绞痛最适宜的治疗药物是()

- A. 利尿剂
- B. 洋地黄
- C. 利多卡因
- D. 硝苯地平
- E. β 受体阻滞剂

179. 模拟题 心绞痛发生的诱因除外()

- A. 卧床休息
- B. 寒冷
- C. 情绪激动
- D. 饱餐
- E. 吸烟

180. 模拟题 发生左心衰竭的患者最常见的症状是()

- A. 便秘
- B. 呼吸困难
- C. 咳嗽
- D. 体重下降
- E. 肌肉酸痛

181. 模拟题 患者,男,40岁。以充血性心力衰竭入院,医嘱给予洋地黄增强心肌收缩力,护士在观察患者脉搏时,发现在一系列正常均匀的脉搏中,出现一次提前而较弱的搏动,其后有一较正常延长的间歇,此脉搏称为()

- A. 丝脉
- B. 洪脉
- C. 缓脉
- D. 间歇脉
- E. 短绌脉

182. 模拟题 患者,男,28岁。3个月前因发热、寒战,诊为亚急性感染性心内膜炎,此病的常见致病菌是()

- A. 大肠杆菌
- B. 溶血性链球菌
- C. 草绿色链球菌
- D. 葡萄球菌
- E. 肠球菌

183. 模拟题 下列哪项不是联合用药治疗高血压的优点()

- A. 提尚疗效
- B. 迅速降压
- C. 减轻药物不良反应
- D. 可减少每种药物的剂量
- E. 可产生协同作用

184. 模拟题 关于高血压急症的叙述,下列哪项不正确()

- A. 血压一般超过180/120mmHg
- B. 血压水平的高低与器官损害的程度成正比
- C. 可出现剧烈呕吐、大汗、视物模糊
- D. 尽早应用硝普钠降压
- E. 严格遵医嘱控制药量

185. 模拟题 洋地黄中毒的主要表现不包括()

- A. 恶心、呕吐
- B. 黄视或绿视
- C. 水肿、蛋白尿
- D. 视物模糊
- E. 室性期前收缩

186. 模拟题 急性心肌梗死患者最早发生变化的酶是()

- A. 谷丙转氨酶
- B. 肌酸激酶同工酶
- C. 乳酸脱氢酶
- D. 肌钙蛋白
- E. 碱性磷酸酶

187. 模拟题 高血压病的治疗药物卡托普利最常见的副作用是()

- A. 心率减慢
- B. 头痛
- C. 乏力
- D. 心率增快
- E. 刺激性干咳

188. 模拟题 法洛四联症患者 X 线检查可见()

- A. 肺门血管呈“残根状”
- B. 可见肺门“舞蹈”征
- C. 心影呈“靴型”
- D. 显示左房增大
- E. 显示左室增大

189. 模拟题 最能提示右心衰竭的表现是()

- A. 水冲脉
- B. 左心室增大
- C. 肺型 P 波
- D. 肝颈静脉回流征阳性
- E. 舒张期奔马律

190. 模拟题 患者,女,50岁。BMI 为 30。自诉经常头晕、头痛、耳鸣、乏力、失眠,查血压为 160/110mmHg,查甘油三酯 4.9mmol/L,胆固醇 8.12mmol/L,血糖 7.0mmol/L 导致患者血压升高最可能的发生机制为()

- A. 胰岛素抵抗
- B. 内皮素水平升高
- C. 肾素-血管紧张素-醛固酮系统失调
- D. 细胞膜离子转运异常
- E. 交感神经兴奋,儿茶酚胺水平升高

191. 模拟题 对长期卧床的慢性心力衰竭患者,鼓励进行床上下肢活动的最重要目的是()

- A. 防止下肢静脉血栓形成
- B. 减少回心血量
- C. 保持关节活动度
- D. 增加机体的耐受力
- E. 防止失用性肌萎缩

192. 模拟题 肝颈静脉回流征阳性是指()

- A. 心源性肝硬化伴黄疸和肝功能损害
- B. 长期右心衰竭时肝持续淤血形成肝硬化
- C. 急性肝充血者出现肝肿大、压痛
- D. 压迫患者腹部或肝脏时颈静脉充盈消失

E. 压迫患者腹部或肝脏时颈静脉充盈更加明显

193. 模拟题 确诊心律失常最好的方法是()

- A. 心室晚电位
- B. 心脏磁共振成像(MRI)
- C. 心向量图
- D. 心电图检查
- E. 超声心动图检查

194. 模拟题 某患者,检查发现颈静脉怒张,肝颈静脉回流征阳性。考虑其最可能的诊断是()

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 心肌梗死
- C. 肝硬化
- D. 左心功能不全
- E. 右心功能不全

195. 模拟题 患者,男性,49岁。发作性胸痛,疑为心绞痛,为明确诊断,下列最为必要的检查是()

- A. 放射性核素检查
- B. X 线检查
- C. 超声心动图
- D. 运动负荷试验及动态心电图
- E. 心肌酶检查

196. 模拟题 患者,男,30岁。触电后在心肺复苏过程中,由心电图发现患者有心室纤颤,应采取的措施是()

- A. 使用阿托品
- B. 置心脏起搏器
- C. 电击除颤
- D. 使用肾上腺素
- E. 使用利多卡因

197. 模拟题 急性心肌梗死时,为了迅速解除病痛,常首选()

- A. 哌替啶 50~100mg 肌内注射
- B. 安痛定 1 支肌内注射
- C. 地塞米松 10mg 静脉注射
- D. 阿托品 5mg 肌内注射
- E. 硝酸甘油口服

198. 模拟题 病毒性心肌炎的治疗有()

- A. 补充铁剂
- B. 大量维生素 C 治疗
- C. 补充维生素 B₁₂
- D. 抗菌治疗
- E. 大量补液

199. 模拟题 急性心肌梗死中 50%~80%的患者发病前有先兆,其最常见的表现为()

- A. 新发生心绞痛或原有心绞痛加重
- B. 自发性心绞痛
- C. 稳定型心绞痛
- D. 变异型心绞痛

E. 混合性心绞痛

200. 模拟题 引起病毒性心肌炎最常见的病毒是()

- A. 柯萨奇 A 病毒
- B. 柯萨奇 B 病毒
- C. 副流感病毒
- D. 流感病毒
- E. 埃可病毒

201. 模拟题 患者,男,67岁。高血压病史多年,今天入急诊室诊断为脑血栓形成,立即给予溶栓治疗,该治疗的时间为发病后()

- A. 1 小时内
- B. 3 小时内
- C. 6 小时内
- D. 9 小时内
- E. 12 小时内

202. 模拟题 心电图中心房激动产生的波是()

- A. Q 波
- B. R 波
- C. S 波
- D. T 波
- E. P 波

203. 模拟题 长期卧床的慢性心功能不全患者,其水肿的分布特点是()

- A. 以踝内侧明显
- B. 以胫前部明显
- C. 以颜面部明显
- D. 以腰背部明显
- E. 以四肢明显

204. 模拟题 患者,男,69岁。高血压性心脏病 10 年。近 1 年来患者明显感觉体力活动受限,洗脸、刷牙即可引起呼吸困难、心悸。此患者目前的心功能处于()

- A. 代偿期
- B. I 级
- C. II 级
- D. III 级
- E. IV 级

205. 模拟题 患儿,13岁。病毒性心肌炎,输液中突然极度烦躁,大汗淋漓,呼吸困难,面色发绀,端坐呼吸,咳粉红色泡沫痰。此时治疗应首选的药物是()

- A. 氨茶碱
- B. 可待因
- C. 氯化铵
- D. 西地兰
- E. 泼尼松

206. 模拟题 产生第一心音的主要机理是()

- A. 二尖瓣、三尖瓣关闭
- B. 二尖瓣、三尖瓣开放
- C. 主动脉瓣、肺动脉瓣关闭
- D. 主动脉瓣、肺动脉瓣开放
- E. 心房、心室肌收缩

207. 模拟题 窦性心动过缓常见于()

- A. 剧烈运动
- B. 过度紧张
- C. 高热
- D. 甲亢
- E. 运动员

208. 模拟题 窦性心动过速不发生于下列哪种情况()

- A. 发热
- B. 甲状腺功能亢进
- C. 运动
- D. 贫血
- E. 甲状腺功能减退

209. 模拟题 患者,男,49岁。发作性胸痛,疑为心绞痛,在疼痛发作时,首先应做的是()

- A. 心电图
- B. X 线检查
- C. 超声心动图
- D. 放射性核素检查
- E. 运动负荷试验

210. 模拟题 阵发性室上性心动过速的心电图特点是()

- A. 起始缓慢发生
- B. 心率通常超过 150 次/分
- C. 心律绝对不齐
- D. QRS 波群形态宽大畸形
- E. P 波与 QRS 波群关系不恒定

211. 模拟题 洋地黄与钙剂应避免同时应用,如有必要至少应间隔()

- A. 2 小时
- B. 5 小时
- C. 7 小时
- D. 8 小时
- E. 10 小时

212. 模拟题 关于室间隔缺损,下列错误的是()

- A. 左向右分流型
- B. 体循环血流量减少
- C. 肺循环血流量增加
- D. 肺动脉第二音亢进
- E. 胸骨左缘第 2~3 肋间可闻及 II~III 级收缩期喷射性杂音

213. 模拟题 患者,女,45岁。既往有风湿性心脏病病史 10 年余。夜间睡眠中突发言角歪斜,口齿不清,左上肢无力 2 天入院。考虑医疗诊断为()

- A. 脑出血
- B. 脑血栓形成
- C. 脑栓塞
- D. 蛛网膜下隙出血
- E. 短暂性脑缺血发作

214. 模拟题 患者,男,68岁。既往偶有心绞痛,含服硝酸甘油有效。现因工作过累发生心前区剧烈疼痛已4小时余,含服硝酸甘油无效,来医院急诊。护士接待时应先做以下何种检查()

- A. 超声心动图
- B. 查24小时血压
- C. 心电图
- D. 心肌酶学检查
- E. 心肺X线检查

215. 模拟题 患者,男,68岁。既往偶有心绞痛,含服硝酸甘油有效。现因工作过累发生心前区剧烈疼痛已4小时余,含服硝酸甘油无效,来医院急诊。针对该患者的护理措施,错误的是()

- A. 病情平稳后扶入病房
- B. 静脉注射硝酸甘油
- C. 持续吸氧
- D. 给哌替啶止痛
- E. 给镇静剂

216. 模拟题 患者,男,68岁。既往偶有心绞痛,含服硝酸甘油有效。现因工作过累发生心前区剧烈疼痛已4小时余,含服硝酸甘油无效,来医院急诊。患者已住入病房后,应绝对卧床休息,一切生活均由他人协助,是因为()

- A. 心脏病要求
- B. 避免增加心脏负荷
- C. 节省患者体力消耗
- D. 长时间心绞痛患者极度疲乏
- E. 避免血压升高

217. 模拟题 15岁的小朱由西北跟随父母来到东南沿海开发区,他听不懂老师同学们的语言,学习成绩下降,出现焦虑、紧张等不适症状,他的压力源来自于()

- A. 生理性压力源
- B. 社会性压力源
- C. 心理性压力源
- D. 文化性压力源
- E. 物理性压力源

218. 模拟题 患者,男,36岁。自感心慌,头晕就医。门诊医生查体:脉搏为52次/分,心率为64次/分,而且心律不规则,快慢不一,心音强弱不等。该患者的状况最可能为()

- A. 二联律
- B. 三联律
- C. 脉搏短绌
- D. 传导阻滞
- E. 期前收缩

219. 模拟题 患者,女,15岁。1周前发热,体温38℃,伴有恶心、呕吐、腹泻,按肠炎治疗好转。近3天来感胸闷、憋气、头晕、乏力。查体:血压120/60mmHg,心率100次/分,律齐,体温36℃,双肺清。心电图示:I度房室传导阻滞,T波倒置。导致该患者上述症状可能的原因是()

- A. 心肌梗死
- B. 扩张型心肌病
- C. 病毒性心肌炎
- D. 自主神经功能紊乱
- E. 缩窄性心包炎

220. 模拟题 患者,女,15岁。1周前发热,体温38℃,伴有恶心、呕吐、腹泻,按肠炎治疗好转。近3天来感胸闷、憋气、头晕、乏力。查体:血压120/60mmHg,心率100次/分,律齐,体温36T,双肺清。心电图示:I度房室传导阻滞,T波倒置。有助于该病诊断的检查结果是()

- A. CK、AST、LDH增高,C反应蛋白增高
- B. 类风湿因子滴度增高
- C. 抗核抗体荧光试验阳性
- D. 抗链“O”阳性
- E. 白细胞增多,血沉减慢

221. 模拟题 患者,女,15岁。1周前发热,体温38℃,伴有恶心、呕吐、腹泻,按肠炎治疗好转。近3天来感胸闷、憋气、头晕、乏力。查体:血压120/60mmHg,心率100次/分,律齐,体温36T,双肺清。心电图示:I度房室传导阻滞,T波倒置。有关该病的治疗措施不妥的是()

- A. 急性期卧床休息
- B. 使用改善心肌营养和代谢的药物
- C. 如发生心力衰竭可使用利尿药
- D. 给予易消化、富含维生素、优质蛋白质饮食
- E. 好转出院后,可以从事体力劳动

222. 模拟题 肠胀气患者肛管排气后缓解不明显时再次进行排气时应间隔()

- A. 2~3小时
- B. 60分钟
- C. 40分钟
- D. 30分钟
- E. 15分钟

223. 真题 2019-J008 心脏冲动的起源部位是()

- A. 房室结
- B. 窦房结
- C. 浦肯野纤维
- D. 心室
- E. 心房

224. 真题 2019-J015 高血压脑病指的是()

- A. 外来血栓堵塞脑动脉
- B. 脑肿瘤

- C. 脑血管内压高而破裂
- D. 血液黏稠致脑血栓形成
- E. 脑小动脉严重痉挛致脑水肿

225. 真题 2019-J029 急性主动脉夹层动脉瘤患者最典型的胸痛性质是()

- A. 压榨性疼痛
- B. 撕裂性疼痛
- C. 窒息样疼痛
- D. 针刺样疼痛
- E. 刀割性疼痛

226. 真题 2019-J037 冠状动脉严重狭窄时, 心肌缺血达多长时间即可发生急性心肌梗死()

- A. 10~20 分钟以上
- B. 20~30 分钟以上
- C. 30~40 分钟以上
- D. 40~50 分钟以上
- E. 50~60 分钟以上

227. 真题 2019-J071 风湿性心脏瓣膜疾病中最常见()

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 肺动脉瓣狭窄
- E. 三尖瓣狭窄

228. 真题 2019-X011 患者女, 52 岁。因心前区疼痛, 行心电图检查, 诊断为心绞痛。能量有效、最快终止心绞痛发作的药物是()

- A. 解热镇痛剂
- B. 硝酸酯制剂
- C. 钙离子拮抗剂
- D. β 受体阻滞剂
- E. 抑制血小板聚集药物

229. 真题 2019-X040 治疗急性肺水肿不恰当的措施是()

- A. 取坐位, 两腿下垂
- B. 口服地高辛
- C. 高流量吸氧
- D. 静滴氨茶碱
- E. 皮下注射吗啡

230. 真题 2019-X051 高血压急症首选的降压药物是()

- A. 速尿
- B. 硝普钠
- C. 硝酸甘油
- D. 地尔硫草
- E. 拉贝洛尔

231. 真题 2019-X062 主动脉瓣狭窄终末期极少见到的并发症是()

- A. 心房颤动
- B. 左心衰竭

- C. 右心衰竭
- D. 感染性心内膜炎
- E. 体循环栓塞

232. 真题 2019-Z033 心绞痛与急性心肌梗死的疼痛区别是()

- A. 前者疼痛更重
- B. 前者含硝酸甘油有效
- C. 前者更持久
- D. 前者无诱因
- E. 前者伴高血压

233. 真题 2019-Z062 二尖瓣狭窄伴房颤, 血栓脱落引起的周围动脉栓塞发生于()

- A. 上肢动脉
- B. 肺动脉
- C. 脑动脉
- D. 脾动脉
- E. 肾动脉

234. 真题 2019-Z063 急性病毒性心肌炎患者, 最重要的护理措施是()

- A. 保证绝对卧床休息
- B. 保证蛋白质的供给
- C. 给予易消化的饮食
- D. 给予多种维生素
- E. 严格记录每日出入液量

235. 真题 2019-Z068 患者, 男, 59 岁。高血压心脏病近 1 年来, 患者明显感觉体力活动受限, 休息时无症状, 但洗脸、刷牙即可引起呼吸困难、心悸, 此患者目前心功能处于()

- A. 代偿期
- B. 心功能 I 级
- C. 心功能 II 级
- D. 心功能 III 级
- E. 心功能 IV 级

236. 真题 2019-Z075 高血压病人饮食不需限制的是()

- A. 高糖食物
- B. 高钠食物
- C. 高钙食物
- D. 高脂肪食物
- E. 高胆固醇食物

四. 消化系统疾病病人的护理

1. 真题 2010-J058 原发性肝癌的常见并发症不包括()

- A. 肝性脑病
- B. 癌旁综合征
- C. 消化道出血
- D. 急性胰腺炎
- E. 感染

2. 真题 2017-Z001 溃疡性结肠炎并发症不包括()

- A. 肠梗阻
- B. 腹膜炎
- C. 中毒性巨结肠
- D. 肠穿孔
- E. 结肠癌变

3. 真题 2010-J016 在我国, 肝硬化的主要病因是()

- A. 血吸虫病
- B. 病毒性肝炎
- C. 胆石症
- D. 胆道蛔虫病
- E. 胃溃疡

4. 模拟题 肝性脑病患者禁用的灌肠液是()

- A. 弱酸性溶液
- B. 高渗盐水
- C. 肥皂水
- D. 水合氯醛
- E. 低渗盐水

5. 真题 2017-Z003 某病人有进食后上腹痛史, 每年冬季加剧, 近一周出现柏油便提示()

- A. 慢性消化不良
- B. 服用铁剂药物
- C. 吃绿色蔬菜过多
- D. 上消化道出血
- E. 胰腺炎症

6. 真题 2018-X003 上消化道出血的典型大便性状为()

- A. 脓样
- B. 食糜样
- C. 米泔样
- D. 柏油样
- E. 白陶土样

7. 真题 2010-J004 与消化性溃疡有关的病原菌是()

- A. 衣原体
- B. 肺炎球菌
- C. 病毒
- D. 支原体
- E. 幽门螺杆菌

8. 真题 2018-J004 黑便常见于()

- A. 痔
- B. 直肠癌
- C. 痢疾
- D. 上消化道出血
- E. 直肠炎

9. 真题 2018-J006 引起慢性胃炎常见的病原菌是()

- A. 幽门螺杆菌
- B. 四联球菌
- C. 链球菌
- D. 支原体

E. 衣原体

10. 真题 2010-J014 引起慢性胃炎常见的细菌是()

- A. 沙门菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 嗜盐杆菌
- D. 空肠弯曲菌
- E. 幽门螺杆菌

11. 真题 2010-X002 肝炎患者眼结膜黄染的原因是()

- A. 血中胆固醇增高
- B. 血中二氧化碳增高
- C. 血中氧含量增高
- D. 血中胆红素增高
- E. 红细胞破坏增多

12. 真题 2010-X054 清蛋白/球蛋白(A/G)比值低于1时, 即 A/G 比值倒置, 最常见于()

- A. 肾病综合征
- B. 严重出血
- C. 慢性消耗性疾病
- D. 营养不良
- E. 肝硬化

13. 真题 2010-X095 肝性脑病伴脑水肿时禁用的药物是()

- A. 硫酸镁
- B. 谷氨酸钠
- C. 谷氨酸钾
- D. 左旋多巴
- E. γ -酪氨酸

14. 真题 2017-J009 慢性胃炎的主要病因是()

- A. 自身免疫反应
- B. 十二指肠液反流
- C. 幽门螺杆菌感染
- D. 理化因素
- E. 机械损伤

15. 真题 2010-X096 肝性脑病伴肾衰竭时禁用的药物是()

- A. 硫酸镁
- B. 谷氨酸钠
- C. 谷氨酸钾
- D. 左旋多巴
- E. γ -酪氨酸

16. 真题 2017-Z010 肝性脑病患者昏迷期的饮食最适宜()

- A. 高热量、高维生素、高碳水化合物、低蛋白质
- B. 高热量、高糖、低盐、低脂、低蛋白质
- C. 高热量、高糖、高维生素、无蛋白质流质饮食
- D. 高热量、高糖、高蛋白质、少纤维饮食
- E. 高热量、高糖、高维生素、低脂、少量蛋白质

17. 真题 2010-Z005 消化性溃疡具有的特征性临床表现是()

- A. 反酸、嗝气
- B. 节律性上腹痛
- C. 消化功能紊乱
- D. 恶心、呕吐
- E. 营养失调

18. 真题 2011-J048 上消化道出血最常见的病因是()

- A. 消化性溃疡
- B. 急性糜烂性胃炎
- C. 胃癌
- D. 贲门黏膜撕裂综合征
- E. 食管-胃底静脉曲张破裂出血

19. 真题 2010-Z025 肝硬化最常见的并发症是()

- A. 上消化道出血
- B. 肝性脑病
- C. 电解质紊乱
- D. 原发性肝癌
- E. 肝肾综合征

20. 真题 2016-J072 患者女, 44 岁。胆石症患者。今餐后 1 小时突发恶心、呕吐, 腹痛, 抽搐。腹痛位于上腹正中, 为持续性刀割样, 阵发性加剧, 向腰背部呈带状放射, 弯腰抱膝可使疼痛减轻。查血淀粉酶 680U/L, 患者抽搐的原因最可能是()

- A. 低血糖
- B. 低血钙
- C. 高血糖
- D. 高血钾
- E. 低血氯

21. 真题 2010-Z028 使用双气囊三腔管时, 正确的护理措施是()

- A. 先向食管囊注气, 再向胃囊注气
- B. 食管囊和胃囊各注气约 30ml
- C. 置管期间每隔 12 小时放气 1 次
- D. 出血停止后即可拔管
- E. 保留管道 24 小时仍需严密观察

22. 真题 2018-Z015 患者男, 45 岁。肝硬化病史 5 年。目前病情稳定, 血氨正常, 无腹水。其饮食原则为()

- A. 高热量、高蛋白、高维生素饮食
- B. 低热量、高蛋白、高维生素饮食
- C. 高热量、低蛋白、高维生素饮食
- D. 低热量、低蛋白、高维生素饮食
- E. 高热量、高蛋白、低纤维素饮食

23. 真题 2010-Z032 原发性肝癌晚期常见的并发症不包括()

- A. 肝癌结节破裂出血
- B. 肝性脑病
- C. 上消化道出血
- D. 肠穿孔

E. 继发感染

24. 真题 2018-Z016 【选项不全】患者女, 48 岁。以“反复上腹痛 3 天”为主诉入院。入院前 3 天进食油腻食物后出现中上腹疼痛, 呈持续性疼痛。向左肩背部放射阵发性加剧, 急查血淀粉酶为 1300U/L, 尿淀粉酶 815U/L。该患者禁食禁饮最主要的目的是()

- A. 减少胆汁的分泌
- B. 避免胃扩张
- C. 减少胃液的分泌
- D. 减少胰液的分泌
- E. 解除**管痉挛

25. 真题 2010-J069 与肝硬化患者出现持续性白细胞减少关系最大的是()

- A. 脾功能亢进
- B. 营养吸收障碍
- C. 上消化道出血
- D. 肝肾综合征
- E. 血小板减少

26. 真题 2018-Z017 患者女, 46 岁。反复上腹部疼痛 5 年, 近几日上述症状再发。疼痛位于上腹中部。多在进餐后出现, 2~3 小时后逐渐缓解, 下次进食后疼痛再次出现, 伴反酸、嗝气。最可能的诊断是()

- A. 慢性胃炎
- B. 十二指肠溃疡
- C. 胃溃疡
- D. 急性胃炎
- E. 胃癌

27. 真题 2010-Z083 患者, 男, 42 岁。饱餐后出现腹部束带状疼痛并向腰背部放射, 伴恶心、呕吐, 诊断为急性胰腺炎。根据患者的表现, 病变部位在()

- A. 胰头
- B. 胰颈
- C. 胰体
- D. 胰尾
- E. 全胰

28. 真题 2010-Z084 患者, 男, 42 岁。饱餐后出现腹部束带状疼痛并向腰背部放射, 伴恶心、呕吐, 诊断为急性胰腺炎。对患者疼痛的护理错误的是()

- A. 应用抗胰酶药物
- B. 禁饮食, 胃肠减压
- C. 变换体位, 按摩背部
- D. 应用吗啡等强效镇痛药物
- E. 应用阿托品等抗胆碱能药物

29. 真题 2011-J037 肝硬化患者诱发肝性脑病的因素是()

- A. 吃甜食
- B. 上消化道出血
- C. 饮浓茶
- D. 摄入低蛋白食物

E. 3 天排便 1 次

30. 真题 2010-J047 长期饮酒致肝硬化的机制是()

- A. 引起门静脉扩张
- B. 直接损伤肝细胞
- C. 减少蛋白吸收
- D. 收缩肝内血管
- E. 阻碍胆汁流动

31. 真题 2011-J041 与消化性溃疡发病相关的损害性因素中, 占主导地位的是()

- A. 幽门螺杆菌感染
- B. 饮食失调
- C. 吸烟
- D. 精神因素
- E. 胃酸、胃蛋白酶

32. 真题 2017-J022 引起原发性肝癌的原因不包括()

- A. 乙型病毒性肝炎
- B. 肝硬化
- C. 饮食中含多量粗纤维
- D. 长期饮用蓝绿藻污染水
- E. 黄曲霉真菌

33. 真题 2018-X022 肝性脑病患者可以出现肝臭的时期是()

- A. 昏迷期
- B. 昏睡期
- C. 前驱期
- D. 昏迷前期
- E. 轻微肝性脑病

34. 真题 2011-J042 消化性溃疡患者出现黑便, 估计其每日出血量至少为()

- A. 30ml
- B. 40ml
- C. 50ml
- D. 60ml
- E. 70ml

35. 真题 2011-J067 患者, 男, 42 岁。饱餐后出现上腹持续性疼痛并向左胃、腰背部放射。伴发恶心、呕吐, 诊断为急性胰腺炎。入院后收集的资料中与其疾病相关的是()

- A. 父亲因冠心病去世
- B. 平时喜食素食
- C. 不嗜烟酒
- D. 有胆绞痛史
- E. 24 岁时做过阑尾手术

36. 真题 2011-J090 在我国, 与急性胰腺炎的发病最密切相关的是()

- A. 暴饮暴食
- B. 遗传因素
- C. 胆汁反流

D. 慢性肝炎

E. 循环障碍

37. 真题 2011-J091 与肝硬化的发病有关的是()

- A. 暴饮暴食
- B. 遗传因素
- C. 胆汁反流
- D. 慢性肝炎
- E. 循环障碍

38. 真题 2011-J092 与原发肝癌的发病有关的是()

- A. 暴饮暴食
- B. 遗传因素
- C. 胆汁反流
- D. 慢性肝炎
- E. 循环障碍

39. 真题 2011-Z065 患者, 男, 56 岁。诊断为急性胰腺炎, 经治疗后腹痛、呕吐基本消失, 开始饮食宜采用()

- A. 无渣半流质
- B. 无脂低蛋白流质
- C. 无脂高蛋白流质
- D. 高脂低蛋白流质
- E. 低脂高蛋白流质

40. 真题 2017-Z028 慢性胃炎最常见的临床表现是()

- A. 无症状
- B. 反复黑便
- C. 呕吐咖啡色液体
- D. 饥饿感、夜间痛
- E. 上腹饱胀不适、疼痛

41. 真题 2013-X082 上消化道出血可发现()

- A. 尿酮体 (+)
- B. 尿中白细胞 >5 个/高倍镜视野
- C. 柏油样便
- D. 血红蛋白 <110g/L
- E. 大量管型尿

42. 真题 2017-Z029 患者女, 48 岁。30 分钟前因消化道大出血入院, 当时患者心率 120 次/分, 出冷汗, 脉搏弱, 血压 65/40mmHg, 皮肤湿冷。该患者的出血量为()

- A. 500ml
- B. 500~600ml
- C. 250ml
- D. 800ml
- E. 1000ml 以上

43. 真题 2011-X037 肝硬化腹水患者每日进水量限制在()

- A. 300ml
- B. 500ml
- C. 1000ml

- D. 1500ml
- E. 2000ml

44. 真题 2016-J070 患者男, 46 岁。乙肝 10 年。今进食后突然呕血 600ml。查体: 右上腹部压痛, 腹水征 (+), 肝质硬, 体积变小, 边缘锐利, 表面有小结节。患者呕血最可能的原因是()

- A. 应激性溃疡
- B. 消化性溃疡
- C. 肝癌结节破裂出血
- D. 急性糜烂性胃炎
- E. 食管-胃底静脉破裂

45. 真题 2016-J077 患者男, 50 岁。夜间上腹烧灼痛发作 2 月余。进食或服阿托品后迅速缓解, 诊断为十二指肠溃疡。进食后疼痛缓解的机制是()

- A. 交感神经兴奋
- B. 胃酸被中和
- C. 胃酸增多
- D. 平滑肌松弛
- E. 迷走神经张力增加

46. 真题 2011-X051 患者, 男, 56 岁。有胃溃疡病史 5 年, 突然呕血 1500ml, 血压 60/30mmHg, 心率 150 次/分。此时首先应采取的措施是()

- A. 禁食
- B. 胃肠减压
- C. 准备急查 B 超
- D. 立即开放静脉补充血容量
- E. 准备给予止血药物

47. 真题 2013-X069 患者, 男, 27 岁。自去年冬季以来每天发生空腹痛, 进食后疼痛缓解。平时伴有恶心、打嗝、反酸。查体: 剑突右侧有局限压痛, 无反跳痛。该患者可能的诊断为()

- A. 急性胃炎
- B. 慢性胃炎
- C. 胃溃疡
- D. 十二指肠溃疡
- E. 食管憩室

48. 真题 2011-X077 患者, 男, 45 岁。上腹胀 5 年, 常在空腹或饥饿时发生, 进食后缓解, 近 3 天出现黑便。查体: 上腹稍偏右有明显压痛。为明确诊断应选择()

- A. 胃液分析
- B. 胃镜检查
- C. X 线检查
- D. 心电图检查
- E. 幽门螺杆菌检查

49. 真题 2018-Z035 使用双气囊三腔管时, 正确的护理措施是()

- A. 出血停止后即可拔管
- B. 置管期间每 12 小时放气 5 分钟
- C. 食道囊和胃囊各注气约 30ml

- D. 拔管后 24 小时仍需严密观察
- E. 先向食道囊注气, 再向胃囊注气

50. 真题 2011-X078 患者, 男, 45 岁。上腹胀 5 年, 常在空腹或饥饿时发生, 进食后缓解, 近 3 天出现黑便。查体: 上腹稍偏右有明显压痛。抑酸作用最强的药物是()

- A. 西咪替丁
- B. 奥美拉唑
- C. 氢氧化铝
- D. 氨苄西林
- E. 枸橼酸铋钾

51. 真题 2017-J036 患者男, 50 岁。夜间上腹烧灼痛发作 2 月余, 进食或服阿托品后迅速缓解, 诊断为十二指肠溃疡, 该患者疼痛发生的主要机制是()

- A. 交感神经兴奋
- B. 胃酸刺激溃疡面
- C. 胃蛋白酶增加
- D. 平滑肌松弛
- E. 迷走神经张力增加

52. 真题 2011-X090 结核性腹膜炎是()

- A. 板状腹
- B. 妊状腹
- C. 舟状腹
- D. 柔韧感腹
- E. 松软腹

53. 真题 2018-Z037 关于急性胰腺炎的处理, 错误的是()

- A. 禁饮食, 持续胃肠减压
- B. 应用抗生素
- C. 应用抗胆碱药物
- D. 抗休克
- E. 应用吗啡止痛

54. 真题 2014-J034 原发性肝癌的常见并发症不包括()

- A. 肝性脑病
- B. 癌旁综合征
- C. 消化道出血
- D. 急性胰腺炎
- E. 感染

55. 真题 2017-J038 溃疡性结肠炎的发作诱因不包括()

- A. 感染
- B. 劳累
- C. 精神刺激
- D. 饮食失调
- E. 使用糖皮质激素

56. 真题 2011-X099 肝硬化患者血生化检查可出现()

- A. 血糖升高

- B. 血糖降低
- C. 清蛋白增高
- D. 清蛋白降低
- E. 球蛋白降低

57. 真题 2017-J039 我国急性胰腺炎最常见的病因是 ()

- A. 胆道疾病
- B. 代谢异常
- C. 酒精中毒
- D. 特异性感染疾病
- E. 药物因素

58. 真题 2011-X100 出血坏死性胰腺炎患者血生化检查可出现 ()

- A. 血糖升高
- B. 血糖降低
- C. 清蛋白增高
- D. 清蛋白降低
- E. 球蛋白降低

59. 真题 2017-J040 胃粘膜层的壁细胞主要分泌 ()

- A. 碱性粘液
- B. 胃蛋白酶原
- C. 凝乳酶原
- D. 生长抑素
- E. 盐酸

60. 真题 2017-X040 患者男, 40 岁, 突然出现头晕、心悸、乏力、脉速, 呕吐咖啡样胃内容物, 为明确病因首选的检查是 ()

- A. 选择性动脉造影
- B. X 线钡餐检查
- C. 胃镜检查
- D. B 超显像
- E. 吞棉线试验

61. 真题 2017-Z040 消化性溃疡病人饮食护理正确的是 ()

- A. 忌食生冷食物
- B. 少量出血时可进行食热流质
- C. 忌食高热量、高营养食物
- D. 进食含纤维素多的蔬菜水果
- E. 急性发作期病人应给予普食

62. 真题 2011-Z003 护士指导肝硬化患者禁食硬食、油炸、粗纤维食物的原因是 ()

- A. 预防食管黏膜出血
- B. 严格限制钠的摄入
- C. 抑制假性神经递质
- D. 减轻肝脏解毒功能
- E. 减少肠道氨的吸收

63. 真题 2011-Z026 溃疡性结肠炎的腹痛特点是 ()

- A. 腹痛一便后缓解

- B. 腹痛一便后加重
- C. 腹痛一进餐加重
- D. 腹痛一进餐缓解
- E. 腹痛一饥饿加重

64. 真题 2011-Z055 患者, 女, 38 岁。每次餐后 30-60 分钟上腹部有烧灼感, 持续 1-2 小时, 此腹痛特点应考虑是 ()

- A. 慢性胃炎
- B. 食管炎
- C. 胃溃疡
- D. 十二指肠溃疡
- E. 胰腺炎

65. 真题 2010-J050 急性胰腺炎常见的病因不包括 ()

- A. 胆石症
- B. 大量饮酒
- C. 急性脂肪肝
- D. 暴饮暴食
- E. 胆道蛔虫

66. 真题 2013-X070 患者, 男, 27 岁。自去年冬季以来每天发生空腹痛, 进食后疼痛缓解。平时伴有恶心、打嗝、反酸。查体: 剑突右侧有局限压痛, 无反跳痛。作何种检查可以确诊 ()

- A. 化验胃酸
- B. 胃镜
- C. CT
- D. B 超
- E. 化验血常规

67. 真题 2011-Z069 肝性脑病患者经治疗病情好转, 开始恢复蛋白质饮食, 应先考虑选择 ()

- A. 豆浆
- B. 鸡蛋
- C. 牛奶
- D. 鱼肉
- E. 鸡肉

68. 真题 2017-S046 患者男, 41 岁。慢性十二指肠溃疡, 有规律性疼痛。给止痛药的正确做法是 ()

- A. 在疼痛开始前给药
- B. 在疼痛开始时给药
- C. 持续给药
- D. 选择中枢镇痛药
- E. 疼痛最重时给药

69. 真题 2013-X071 患者, 男, 27 岁。自去年冬季以来每天发生空腹痛, 进食后疼痛缓解。平时伴有恶心、打嗝、反酸。查体: 剑突右侧有局限压痛, 无反跳痛。目前认为是何种细菌感染 ()

- A. 链球菌
- B. 铜绿假单胞菌
- C. 肺炎球菌
- D. 化脓球菌

E. 幽门螺杆菌

70. 真题 2018-Z047 患者男, 30 岁。夜间发作性上腹烧灼痛 2 月余, 进食后迅速缓解。昨起排柏油样便 2 次, 今晨起床时晕倒而就诊。体检: T37°C, P120 次/分, R24 次/分, BP10. 7/6. 6kPa(80/60mmHg), 神志恍惚, 皮肤苍白, 四肢厥冷。考虑出血原因是()

- A. 胃底静脉曲张
- B. 应激性溃疡
- C. 十二指肠球部溃疡
- D. 胃小弯溃疡
- E. 胃癌

71. 真题 2011-Z080 患者, 男, 55 岁。上腹痛 3 年, 便血约 250ml, 伴晕倒, 有冠心病病史 3 年。检查: 血压 100/70mmHg, 脉搏 90 次/分, 神清, 心律齐, 无杂音。肝脾未触及, 肠鸣音活跃。抢救时禁用的药物是()

- A. 西咪替丁
- B. 生长抑素
- C. 奥美拉唑
- D. 垂体后叶素
- E. 去甲肾上腺素

72. 真题 2011-Z081 患者, 男, 55 岁。上腹痛 3 年, 便血约 250ml, 伴晕倒, 有冠心病病史 3 年。检查: 血压 100/70mmHg, 脉搏 90 次/分, 神清, 心律齐, 无杂音。肝脾未触及, 肠鸣音活跃。患者出血停止, 病情稳定后, 为明确病因, 首选的检查是()

- A. 内镜检查
- B. B 超检查
- C. 吞线试验
- D. 选择性动脉造影
- E. X 线钡餐造影检查

73. 真题 2013-J016 急性胰腺炎最突出的症状是()

- A. 腹痛
- B. 呕吐
- C. 腹泻
- D. 发热
- E. 水电解质紊乱

74. 真题 2018-X050 诊断慢性胃炎最可靠的方法是()

- A. 胃液酸度分析
- B. 胃肠钡餐造影
- C. 病史及临床表现
- D. 血清抗体测定
- E. 纤维胃镜检查

75. 真题 2013-J021 我国急性胰腺炎最常见的病因是()

- A. 胆道疾病
- B. 代谢异常
- C. 酒精中毒
- D. 特异性感染疾病
- E. 药物因素

76. 真题 2017-J051 与肝硬化患者出现持续性白细胞减少关系最大的是()

- A. 脾亢
- B. 营养吸收障碍
- C. 上消化道出血
- D. 肝肾综合征
- E. 血小板减少

77. 真题 2013-J059 关于原发性肝癌的叙述, 错误的是()

- A. 发病与丙型肝炎病毒感染有关
- B. 原发性肝癌合并肝硬化多为小结节性肝硬化
- C. 黄曲霉毒素有较强的致癌作用
- D. 池塘中生长的蓝绿藻产生的微囊藻毒素可导致肝癌
- E. 亚硝胺、有机氯农药为可疑致癌物质

78. 真题 2013-J065 与肝硬化患者出现持续性白细胞减少关系最大的是()

- A. 脾功能亢进
- B. 营养吸收障碍
- C. 上消化道出血
- D. 肝肾综合征
- E. 血小板减少

79. 真题 2015-J074 患者, 男, 32 岁。昨晚与朋友饮酒后突发上腹部持续剧烈疼痛, 并向腰背部放射, 伴恶心呕吐, 呕吐物为胃内容物, 吐后腹痛不缓解, 来医院就诊。实验室检查: 血清淀粉酶 650U/L。初步诊断为急性胰腺炎。最可能的病因是()

- A. 胆管结石
- B. 酗酒和暴饮暴食
- C. 胰管结石
- D. 十二指肠液反流
- E. 急性胆囊炎

80. 真题 2018-J054 患者男, 51 岁, 肝癌, 今晨突发右上腹胀痛明显, 迅速蔓延至全腹, 难以忍受, 腹水呈血性。患者出现此状况的原因可能是()

- A. 门静脉血栓形成
- B. 原发性腹膜炎
- C. 急性消化道穿孔
- D. 癌结节破裂出血
- E. 急性肝坏死

81. 真题 2018-Z054 患者男, 50 岁。肝硬化病史 5 年。今日出现腹痛、腹胀和低热, 表情淡漠, 嗜睡。诊断考虑为肝性脑病, 对诊断帮助最大的体征是()

- A. 腱反射亢进
- B. 肌阵挛
- C. Babinski 征阳性
- D. 腹壁反射消失
- E. 扑翼样震颤

82. 真题 2013-X004 严重呕血患者应暂禁食()

- A. 2-4 小时
- B. 4-6 小时
- C. 6-8 小时
- D. 1-2 小时
- E. 8-24 小时

83. 真题 2018-Z056 某消化性溃疡患者经常胃出血，并发现黑便。出血量约为()

- A. 3~5ml
- B. 10ml
- C. 500ml
- D. 60ml
- E. 1000ml

84. 真题 2013-X010 质子泵阻滞剂作用机制是()

- A. 阻止组胺与其 H_2 受体相结合
- B. 抑制壁细胞分泌 H^+ 的 H^+-K^+-ATP 酶
- C. 与盐酸作用形成盐和水
- D. 与溃疡面结合形成防酸屏障
- E. 可降低基础及刺激后胃酸分泌

85. 真题 2013-Z015 以下哪项符合胃溃疡的特点()

- A. 发病年龄多为青年
- B. 好发于胃大弯
- C. 上腹压痛点常在上腹偏右
- D. 疼痛多在饭后 3~4 小时发生
- E. X 线钡餐检查有龛影

86. 真题 2013-Z005 某患者肝炎后肝硬化，近日食欲欠佳，腹胀，体检：腹部有移动性浊音，提示()

- A. 腹水
- B. 肠胀气
- C. 腹膜炎
- D. 胆囊结石
- E. 胰管梗死

87. 真题 2010-J082 患者，男，50 岁。夜间上腹烧灼痛发作 2 月余，进食或服阿托品后迅速缓解，诊断为十二指肠溃疡。进食后疼痛缓解的机制是()

- A. 交感神经兴奋
- B. 胃酸被中和
- C. 胃酸增多
- D. 平滑肌松弛
- E. 迷走神经张力增加

88. 真题 2010-J088 患者，女，44 岁。胆石症患者，今餐后 1 小时突发恶心、呕吐，腹痛，抽搐，腹痛位于上腹正中，为持续性刀割样，阵发性加剧，向腰背部呈带状放射，弯腰抱膝可使疼痛减轻，查血淀粉酶 680U/L。患者抽搐的原因最可能是()

- A. 低血糖
- B. 低血钙
- C. 高血糖
- D. 高血钾
- E. 低血氯

89. 真题 2013-Z014 某消化性溃疡患者，原有疼痛节律消失，变为持续上腹痛，伴频繁呕吐，呕吐物含发酵性宿食。最可能的并发症是()

- A. 幽门梗阻
- B. 急性胰腺炎
- C. 穿孔
- D. 胃癌
- E. 上消化道出血

90. 真题 2013-Z016 肝硬化最危重的并发症是()

- A. 肝性脑病
- B. 原发性肝癌
- C. 肝肾综合征
- D. 自发性腹膜炎
- E. 上消化道大出血

91. 真题 2013-Z017 下面哪一项不是门静脉高压症的常见表现()

- A. 脾大
- B. 肝大
- C. 食管静脉曲张破裂出血
- D. 腹水
- E. 痔核形成

92. 真题 2013-Z046 肝癌患者首发症状是()

- A. 消瘦
- B. 恶心呕吐
- C. 肝区疼痛
- D. 黄疸
- E. 贫血

93. 真题 2013-Z049 女性，61 岁，暴饮后突发急性胰腺炎入院，观察时要警惕该患者可能发生的最常见并发症是()

- A. 休克
- B. 化脓感染
- C. 肾衰竭
- D. 中毒性脑病
- E. 胰腺假性囊肿

94. 真题 2014-J012 与原发肝癌的发生关系最密切的是()

- A. 胆道感染
- B. 肝炎后肝硬化
- C. 酒精性肝硬化
- D. 血吸虫性肝硬化
- E. 肝脏良性肿瘤

95. 真题 2014-J022 引起慢性胃炎常见的细菌是()

- A. 沙门菌
- B. 大肠杆菌
- C. 嗜盐杆菌
- D. 空肠弯曲菌

E. 幽门螺杆菌

96. 真题 2014-J042 溃疡性结肠炎的临床表现与哪种细菌的感染相似()

- A. 幽门螺杆菌
- B. 沙门菌
- C. 嗜盐菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 痢疾杆菌

97. 真题 2018-J069 下列不属于引发原发性肝癌的原因是()

- A. 乙型病毒性肝炎
- B. 肝硬化
- C. 饮食中含多量粗纤维
- D. 黄曲霉毒素
- E. 华支睾吸虫感染

98. 真题 2014-J062 以下哪类病毒性肝炎不会引起肝硬化()

- A. 甲型肝炎
- B. 乙型肝炎
- C. 丙型肝炎
- D. 丁型肝炎
- E. 庚型肝炎

99. 真题 2014-J099 上消化道出血最常见的原因是()

- A. 慢性胃炎
- B. 食管-胃底静脉曲张
- C. 胃癌
- D. 消化性溃疡
- E. 贲门黏膜撕裂症

100. 真题 2014-J100 上消化道大量出血最常见的原因是()

- A. 慢性胃炎
- B. 食管-胃底静脉曲张
- C. 胃癌
- D. 消化性溃疡
- E. 贲门黏膜撕裂症

101. 真题 2014-X002 肝炎患者眼结膜黄染的原因是()

- A. 血中胆固醇增高
- B. 血中二氧化碳增高
- C. 血中氧含量增高
- D. 血中胆红素增高
- E. 红细胞破坏

102. 真题 2014-X021 血清蛋白显著降低应考虑()

- A. 肝硬化
- B. 肺炎
- C. 支气管炎
- D. 哮喘
- E. 贫血

103. 真题 2014-X071 患者,男,45岁。饱餐后突发上腹刀割样剧烈疼痛,并迅速蔓延至全腹2小时,伴恶心呕吐。查体:面色苍白,体温37℃,脉搏90次/分,血压105/75mmHg,腹式呼吸消失,全腹有压痛、反跳痛和肌紧张,肝浊音界缩小,肠鸣音消失,拟诊为胃溃疡穿孔。有助于诊断的辅助检查是()

- A. MRI
- B. 选择性腹腔动脉造影
- C. CT
- D. 立位X线腹部透视或平片
- E. B超

104. 真题 2014-X074 患者,男,50岁。以餐后腹部烧灼痛,黑便2日入院。对其诊断最有价值的辅助检查是()

- A. 胃镜检查
- B. 血常规检查
- C. 选择性动脉造影
- D. X线检查
- E. 胃液分析检查

105. 真题 2014-X088 可破坏胃黏膜屏障的药物是()

- A. 枸橼酸铋钾
- B. 法莫替丁
- C. 吡哌美辛
- D. 硫糖铝
- E. 阿托品

106. 真题 2014-X089 可保护胃黏膜、杀灭幽门螺杆菌的药物是()

- A. 枸橼酸铋钾
- B. 法莫替丁
- C. 吡哌美辛
- D. 硫糖铝
- E. 阿托品

107. 真题 2014-Z003 慢性胃炎最常见的临床表现是()

- A. 无症状
- B. 反复黑便
- C. 呕吐咖啡色液体
- D. 饥饿感、夜间痛
- E. 上腹饱胀不适、疼痛

108. 真题 2014-Z017 护士指导肝硬化患者禁食油炸、粗纤维食物的原因是()

- A. 预防食管黏膜出血
- B. 严格限制钠的摄入
- C. 抑制假神经递质
- D. 减轻肝脏解毒功能
- E. 减少肠道氨的吸收

109. 真题 2018-X080 对原发性肝癌最有意义的检测是()

- A. 癌胚抗原
- B. 甲胎蛋白

- C. 血浆蛋白
- D. 粪便隐血
- E. 肝功能

110. 真题 2014-Z022 肝硬化患者肝功能失代偿期最突出的临床表现是()

- A. 食欲不振
- B. 恶心、呕吐
- C. 乏力、黄疸
- D. 肝脏增大
- E. 腹水

111. 真题 2014-Z025 溃疡性结肠炎急性发作期患者正确的饮食是()

- A. 给予冷饮
- B. 给予牛乳等高蛋白饮食
- C. 给予富含纤维素的水果
- D. 给予富含纤维素的蔬菜
- E. 给予少渣流质或半流质饮食

112. 真题 2018-X082 患者男, 50 岁。餐后上腹部烧灼痛 2 个月, 黑便 2 日入院。对其诊断最有价值的辅助检查是()

- A. 胃镜检查
- B. 血常规检查
- C. 选择性动脉造影
- D. X 线检查
- E. 胃液分析检查

113. 真题 2014-Z029 肝性脑病的护理措施中, 最重要的环节是()

- A. 加强安全措施
- B. 去除和避免一切诱发因素
- C. 注意休息
- D. 合理饮食
- E. 密切观察病情变化

114. 真题 2014-Z055 上消化道出血的饮食护理, 不正确的是()

- A. 严重呕血者要暂时禁食 8-24 小时
- B. 溃疡伴小量出血一般不需禁食
- C. 食管静脉曲张破裂出血要禁食
- D. 一般溃疡出血可进牛奶等流质饮食
- E. 大便隐血试验持续阳性, 应暂时禁食

115. 真题 2014-Z060 患者, 女, 38 岁。每次餐后 30-60 分钟上腹部有烧灼感, 持续 1-2 小时, 此腹痛特点应考虑是()

- A. 慢性胃炎
- B. 食管炎
- C. 胃溃疡
- D. 十二指肠溃疡
- E. 胰腺炎

116. 真题 2015-X004 大便呈柏油样常见于()

- A. 痢疾
- B. 上消化道出血
- C. 直肠癌
- D. 霍乱
- E. 胰腺炎

117. 真题 2015-X021 原发性肝癌非手术治疗的首选方法是()

- A. 放射治疗
- B. 化学治疗
- C. 肝动脉化疗栓塞治疗
- D. 中药治疗
- E. 免疫治疗

118. 真题 2017-X087 患者男, 40 岁, 肝硬化病史 2 年, 高蛋白饮食后出现睡眠障碍, 定向力减退, 脑电异常, 下列治疗措施中不正确的是()

- A. 限制蛋白饮食
- B. 硫酸镁导泻
- C. 弱碱性溶液灌肠
- D. 乳果糖口服
- E. 精氨酸滴注

119. 真题 2015-X067 患者, 男, 65 岁。肝硬化病史 2 年, 近日出现持续肝区疼痛。急诊入院行超声检查示腹腔大量腹水, 肝脏增大伴弥漫性改变, 肝右叶可见多个大小不等的强回声光团。最可能的诊断是()

- A. 肝硬化癌变
- B. 肝硬化失代偿期
- C. 肝肾综合征
- D. 肝硬化腹水
- E. 肝硬化、肝囊肿

120. 真题 2017-X088 对原发性肝癌诊断有价值的化验检查是()

- A. 甲胎蛋白增高
- B. 癌胚抗原增高
- C. 淀粉酶增高
- D. 碱性磷酸酶增高
- E. 酸性磷酸酶增高

121. 真题 2015-X081 患者, 男, 57 岁。肝硬化病史 10 年。近 3 天来大便不畅, 逐渐出现嗜睡、幻觉。脑电图变现异常, 节律变慢, 出现 S 波。医生给予弱酸性溶液灌肠, 其目的是()

- A. 减少氨的吸收
- B. 减少血氨形成
- C. 促进体内尿素形成
- D. 减少肠道氨的形成
- E. 取代脑中假性神经传导介质

122. 真题 2017-J089 吃腌制食物与肝癌发病有一定的关系, 是因为腌制食物中含有()

- A. 亚硝酸盐

- B. 黄曲霉素
- C. 偶氮苯胺物质
- D. 较高的铁
- E. 较高的苯

123. 真题 2017-X089 对急性胰腺炎诊断有价值的化验检查是()

- A. 甲胎蛋白增高
- B. 癌胚抗原增高
- C. 淀粉酶增高
- D. 碱性磷酸酶增高
- E. 酸性磷酸酶增高

124. 真题 2015-J001 与消化性溃疡发病相关的损害性因素中, 占主导地位的是()

- A. 幽门螺杆菌感染
- B. 饮食失调
- C. 吸烟
- D. 精神因素
- E. 胃酸、胃蛋白酶

125. 真题 2018-J090 与急性胰腺炎的发病有关的是()

- A. 暴饮暴食
- B. 遗传因素
- C. 胆汁反流
- D. 慢性肝炎
- E. 循环障碍

126. 真题 2015-J003 慢性胃炎常见的病原菌是()

- A. 幽门螺杆菌
- B. 四联球菌
- C. 链球菌
- D. 支原体
- E. 衣原体

127. 真题 2018-J091 与肝硬化的发病有关的是()

- A. 暴饮暴食
- B. 遗传因素
- C. 胆汁反流
- D. 慢性肝炎
- E. 循环障碍

128. 真题 2015-J004 在我国, 肝硬化的主要病因是()

- A. 血吸虫病
- B. 病毒性肝炎
- C. 胆石症
- D. 胆道蛔虫病
- E. 胃溃疡

129. 真题 2018-J092 与原发肝癌的发病有关的是()

- A. 暴饮暴食
- B. 遗传因素
- C. 胆汁反流
- D. 慢性肝炎
- E. 循环障碍

130. 真题 2015-J045 引起原发性肝癌的原因不包括()

- A. 乙型病毒性肝炎
- B. 肝硬化
- C. 饮食中含多量粗纤维
- D. 长期饮用蓝绿藻污染水
- E. 黄曲霉真菌

131. 真题 2015-J095 目前认为最强的胃酸分泌抑制剂是()

- A. 硫糖铝
- B. 氢氧化铝
- C. 西咪替丁
- D. 雷尼替丁
- E. 奥美拉唑

132. 真题 2015-J096 属于保护胃黏膜的药物是()

- A. 硫糖铝
- B. 氢氧化铝
- C. 西咪替丁
- D. 雷尼替丁
- E. 奥美拉唑

133. 真题 2015-Z016 十二指肠溃疡的典型临床表现是()

- A. 可向右肩部放射
- B. 夜间痛不明显
- C. 持续性绞痛
- D. 夏季好发
- E. 饥饿痛

134. 真题 2015-Z025 上消化道大出血伴休克时首选的护理措施是()

- A. 迅速建立静脉通路
- B. 按医嘱采用止血措施
- C. 准备急救药品
- D. 稳定患者情绪
- E. 迅速配血

135. 真题 2015-Z030 关于对肝性脑病患者的护理措施, 不妥的叙述是()

- A. 禁蛋白饮食
- B. 弱酸溶液灌肠
- C. 保持大便通畅
- D. 烦躁者给镇静剂
- E. 注意观察生命体征

136. 真题 2015-Z040 溃疡性结肠炎并发症不包括()

- A. 肠梗阻
- B. 腹膜炎
- C. 中毒性巨结肠
- D. 肠穿孔
- E. 结肠癌变

137. 真题 2017-J099 上消化道出血常见的原因是()

- A. 慢性胃炎
- B. 食管胃底静脉曲张
- C. 胃癌
- D. 消化性溃疡
- E. 贲门粘膜撕裂症

138. 真题 2015-Z047 患者,男,35岁。服用吲哚美辛后胃痛,今晨呕吐咖啡渣样胃内容物约 250ml 来就诊,既往无胃病史。首选的检查是()

- A. 胃液分析
- B. X 线钡餐检查
- C. 幽门螺杆菌检查
- D. 血清胃泌素测定
- E. 急诊胃镜

139. 真题 2017-J100 上消化道大量出血最常见的原因是()

- A. 慢性胃炎
- B. 食管胃底静脉曲张
- C. 胃癌
- D. 消化性溃疡
- E. 贲门粘膜撕裂症

140. 真题 2015-Z058 患者,男,65岁。胃溃疡病史 30 年。近 2 周上腹部持续疼痛,服用治疗胃溃疡的药物无效,并伴有黑便多次。患者可能的并发症为()

- A. 出血
- B. 癌变
- C. 幽门梗阻
- D. 穿孔
- E. 胃炎

141. 真题 2016-J033 慢性胃炎的主要病因是()

- A. 幽门螺杆菌感染
- B. 消炎药物
- C. 烟酒过度
- D. 暴饮暴食
- E. 胆汁反流

142. 真题 2016-X003 肝炎病人眼结膜黄染的原因是()

- A. 血中胆固醇增高
- B. 血中二氧化碳增高
- C. 血中氧含量增高
- D. 血中胆红素增高
- E. 红细胞破坏增多

143. 真题 2016-X005 对肝硬化具有确诊价值的检查是()

- A. X 线检查
- B. 肝功能检查
- C. 免疫学检查
- D. 肝穿刺活检
- E. 血生化检查

144. 真题 2016-X007 皮肤出现蜘蛛痣见于()

- A. 肺炎
- B. 再生障碍性贫血
- C. 缺铁性贫血
- D. 严重肝硬化
- E. 肾盂肾炎

145. 真题 2016-X030 肝性脑病患者并发上消化道出血时,应避免输入的血液制品为()

- A. 库存血
- B. 新鲜血
- C. 白蛋白
- D. 血浆
- E. 血小板

146. 真题 2016-X032 对胃酸抑制作用最强的是()

- A. 硫糖铝
- B. 奥美拉唑
- C. 氢氧化铝
- D. 西咪替丁
- E. 枸橼酸铋钾

147. 真题 2016-X057 肝硬化的腹水属于()

- A. 漏出液
- B. 渗出液
- C. 血性
- D. 脓性
- E. 乳糜性

148. 真题 2016-Z004 消化性溃疡最常见的并发症是()

- A. 穿孔
- B. 出血
- C. 幽门梗阻
- D. 癌变
- E. 感染

149. 真题 2016-Z013 使用双气囊三腔管时,正确的护理措施是()

- A. 先向食道囊注气,再向胃囊注气
- B. 食道囊和胃囊各注气约 30ml
- C. 置管期间每隔 12 小时放气 1 次
- D. 出血停止后即可拔管
- E. 拔管后 24 小时仍需严密观察

150. 真题 2016-Z022 胃炎患者,有少量出血,恰当的饮食是()

- A. 高热量高纤维饮食
- B. 无特别禁忌
- C. 牛奶,米汤等温凉流质饮食
- D. 易消化,营养丰富饮食
- E. 少渣,半流质饮食

151. 真题 2016-Z025 肝性脑病患者需限制的食物是()

- A. 水果
- B. 蔬菜
- C. 肉类

- D. 米饭
- E. 面食

152. 真题 2016-Z040 溃疡性结肠炎最突出的消化系统症状是()

- A. 腹泻
- B. 腹痛
- C. 腹胀
- D. 食欲不振
- E. 恶心、呕吐

153. 真题 2016-Z080 患者男, 50 岁。确诊乙型肝炎 20 年, 长期需要家人照顾其生活起居, 今日该患者因食欲不振、厌油、腹胀 3 个月。加重 1 个月入院, 查体: 全身散在皮肤紫癜, 腹部胀痛, 叩诊移动性浊音阳性, 肝脏触诊质硬有结节感, 边缘较薄, 无压痛。实验室检查 ALT (GPT) 显著升高, AFP 正常。最可能的诊断是()

- A. 酒精性肝病
- B. 肝硬化
- C. 原发性肝癌
- D. 结核性腹膜炎
- E. 腹腔内肿瘤

154. 真题 2016-Z081 患者男, 50 岁。确诊乙型肝炎 20 年, 长期需要家人照顾其生活起居, 今日该患者因食欲不振、厌油、腹胀 3 个月。加重 1 个月入院, 查体: 全身散在皮肤紫癜, 腹部胀痛, 叩诊移动性浊音阳性, 肝脏触诊质硬有结节感, 边缘较薄, 无压痛。实验室检查 ALT (GPT) 显著升高, AFP 正常。若该患者腹水诊断明确, 每日摄入的钠盐应控制在()

- A. 1-2g/d
- B. 2-3g/d
- C. 3-4g/d
- D. 4-5g/d
- E. 5-6g/d

155. 真题 2016-Z082 患者男, 50 岁。确诊乙型肝炎 20 年, 长期需要家人照顾其生活起居, 今日该患者因食欲不振、厌油、腹胀 3 个月。加重 1 个月入院, 查体: 全身散在皮肤紫癜, 腹部胀痛, 叩诊移动性浊音阳性, 肝脏触诊质硬有结节感, 边缘较薄, 无压痛。实验室检查 ALT (GPT) 显著升高, AFP 正常。若该患者入院第 3 天早饭后感腹胀不适, 并呕吐咖啡渣样液体, 随即出现乏力、皮肤湿冷。测 BP80/50mmHg, HR138 次/分。则该患者目前首要的护理问题是()

- A. 体液不足
- B. 焦虑
- C. 活动无耐力
- D. 营养失调: 低于机体需要量
- E. 潜在并发症: 休克

156. 真题 2016-Z083 患者男, 50 岁。确诊乙型肝炎 20 年, 长期需要家人照顾其生活起居, 今日该患者因食欲不振、厌油、腹胀 3 个月。加重 1 个月入院, 查体: 全身散在皮肤紫癜, 腹部胀痛, 叩诊移动性浊音阳性, 肝

脏触诊质硬有结节感, 边缘较薄, 无压痛。实验室检查: ALT (GPT) 显著升高, AFP 正常。为了早期预防患者肝性脑病的发生, 最应该采取的护理措施是()

- A. 指导患者戒烟、戒酒
- B. 积极补充血容量
- C. 清理消化道内积血
- D. 放腹水时严格无菌操作
- E. 给予高热量、高蛋白、易消化的饮食

157. 模拟题 引起慢性胃炎的主要病因是()

- A. 幽门螺旋杆菌感染
- B. 自身免疫反应
- C. 机械因素影响
- D. 化学因素影响
- E. 黏膜退变

158. 模拟题 消化性溃疡形成的直接原因是()

- A. 胃酸对胃黏膜的侵袭作用
- B. 幽门螺杆菌感染
- C. 胃蛋白酶的蛋白水解作用
- D. 过度精神紧张
- E. 遗传因素

159. 模拟题 肝硬化患者禁食粗硬食物的目的是()

- A. 减少肠道氨的吸收
- B. 严格限制钠的摄入
- C. 抑制假性神经递质
- D. 减轻肝脏解毒功能
- E. 防止食管—胃底静脉曲张破裂

160. 模拟题 胃壁主细胞分泌的是()

- A. 碱性黏液
- B. 促胃液素
- C. 胃蛋白酶原
- D. 盐酸
- E. 抗贫血因子

161. 模拟题 患者, 男, 42 岁。与朋友聚餐大量饮酒、吃肉后出现上腹持续性刀割样疼痛, 阵发性加剧, 伴恶心、呕吐、发热, 体温 38.5℃, 急查血, 血清淀粉酶超过正常值 4 倍, 诊断为急性胰腺炎。急诊收入院后, 护士收集的患者资料中与急性胰腺炎的发病有关的是()

- A. 父母双方均有高血压病史
- B. 睡眠欠佳
- C. 有胆绞痛史
- D. 19 岁时曾患甲型肝炎
- E. 青霉素过敏史

162. 模拟题 可诱发消化性溃疡的药物是()

- A. 阿司匹林
- B. 雷尼替丁
- C. 奥美拉唑
- D. 碳酸氢铝
- E. 枸橼酸铋钾

163. 模拟题 慢性胃炎患者应避免应用()

- A. 链霉素
- B. 庆大霉素
- C. 泼尼松
- D. 吗丁啉
- E. 甲氧氯普胺

164. 模拟题 血淀粉酶显著增高见于()

- A. 胰腺炎
- B. 溃疡病
- C. 急性肝炎
- D. 肝硬化
- E. 心肌炎

165. 模拟题 肠结核好发于()

- A. 小肠
- B. 回盲部
- C. 外结肠
- D. 横结肠
- E. 乙状结肠

166. 模拟题 患者,男,40岁。腹部叩及移动性浊音,标志腹水量为()

- A. 200ml 以上
- B. 500ml 以上
- C. 600~800ml 以上
- D. 1000ml 以上
- E. 2000ml 以上

167. 模拟题 胃溃疡伴小量出血无呕吐者可给予()

- A. 暂禁食
- B. 温凉、流质饮食
- C. 禁蛋白饮食
- D. 低蛋白饮食
- E. 低盐饮食

168. 模拟题 患者,男。肝硬化病史16年,近4个月出现顽固性腹腔积液,最佳的治疗方案是()

- A. 腹膜透析
- B. 甘露醇导泻
- C. 腹腔穿刺放腹腔积液
- D. 控制出入量
- E. 腹腔积液浓缩回输

169. 模拟题 患者,女,32岁。3年来常出现左上腹痛,常在进食后疼痛,先后曾呕血3次,胃肠钡餐检查未发现明显异常,体检仅上腹压痛。该患者最有可能的诊断是()

- A. 慢性胃炎
- B. 胃癌
- C. 胃溃疡
- D. 肠梗阻
- E. 十二指肠溃疡

170. 模拟题 消化性溃疡的主要症状是()

- A. 恶心
- B. 呕吐
- C. 反酸
- D. 嗝气
- E. 上腹痛

171. 模拟题 下列可破坏胃黏膜屏障的药物是()

- A. 枸橼酸铋钾
- B. 法莫替丁
- C. 吡哌美辛
- D. 雷尼替丁
- E. 西沙必利

172. 模拟题 确诊消化性溃疡的首选检查方法是()

- A. 幽门螺杆菌检查
- B. 胃液分析
- C. 血清学检查
- D. 胃镜及胃黏膜活组织检查
- E. 大便隐血试验

173. 模拟题 下列关于溃疡性结肠炎的描述,错误的是()

- A. 出现黏液脓血便
- B. 腹痛主要局限在右下腹
- C. 活动期有低热或中等度发热
- D. 具有“疼痛—便意—便后缓解”的规律
- E. 活动期有轻或中度腹痛,为左下腹或下腹的阵痛

174. 模拟题 上消化道出血患者的粪便可呈()

- A. 脓血样
- B. 果酱样
- C. 米泔水样
- D. 柏油样
- E. 白陶土样

175. 模拟题 患者,女,79岁。丙型肝炎病史25年,肝硬化病史10年,现确诊为肝性脑病,给予患者乳果糖口服的目的是()

- A. 酸化肠道
- B. 保护脑细胞功能
- C. 减少腹水
- D. 预防电解质紊乱
- E. 促进有毒物质的代谢清除

176. 模拟题 患者,男,50岁。患肝炎后肝硬化已6年,近日牙龈出血就诊。查体腹水征(+),查血红细胞 $3.0 \times 10^{12}/L$,白细胞 $3.2 \times 10^9/L$,血小板 $62 \times 10^9/L$,大便隐血试验(+),腹水化验为漏出液,每天尿量300ml,血尿素氮及血肌酐均高。根据血常规化验结果可考虑为()

- A. 缺铁性贫血
- B. 血小板减少性紫癜
- C. 急性再障
- D. 慢性再障

E. 脾功能亢进

177. 模拟题 患者,男,50岁。患肝炎后肝硬化已6年,近日牙龈出血就诊。查体腹水征(+),查血红细胞 $3.0 \times 10^{12}/L$,白细胞 $3.2 \times 10^9/L$,血小板 $62 \times 10^9/L$,大便隐血试验(+),腹水化验为漏出液,每天尿量300ml,血尿素氮及血肌酐均高。腹水化验为漏出性,其原因是()

- A. 血浆清蛋白减少
- B. 细菌感染
- C. 血钠增高
- D. 肾功能不全
- E. 球蛋白过多

178. 模拟题 患者,男,50岁。患肝炎后肝硬化已6年,近日牙龈出血就诊。查体腹水征(+),查血红细胞 $3.0 \times 10^{12}/L$,白细胞 $3.2 \times 10^9/L$,血小板 $62 \times 10^9/L$,大便隐血试验(+),腹水化验为漏出液,每天尿量300ml,血尿素氮及血肌酐均高。患者每天尿量300ml,血尿素氮及血肌酐增高提示()

- A. 肝肾综合征
- B. 脾功能亢进
- C. 肝功能不全
- D. 心力衰竭
- E. 肾功能不全

179. 模拟题 不利于溃疡病大出血治疗的是()

- A. 禁食
- B. 内镜直视下止血
- C. 给予去甲肾上腺素
- D. 补液和输血
- E. 给予阿托品等解痉药

180. 模拟题 患者,男,52岁。肝硬化,大量腹水。入院后给予利尿剂治疗,腹水量明显减少,但患者出现了淡漠少言、反应迟钝、言语不清等症状。该患者可能出现的电解质紊乱是()

- A. 代谢性酸中毒
- B. 代谢性碱中毒
- C. 呼吸性酸中毒
- D. 呼吸性碱中毒
- E. 混合性酸中毒

181. 模拟题 患者,男,52岁。肝硬化,大量腹水。入院后给予利尿剂治疗,腹水量明显减少,但患者出现了淡漠少言、反应迟钝、言语不清等症状。对于该患者的饮食护理,应特别注意()

- A. 限制蛋白质每天为 $1 \sim 1.5g/kg$
- B. 易消化、高蛋白、高热量饮食
- C. 多饮水,多吃新鲜蔬菜和水果
- D. 首选动物蛋白,增加营养
- E. 控制糖的摄入量

182. 模拟题 患者,男,52岁。肝硬化,大量腹水。

入院后给予利尿剂治疗,腹水量明显减少,但患者出现了淡漠少言、反应迟钝、言语不清等症状。若此时给患者做心电图检查,最可能的改变是()

- A. 无异常改变
- B. 波形正常,节律变慢
- C. 波形正常,节律变快
- D. 出现每秒 $1 \sim 3$ 次的S波
- E. 出现每秒 $4 \sim 7$ 次的S波

183. 模拟题 肝硬化患者侧支循环形成时最重要的交通支是()

- A. 直肠下段、肛管交通支
- B. 腹膜后交通支
- C. 胃底、食管下段交通支
- D. 脐旁静脉与腹壁上静脉交通支
- E. 脐旁静脉与腹壁下静脉交通支

184. 模拟题 在我国引起急性胰腺炎的最常见病因是()

- A. 胆道疾病
- B. 胰管阻塞
- C. 酗酒和暴饮暴食
- D. 十二指肠及周围疾病
- E. 腹部手术

185. 模拟题 肠结核的好发部位是()

- A. 空肠
- B. 回肠上端
- C. 回盲部
- D. 升结肠
- E. 乙状结肠

186. 模拟题 上消化道呕出大量鲜红色血且不易控制,该出血的常见病因为()

- A. 十二指肠球后溃疡出血
- B. 应激性溃疡出血
- C. 食管-胃底静脉曲张破裂出血
- D. 胆道出血
- E. 胃癌出血

187. 模拟题 轻度溃疡性结肠炎药物治疗首选()

- A. 口服抗生素
- B. 硫唑嘌呤
- C. 乳酸杆菌制剂
- D. 糖皮质激素
- E. 柳氮磺吡啶

188. 模拟题 下列诊断肝性脑病最有意义的体征是()

- A. 巴宾斯基征阳性
- B. 锥体束征阳性
- C. 扑翼样震颤
- D. 肌张力增高
- E. 踝阵挛阳性

189. 模拟题 胃食管反流病患者服用胃动力药时,不宜

合用的药物是()

- A. 阿托品
- B. 地西泮
- C. 新斯的明
- D. 阿莫西林
- E. 谷氨酸钾

190. 模拟题 在消化性溃疡的治疗中,抑制胃酸分泌作用最强的药物是()

- A. 碳酸镁
- B. 西咪替丁
- C. 碳酸氢钠
- D. 枸橼酸铍钾
- E. 奥美拉唑

191. 模拟题 患儿,女,5岁。流行性腮腺炎,第2天出现上腹疼痛伴发热、呕吐,上腹部压痛,判断病变是否累及胰腺,应测定血清中的()

- A. 脂肪酶
- B. 蛋白酶
- C. 乳酸脱氢酶
- D. 碱性磷酸酶
- E. 葡萄糖酸酐转移酶

192. 模拟题 患者,女,50岁。肝硬化10余年伴大量腹水,近日出现意识障碍,血氨增高,肝肾功能减退,下列治疗不妥的是()

- A. 加强利尿,减少腹水
- B. 精氨酸静脉滴注
- C. 口服乳果糖,降低肠腔pH,减少氨的形成和吸收
- D. 静脉注射支链氨基酸补充能量,降低血氨
- E. 选用谷氨酸钠,降低血氨

193. 模拟题 蛙腹的大量腹水最常见于()

- A. 肝硬化门静脉高压症
- B. 心力衰竭
- C. 缩窄性心包炎
- D. 结核性腹膜炎
- E. 腹膜转移性肿瘤

194. 模拟题 患者,女。急性腹痛发作10小时入院,下列哪项检查对诊断急性胰腺炎最有价值()

- A. 血清淀粉酶测定
- B. 血清脂肪酶测定
- C. 血糖测定
- D. 血清钙测定
- E. 血清丙氨酸氨基转移酶测定

195. 模拟题 降低胃内酸度作用最强的药物是()

- A. 含铝抗酸剂
- B. H₂受体拮抗剂
- C. 质子泵抑制剂
- D. 抗胆碱能药物
- E. 胃泌素受体拮抗剂

196. 模拟题 患者,男,42岁。间歇性上腹痛3年,有嗝气、反酸、食欲不振,冬春季节较常发作。近3天来腹痛加剧,且突然呕血400ml。该患者出血的原因,最有可能的是()

- A. 慢性胃炎
- B. 消化性溃疡
- C. 胃癌
- D. 胃肠道黏膜糜烂
- E. 肝硬化

197. 模拟题 患者,男,42岁。间歇性上腹痛3年,有嗝气、反酸、食欲不振,冬春季节较常发作。近3天来腹痛加剧,且突然呕血400ml。最适宜采取何种治疗()

- A. 禁食
- B. 禁食+输液治疗
- C. 禁食+输血治疗
- D. 禁食+输液+法莫替丁
- E. 输血治疗+酸磺乙胺

198. 模拟题 下列不属于肝性脑病病理基础的是()

- A. 含氮物质代谢障碍
- B. 假性神经递质积聚
- C. GABA血浓度增高
- D. 芳香族氨基酸增多而支链氨基酸减少
- E. 低蛋白饮食

199. 模拟题 急性胰腺炎时关于血、尿淀粉酶改变,错误的是()

- A. 尿淀粉酶增高迟于血清淀粉酶
- B. 尿淀粉酶下降较血清淀粉酶晚
- C. 血清淀粉酶测定值大于200U有诊断意义
- D. 淀粉酶越高诊断的正确率越大
- E. 淀粉酶的高低与病变程度不一定呈正比

200. 模拟题 患者,男,55岁。呕血及黑便2天。体检:脾中度肿大,肝肋下2cm,剑突下3cm,结节状,质硬,移动性浊音(-)。血清甲胎蛋白(AFP)850pg/L。急诊纤维内镜检查:食管下端中度静脉曲张,伴出血。患者10年前曾患病毒性肝炎。定位诊断中首选的检查是()

- A. 磁共振成像(MRI)
- B. B型超声波显像(B超)
- C. 数字减影肝动脉造影(DSA)
- D. X线电子计算机断层成像(CT)
- E. 放射性核素断层肝扫描(ECT)

201. 模拟题 患者,男,55岁。呕血及黑便2天。体检:脾中度肿大,肝肋下2cm,剑突下3cm,结节状,质硬,移动性浊音(-)。血清甲胎蛋白(AFP)850pg/L。急诊纤维内镜检查:食管下端中度静脉曲张,伴出血。患者10年前曾患病毒性肝炎。患者并发上消化道大出血,其紧急处理措施是()

- A. 肝叶切除术
- B. 脾切除术

- C. 三腔二囊管压迫
- D. 门腔静脉分流术
- E. 肝固有动脉结扎术

202. 模拟题 患者,男,55岁。呕血及黑便2天。体检:脾中度肿大,肝肋下2cm,剑突下3cm,结节状,质硬,移动性浊音(-)。血清甲胎蛋(AFP)850pg/L。急诊纤维内镜检查:食管下端中度静脉曲张,伴出血。患者10年前曾患病毒性肝炎。患者行半肝切除术后24小时,对其护理错误的是()

- A. 平卧位
- B. 间歇吸氧
- C. 补充清蛋白
- D. 补充血容量
- E. 鼓励早期下床活动

203. 模拟题 王先生,患肝硬化已4年,今天饮酒后突然大量呕血,伴神志恍惚、四肢湿冷、血压下降。据上述资料判断患者出血量约为()

- A. 500ml
- B. 600ml
- C. 700ml
- D. 800ml
- E. 1000ml 以上

204. 模拟题 王先生,患肝硬化已4年,今天饮酒后突然大量呕血,伴神志恍惚、四肢湿冷、血压下降。此时最有效的止血方法是()

- A. 静脉滴注西咪替丁
- B. 胃内灌注去甲肾上腺素
- C. 补充血容量
- D. 生长抑素
- E. 三腔二囊管压迫止血

205. 模拟题 溃疡性结肠炎主要临床表现是()

- A. 恶心、呕吐
- B. 厌食、消瘦
- C. 腹胀、腹痛
- D. 腹泻
- E. 发热

206. 模拟题 患者,男,60岁。肝硬化5年,少量腹水,口服利尿剂,近日为补充营养,口服蛋白粉。今日家属发现其表情淡漠,回答问题准确,但吐字不清,有双手扑翼样震颤,初步诊断肝性脑病,其发病诱因为()

- A. 上消化道出血
- B. 高蛋白饮食
- C. 感染
- D. 大量排钾利尿
- E. 放腹水

207. 模拟题 患者,男。消化性溃疡患者,经常胃出血,近期出现黑粪,估计其出血量为()

- A. 3~5ml
- B. 30ml

- C. 60ml
- D. 200ml
- E. 500ml

208. 模拟题 当肝硬化患者腹水呈血性时,应首先考虑合并()

- A. 腹腔内有出血点
- B. 癌变
- C. 肝肾综合征
- D. 门静脉血栓形成
- E. 肝脏破裂

209. 模拟题 肝性脑病前驱期的主要表现是()

- A. 轻度性格行为异常
- B. 意识错乱、睡眠障碍
- C. 昏睡、精神错乱
- D. 神志完全丧失
- E. 嗜睡、神经失常

210. 模拟题 戊型肝炎的特点不包括()

- A. 水源污染可引起爆发流行
- B. 主要表现为急性肝炎
- C. 感染后免疫力不持久
- D. 孕妇易感性较高
- E. 戊型肝炎无明显季节性

211. 模拟题 关于上消化道出血的定义,正确的是()

- A. 贲门以上部位出血
- B. 幽门以上部位出血
- C. 空肠以上部位出血
- D. 屈氏韧带以上部位出血
- E. 十二指肠乳头以上部位出血

212. 真题 2019-J009 在我国,肝硬化的主要病因是()

- A. 血吸虫病
- B. 病毒性肝炎
- C. 胆石症
- D. 胆道蛔虫症
- E. 胃溃疡

213. 真题 2019-J017 慢性胃炎常见的病原菌是()

- A. 幽门螺杆菌
- B. 四联球菌
- C. 链球菌
- D. 支原体
- E. 衣原体

214. 真题 2019-J040 患者男,42岁,饱餐后出现上腹持续性疼痛并向左肩、腰背部放射,伴恶心呕吐,诊断为急性胰腺炎,入院后首选的治疗中与其疾病相关的是()

- A. 患者父亲因冠心病去世
- B. 平时喜食素食
- C. 不嗜烟酒
- D. 有胆绞痛史

E. 24 岁时做过阑尾切除术

215. 真题 2019-J059 溃疡性结肠炎的好发部位是()

- A. 升结肠中
- B. 回盲部
- C. 空肠
- D. 横结肠
- E. 直肠、乙状结肠

216. 真题 2019-J063 上消化道大出血的最常见原因是()

- A. 消化性溃疡
- B. 食管胃底
- C. 肝硬化
- D. 肝炎
- E. 胃癌

217. 真题 2019-J066 引起原发性肝癌的原因不包括()

- A. 乙型病毒性肝炎
- B. 肝硬化
- C. 饮食中含多量粗纤维
- D. 长期饮用蓝绿藻污染水
- E. 黄曲霉真菌

218. 真题 2019-J070 与消化性溃疡发生关系密切的细菌是()

- A. 大肠杆菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 幽门螺杆菌
- D. 痢疾杆菌
- E. 链球菌

219. 真题 2019-X020 门静脉高压患者出血后采取的措施, 错误的是()

- A. 输血、输液
- B. 应用静脉止血药物
- C. 应用保肝药物
- D. 应用肥皂水灌肠
- E. 应用三腔二囊管压迫止血

220. 真题 2019-X036 患者男, 50 岁, 肝硬化病史 10 年, 半年前曾有上消化道出血史。1 天前出现黑便, 下列护理措施错误的是()

- A. 饮食温度要低
- B. 不进食粗糙、刺激性食物
- C. 口服药物应磨成粉冲服
- D. 一般不放置胃管
- E. 避免咳嗽, 常做屏气锻炼

221. 真题 2019-X038 血淀粉酶显著增高常见于()

- A. 胰腺炎
- B. 溃疡病
- C. 急性肝炎
- D. 肝硬化
- E. 心肌炎

222. 真题 2019-X048 患者男, 49 岁。有肝硬化病史, 近半月来肝区疼痛明显。有助于确诊的检查是()

- A. 血沉
- B. 甲胎蛋白
- C. 尿胆红素
- D. 血三酰甘油
- E. 血清球蛋白

223. 真题 2019-X057 大便呈柏油样常见于()

- A. 痢疾
- B. 上消化道出血
- C. 直肠癌
- D. 霍乱
- E. 胰腺炎

224. 真题 2019-X063 上消化道出血病因诊断的首选检查()

- A. X 线钡餐检查
- B. 内窥镜检查
- C. 选择性动脉造影
- D. 胃液分析
- E. 粪潜血试验

225. 真题 2019-Z014 消化性溃疡具有的特征性临床表现是()

- A. 反酸、嗝气
- B. 节律性上腹痛
- C. 消化功能紊乱
- D. 恶心、呕吐
- E. 营养失调

226. 真题 2019-Z016 有较明显腹胀的患者不宜进食()

- A. 米汤
- B. 馒头
- C. 牛奶
- D. 面条
- E. 肉末粥

227. 真题 2019-Z051 某患者大量腹水, 有腹壁静脉曲张, 脐以上血管流向上, 脐以下血管流向下, 患者最可能发生了()

- A. 右心衰竭
- B. 腹膜炎
- C. 幽门梗阻
- D. 肝硬化
- E. 胰腺炎

228. 真题 2019-Z065 急性胰腺炎最突出的症状是()

- A. 腹痛
- B. 呕吐
- C. 腹泻
- D. 发热
- E. 水电解质紊乱

229. 真题 2019-Z066 患者,男,26岁。和朋友聚餐后出现腹痛、腹胀频繁呕吐,诊断为急性胰腺炎。不恰当的处理措施是()
- A. 严密监测生命体征
 - B. 解痉止痛
 - C. 减少胰液分泌
 - D. 早期流质饮食
 - E. 抗休克

230. 真题 2019-Z067 某十二指肠溃疡患者,除有空腹痛、饮食后缓解外,突然发生呕吐,所呕吐物为每天吃的食物。引发的原因最可能是()
- A. 食管炎
 - B. 急性胃炎
 - C. 胆石症
 - D. 幽门梗阻
 - E. 急性胰腺炎

五.泌尿系统疾病病人的护理

1. 真题 2010-J006 与慢性肾衰竭临床表现有关的原因是()
- A. 血糖过多
 - B. 代谢产物潴留
 - C. 脂肪过多
 - D. 血清锌过多
 - E. 血清铁过多
2. 真题 2010-J061 原发性肾病综合征的主要病因是()
- A. 遗传因素
 - B. 过敏因素
 - C. 免疫因素
 - D. 理化因素
 - E. 感染因素
3. 真题 2010-X013 对肾病综合征有确诊价值的尿检结果是()
- A. 脓尿
 - B. 肉眼血尿
 - C. 管型尿
 - D. 24小时尿蛋白定量 $>3.5\text{g}$
 - E. 镜下血尿
4. 真题 2010-X073 患者,女,36岁。患慢性肾炎,有眼睑水肿,血压高,大量蛋白尿,但肾功能正常。饮食应采用()
- A. 低盐饮食
 - B. 高磷饮食
 - C. 高蛋白饮食
 - D. 高脂饮食
 - E. 不限制饮食
5. 真题 2010-Z014 肾性水肿患者进食蛋白应选用()
- A. 优质低蛋白
 - B. 高蛋白

- C. 任意蛋白
- D. 以植物蛋白为主
- E. 大量豆浆

6. 真题 2010-Z040 对于慢性肾衰竭尿毒症期的健康指导正确的是()
- A. 高生物效价高蛋白饮食
 - B. 每日摄入水 2000ml
 - C. 每日摄入钠盐 15g
 - D. 可用肥皂水擦洗皮肤
 - E. 避免应用庆大霉素

7. 真题 2010-Z073 患者,男,70岁。有2型糖尿病,但未认真治疗,近一周来发现尿频、尿急、尿痛,伴腰痛、低热。引发原因是()
- A. 急性肾炎
 - B. 肾盂肾炎
 - C. 慢性肾炎
 - D. 肾结石
 - E. 肾结核

8. 真题 2011-X046 蛋白尿是指尿液蛋白含量每日超过()
- A. 80mg
 - B. 95mg
 - C. 100mg
 - D. 125mg
 - E. 150mg

9. 真题 2018-Z008 慢性肾功能衰竭患者皮肤瘙痒的原因是()
- A. 久不洗浴
 - B. 尿素刺激
 - C. 皮肤发炎
 - D. 汗液刺激
 - E. 末梢神经炎

10. 真题 2011-J015 肾单位的组成包括()
- A. 肾小球和肾小囊
 - B. 肾小体和集合管
 - C. 肾小球和肾小管
 - D. 肾小体和肾小管
 - E. 皮质和髓质

11. 真题 2018-J010 不属于肾盂肾炎易感因素的是()
- A. 妊娠
 - B. 尿路结石
 - C. 留置尿管
 - D. 尿路畸形
 - E. 紧张性

12. 真题 2011-J050 肾小球滤过膜损伤、通透性增加时可引起()
- A. 多尿

- B. 少尿
- C. 夜尿多
- D. 蛋白尿
- E. 尿频

13. 真题 2011-J051 原发性肾病综合征患者水肿的主要原因是()

- A. 蛋白质合成障碍
- B. 低蛋白血症
- C. 高脂血症
- D. 循环血容量不足
- E. 肾小管重吸收蛋白障碍

14. 真题 2011-J060 慢性肾衰竭伴发心力衰竭的原因, 一般不包括()

- A. 水钠潴留
- B. 高血压
- C. 严重贫血
- D. 消化道出血
- E. 尿毒症性心肌病

15. 真题 2011-X039 肾盂肾炎尿中白细胞数每高倍视野应大于()

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6
- E. 7

16. 真题 2011-Z011 肾盂肾炎最简单的预防措施是()

- A. 抗生素隔日口服
- B. 多饮水
- C. 保持外阴清洁
- D. 每天冲洗膀胱
- E. 每天尿道口消毒

17. 真题 2011-Z017 慢性肾衰竭消化系统中最早出现的症状是()

- A. 皮肤瘙痒
- B. 胸痛
- C. 呼吸深长
- D. 食欲不振
- E. 骨酸痛

18. 真题 2018-J016 导致慢性肾小球肾炎病情发展加速的饮食因素是()

- A. 低必需氨基酸饮食
- B. 高蛋白高脂饮食
- C. 低钾饮食
- D. 低钠低蛋白饮食
- E. 高纤维素饮食

19. 真题 2011-Z036 慢性肾炎患者长期低优质蛋白饮食还需补充的是()

- A. 球蛋白
- B. 清蛋白
- C. 高密度脂蛋白
- D. 低密度脂蛋白
- E. 必需氨基酸

20. 真题 2011-Z037 急性肾盂肾炎患者治愈的标准是()

- A. 停药后 1 周、3 周复查尿菌均为阴性
- B. 停药后 2 周、8 周复查尿菌均为阴性
- C. 停药后 3 周、6 周复查尿菌均为阴性
- D. 停药后 2 周、6 周复查尿菌均为阴性
- E. 停药后 3 周、8 周复查尿菌均为阴性

21. 真题 2017-J018 患者女, 26 岁。产后第三天出现寒战高热, 尿急尿频。查体: 体温 39℃, 肋脊角压痛, 肾区叩击痛明显。血白细胞 $16 \times 10^9/L$, 尿沉渣镜检: 白细胞 12 个/HP, 红细胞 6 个/HP, 白细胞管型 5 个/HP。引起患者感染的致病菌最可能是()

- A. 铜绿假单胞菌
- B. 葡萄球菌
- C. 粪链球菌
- D. 大肠杆菌
- E. 变形杆菌

22. 真题 2013-J033 肾盂肾炎最常见的致病菌是()

- A. 变形杆菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 普通球菌
- D. 厌氧菌
- E. 粪链球菌

23. 真题 2017-J015 不符合慢性肾炎患者肾功能状况的描述是()

- A. 呈慢性进行性损害
- B. 感染、劳累可使肾功能急剧恶化
- C. 高血压对肾功能有影响
- D. 一些药物可加重肾功能损害
- E. 肾功能损害是不可逆的

24. 真题 2013-J046 慢性肾衰竭贫血的最主要原因是()

- A. 铁缺乏
- B. 促红细胞生成素缺乏
- C. 叶酸缺乏
- D. 营养不良
- E. 消化道出血

25. 真题 2013-J049 原发性肾病综合征的主要病因是()

- A. 遗传因素
- B. 过敏因素
- C. 免疫因素
- D. 理化因素
- E. 感染因素

26. 真题 2013-X012 肾盂肾炎中白细胞每高倍镜视野应大于()

- A. 3 个
- B. 4 个
- C. 5 个
- D. 6 个
- E. 7 个

27. 真题 2013-X013 某女患者因发热、腰痛、尿频、尿急、尿痛就医,确诊为急性肾盂肾炎,尿化验的特点是()

- A. 颗粒管型(++)
- B. 大量红细胞
- C. 蜡样管型
- D. 蛋白(++)
- E. 尿白细胞>5 个/HP

28. 真题 2018-J023 患者男,56 岁。诊断肾功能衰竭。伴有高尿酸血症。医嘱每周行血液透析治疗 3 次。第二次行透析治疗过程中。患者诉头痛、恶心、伴呕吐。继而出现抽搐、意识不清。此时患者可能出现()

- A. 透析反应
- B. 空气栓塞
- C. 肌肉痉挛
- D. 低血压
- E. 失衡综合征

29. 真题 2013-X020 能对肾功能进行监测的是()

- A. 血尿素氮
- B. 黄疸指数
- C. 中心静脉压
- D. 凝血酶原时间
- E. 3P 试验

30. 真题 2013-S013 可出现尿频、尿急、尿痛症状的患者是()

- A. 膀胱造瘘
- B. 妊娠压迫
- C. 膀胱炎症
- D. 膀胱结核
- E. 急性肾炎

31. 真题 2013-J080 关于健存肾单位学说的叙述,正确的是()

- A. 每个肾单位中,肾小球受累时所属肾小管也受累
- B. 相当数量肾单位破坏,残余健全肾单位代偿
- C. 肾单位一部分受损,又再生一批肾单位代偿
- D. 随着肾单位破坏增加,残余健全肾单位代偿性发生高灌注、高过滤
- E. 机体在纠正肾衰竭出现的病态现象时,产生各系统间断的不平衡

32. 真题 2013-Z019 预防肾盂肾炎最简单的措施是()

- A. 保持外阴清洁

- B. 隔天一次抗生素
- C. 多饮水,勤排尿
- D. 每天尿道消毒
- E. 每次尿后冲洗膀胱

33. 真题 2013-Z020 诊断急性肾盂肾炎最重要的依据是()

- A. 膀胱刺激症状
- B. 脓尿和菌尿
- C. 高热、寒战
- D. 肾区叩击痛
- E. 少量蛋白尿

34. 真题 2013-Z021 护士夜间巡视病房,发现尿毒症患者烦躁不安,主诉胸闷、心慌、咳嗽、咳白色泡沫样痰。体检:双肺底有湿啰音,可考虑()

- A. 尿毒症性肺炎
- B. 尿毒症性胸膜炎
- C. 尿毒症性心包炎
- D. 尿毒症引起的心力衰竭
- E. 尿毒症所致心律失常

35. 真题 2013-Z069 符合单纯性肾病典型临床表现的是()

- A. 多发 2-7 岁小儿
- B. 非凹陷性水肿
- C. 常伴血压升高
- D. 可有补体下降
- E. 常伴持续性血尿

36. 真题 2014-J001 肾单位的组成是()

- A. 肾小球和肾小囊
- B. 肾小体和集合管
- C. 肾小球和肾小管
- D. 肾小体和肾小管
- E. 皮质和髓质

37. 真题 2017-X031 关于肾病综合征患者的饮食指导,不正确的是()

- A. 水肿时应低盐
- B. 足够热量
- C. 多进富含饱和脂肪酸的食物
- D. 摄入富含氨基酸的优质蛋白
- E. 高度水肿而尿量少者应严格控制液体量

38. 真题 2014-J007 导致慢性肾小球肾炎加重的饮食因素是()

- A. 高蛋白高脂饮食
- B. 低钠低蛋白饮食
- C. 低钾饮食
- D. 低必需氨基酸饮食
- E. 高纤维素饮食

39. 真题 2018-X032 患者男,31 岁。头痛、乏力 5 个

月，视物模糊 5 天。查体：血压 180/100mmHg，尿蛋白(++)，尿红细胞 20/HP，眼底视网膜动脉痉挛，黄斑部有渗出与出血，视乳头无水肿。B 超示双肾体积缩小。最可能的诊断是()

- A. 原发性高血压肾损害
- B. 肾动脉狭窄
- C. 急进性肾炎
- D. 肾性高血压
- E. 恶性高血压肾损害

40. 真题 2014-J046 慢性肾衰竭伴发心力衰竭的原因一般不包括()

- A. 水钠潴留
- B. 高血压
- C. 严重贫血
- D. 消化道出血
- E. 尿毒症性心肌病变

41. 真题 2014-X044 治疗慢性肾炎所致的容量依赖性高血压首选的药物是()

- A. 氢氯噻嗪
- B. 普萘洛尔
- C. 硝苯地平
- D. 卡托普利
- E. 替米沙坦

42. 真题 2014-Z001 关于尿毒症患者的皮肤护理，错误的叙述是()

- A. 勤用肥皂洗澡
- B. 瘙痒明显可用温水浴
- C. 勤换衣服
- D. 经常更换卧姿
- E. 按摩受压部位

43. 真题 2014-Z014 关于慢性肾小球肾炎患者的护理措施，不正确的是()

- A. 消除疑虑，配合治疗
- B. 合理膳食、保证足够营养
- C. 让患者了解有关的防治知识
- D. 多饮水，保持尿量在 2500ml
- E. 多休息，减轻肾脏负担

44. 真题 2014-Z019 慢性肾衰竭引起贫血的原因是()

- A. 造血原料吸收减少
- B. 促红细胞生成素减少
- C. 骨髓造血抑制
- D. 红细胞寿命缩短
- E. 促红细胞生成素增多

45. 真题 2014-Z020 慢性肾衰竭最早最突出的临床表现为()

- A. 心血管症状
- B. 贫血出血倾向
- C. 恶心、食欲减退
- D. 肾性骨病

E. 水、电解质酸碱平衡紊乱

46. 真题 2015-X044 原发性肾病综合征复发的主要原因是()

- A. 血栓
- B. 感染
- C. 动脉粥样硬化
- D. 肾功能不全
- E. 血液高凝状态

47. 真题 2015-X055 关于慢性肾盂肾炎的治疗，正确的叙述是()

- A. 常规使用长程抑菌疗法
- B. 长期使用足量的抗生素
- C. 抗生素使用至尿常规转阴性时停药
- D. 寻找易感因素，提高机体免疫力
- E. 缓解症状是判断治疗成功与否的关键

48. 真题 2016-J076 患者女，38 岁。患慢性肾小球肾炎不会加重肾损害的因素是()

- A. 妊娠
- B. 劳累
- C. 感染
- D. 预防接种
- E. 心脏早搏

49. 真题 2017-J041 原发性肾病综合征常见的病因是()

- A. 急性肾炎
- B. 糖尿病性肾病
- C. 肾淀粉样变
- D. 狼疮性肾病
- E. 过敏性紫癜

50. 真题 2015-X078 患者，男，31 岁。头痛、乏力 5 个月，视物模糊 5 天。查体：血压 180/100mmHg，尿蛋白(++)，尿红细胞 20 个/HP，眼底视网膜动脉痉挛，黄斑部有渗出和出血，视神经盘无水肿，B 超示双肾体积缩小。最可能的诊断是()

- A. 肾性高血压
- B. 肾动脉狭窄
- C. 急进性肾炎
- D. 原发性高血压肾损害
- E. 恶性高血压肾损害

51. 真题 2018-X042 肾病综合征的临床表现不包括()

- A. 高血脂
- B. 低蛋白血症
- C. 高度水肿
- D. 高蛋白尿
- E. 血脂低

52. 真题 2015-X089 急性肾盂肾炎常见的尿液特点为()

- A. 血尿
- B. 蛋白尿
- C. 乳糜尿
- D. 脓尿
- E. 少尿或无尿

53. 真题 2015-X090 慢性肾小球肾炎常见的尿液特点为()

- A. 血尿
- B. 蛋白尿
- C. 乳糜尿
- D. 脓尿
- E. 少尿或无尿

54. 真题 2015-X091 慢性肾衰竭常见的尿液特点为()

- A. 血尿
- B. 蛋白尿
- C. 乳糜尿
- D. 脓尿
- E. 少尿或无尿

55. 真题 2015-J011 慢性肾衰竭患者贫血的最主要原因是()

- A. 铁缺乏
- B. 促红细胞生成素缺乏
- C. 叶酸缺乏
- D. 营养不良
- E. 消化道出血

56. 真题 2015-J039 不符合慢性肾炎患者肾功能状况的描述是()

- A. 呈慢性进行性损害
- B. 感染劳累可使肾功能急剧恶化
- C. 高血压对肾功能有影响
- D. 一些药物可加重肾功能损害
- E. 肾功能损害是不可逆转的

57. 真题 2015-J043 肾盂肾炎最常见的致病菌是()

- A. 变形杆菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 葡萄球菌
- D. 厌氧菌
- E. 粪链球菌

58. 真题 2015-J060 患者,男,23岁。全身高度水肿4周。实验室检查:血浆清蛋白降低,血脂增高,尿蛋白(+++),尿红细胞(+).患者水肿最主要的原因是()

- A. 继发醛固酮增多
- B. 抗利尿激素增多
- C. 全身毛细血管扩张
- D. 肾小球滤过率下降
- E. 血浆胶体渗透压降低

59. 真题 2015-Z008 关于糖皮质激素治疗肾病综合征,正确的叙述是()

- A. 从小剂量开始根据体重加大剂量
- B. 症状缓解后即可停药
- C. 治疗量有效后即可减量
- D. 维持时间长,在1-2年左右
- E. 维持大剂量服药,勿增减剂量

60. 真题 2015-Z009 肾性水肿患者进食蛋白应选用()

- A. 优质蛋白
- B. 高蛋白
- C. 任意蛋白
- D. 以植物蛋白为主
- E. 大量豆浆

61. 真题 2015-Z020 急性肾盂肾炎患者最重要的护理措施是()

- A. 卧床休息、多饮水
- B. 分散注意力
- C. 观察药物毒副作用
- D. 每天查尿常规
- E. 每天尿培养一次

62. 真题 2015-Z064 患者,男,38岁。慢性肾衰竭伴严重水肿,不妥的护理措施是()

- A. 准确记录24小时的出入量
- B. 控制水的摄入
- C. 食盐摄入量<1g/d
- D. 注意皮肤、口腔、外阴的护理
- E. 防止上呼吸道感染

63. 真题 2016-J011 肾盂肾炎的最常见感染途径是()

- A. 上行感染
- B. 血行感染
- C. 淋巴管感染
- D. 直接感染
- E. 接触感染

64. 真题 2016-J039 原发性肾病综合征的主要病因是()

- A. 遗传因素
- B. 过敏因素
- C. 免疫因素
- D. 理化因素
- E. 感染因素

65. 真题 2016-J057 慢性肾衰伴发心力衰竭的原因,一般不包括()

- A. 水钠潴留
- B. 高血压
- C. 严重贫血
- D. 消化道出血
- E. 尿毒症性心肌病变

66. 真题 2016-X015 肾性水肿一般最先发生的部位是()

- A. 眼睑及面部

- B. 骶尾部
- C. 心包
- D. 胸腔
- E. 双下肢

67. 真题 2016-Z016 慢性肾衰竭患者发生贫血的主要原因是()

- A. 铁缺乏
- B. 肾脏产生红细胞生成素减少
- C. 叶酸缺乏
- D. 代谢产物抑制骨髓造血
- E. 红细胞寿命缩短

68. 真题 2016-Z050 肾病综合征的治疗, 不合理的措施是()

- A. 必要时补充白蛋白
- B. 必要时可应用阿司匹林
- C. 用激素治疗 4 周, 无效加用环磷酰胺
- D. 用激素治疗, 尿蛋白减少立即减量
- E. 必要时应用环孢素 A

69. 真题 2016-Z059 患者女, 32 岁。寒战、高热、尿频、尿急、腰痛 3 个月。镜检: 尿白细胞 > 5 个/高倍视野, 初步诊断()

- A. 肾结核
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 急性肾小球肾炎
- D. 慢性肾炎急性发作
- E. 慢性肾小球肾炎

70. 模拟题 肾盂肾炎患者尿中最常见的管型是()

- A. 透明管型
- B. 红细胞管型
- C. 白细胞管型
- D. 颗粒管型
- E. 蜡样管型

71. 模拟题 急性肾盂肾炎患者多饮水的主要目的是()

- A. 加速退热
- B. 保持口腔清洁
- C. 维持体液平衡
- D. 减少药物不良反应
- E. 促进细菌、毒素排出

72. 模拟题 患者, 女, 58 岁。确诊慢性肾小球肾炎 10 余年, 近 1 周来出现双下肢水肿加重, 入院后应选用的胶体溶液为()

- A. 浓缩白蛋白注射液
- B. 中分子右旋糖酐
- C. 低分子右旋糖酐
- D. 低分子羟乙基淀粉
- E. 水解蛋白注射液

73. 真题 2018-Z063 为延缓肾小球硬化及肾功能减退。应选择的饮食是()

- A. 低甘油三脂
- B. 高维生素
- C. 低胆固醇
- D. 高碳水化合物
- E. 低蛋白饮食

74. 模拟题 患者, 男, 65 岁。患肾盂肾炎 4 年, 今因腰痛、低热就诊。其中与发病密切相关的护理资料是()

- A. 男性
- B. 年龄
- C. 职业
- D. 口服激素
- E. 患有前列腺肥大症

75. 模拟题 关于急性肾炎的临床表现, 下列描述正确的是()

- A. 多发于 1~3 岁的小儿
- B. 发病前 3 天常有感染史
- C. 常出现少尿、血尿及高血压
- D. 发病 4 周后可见镜下血尿
- E. 血清补体 C 增高

76. 模拟题 患者, 女, 30 岁。有反复发作性尿频、尿急、尿痛史, 肾区叩击痛(+), 对其进行保健指导内容不妥的是()

- A. 多喝水
- B. 预防便秘
- C. 多吃水果
- D. 经常预防性服用抗菌药物
- E. 每天清洗外阴

77. 模拟题 患者, 男, 46 岁。慢性肾炎。近 2 天尿少, 昼夜尿量为 350~400ml, 测血压 190/110mmHg, 血钾 6.3mmol/L。根据病情, 护士给患者的饮食建议是()

- A. 吃橘子
- B. 吃榨菜
- C. 吃香蕉
- D. 喝骨头汤
- E. 喝鸡蛋汤

78. 模拟题 患者, 男, 26 岁。于 2 年前患慢性肾小球肾炎, 近 1 年来出现颜面及眼睑水肿、贫血。入院后诊断为慢性肾衰竭(氮质血症期)。本病的诊断要点不包括()

- A. 慢性肾衰竭的临床表现
- B. 内生肌酐清除率下降
- C. 血肌酐升高
- D. 血尿素氮升高
- E. 双肾增大

79. 模拟题 肾病综合征患者水肿的原因是()

- A. 肾小球滤过少
- B. 饮水过多
- C. 血钠过多
- D. 血浆胶体渗透压下降

- E. 尿小管吸收多
80. 模拟题 肾病综合征患者发生大量蛋白尿的原因是()
- 肾小球滤过率增加
 - 血浆胶体渗透压下降
 - 肾功能下降
 - 尿量增加
 - 感染
81. 模拟题 诊断肾病综合征必备的条件是()
- 大量蛋白尿、高脂血症
 - 大量蛋白尿、低蛋白血症
 - 水肿、高脂血症
 - 高脂血症、大量蛋白尿
 - 低蛋白血症、水肿
82. 模拟题 刘女士, 35岁。昨晚突发尿频、尿急和尿痛, 伴下腹疼痛, 首先考虑的检查为()
- CT
 - 膀胱镜
 - 尿常规
 - 排泄性尿路造影
 - 导尿测试残余尿
83. 模拟题 尿中出现蜡样管型提示()
- 肾结核
 - 泌尿系统结石
 - 肾病综合征
 - 慢性肾盂肾炎
 - 肾衰竭
84. 模拟题 患者, 男, 48岁。房屋坍塌致大腿挤压伤、急性肾衰竭。按原因分类其肾衰竭属于()
- 肾性肾衰竭
 - 肾后性肾衰竭
 - 肾前性肾衰竭
 - 暂时性肾衰竭
 - 创伤性肾衰竭
85. 模拟题 慢性肾衰竭的治疗原则不包括()
- 治疗原发病
 - 消除尿蛋白
 - 纠正电解质紊乱
 - 防治严重并发症
 - 防止肾功能进行性减退
86. 真题 2018-Z075 需多饮水的疾病是()
- 肾盂肾炎
 - 慢性肾衰竭
 - 慢性肾小球肾炎
 - 急性肾小球肾炎
 - 原发性肾病综合征
87. 模拟题 关于尿细菌定量培养的叙述, 不正确的是()
- 菌落数 $>10^5$ /ml, 可诊断尿路感染
 - 留取的尿标本应在膀胱内停留6~8小时
 - 尿标本采集后应尽快做培养和菌落计数
 - 要在充分清洗会阴部后采集标本
 - 留取尿标本, 应在使用抗菌药前或停药3天后
88. 模拟题 尿毒症患者贫血的主要原因是()
- 促红细胞生成素减少
 - 低蛋白血症
 - 恶心呕吐
 - 换血
 - 缺铁
89. 模拟题 原发性肾病综合征复发及疗效不佳的主要原因是()
- 血栓
 - 感染
 - 动脉粥样硬化
 - 肾功能不全
 - 血液高凝状态
90. 模拟题 产生肾炎性水肿的主要机理为()
- 肾小球滤过率下降
 - 肾小管重吸收减少
 - 继发性醛固酮增多
 - 肾小管重吸收增加
 - 血浆清蛋白减少
91. 模拟题 肾病综合征的病理生理改变中意义最大的是()
- 氮质血症
 - 高脂血症
 - 水钠潴留
 - 低蛋白血症
 - 大量蛋白尿
92. 模拟题 慢性肾炎的必有的表现是()
- 镜下血尿
 - 下肢水肿
 - 高血压
 - 蛋白尿
 - 尿路感染
93. 模拟题 患者, 女, 26岁。突然发热, 一天后出现肉眼血尿, 无尿频、尿痛, 化验尿常规蛋白(+), 红细胞30~40个/HP, 白细胞10~20个/HP。为尽早明确诊断, 检查应首选()
- 尿细菌培养
 - 血常规检查
 - 尿蛋白定性
 - 膀胱镜
 - 肾盂造影

94. 模拟题 患者,男,35岁。拟诊为慢性肾炎10年,发热、咽痛1周,鼻出血3天入院。体检:血压150/90mmHg,血红蛋白70g/L,尿蛋白(++),小便潜血(+),血清肌酐 $801\mu\text{mol/L}$ 。该患者贫血的原因除去下列哪项()
- 失血
 - 缺铁
 - 维生素B12缺乏
 - 红细胞寿命缩短
 - 血红素异常
95. 模拟题 肾病综合征最典型的表现是()
- 高脂血症
 - 高度水肿
 - 尿颗粒管型
 - 低清蛋白血症
 - 大量蛋白尿
96. 真题2018-X084 治疗肾病综合征的首选药物是()
- 免疫抑制剂
 - 利尿剂
 - 肾上腺糖皮质激素
 - 镇静剂
 - 抗生素
97. 模拟题 引起慢性肾衰竭的最常见病因是()
- 慢性肾盂肾炎
 - 慢性肾小球肾炎
 - 肾结核
 - 肾小球硬化症
 - 慢性尿路梗阻
98. 模拟题 尿崩症引起的多尿,尿量一般是()
- 1L/d
 - 2L/d
 - 3L/d
 - 5L/d
 - 18L/d
99. 模拟题 镜下血尿是指离心沉淀的尿沉渣中,每高倍视野的红细胞数超过()
- 1个
 - 2个
 - 3个
 - 4个
 - 5个
100. 模拟题 下列关于慢性肾衰竭患者的治疗措施中,其作用是纠正酸中毒,又防止手足抽搐的是()
- 进食含磷丰富的饮食
 - 预防感染
 - 纠正贫血
 - 降压
 - 补钙
101. 真题2016-Z014 关于慢性肾小球肾炎患者健康指导的叙述,错误的是()
- 进行适当锻炼
 - 禁烟酒
 - 注意保暖,预防感冒
 - 为避免劳累,应停止工作
 - 避免一切加重疾病或使其复发的因素
102. 真题2019-J018 肾盂肾炎的致病菌多见()
- 变形杆菌
 - 大肠埃希菌
 - 葡萄球菌
 - 厌氧菌
 - 链球菌
103. 真题2019-X006 内生肌酐清除率下降提示()
- 肾功能衰竭
 - 心力衰竭
 - 肝昏迷
 - 呼吸衰竭
 - 脑出血
104. 真题2019-X014 慢性肾功能衰竭最早以哪个系统最为突出()
- 血液系统
 - 呼吸系统
 - 消化系统
 - 精神、神经系统
 - 循环系统
105. 真题2019-X017 肾病综合征患者最常见的体征是()
- 大量蛋白尿
 - 低蛋白血症
 - 水肿
 - 高脂血症
 - 感染
106. 真题2019-X018 镜下血尿是指每高倍视野中红细胞至少()
- 3个
 - 4个
 - 5个
 - 6个
 - 7个
107. 真题2019-X072 原发性肾病综合征首选的治疗药物是()
- 抗生素
 - 螺内酯
 - 糖皮质激素
 - 白蛋白
 - 环孢素

108. 真题 2019-X076 急性肾盂肾炎常见的尿液特点为()

- A. 血尿
- B. 蛋白尿
- C. 乳糜尿
- D. 脓尿
- E. 少尿或无尿

109. 真题 2019-X077 慢性肾衰竭常见的尿液特点为()

- A. 血尿
- B. 蛋白尿
- C. 乳糜尿
- D. 脓尿
- E. 少尿或无尿

110. 真题 2019-Z018 中度肾性高血压病人适当卧床休息的益处是()

- A. 增加全身血液循环
- B. 增强免疫力
- C. 增加食欲
- D. 促进睡眠
- E. 增加尿量

六.血液及造血系统疾病病人的护理

1. 真题 2010-J029 再生障碍性贫血属于()

- A. 红细胞疾病
- B. 粒细胞疾病
- C. 淋巴细胞和浆细胞疾病
- D. 造血干细胞疾病
- E. 出血性及血栓性疾病

2. 真题 2010-X014 对诊断再生障碍性贫血有价值的检查结果是()

- A. 全血细胞减少
- B. 骨髓增生活跃
- C. 网织红细胞增多
- D. 肝、脾、淋巴结肿大
- E. 出现小细胞低色素性贫血

3. 真题 2017-X002 对血液病诊断,最有价值的实验室检查方法是()

- A. CT
- B. B型超声
- C. X线检查
- D. 骨髓检查
- E. 肝功能检查

4. 真题 2018-J002 下列属于构成骨髓微环境的细胞是()

- A. 浆细胞
- B. 巨核细胞
- C. 巨噬细胞
- D. 单核细胞
- E. 造血干细胞

5. 真题 2010-X025 治疗营养性缺铁性贫血,铁剂服用的时间是()

- A. 血红蛋白正常后停药
- B. 血红蛋白正常2周后停药
- C. 血红蛋白正常后1个月停药
- D. 血红蛋白正常后2个月停药
- E. 血红蛋白正常后3个月停药

6. 真题 2010-X043 特发性血小板减少性紫癜的首选治疗是()

- A. 脾切除
- B. 输血小板
- C. 大剂量免疫球蛋白
- D. 糖皮质激素
- E. 免疫抑制剂

7. 真题 2010-X071 患者,男,35岁。头昏乏力、发热,皮肤出现出血点半个月。体检:贫血貌,心肺无异常,胸骨压痛,肝肋下1cm,脾肋下5cm。血象:血红蛋白70g/L,白细胞 $20 \times 10^9/L$,血小板 $20 \times 10^9/L$ 。首先考虑的诊断是()

- A. 血小板减少性紫癜
- B. 再生障碍性贫血
- C. 急性白血病
- D. 巨幼红细胞性贫血
- E. 溶血性贫血

8. 真题 2010-Z015 急性白血病患者发热 $38^{\circ}C$ 是由于()

- A. 感染
- B. 吸收热
- C. 红细胞破坏
- D. 白细胞破坏
- E. 血小板过少

9. 真题 2018-S006 进行心肺复苏时,胸外心脏按压的有效指标不包括()

- A. 出现自主呼吸
- B. 动脉收缩压 $>8kPa$
- C. 黏膜转红润
- D. 瞳孔由大逐渐缩小
- E. 肌张力降低

10. 真题 2010-Z018 急性再生障碍性贫血的患者预防感染的措施是()

- A. 支持疗法
- B. 抗生素
- C. 输白细胞
- D. 保护性隔离
- E. 输血

11. 真题 2017-Z007 严重贫血时出现晕厥、神志模糊的原因为()

- A. 脑血栓形成

- B. 高血压脑病
- C. 颈椎病
- D. 短暂癫痫
- E. 脑缺氧

12. 真题 2011-S012 给患者服用铁剂时, 正确的做法是()

- A. 服用茶水可促进其吸收
- B. 服用前应常规测心率
- C. 服药后不宜饮水
- D. 可用饮水管吸
- E. 宜饭前服用

13. 真题 2010-Z051 患者, 男, 因发热来门诊, 经检查血及骨髓发现均有大量原始及早幼粒细胞(约 10%), 诊断为急性白血病。患者有四肢关节肿痛, 肝脾及淋巴结肿大, 这些表现是由以下哪种情况引起()

- A. 细菌感染
- B. 脏器淤血
- C. 白血病细胞浸润
- D. 组织细胞浸润
- E. 病毒感染

14. 真题 2017-Z009 预防减少血液病病人皮肤黏膜出血的护理措施不正确的是()

- A. 不用剃须刀刮胡须
- B. 勤剪指甲, 避免搔抓皮肤
- C. 不用硬牙刷刷牙, 不用牙签剔牙
- D. 及时用手指或其他方法剥去鼻腔内血痂
- E. 齿龈及鼻出血时局部用肾上腺素湿润棉片贴敷或填塞

15. 真题 2011-J099 特发性血小板减少性紫癜发病的相关因素是()

- A. 雄激素
- B. 雌激素
- C. 甲状腺激素
- D. 抗利尿激素
- E. 肾上腺皮质激素

16. 真题 2011-X023 治疗中枢神经系统白血病常用的药物是()

- A. 阿霉素
- B. 长春新碱
- C. 甲氨蝶呤
- D. 环磷酰胺
- E. 苯丁酸氮芥

17. 真题 2011-X041 血小板减少见于()

- A. 溶血性贫血
- B. 急性出血
- C. 急性中毒
- D. 脾切除后
- E. 再生障碍性贫血

18. 真题 2011-X042 网织红细胞减少见于()

- A. 溶血性贫血
- B. 出血性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 叶酸缺乏性贫血
- E. 维生素 B₁₂缺乏性贫血

19. 真题 2011-X044 对急性非淋巴细胞性白血病目前常用的标准化疗诱导缓解方案是()

- A. YAP 方案
- B. YP 方案
- C. DA 方案
- D. VADP 方案
- E. VDP 方案

20. 真题 2011-Z030 急性白血病患者发病时高热, 主要原因是()

- A. 贫血
- B. 代谢亢进
- C. 白细胞浸润
- D. 感染
- E. 化疗反应

21. 真题 2010-J048 特发性血小板减少性紫癜的发病机制不包括()

- A. 血小板计数减少
- B. 血小板寿命缩短
- C. 血小板相关免疫球蛋白增高
- D. 形成血小板的巨核细胞减少
- E. 白细胞计数减少

22. 真题 2011-Z033 缺铁性贫血治疗最重要的是()

- A. 补充铁剂
- B. 脾切除
- C. 输血治疗
- D. 肌内注射维生素 B₁₂
- E. 病因治疗

23. 真题 2011-Z067 患者, 男, 45 岁。急性再生障碍性贫血 5 年, 突然出现头痛、头晕、视物模糊、呼吸急促。该患者可能发生了()

- A. 脑梗死
- B. 高血压危象
- C. 高血压脑病
- D. 颅内出血
- E. 脑动脉痉挛

24. 真题 2013-J055 血小板来源于骨髓中的()

- A. 浆细胞
- B. 单核细胞
- C. 巨核细胞
- D. 巨噬细胞
- E. 组织嗜碱细胞

25. 真题 2013-J068 不属于特发性血小板减少性紫癜

发病机制的是()

- A. 血小板计数减少
- B. 血小板寿命缩短
- C. 血小板相关免疫球蛋白增高
- D. 形成血小板的巨核细胞减少
- E. 白细胞计数减少

26. 真题 2013-X018 皮肤白皙的贫血患者就诊, 护士检查时最能反映贫血的部位是()

- A. 面颊皮肤及上腭黏膜
- B. 手背皮肤及口腔黏膜
- C. 耳廓皮肤
- D. 颈部皮肤及舌面
- E. 睑结膜、指甲、口唇

27. 真题 2013-X084 贫血可发现()

- A. 尿酮体 (+)
- B. 尿中白细胞>5 个/高倍镜视野
- C. 柏油样便
- D. 血红蛋白<110g/L
- E. 大量管型尿

28. 真题 2013-Z022 有关出血倾向的护理措施, 下列哪项错误()

- A. 避免皮肤摩擦, 操作轻柔
- B. 尽可能避免注射治疗
- C. 绝对卧床, 限制肢体活动
- D. 注意口腔清洁, 不吃坚硬食物
- E. 床单平整, 被褥轻软

29. 真题 2018-Z023 急性白血病患者易感染的最主要原因是()

- A. 缺乏成熟中性粒细胞
- B. 缺少白蛋白
- C. 缺少红细胞
- D. 缺乏预防接种
- E. 缺乏血小板

30. 真题 2014-J047 与特发性血小板减少性紫癜血小板减少无关的是()

- A. 营养不良使血小板生成减少
- B. 病理性免疫产生血小板抗体
- C. 脾产生血小板特异性 IgG
- D. 血小板在脾脏遭到破坏
- E. 免疫抗体影响巨核细胞成熟

31. 真题 2014-J063 缺铁性贫血患儿出现非造血系统表现的主要原因是()

- A. 血红蛋白合成减少
- B. 肌红蛋白合成减少
- C. 红细胞合成减少
- D. 红细胞携氧减少
- E. 含铁酶活性降低

32. 真题 2017-Z025 急性白血病引起出血的主要原因

是()

- A. 小血管破裂
- B. 进行性贫血
- C. 血小板减少
- D. 纤维素溶解
- E. 血管内凝血

33. 真题 2014-X006 治疗慢性再生障碍性贫血的首选药是()

- A. 糖皮质激素
- B. 免疫抑制剂
- C. 造血因子
- D. 雄激素
- E. 雌激素

34. 真题 2014-X013 急性特发性血小板减少性紫癜的血小板计数一般()

- A. $<20 \times 10^9/L$
- B. $<30 \times 10^9/L$
- C. $<40 \times 10^9/L$
- D. $<50 \times 10^9/L$
- E. $<60 \times 10^9/L$

35. 真题 2014-X014 某人因牙龈及全身皮肤出血而就医。化验: 血红蛋白 100g/L, 红细胞 $3.2 \times 10^{12}/L$, 白细胞 $3.0 \times 10^9/L$, 血小板 $20 \times 10^9/L$, 骨髓检查: 增生不良。应考虑()

- A. 急性再生障碍性贫血
- B. 慢性再生障碍性贫血
- C. 急性白血病
- D. 特发性血小板减少性紫癜
- E. 脾功能亢进

36. 真题 2014-X020 属于血液系统监护检查的是()

- A. 血肌酐
- B. 尿肌酐
- C. 血小板
- D. 血糖
- E. 血氨

37. 真题 2014-X090 再生障碍性贫血()

- A. 全血细胞减少
- B. 红细胞及血小板正常
- C. 红细胞及血红蛋白均减少
- D. 血小板减少
- E. 周围血含大量原始和幼稚白细胞

38. 真题 2018-X030 特发性血小板减少性紫癜的首选治疗是()

- A. 免疫抑制剂
- B. 大剂量免疫球蛋白
- C. 糖皮质激素
- D. 输血小板
- E. 脾切除

39. 真题 2014-X091 急性白血病()

- A. 全血细胞减少
- B. 红细胞及血小板正常
- C. 红细胞及血红蛋白均减少
- D. 血小板减少
- E. 周围血含大量原始和幼稚白细胞

40. 真题 2014-X092 特发性血小板减少性紫癜()

- A. 全血细胞减少
- B. 红细胞及血小板正常
- C. 红细胞及血红蛋白均减少
- D. 血小板减少
- E. 周围血含大量原始和幼稚白细胞

41. 真题 2014-X093 缺铁性贫血()

- A. 全血细胞减少
- B. 红细胞及血小板正常
- C. 红细胞及血红蛋白均减少
- D. 血小板减少
- E. 周围血含大量原始和幼稚白细胞

42. 真题 2017-J033 小细胞低色素性贫血见于()

- A. 溶血性贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 急性失血性贫血
- E. 遗传性球形细胞增多症

43. 真题 2014-Z052 患者, 女, 36 岁。反复发作皮肤瘀点、瘀斑伴月经量过多 3 个月来院就诊。查体: 轻度贫血貌, 周身皮肤可见散在瘀点, 余无异常。鉴别特发性血小板减少性紫癜和过敏性紫癜的最有效检查是()

- A. 束臂试验
- B. 骨髓象分析
- C. 凝血时间测定
- D. 细胞化学染色
- E. 血小板计数和形态

44. 真题 2014-Z056 患者贫血、出血及发热, 经化验确诊急性白血病, 该患者发热的原因是()

- A. 血小板少
- B. 骨髓被破坏
- C. 出血被吸收
- D. 红细胞破坏多
- E. 细菌感染

45. 真题 2017-X035 急性白血病患者的骨髓象是()

- A. 多为原始细胞和幼稚细胞
- B. 多为中性核和中性分叶核细胞
- C. 多为淋巴细胞和巨幼细胞
- D. 以淋巴细胞为主, 少数幼稚淋巴细胞
- E. 多为中幼、晚幼粒和杆状粒细胞

46. 真题 2015-X027 白血病诊断的重要检查依据是()

- A. 血象检查
- B. 骨髓检查
- C. 免疫学检查
- D. 细胞化学染色
- E. 染色体和基因检查

47. 真题 2015-X053 确诊缺铁性贫血的化验项目是()

- A. 网织红细胞
- B. 红细胞总数
- C. 血红蛋白
- D. 血清铁
- E. 血清铁蛋白

48. 真题 2015-X093 重度甲亢基础代谢率是()

- A. -10%
- B. 10%
- C. 20%-30%
- D. 30%-60%
- E. >+60%

49. 真题 2015-X099 特发性血小板减少性紫癜患者治疗首选()

- A. 输血
- B. 脾切除
- C. 雄激素治疗
- D. 糖皮质激素治疗
- E. 免疫抑制剂治疗

50. 真题 2015-X100 重型再生障碍性贫血患者治疗首选()

- A. 输血
- B. 脾切除
- C. 雄激素治疗
- D. 糖皮质激素治疗
- E. 免疫抑制剂治疗

51. 真题 2015-J024 再生障碍性贫血属于()

- A. 红细胞疾病
- B. 粒细胞疾病
- C. 淋巴细胞和浆细胞疾病
- D. 造血干细胞疾病
- E. 出血性及血栓性疾病

52. 真题 2015-J044 属于构成骨髓微环境的细胞是()

- A. 浆细胞
- B. 巨核细胞
- C. 巨噬细胞
- D. 单核细胞
- E. 造血干细胞

53. 真题 2015-Z014 慢性白血病患者护理体检最突出的体征是()

- A. 巨大脾脏
- B. 肝脏增大
- C. 胸骨压痛

- D. 皮肤瘀斑
- E. 浅表淋巴结肿大

54. 真题 2015-Z024 白血病患者化疗静脉给药的处理措施,不妥的是()

- A. 药物静脉滴注的速度要慢
- B. 血管要轮换使用
- C. 使用后用 0.9%生理盐水冲洗静脉
- D. 对化疗药物引起的静脉炎应定时热敷
- E. 药物外溢皮下时及时用普鲁卡因封闭

55. 真题 2015-Z051 患者,女,35岁。四肢皮肤反复出现紫癜 1 年余。实验室检查示血小板明显减少,红细胞、白细胞基本正常。应考虑的诊断是()

- A. DIC
- B. 贫血
- C. 白血病
- D. 特发性血小板减少性紫癜
- E. 再生障碍性贫血

56. 真题 2015-Z062 患者,女,35岁。头晕 1 个月余来院就诊。查血常规 $RBC 3.0 \times 10^{12}/L$, $Hb 80g/L$, $WBC 2.0 \times 10^9/L$, $PLT 40 \times 10^9/L$ 。应考虑的是()

- A. 化脓感染
- B. 再生障碍性贫血
- C. 缺铁性贫血
- D. 病毒感染
- E. 急性溶血

57. 真题 2016-J012 缺铁性贫血的主要病因是()

- A. 需要量增加而摄入不足
- B. 铁吸收不良
- C. 慢性失血
- D. 理化因素
- E. 生物因素

58. 真题 2017-J047 患者女,35岁。头晕乏力面色苍白 6 个月,体检贫血貌。血常规: $Hb 70g/L$, 红细胞 $2.6 \times 10^{12}/L$, 血清铁降低,总铁结合力增高。追问病史,患者常有月经过多。该患者贫血的主要原因是()

- A. 慢性失血
- B. 铁代谢障碍
- C. 铁摄入不足
- D. 铁的吸收不足
- E. 铁的需要量增加

59. 真题 2016-J023 已证明与白血病发病有密切关系的病毒是()

- A. DNA 病毒
- B. 柯萨奇病毒
- C. 流感病毒
- D. 埃可病毒
- E. C 型 RNA 病毒

60. 真题 2016-X001 治疗慢性再生障碍性贫血的首选

药物是()

- A. 糖皮质激素
- B. 免疫抑制剂
- C. 造血因子
- D. 雄激素
- E. 雌激素

61. 真题 2016-X013 小细胞低色素性贫血最重要的治疗措施是()

- A. 补充维生素
- B. 给予叶酸
- C. 补充铁剂
- D. 输入鲜血
- E. 增加蛋白质

62. 真题 2016-X065 患者男,36岁。突发高热,严重贫血及皮肤广泛瘀斑,最有助于确诊的检查是()

- A. 大便潜血
- B. CT
- C. 尿化验
- D. 骨髓象
- E. B 超

63. 真题 2016-X084 治疗慢性粒细胞白血病首选的药物是()

- A. 马利兰
- B. 长春新碱
- C. 三尖杉酯碱
- D. 苯丁酸氮芥
- E. 糖皮质激素

64. 真题 2016-X085 治疗慢性淋巴细胞白血病首选的药物是()

- A. 马利兰
- B. 长春新碱
- C. 三尖杉酯碱
- D. 苯丁酸氮芥
- E. 糖皮质激素

65. 真题 2016-Z039 最能反映贫血程度的实验室指标是()

- A. 红细胞计数
- B. 红细胞沉降率
- C. 血清蛋白总量
- D. 血红蛋白定量
- E. 网织红细胞计数

66. 真题 2016-Z095 常为急性白血病病人的首发症状是()

- A. 贫血
- B. 出血
- C. 发热
- D. 脾大
- E. 淋巴结肿大

67. 真题 2016-Z096 常见慢性淋巴细胞白血病首发体征是()

- A. 贫血
- B. 出血
- C. 发热
- D. 脾大
- E. 淋巴结肿大

68. 真题 2016-Z097 慢性粒细胞白血病病人最显著的体征是()

- A. 贫血
- B. 出血
- C. 发热
- D. 脾大
- E. 淋巴结肿大

69. 模拟题 急性早幼粒细胞性白血病患者血小板计数低于何值, 可发生严重的自发性出血()

- A. $20 \times 10^9/L$
- B. $25 \times 10^9/L$
- C. $15 \times 10^9/L$
- D. $50 \times 10^9/L$
- E. $30 \times 10^9/L$

70. 模拟题 患者, 女, 45岁。为ITP患者, 经糖皮质激素治疗7个月后, 血小板为 $22 \times 10^9/L$, 仍有月经过多、牙龈出血症状, 进一步治疗需考虑()

- A. 继续使用糖皮质激素治疗
- B. 免疫抑制剂
- C. 脾切除
- D. 输血小板
- E. 中药治疗

71. 模拟题 见于急性粒细胞白血病的是()

- A. 骨髓显示增生低下或极度低下
- B. 红细胞和血红蛋白量增加
- C. 原始和早幼粒细胞明显增多
- D. 中性杆状核和晚幼粒细胞明显增多
- E. 骨髓巨核细胞正常或增多, 形成血小板的巨核细胞减少

72. 模拟题 见于再生障碍性贫血的是()

- A. 骨髓显示增生低下或极度低下
- B. 红细胞和血红蛋白量增加
- C. 原始和早幼粒细胞明显增多
- D. 中性杆状核和晚幼粒细胞明显增多
- E. 骨髓巨核细胞正常或增多, 形成血小板的巨核细胞减少

73. 模拟题 见于ITP的是()

- A. 骨髓显示增生低下或极度低下
- B. 红细胞和血红蛋白量增加
- C. 原始和早幼粒细胞明显增多
- D. 中性杆状核和晚幼粒细胞明显增多
- E. 骨髓巨核细胞正常或增多, 形成血小板的巨核细胞

减少

74. 模拟题 见于慢性粒细胞白血病的是()

- A. 骨髓显示增生低下或极度低下
- B. 红细胞和血红蛋白量增加
- C. 原始和早幼粒细胞明显增多
- D. 中性杆状核和晚幼粒细胞明显增多
- E. 骨髓巨核细胞正常或增多, 形成血小板的巨核细胞减少

75. 模拟题 引起再生障碍性贫血的高危因素是()

- A. 反复上呼吸道感染
- B. 长期接触苯
- C. 细菌感染
- D. 营养缺乏
- E. 长期服用抗生素

76. 模拟题 急性白血病患者死亡的主要原因是()

- A. 极度贫血
- B. 出血
- C. 感染
- D. 肾衰竭
- E. 精神崩溃

77. 模拟题 急性白血病患者贫血的主要原因是()

- A. 弥散性血管内凝血
- B. 正常红细胞减少
- C. 血小板功能异常
- D. 凝血因子减少
- E. 感染毒素对血管的损伤

78. 模拟题 口服液体铁剂的正确方法是()

- A. 饭前服用
- B. 饭前测心率
- C. 吸管吸入
- D. 茶水送服
- E. 服后不宜立即饮水

79. 模拟题 营养性缺铁性贫血属于()

- A. 大细胞性贫血
- B. 小细胞性贫血
- C. 小细胞低色素性贫血
- D. 正细胞性贫血
- E. 感染性贫血

80. 模拟题 患者, 女, 26岁。近2个月来出现乏力、腹部憋胀, B超检查提示脾大, 血细胞检查Ph染色体阳性, 白细胞计数为 $88 \times 10^9/L$, 以中幼、晚幼、杆状核粒细胞为主。该患者最可能的诊断为()

- A. 再生障碍性贫血
- B. 慢性粒细胞白血病
- C. 急性粒细胞白血病
- D. 急性粒-单核细胞白血病
- E. 急性单核细胞白血病

81. 模拟题 特发性血小板减少性紫癜的主要发病原因是()
- 免疫因素
 - 脾功能亢进
 - 单核-巨噬细胞
 - 雌激素
 - 病毒感染
82. 模拟题 再生障碍性贫血的主要发病机制是()
- 产生抗血小板抗体
 - 骨髓造血功能衰竭
 - 机体免疫功能缺陷
 - 凝血能力超过抗凝能力
 - 凝血因子缺乏
83. 模拟题 白血病的主要发病机制是()
- 产生抗血小板抗体
 - 骨髓造血功能衰竭
 - 机体免疫功能缺陷
 - 凝血能力超过抗凝能力
 - 凝血因子缺乏
84. 模拟题 ITP 的主要发病机制是()
- 产生抗血小板抗体
 - 骨髓造血功能衰竭
 - 机体免疫功能缺陷
 - 凝血能力超过抗凝能力
 - 凝血因子缺乏
85. 模拟题 下列药物不损伤血小板的是()
- 阿司匹林
 - 右旋糖酐
 - 保泰松
 - 双嘧达莫
 - 硫酸亚铁
86. 模拟题 下列药物禁用于 ITP 患者的是()
- 强的松(泼尼松)
 - 阿莫西林
 - 红霉素
 - 阿司匹林
 - 地西洋
87. 模拟题 关于铁的代谢, 下列叙述错误的是()
- 人体内的铁主要来源于普通食物
 - 人体能吸收的铁为三价铁
 - 血浆转铁蛋白能结合的铁为三价铁
 - 正常女性铁的丢失形式主要是月经、妊娠、哺乳等
 - 正常男性铁的丢失形式主要是经皮肤、胆汁和粪便等排出
88. 模拟题 再生障碍性贫血的临床特点是()
- 进行性贫血、出血、感染, 而肝、脾、淋巴结多无肿大
 - 主要表现为皮肤、黏膜、内脏出血
 - 发热、贫血、出血及各种器官浸润所引起的症状和体征
 - 发热、消瘦、盗汗、脾大
 - 皮肤干燥、角化, 舌乳头萎缩, 疲乏无力
89. 模拟题 急性白血病的临床特点是()
- 进行性贫血、出血、感染, 而肝、脾、淋巴结多无肿大
 - 主要表现为皮肤、黏膜、内脏出血
 - 发热、贫血、出血及各种器官浸润所引起的症状和体征
 - 发热、消瘦、盗汗、脾大
 - 皮肤干燥、角化, 舌乳头萎缩, 疲乏无力
90. 模拟题 ITP 的临床特点是()
- 进行性贫血、出血、感染, 而肝、脾、淋巴结多无肿大
 - 主要表现为皮肤、黏膜、内脏出血
 - 发热、贫血、出血及各种器官浸润所引起的症状和体征
 - 发热、消瘦、盗汗、脾大
 - 皮肤干燥、角化, 舌乳头萎缩, 疲乏无力
91. 模拟题 可区别急性白血病和再生障碍性贫血最主要的检查项目是()
- 血小板计数
 - 束臂试验
 - 骨髓检查
 - 出血时间(BT)测定
 - 网织红细胞数
92. 模拟题 血友病患者最应警觉的情况是()
- 皮肤黏膜血肿
 - 呼吸道出血
 - 消化道出血
 - 泌尿生殖系统出血
 - 颅内出血
93. 模拟题 患者, 男, 36岁。近日头晕、乏力, 活动后症状加重伴心慌、气促, 在骨髓涂片中肉眼可看到脂肪滴, 骨髓检测结果: 骨髓增生减低, 三系细胞均有不同程度的减少。慢性再障诊断成立。目前首选的治疗药物是()
- 糖皮质激素
 - 盐皮质激素
 - 雄激素
 - 雌激素
 - 抗胸腺细胞蛋白和抗淋巴细胞球蛋白
94. 模拟题 紫癜是指皮下或黏膜下出血范围为()
- 直径小于 2mm
 - 直径小于 3mm
 - 直径在 3~5mm 之间
 - 直径大于 5mm

E. 直径在 2~3mm 之间

95. 模拟题 对于既有发热和出血征象, 又伴有肝、脾肿大的患者, 为明确诊断, 最有鉴别价值的实验室检查方法是()

- A. 肝功能
- B. B 超
- C. CT
- D. 骨髓检查
- E. 磁共振

96. 模拟题 特发性血小板减少性紫癜最主要的发病机制是()

- A. 骨髓制造巨核细胞功能低下
- B. 免疫反应
- C. 毛细血管脆性增加
- D. 脾脏破坏血小板
- E. 血小板功能异常

97. 模拟题 患者, 女, 56 岁。行胃大部切除半年, 伴有头痛, 乏力 2 个月, 加重 3 天, 进一步检查确诊为缺铁性贫血。发生贫血最可能的原因是()

- A. 铁的需求量增加
- B. 铁摄入不足
- C. 铁吸收障碍
- D. 肿瘤
- E. 手术中失血所致

98. 模拟题 下列不是慢性粒细胞白血病诊断依据的是()

- A. 血象
- B. 骨髓象
- C. 患者有贫血和明显的脾大
- D. Ph 染色体阳性
- E. 骨扫描

99. 真题 2017-S088 参与合成血红蛋白、肌红蛋白与细胞色素 A 的物质是()

- A. 钙
- B. 磷
- C. 碘
- D. 锌
- E. 铁

100. 模拟题 治疗慢性粒细胞白血病慢性期的首选药物为()

- A. 羟基脲
- B. 白消安
- C. 二溴甘
- D. 氮芥
- E. 干扰素

101. 真题 2018-X089 治疗白血病的药物会产生心脏毒性的是()

- A. 长春新碱

- B. 泼尼松
- C. 柔红毒素
- D. 甲氨蝶呤
- E. 环磷酰胺

102. 模拟题 血液系统疾病外周血白细胞少于多少时, 应实行保护性隔离()

- A. $4 \times 10^9/L$
- B. $3 \times 10^9/L$
- C. $2 \times 10^9/L$
- D. $1 \times 10^9/L$
- E. $0.5 \times 10^9/L$

103. 真题 2018-X090 治疗白血病的药物会产生出血性膀胱炎的是()

- A. 长春新碱
- B. 泼尼松
- C. 柔红毒素
- D. 甲氨蝶呤
- E. 环磷酰胺

104. 模拟题 观察铁剂治疗效果最早的化验指标是()

- A. 红细胞数上升
- B. 血清铁含量上升
- C. 血红蛋白量上升
- D. 红细胞体积增大
- E. 网织红细胞数上升

105. 模拟题 急性白血病患者出现头痛、恶心、呕吐、颈项强直等症状常提示()

- A. 颅内出血
- B. 败血症
- C. 中枢神经系统白血病
- D. 上消化道出血
- E. 脑栓塞

106. 模拟题 患者, 男, 26 岁。患慢性粒细胞白血病住院治疗, 为增加其机体抵抗力, 可给予输入的血液制品是()

- A. 洗涤红细胞
- B. 白细胞浓缩悬液
- C. 血小板浓缩悬液
- D. 库存血
- E. 新鲜血

107. 真题 2017-X093 重型再生障碍性贫血患者治疗首选()

- A. 输血
- B. 脾切除
- C. 雄激素治疗
- D. 糖皮质激素治疗
- E. 免疫抑制剂治疗

108. 真题 2017-X094 特发性血小板减少性紫癜患者治疗首选()

- A. 输血
- B. 脾切除
- C. 雄激素治疗
- D. 糖皮质激素治疗
- E. 免疫抑制剂治疗

109. 真题 2019-J014 血小板来源于骨髓中的()

- A. 浆细胞
- B. 单核细胞
- C. 巨核细胞
- D. 巨噬细胞
- E. 组织嗜碱细胞

110. 真题 2019-J024 成人缺铁性贫血的主要病因是()

- A. 需要量增加而摄入不足
- B. 铁吸收不良
- C. 慢性失血
- D. 理化因素
- E. 生物因素

111. 真题 2019-J061 小儿缺铁性贫血的原因是()

- A. 摄入不足
- B. 铁吸收不良
- C. 慢性失血
- D. 物理因素
- E. 生物因素

112. 真题 2019-X042 对血液病诊断,最有价值的实验室检查方法是()

- A. CT
- B. B型超声
- C. X线检查
- D. 骨髓检查
- E. 肝功能检查

113. 真题 2019-X071 属于急性特发性血小板减少性紫癜病人骨髓象变化的是()

- A. 巨核细胞数量减少
- B. 巨核细胞正常或增多
- C. 巨核细胞浆呈退行性变
- D. 巨核细胞多数为成熟型
- E. 巨核细胞明显增多

114. 真题 2019-Z015 不属于白血病细胞浸润的表现是()

- A. 肝脾淋巴结肿大
- B. 骨骼和关节疼痛
- C. 肺脏浸润表现
- D. 脾及黏膜浸润
- E. 眼眶骨膜浸润

115. 真题 2019-Z028 患者,女,31岁。近日反复出现皮肤瘀点,鼻衄,月经过多,脾大,实验室检查:Hb90g/L。护理措施错误的是()

- A. 适当限制活动

- B. 预防各种创伤
- C. 尽量减少肌肉注射
- D. 保持鼻腔通畅,剥去鼻血痂
- E. 高蛋白、高维生素、易消化饮食

116. 真题 2019-Z060 服用铁剂治疗缺铁性贫血时,血红蛋白恢复正常后还需服用铁剂的时间是()

- A. 1~2周
- B. 3~4周
- C. 5~8周
- D. 3~6个月
- E. 12个月

117. 真题 2019-Z072 有关急性白血病细胞浸润的表现下列哪项不妥()

- A. 骨骼和关节疼痛
- B. 肝脾轻度至中度肿大
- C. 中枢神经系统白血病
- D. 淋巴结肿大多数无压痛
- E. 皮肤、牙龈、睾丸等不会被浸润

七.内分泌代谢性疾病病人的护理

1. 模拟题 某糖尿病患者,口服降糖药效果欠佳,遵医嘱皮下注射胰岛素治疗时,应注意观察患者()

- A. 有无心慌
- B. 出冷汗
- C. 神志不清
- D. 低血糖反应
- E. 以上都是

2. 模拟题 下列与糖尿病周围神经病变的表现不符的是()

- A. 四肢麻木
- B. 肢体疼痛
- C. 感觉过敏
- D. 肌力减弱
- E. 尿失禁

3. 模拟题-J037 预防发生甲状腺危象的关键是()

- A. 术中彻底止血
- B. 术中操作轻柔
- C. 术后继续服用碘剂
- D. 术前充分准备
- E. 术后良好的护理

4. 模拟题 有关突眼护理正确的是()

- A. 避免点眼药
- B. 低盐饮食
- C. 睡前摘掉眼罩
- D. 放低头部
- E. 外出时带无色眼镜

5. 模拟题 库欣综合征的特征性表现为()

- A. 脊柱变形
B. 多毛与痤疮
C. 皮肤紫纹
D. 向心性肥胖
E. 皮肤黏膜色素沉着
6. 真题 2017-X005 糖尿病酮症酸中毒的患者呼出的气味是()
A. 氨臭味
B. 烂苹果味
C. 粪臭味
D. 恶臭味
E. 刺激性酸味
7. 真题 2016-Z049 糖尿病患者运动治疗的最佳时间是()
A. 晨起锻炼
B. 餐后 2 小时
C. 睡前
D. 餐后 1 小时
E. 餐前 1 小时
8. 真题 2016-Z017 毒性弥漫性甲状腺肿患者甲状腺肿大的描述, 错误的是()
A. 柔软
B. 双侧对称
C. 压痛明显
D. 可有震颤
E. 能随吞咽运动
9. 真题 2018-Z007 糖尿病患者出现强烈饥饿感、心悸、手颤, 出汗可能的原因是()
A. 胃溃疡
B. 糖尿病加重
C. 高血压
D. 低血糖
E. 合并甲亢
10. 真题 2016-X066 患者女, 28 岁。甲状腺功能亢进病史半年, 妊娠 3 个月, 甲状腺功能亢进症状加重, 治疗宜选用()
A. 甲状腺次全切除术
B. 放射性 ^{131}I 治疗
C. 丙基硫氧嘧啶
D. 普萘洛尔
E. 碘剂
11. 真题 2016-X006 诊断糖尿病的标准是空腹血糖值不低于()
A. 5.0mmol/L
B. 6.0mmol/L
C. 7.0mmol/L
D. 8.0mmol/L
E. 9.0mmol/L
12. 真题 2016-J083 患者女, 32 岁。甲亢患者。近 2 周来, 眼球突出, 眼裂增宽, 瞬目减少, 突眼度 18mm, 辐辏反射减弱, 双眼聚合不良。出现上述表现的原因最可能是()
A. 眶内继发肿瘤
B. 球后组织水肿
C. 球后淋巴细胞浸润
D. 上、下睑肌麻痹
E. 眼外肌和上睑肌张力增高
13. 真题 2016-J030 引起甲状腺功能亢进症的主要因素是()
A. 病毒感染
B. 理化因素
C. 手术创伤
D. 自身免疫
E. 遗传因素
14. 模拟题 低血糖昏迷的患者应立即静脉注射()
A. 10%葡萄糖酸钙
B. 50%葡萄糖
C. 氨茶碱
D. 维生素 B6
E. 10%氯化钠
15. 模拟题 内分泌腺功能减退性疾病的治疗主要采用()
A. 替代治疗
B. 病因治疗
C. 对症治疗
D. 支持治疗
E. 放疗或化疗
16. 模拟题 患者, 男, 18 岁。有“三多一少”症状 2 个月余, 空腹血糖 16.7mmol/L, 尿糖阳性、尿酮体阴性。首选的治疗方法为()
A. 磺脲类降糖药
B. 双胍类降糖药
C. 葡萄糖苷酶抑制剂
D. 噻唑烷二酮
E. 胰岛素
17. 真题 2018-J015 患者女, 36 岁, 诊断为 Graves 病, 口服丙基硫氧嘧啶治疗 1 年半, 目前症状控制, 甲状腺缩小, 考虑停药, 需进行的监测项目为()
A. TSAb 测定
B. 基础代谢测定
C. T_3 抑制试验
D. 甲状腺摄 ^{131}I 率
E. 放射性核素扫描
18. 真题 2017-Z016 不符合甲亢危象的表现是()

- A. 高热达 39℃ 以上
- B. 心率快, ≥ 140 次/分
- C. 患者烦躁, 焦虑, 嗜睡或谵妄
- D. 厌食、恶心、呕吐、腹泻
- E. 血白细胞降低

19. 模拟题 患者, 男, 68 岁。患 2 型糖尿病 10 年, 在家自行口服降糖药物治疗。现突然失明, 引起失明最可能的原因是()

- A. 白内障
- B. 脑血管意外
- C. 颅内压增高
- D. 视网膜剥离
- E. 视神经盘水肿

20. 模拟题 维生素 D 缺乏后, 血钙降低刺激机体代偿分泌增加的激素是()

- A. 肾素
- B. 胰岛素
- C. 甲状腺素
- D. 甲状旁腺素
- E. 肾上腺素

21. 模拟题 下列关于糖尿病的描述中不正确的是()

- A. 1 型糖尿病又称为胰岛素依赖型糖尿病
- B. 2 型糖尿病又称为胰岛素非依赖型糖尿病
- C. 原发性糖尿病最少见, 继发性糖尿病相对多见
- D. 妊娠期发生糖耐量减低称为妊娠期糖尿病
- E. 糖尿病是多基因性遗传性疾病

22. 真题 2014-Z091 甲状腺危象原因为()

- A. 胰岛素绝对不足
- B. 突然大量甲状腺素入血
- C. 呼吸带烂苹果气味
- D. 甲状腺肿大震颤有杂音
- E. 饥饿感、心慌手颤

23. 模拟题 甲亢患者的大便次数多, 是因为()

- A. 肠蠕动过快
- B. 甲状腺素过少
- C. 高热
- D. 饮水过多
- E. 进食过多

24. 模拟题 患者, 女, 48 岁。尿液呈烂苹果味, 提示该患者可能处于()

- A. 肝昏迷
- B. 泌尿系统感染
- C. 阻塞性胆管炎
- D. 有机磷农药中毒
- E. 糖尿病酮症酸中毒

25. 模拟题 放射性 ^{131}I 治疗甲亢的作用机制是()

- A. 阻断 TSH 对甲状腺的促进作用
- B. 抑制自身免疫反应

- C. 抑制甲状腺素的活性
- D. 破坏甲状腺泡上皮, 减少甲状腺素的合成与释放
- E. 降低机体组织对甲状腺激素的敏感性

26. 真题 2018-J022 患者女, 36 岁。因“消瘦、乏力、怕热、多汗 4 月”就诊, 检查: 体温 37.6℃, 心率 116 次/分, 血压 145/90mmHg, 甲状腺弥漫性、对称性肿大, 质软, 随吞咽上下活动, 伴有震颤, 并可闻及血管杂音, 首先考虑的诊断是()

- A. 单纯性甲状腺囊肿
- B. 皮质醇增多症
- C. 甲亢危象
- D. 甲状腺功能减退
- E. 甲状腺功能亢进

27. 模拟题 糖尿病患者最易发生的感染是()

- A. 肺结核
- B. 皮肤化脓性感染
- C. 败血症
- D. 肾盂肾炎
- E. 真菌性阴道炎

28. 模拟题 磺脲类降糖药主要适用于哪种患者()

- A. 饮食控制无效的 II 型糖尿病
- B. I 型糖尿病伴眼底病变
- C. 糖尿病酮症酸中毒
- D. I 型糖尿病
- E. 肥胖且饮食控制无效的糖尿病

29. 真题 2015-Z100 甲状腺功能减退症的患者常可出现()

- A. 色素沉着
- B. 身材矮小
- C. 身材高大
- D. 消瘦
- E. 肥胖

30. 真题 2013-Z023 对甲状腺功能亢进症重度浸润性突眼的护理不应()

- A. 抬高头部
- B. 鼓励多食略咸食品
- C. 外出时用眼罩
- D. 生理盐水纱布局部湿敷
- E. 抗生素眼膏涂眼

31. 真题 2015-Z099 呆小症患者常可出现()

- A. 色素沉着
- B. 身材矮小
- C. 身材高大
- D. 消瘦
- E. 肥胖

32. 真题 2011-Z088 甲状腺危象原因为()

- A. 胰岛素绝对不足

- B. 突然大量甲状腺素入血
- C. 呼吸带烂苹果味
- D. 甲状腺肿大, 震颤, 有杂音
- E. 饥饿感, 心慌手颤

33. 真题 2011-X068 患者, 女, 36 岁。颈前弥漫性肿大, 疑为甲亢。下列检查对诊断意义不大的是()

- A. 基础代谢率
- B. 甲状腺摄 131I 率测定
- C. 声带检查
- D. 颈部 X 线
- E. 测血肌酐

34. 真题 2011-X016 基础代谢率 (BMR) 测定前的准备不包括()

- A. 禁食 12 小时
- B. 可口服抗甲状腺药物
- C. 至少睡眠 8 小时
- D. 不能服用镇静剂
- E. 清晨醒来后静卧状态

35. 真题 2011-Z089 1 型糖尿病时患者()

- A. 胰岛素绝对不足
- B. 突然大量甲状腺素入血
- C. 呼吸带烂苹果味
- D. 甲状腺肿大, 震颤, 有杂音
- E. 饥饿感, 心慌手颤

36. 真题 2011-X013 抗甲状腺药物治疗的副作用主要是()

- A. 皮肤瘙痒
- B. 剥脱性皮炎
- C. 中毒性肝炎
- D. 心绞痛
- E. 粒细胞减少

37. 真题 2011-Z090 糖尿病酮症酸中毒的患者()

- A. 胰岛素绝对不足
- B. 突然大量甲状腺素入血
- C. 呼吸带烂苹果味
- D. 甲状腺肿大, 震颤, 有杂音
- E. 饥饿感, 心慌手颤

38. 真题 2011-X005 确诊甲状腺功能亢进的实验室检查是()

- A. 三脂酰甘油 (甘油三酯) 增高
- B. 三碘甲状腺原氨酸增高
- C. β_1 微球蛋白增高
- D. 磷酸肌酸激酶减少
- E. 谷丙转氨酶减少

39. 真题 2011-J078 患儿, 女, 9 岁。多饮, 多食, 多尿, 消瘦 2 个月。查空腹血糖 13mmol/L。尿糖 (+), 尿酮 (+)。该病的主要机制是()

- A. 胰岛素绝对缺乏
- B. 胰岛素相对缺乏
- C. 胰岛素受体缺乏
- D. 胰岛素亲和力下降
- E. 胰岛素受体抗体产生

40. 真题 2011-J032 人体最重要的神经内分泌器官是()

- A. 下丘脑
- B. 腺垂体
- C. 肾上腺
- D. 甲状腺
- E. 胰腺

41. 真题 2010-Z096 甲状腺功能亢进容易引起()

- A. 窦性心动过速
- B. 窦性心动过缓
- C. 心房颤动
- D. 预激综合征
- E. 病态窦房结综合征

42. 真题 2017-X036 抗甲状腺药物治疗的不良反应中最危险的是()

- A. 肝功能受损
- B. 胃肠道反应
- C. 粒细胞缺乏
- D. 白细胞减少
- E. 药疹

43. 真题 2015-X092 轻度甲亢基础代谢率是()

- A. -10%
- B. 10%
- C. 20%-30%
- D. 30%-60%
- E. >+60%

44. 真题 2010-Z022 患者, 女, 60 岁。甲状腺肿大 20 年, 下列与压迫临近组织无关的症状是()

- A. 呼吸困难
- B. 吞咽困难
- C. 头面部淤血
- D. 咳粉红色泡沫痰
- E. 声音嘶哑

45. 真题 2010-X079 患者, 女, 清晨未起床时测得血压 125/80mmHg, 脉搏 88 次/分, 其基础代谢率为()

- A. 14%
- B. 16%
- C. 20%
- D. 21%
- E. 22%

46. 真题 2010-X061 患者, 女, 32 岁。糖尿病 11 年, 呼吸深大而快, 且有烂苹果气味。化验: 尿糖 (+++), 血糖 12.6mmol/L (226.8mg/Dl), 血酮增高。初步诊断

- 为()
- A. 右心衰竭
B. 慢性肾衰竭
C. 酮症酸中毒
D. 周围神经病变
E. 自主神经病变
47. 真题 2010-X027 测定基础代谢率前应禁食的时间为()
- A. 4 小时
B. 6 小时
C. 8 小时
D. 10 小时
E. 12 小时
48. 真题 2010-J015 甲状腺功能亢进的主要原因是()
- A. 精神刺激
B. 细菌感染
C. 过度劳累
D. 自身免疫
E. 外部创伤
49. 真题 2013-J053 与 1 型糖尿病发病无关的病毒是()
- A. 流感病毒
B. 柯萨奇病毒
C. 巨细胞病毒
D. 风疹病毒
E. ECHO 病毒
50. 真题 2013-J066 不属于弥漫性甲状腺肿诱发因素的是()
- A. 感染
B. 创伤
C. 贫血
D. 精神刺激
E. 劳累
51. 真题 2013-X083 酮症酸中毒可出现()
- A. 尿酮体 (+)
B. 尿中白细胞>5 个/高倍镜视野
C. 柏油样便
D. 血红蛋白<110g/L
E. 大量管型尿
52. 真题 2015-Z098 慢性肾上腺皮质功能减退症的患者常可出现()
- A. 色素沉着
B. 身材矮小
C. 身材高大
D. 消瘦
E. 肥胖
53. 真题 2015-Z056 某 1 型糖尿病患者, 查餐后 2 小时血糖 15mmol/L, 给胰岛素静脉滴注, 静脉滴注时患者自觉多汗、手抖、饥饿, 应考虑其原因是()
- A. 低血压
B. 低血糖
C. 静脉滴注过快
D. 药物过敏
E. 精神紧张
54. 真题 2015-J020 Graves 病最主要的病因是()
- A. 遗传因素
B. 应激因素
C. 自身免疫
D. 病毒感染
E. 环境因素
55. 真题 2015-J015 I 型糖尿病发病的机制是()
- A. 老年人肾小球排糖少
B. 吃糖过多, 短期无法排出
C. 胰岛素分泌绝对不足
D. 肝糖原快速释放糖
E. 老年人肾小管重吸收糖多
56. 真题 2015-X039 2 型糖尿病患者最主要的死因是()
- A. 糖尿病足
B. 肾脏病变
C. 心脑血管病变
D. 糖尿病视网膜病变
E. 神经病变
57. 真题 2017-X050 2 型糖尿病患者最主要的死因是()
- A. 糖尿病足
B. 肾脏病变
C. 心脑血管病变
D. 糖尿病视网膜病变
E. 神经病变
58. 真题 2014-Z093 符合糖尿病酮症酸中毒患者的叙述是()
- A. 胰岛素绝对不足
B. 突然大量甲状腺素入血
C. 呼吸带烂苹果气味
D. 甲状腺肿大震颤有杂音
E. 饥饿感、心慌手颤
59. 真题 2014-Z092 符合 1 型糖尿病患者的叙述是()
- A. 胰岛素绝对不足
B. 突然大量甲状腺素入血
C. 呼吸带烂苹果气味
D. 甲状腺肿大震颤有杂音
E. 饥饿感、心慌手颤
60. 真题 2017-Z053 甲状腺术后最危险的并发症()
- A. 术后呼吸困难和窒息
B. 喉返神经损伤

- C. 喉上神经损伤
- D. 患侧上肢肿胀
- E. 低钙抽搐

61. 真题 2014-X031 抗甲状腺药物的副作用主要是()
- A. 皮肤瘙痒
 - B. 剥脱性皮炎
 - C. 中毒性肝炎
 - D. 心绞痛
 - E. 粒细胞减少

62. 真题 2014-J037 Graves 病又称()
- A. 多结节性甲状腺肿伴功能亢进症
 - B. 自主性高功能甲状腺腺瘤
 - C. 弥漫性甲状腺肿伴功能亢进症
 - D. 慢性淋巴细胞性甲状腺炎
 - E. 亚急性甲状腺炎

63. 真题 2013-Z076 62 岁男性患者, 因患糖尿病 9 年而长期接受胰岛素治疗, 尿糖基本控制在 (+~++)。昨晚因多食后, 今上午尿糖定性试验为 (+++), 自行增加了胰岛素剂量, 1 小时后突然感到心悸、饥饿、出冷汗, 随即昏迷。对上述患者, 应立即给予下列哪项处理措施()
- A. 静脉注射 50g/L 葡萄糖溶液
 - B. 静脉滴注小剂量胰岛素
 - C. 静脉注射氯化钾
 - D. 静脉滴注 50g/L 碳酸氢钠 100ml
 - E. 静脉滴注复方氯化钠溶液

64. 真题 2013-Z075 62 岁男性患者, 因患糖尿病 9 年而长期接受胰岛素治疗, 尿糖基本控制在 (+~++)。昨晚因多食后, 今上午尿糖定性试验为 (+++), 自行增加了胰岛素剂量, 1 小时后突然感到心悸、饥饿、出冷汗, 随即昏迷。该患者送来医院后, 为明确诊断, 你认为应立即进行下列哪项检查()
- A. 血糖
 - B. 尿糖
 - C. 血酮
 - D. 尿酮
 - E. 血气分析

65. 真题 2013-Z024 糖尿病患者在家注射胰岛素, 出现极度饥饿、软弱、手抖、出汗、头晕等, 此时应当()
- A. 让患者卧床休息至症状消失
 - B. 让患者平卧并协助活动四肢
 - C. 给一些口服糖块
 - D. 立即打电话询问保健医生
 - E. 立即送至附近医院

66. 真题 2013-Z002 一昏迷患者由警察送来急诊, 故无法询问病史, 但患者呼吸时有烂苹果味, 可拟诊何病()
- A. 酒醉
 - B. 有机磷农药中毒

- C. 糖尿病酮症酸中毒
- D. 脑动脉梗阻
- E. 癔症

67. 真题 2017-J064 甲状腺素的作用不包括()
- A. 增加全身组织的耗氧量
 - B. 促进生长发育
 - C. 抑制组织分化
 - D. 促进蛋白质、脂肪、糖类的分解
 - E. 影响体内水的代谢

68. 真题 2018-J067 正常人体的甲状旁腺个数是()
- A. 3
 - B. 1
 - C. 4
 - D. 5
 - E. 2

69. 真题 2018-X073 Graves 病中最重要而特异的体征是()
- A. 粘液性水肿
 - B. 怕热多汗
 - C. 突眼
 - D. 甲状腺肿大
 - E. 甲状腺危象

70. 真题 2017-J075 Graves 病最主要的原因是()
- A. 遗传因素
 - B. 应激因素
 - C. 自身免疫
 - D. 病毒感染
 - E. 环境因素

71. 真题 2017-J080 1 型糖尿病发病的机制是()
- A. 老年人肾小球排糖少
 - B. 吃糖过多, 短期内无法排出
 - C. 胰岛素分泌绝对不足
 - D. 肝糖原快速释放糖
 - E. 老年人肾小管重吸收糖多

72. 真题 2018-X087 对可疑糖尿病检查首选()
- A. 尿糖测定
 - B. 血糖测定
 - C. 血脂测定
 - D. 糖化血红蛋白测定
 - E. 口服葡萄糖耐量试

73. 真题 2019-Z061 糖尿病酮症酸中毒患者经治疗清醒后, 出现心悸, 饥饿, 出汗, 又发生意识不清, 应采取的措施是()
- A. 增加胰岛素用量
 - B. 加用优降糖
 - C. 静脉注射葡萄糖
 - D. 给予呼吸兴奋剂
 - E. 静脉滴注碳酸氢钠

74. 真题 2019-X044 糖尿病微血管病变的典型改变是()

- A. 肾小管同质病变
- B. 出现微血管瘤、视网膜出血、硬性渗出物
- C. 心脏微血管病变
- D. 弥漫性肾小球硬化病变
- E. 微血管基膜增厚和微循环障碍

75. 真题 2019-J056 人体最重要的神经内分泌器官是()

- A. 下丘脑
- B. 腺垂体
- C. 肾上腺
- D. 甲状腺
- E. 胰腺

76. 真题 2019-J055 甲亢危象治疗过程中禁用的药物是()

- A. 异丙嗪
- B. 阿司匹林
- C. 抗生素
- D. 丙硫氧嘧啶
- E. 碘化钠

77. 真题 2019-Z073 甲亢性病人具有特征性的表现是()

- A. 易饥多食, 体重锐减
- B. 大便呈糊状
- C. 大便有不消化食物
- D. 肠鸣音亢进
- E. 大便次数多

八. 风湿性疾病病人的护理

1. 真题 2010-J025 为防止诱发疾病, 系统性红斑狼疮患者应避免的是()

- A. 寒冷
- B. 精神刺激
- C. 过度疲劳
- D. 阳光照射
- E. 缺乏营养

2. 模拟题 类风湿关节炎患者体内最常见的自身抗体是()

- A. 抗核抗体
- B. 抗单链 DNA 抗体
- C. 抗双链 DNA 抗体
- D. 抗 Sm 抗体
- E. 类风湿因子

3. 模拟题 系统性红斑狼疮发病的原因是()

- A. 劳累
- B. 药物过敏
- C. 自身免疫

D. 阳光照射

E. 性激素

4. 模拟题 类风湿关节炎的手指畸形表现为()

- A. 匙状指
- B. 杵状指
- C. 梭状指
- D. 锤状指
- E. 蜘蛛指

5. 模拟题 无心肌炎的急性风湿热患儿应绝对卧床休息()

- A. 1 周
- B. 2 周
- C. 3 周
- D. 4 周
- E. 8 周

6. 模拟题 过敏性紫癜的首发症状常是()

- A. 皮肤紫癜
- B. 腹痛、便血
- C. 恶心、呕吐
- D. 关节疼痛肿胀
- E. 血尿

7. 模拟题 对系统性红斑狼疮患者的皮肤护理, 下列哪一项是错误的()

- A. 常用清水清洗
- B. 忌用碱性患液
- C. 忌用化妆品
- D. 避免阳光照射
- E. 10℃冷水湿敷

8. 模拟题 抗甲状腺药物的作用机制是()

- A. 抑制甲状腺细胞摄取碘
- B. 抑制甲状腺组织释放碘
- C. 抑制甲状腺过氧化物酶, 阻断甲状腺激素合成
- D. 抑制甲状腺组织释放 TH
- E. 增加甲状腺激素的降解

9. 真题 2016-Z064 患者女, 24 岁。未婚。面部有较严重蝶形红斑, 且长期不规则低热。其首优护理诊断是()

- A. 体温过高
- B. 皮肤完整性受损
- C. 有感染的危险
- D. 相关知识缺乏
- E. 思维过程改变

10. 真题 2016-Z019 类风湿性关节炎常见临床表现不包括()

- A. 晨僵
- B. 关节痛与畸形
- C. 肺间质病变
- D. 蛋白尿
- E. 高热

11. 真题 2016-X049 对系统性红斑狼疮最具有特异性的检查是()

- A. 血沉增快
- B. 抗核抗体阳性
- C. 血或骨髓中发现狼疮细胞
- D. C3 补体显著升高
- E. 抗 Sm 抗体阳性

12. 真题 2016-X018 类风湿关节炎患者进行关节功能锻炼的最佳时期是()

- A. 恢复期
- B. 急性期
- C. 症状前期
- D. 病变后期
- E. 晨僵期

13. 真题 2016-J048 风湿性疾病不会累及的组织是()

- A. 骨
- B. 关节及肌腱
- C. 肌内
- D. 滑膜
- E. 筋膜

14. 真题 2017-Z014 类风湿关节炎活动期的标志是()

- A. 自发病
- B. 杵状指
- C. 晨僵
- D. 压痛
- E. 畸形

15. 模拟题 类风湿关节炎重要的病变是()

- A. 类风湿结节
- B. 滑膜炎
- C. 周围神经病变
- D. 骨质增生
- E. 软骨增生

16. 模拟题 系统性红斑狼疮典型的皮损是()

- A. 结节
- B. 蝶形红斑
- C. 斑丘疹
- D. 紫斑
- E. 荨麻疹

17. 模拟题 患者, 女, 25 岁。职员, 主诉双肘、腕、手指近端指间关节肿痛 3 年, 加重 2 个月, 以类风湿关节炎收入院。经休息、药物治疗后, 现在病情缓解, 准备出院, 护士应进行的健康教育是()

- A. 避免劳累, 预防感冒
- B. 每天进行运动锻炼 4 小时
- C. 吃高蛋白、高热量饮食
- D. 每天饮水控制在 500ml
- E. 在家承担所有家务劳动

18. 模拟题 患者, 女, 35 岁。主因双肘、腕、手指近端指间关节肿痛 2 年, 加重 2 周, 以类风湿关节炎收入院。给予泼尼松、布洛芬和青霉胺等药物治疗, 后出现恶心、反酸和胃部不适, 此症状可能是()

- A. 青霉胺的不良反应
- B. 布洛芬的不良反应
- C. 泼尼松的不良反应
- D. 病情加重
- E. 进食食物不当

19. 模拟题 在治疗痛风的药物中, 能抑制尿酸合成的是()

- A. 秋水仙碱
- B. 布洛芬
- C. 糖皮质激素
- D. 别嘌醇
- E. 丙磺舒

20. 模拟题 患者, 女, 28 岁。全身节痛, 面部有蝶形斑, 血抗 Sm 抗体 (+), 诊断为系统性红斑狼疮, 医嘱避免日光照射, 外出穿长袖上衣和长裤, 戴帽子或撑遮阳伞。护士为患者解释其中的原因是()

- A. 紫外线可致内分泌紊乱
- B. 紫外线是本病的重要诱因
- C. 紫外线直接破坏皮肤黏膜
- D. 紫外线加重关节痛
- E. 紫外线直接损害骨髓

21. 模拟题 提示类风湿关节炎活动性和严重性的检查项目是()

- A. 血常规
- B. 血沉
- C. 关节 X 线片
- D. 类风湿因子滴度
- E. 关节滑液

22. 模拟题 关于系统性红斑狼疮的描述不正确的是()

- A. 以年轻女性好发, 育龄妇女占大多数
- B. 典型症状是面部蝶形红斑
- C. 病因不明, 可能与精神刺激、创伤等应急因素有关
- D. 反复发作, 常迁延不愈
- E. 伴有多脏器受累

23. 模拟题 类风湿关节炎所造成的关节痛性质是()

- A. 多呈对称性、持续性, 但时轻时重
- B. 多呈对称性、持续性, 逐渐加重
- C. 不对称性、持续性, 时轻时重
- D. 不对称性、间断性, 逐渐加重
- E. 不对称性、间断性, 时轻时重

24. 真题 2017-Z024 系统性红斑狼疮患者, 皮肤护理不正确的是()

- A. 常用温水清洗
- B. 忌用碱性肥皂
- C. 忌用化妆品

- D. 避免阳光曝晒
- E. 每日 3 次用冷水局部湿敷

25. 真题 2016-J043 类风湿关节炎最基本的病理损害是关节的()

- A. 滑膜炎症
- B. 软骨炎症
- C. 骨质疏松
- D. 腔隙增大
- E. 腔隙变窄

26. 真题 2015-Z089 SLE 患者除关节炎外的表现是()

- A. 无全身症状
- B. 无关节畸形
- C. 有多系统脏器损害
- D. 有关节畸形
- E. 有乏力发热体重减轻

27. 真题 2013-Z025 类风湿关节炎关节病变的特点是()

- A. 大关节
- B. 关节畸形
- C. 游走性疼痛
- D. 对称性改变
- E. 关节肿胀

28. 真题 2013-X014 钱女士, 28 岁。近半年来全身乏力, 低热, 关节疼痛。免疫学检查: 抗 Sm 抗体阳性。应考虑是()

- A. 类风湿性关节炎
- B. 皮炎
- C. 系统性红斑狼疮
- D. 慢性关节炎
- E. 先天性关节畸形

29. 真题 2013-J071 与系统性红斑狼疮发病可能有关的是()

- A. 甲状旁腺素
- B. 性激素
- C. 生长激素
- D. 肾素
- E. 肾上腺素

30. 真题 2011-X050 早期改善类风湿病患儿症状的主要药物是()

- A. 类固醇激素
- B. 免疫抑制剂
- C. 免疫增强剂
- D. 慢作用抗炎药
- E. 非甾体类抗炎药

31. 真题 2011-X011 治疗系统性红斑狼疮的首选药物是()

- A. 氯丙嗪

- B. 避孕药
- C. 强的松
- D. 胍苯达嗪
- E. 普鲁卡因酰胺

32. 真题 2011-J100 系统性红斑狼疮发病的相关因素是()

- A. 雄激素
- B. 雌激素
- C. 甲状腺激素
- D. 抗利尿激素
- E. 肾上腺皮质激素

33. 真题 2011-J096 系统性红斑狼疮最严重的受损部位是()

- A. 大脑
- B. 心脏
- C. 肾脏
- D. 脾脏
- E. 肺脏

34. 真题 2011-J017 类风湿关节炎最基本的病理损害是关节的()

- A. 滑膜炎症
- B. 软骨炎症
- C. 骨质疏松
- D. 腔隙增大
- E. 腔隙变窄

35. 真题 2017-X033 治疗系统性红斑狼疮的首选药物是()

- A. 氯丙嗪
- B. 避孕药
- C. 强的松
- D. 胍苯达嗪
- E. 普鲁卡因酰胺

36. 真题 2011-J003 系统性红斑狼疮的发病机制是()

- A. 自身免疫
- B. 烈日曝晒
- C. 烟酒过多
- D. 劳累过度
- E. 药物过敏

37. 真题 2010-Z027 患者, 女, 26 岁。类风湿关节炎病史 10 年, 目前病情缓解, 对其重要的护理措施是()

- A. 病变关节理疗
- B. 保持关节功能位
- C. 规范使用强的松
- D. 患肢功能锻炼
- E. 高热量高蛋白饮食

38. 真题 2010-X072 患者, 女, 27 岁。发热, 多处关节炎, 面部有蝶形红斑, 诊断为系统性红斑狼疮。特异性高的检查结果是()

- A. 红细胞花环形成
- B. 类风湿因子 (+)
- C. 抗核抗体 (+)
- D. 抗 Sm 抗体 (+)
- E. 红细胞沉降率快

39. 真题 2010-X036 类风湿关节炎急性期时, 下列采用的措施中不妥的是 ()

- A. 给予止痛消炎药
- B. 注意活动四肢
- C. 保持关节功能位
- D. 按摩
- E. 听音乐放松心情

40. 真题 2013-Z026 系统性红斑狼疮性患者皮肤护理哪项不妥 ()

- A. 常用清水清洗
- B. 忌用碱性肥皂
- C. 忌用化妆品
- D. 避免阳光暴晒
- E. 10℃水局部湿敷

41. 真题 2013-Z094 类风湿关节炎患者 ()

- A. 关节疼痛呈游走性
- B. 无关节畸形
- C. 关节疼痛发作突然
- D. 有关节畸形
- E. 多累及单一关节

42. 真题 2018-J040 关于类风湿关节炎的叙述, 正确的是 ()

- A. 多累及大关节, 愈后不佳
- B. 肾脏损害多见
- C. 是一种自身免疫性疾病
- D. 多数急性起病
- E. 男性发病多于女性

43. 真题 2013-Z095 SLE 患者 ()

- A. 关节疼痛呈游走性
- B. 无关节畸形
- C. 关节疼痛发作突然
- D. 有关节畸形
- E. 多累及单一关节

44. 真题 2015-Z088 类风湿关节炎患者的表现是 ()

- A. 无全身症状
- B. 无关节畸形
- C. 有多系统脏器损害
- D. 有关节畸形
- E. 有乏力发热体重减轻

45. 真题 2017-J042 患者女, 40 岁, 因关节肿痛伴僵硬多年诊断为类风湿性关节炎, 其发病的相关因素是 ()

- A. 遗传因素
- B. 感染因素

- C. 环境因素
- D. 化学物理因素
- E. 自身免疫因素

46. 真题 2015-Z073 患者, 女, 26 岁。患系统性红斑狼疮 3 年, 未婚。面部有较严重的蝶形红斑, 怕见人, 且有不规则发热。患者首要的护理诊断是 ()

- A. 体温过高
- B. 绝望
- C. 焦虑
- D. 皮肤完整性受损
- E. 思维过程改变

47. 真题 2015-J086 系统性红斑狼疮最常受损的部位是 ()

- A. 大脑
- B. 肝脏
- C. 肾脏
- D. 脾脏
- E. 肺脏

48. 真题 2015-J073 患者, 女, 40 岁。因关节肿痛伴僵硬多年, 诊断为类风湿性关节炎。其发病的相关因素是 ()

- A. 遗传因素
- B. 感染因素
- C. 环境因素
- D. 化学物理因素
- E. 自身免疫因素

49. 真题 2017-X045 口服甲氨蝶呤片治疗类风湿关节炎患者通常服药频次为 ()

- A. 每日 1 次
- B. 每日 2 次
- C. 每日 3 次
- D. 隔日 1 次
- E. 每周 1 次

50. 真题 2015-J049 系统性红斑狼疮属于 ()

- A. 自身免疫性疾病
- B. 变态反应性疾病
- C. 细菌感染性疾病
- D. 病毒感染性疾病
- E. 支原体感染性疾病

51. 真题 2015-X033 系统性红斑狼疮特异性的检查是 ()

- A. 抗 Sm 抗体
- B. 抗 DNA 抗体
- C. 狼疮细胞
- D. 抗核抗体
- E. 白细胞总数

52. 真题 2015-X017 治疗系统性红斑狼疮的首选药物是 ()

- A. 氯丙嗪
- B. 避孕药
- C. 强的松
- D. 胍苯达嗪
- E. 普鲁卡因酰胺

53. 真题 2014-Z009 关于类风湿关节炎的护理措施,不妥的叙述是()

- A. 绝对卧床休息
- B. 热水浴缓解疼痛
- C. 保持关节功能位
- D. 必要时用夹板固定关节
- E. 注意观察药物疗效和副作用

54. 真题 2014-X067 患者,女,26岁。诊断为系统性红斑狼疮,双面颊和鼻梁有紫红色蝶形红斑,表面光滑,有时可见鳞屑。皮肤护理措施不正确的是()

- A. 出门穿长袖衣裤
- B. 禁忌日光浴
- C. 保持皮肤的清洁卫生
- D. 碱性肥皂水洗浴
- E. 避免使用化妆品

55. 真题 2014-X033 女,21岁。发热,多处关节炎,面部有蝶形红斑,诊断为系统性红斑狼疮。查血化验最具特征性的发现是()

- A. 红细胞花环形成
- B. 类风湿因子(+)
- C. 抗核抗体(+)
- D. 抗Sm抗体(+)
- E. 血沉快

56. 真题 2014-X030 抗幼年类风湿关节炎治疗的主要药物是()

- A. 青霉素
- B. 红霉素
- C. 水杨酸制剂
- D. 维生素C
- E. 维生素D

57. 真题 2014-J019 类风湿关节炎最基本病理改变是()

- A. 血管炎
- B. 结缔组织纤维蛋白样变性
- C. 滑膜变性坏死
- D. 滑膜炎
- E. 关节软骨钙化

58. 真题 2014-J003 系统性红斑狼疮的发病机制是()

- A. 自身免疫
- B. 烈日暴晒
- C. 烟酒过多
- D. 劳累过度
- E. 药物过敏

59. 真题 2010-J066 类风湿关节炎引起自身免疫反应中最常见的因子是()

- A. 自身抗体 IgM
- B. 外源性抗体
- C. 自身抗体 IgA
- D. 胶原蛋白
- E. II型胶原抗体

60. 真题 2018-Z060 SLE 最常累及的器官是()

- A. 心脏
- B. 肺脏
- C. 肝脏
- D. 脾脏
- E. 肾脏

61. 真题 2018-X063 患者女,21岁。发热、多处关节炎、面部有蝶形红斑,诊断为系统性红斑狼疮。特异性高的检查结果是()

- A. 红细胞花环形成
- B. 抗SM抗体(+)
- C. 抗核抗体(+)
- D. 血沉快
- E. 类风湿因子(+)

62. 真题 2018-Z081 患者男,42岁。诊断类风湿关节炎1年余,其治疗方案为双氯芬酸钠+柳氮磺吡啶,为尽快控制症状,可首选()

- A. 泼尼松
- B. 硫酸羟氯喹
- C. 甲氨蝶呤
- D. 滑膜切除术
- E. 双氯芬酸钠

63. 真题 2018-X081 类风湿关节炎中,因为侧韧带从近端指间关节两侧滑脱及挛缩而致的畸形是()

- A. 天鹅颈
- B. 纽扣花
- C. 技工手
- D. 望远镜手
- E. 扳机手

64. 真题 2018-Z083 类风湿关节炎患者现进行性呼吸困难,胸片检查有双肺网状阴影,在常规治疗的基础上应首选()

- A. 泼尼松
- B. 硫酸羟氯喹
- C. 甲氨蝶呤
- D. 滑膜切除术
- E. 双氯芬酸钠

65. 真题 2017-J087 引起系统性红斑狼疮发病和病情加重的直接诱因是()

- A. 气温急剧变化

- B. 长期在潮湿环境下
- C. 长时间在高温环境下
- D. 空气污染严重
- E. 阳光照射裸露皮肤

66. 真题 2019-Z005 患者，女，26岁。患系统性红斑狼疮3年，未婚。面部有较严重的蝶形红斑，怕见人，且有不规则发热。患者首要的护理诊断是()

- A. 体温过高
- B. 绝望
- C. 焦虑
- D. 皮肤完整性受损
- E. 思维过程改变

67. 真题 2019-X025 类风湿关节炎最常累及的关节是()

- A. 肩关节
- B. 肘关节
- C. 髋关节
- D. 膝关节
- E. 四肢小关节

68. 真题 2019-J086 系统性红斑狼疮最常受损的部位是()

- A. 大脑
- B. 心脏
- C. 肾脏
- D. 脾脏
- E. 肺脏

69. 真题 2019-J048 类风湿关节引起自身免疫反应的因子是()

- A. 自身抗体 IgM
- B. 外源性抗体
- C. 自身抗体 IgA
- D. 胶原蛋白
- E. II型胶原抗体

70. 真题 2019-J002 系统性红斑狼疮的发病机制是()

- A. 药物过敏
- B. 劳累过度
- C. 烟酒过多
- D. 烈日暴晒
- E. 自身免疫

71. 真题 2019-Z012 患者，男，42岁。患类风湿关节炎20年，目前仍有不规则低热，关节肿痛及晨僵，其护理措施不包括()

- A. 高蛋白、高维生素饮食
- B. 舒适体位，卧床休息
- C. 保持病变关节功能位
- D. 长期服用强的松
- E. 病变关节理疗

九.理化因素所致疾病病人的护理

1. 模拟题 胆碱酯酶复能剂解除有机磷农药毒性的机制是()

- A. 拮抗烟碱样作用
- B. 拮抗毒蕈样作用
- C. 增加血氧饱和度
- D. 减轻中枢神经系统症状
- E. 抑制体温调节中枢

2. 模拟题 高热环境剧烈运动伴大量出汗时，饮用无盐饮料易导致()

- A. 热痉挛
- B. 热衰竭
- C. 日射病
- D. 中毒先兆
- E. 热射病

3. 模拟题 患者，男，50岁。在家用煤气加热器淋浴时出现头晕、头痛、乏力、胸闷、心悸、恶心等症状。对其进行抢救的首要措施是()

- A. 立即将患者搬到室外空气新鲜处
- B. 吸氧
- C. 给予止痛药
- D. 保持呼吸道通畅
- E. 松解衣服

4. 模拟题 患者，男，60岁。突然发生昏迷。体检：呼吸困难、脉率快、瞳孔缩小、流涎、呕吐。为尽快明确昏迷原因，首选的检查是()

- A. 脑电图
- B. 脑部CT
- C. 脑血管造影
- D. 脑部MRI
- E. 呕吐物鉴定

5. 模拟题 有机磷中毒蕈碱样症状严重者可出现()

- A. 肌纤维颤动
- B. 共济失调
- C. 肺水肿
- D. 呼吸肌麻痹
- E. 抽搐和昏迷

6. 模拟题 有机磷农药中毒原理是()

- A. 抑制呼吸中枢
- B. 使胆碱酯酶活性增加
- C. 直接作用于中枢神经
- D. 使乙酰胆碱在体内蓄积
- E. 直接作用于心肌引起循环衰竭

7. 模拟题 治疗有机磷农药中毒时使用阿托品静脉给药，“阿托品化”的指征是()

- A. 瞳孔缩小
- B. 心率减慢

- C. 口干
- D. 皮肤潮湿
- E. 肺部湿啰音明显

8. 模拟题 双侧瞳孔缩小见于()

- A. 脑疝
- B. 颅内压增高
- C. 乐果中毒
- D. 阿托品中毒
- E. 硬脑膜下血肿

9. 模拟题 有机磷农药职业性中毒的原因多为()

- A. 误服
- B. 误用
- C. 违反操作规定
- D. 生产设备密闭
- E. 防护完善

10. 真题 2017-X009 现场抢救一氧化碳中毒者首选措施是()

- A. 给予吸氧
- B. 将其转移到空气新鲜处
- C. 使其卧平
- D. 给予脱水治疗
- E. 打开其气道

11. 模拟题 有机磷农药中毒后出现毒蕈碱样症状的原因是()

- A. 交感神经兴奋
- B. 乙酰胆碱持续存在
- C. 锥体束受损
- D. 脊髓前角炎
- E. 农药直接作用

12. 模拟题 有机磷中毒患者迟发性神经损害的主要临床表现是()

- A. 下肢瘫痪
- B. 去大脑皮质状态
- C. 下肢感觉异常
- D. 癫痫
- E. 周围神经病变

13. 模拟题 热射病“三联症”是指()

- A. 高热、无汗、意识障碍
- B. 高热、烦躁、嗜睡
- C. 高热、灼热、无汗
- D. 高热、疲乏、眩晕
- E. 高热、多汗、心动过速

14. 模拟题 中暑高热患者的病室应保持在()

- A. 18~20℃
- B. 20~22℃
- C. 22~24℃
- D. 20~25℃
- E. 18~22℃

15. 模拟题 急性一氧化碳中毒潜在的并发症是()

- A. 迟发性脑病
- B. 水电解质紊乱
- C. 肺水肿
- D. 昏迷
- E. 脑水肿

16. 模拟题 患者,男,29岁。因服毒昏迷不醒,被送入急诊室抢救。其家属不能准确地说出毒物的名称及性质,患者双侧瞳孔缩小。正确的处理是()

- A. 请家属立即查清毒物名称后洗胃
- B. 抽出胃内容物送检,再用温水洗胃
- C. 用生理盐水清洁灌肠,减少毒物吸收
- D. 鼻饲牛奶或蛋清水,以保护胃黏膜
- E. 禁忌洗胃,待清醒后用催吐法排出毒物

17. 模拟题 患者,男,29岁。因服毒昏迷不醒,被送入急诊室抢救。其家属不能准确地说出毒物的名称及性质,患者双侧瞳孔缩小。根据患者瞳孔变化初步判断引起患者中毒的毒物可能是()

- A. 碱性物中毒
- B. 酸性物中毒
- C. 有机磷、吗啡类中毒
- D. 颠茄类中毒
- E. 酒精中毒

18. 模拟题 患者,女,47岁。用煤炉做饭后,感觉剧烈头痛、头晕、乏力伴恶心、呕吐,想卧床休息。家属发现患者躺卧地上,呼之不醒,立即到急诊。查体:生命体征正常,浅昏迷状态,双侧瞳孔等大,对光反射存在,口唇皮肤黏膜呈樱桃红色,双肺未闻及湿啰音,应诊断为()

- A. 氰化物中毒
- B. 二氧化碳中毒
- C. 一氧化碳中毒
- D. 硫化氢中毒
- E. 苯酚中毒

19. 模拟题 患者,男,35岁。高温工作4小时。因出汗较多,口渴,饮水3大杯。30分钟后自感乏力、腿痛,不能走路,并有腹痛。最可能出现的情况是()

- A. 中暑先兆
- B. 热射病
- C. 高热衰竭
- D. 中暑痉挛
- E. 中暑衰竭

20. 真题 2018-X018 阿托品对有机磷农药中毒引起的症状没有疗效的是()

- A. 平滑肌痉挛
- B. 多汗,流涎
- C. 肌纤维颤动
- D. 瞳孔缩小
- E. 肺部湿啰音

21. 真题 2016-Z100 属于日射病的临床表现是()

- A. 面色苍白、大汗、四肢湿冷
- B. 头部温度高, 体温基本正常
- C. 面色潮红、多汗、口唇呈樱桃红色
- D. 早期多汗, 体温可达 40℃ 以上, 继而无汗干热
- E. 皮肤苍白、出冷汗、血压下降、体温基本正常

22. 真题 2016-Z099 属于热射病的临床表现是()

- A. 面色苍白、大汗、四肢湿冷
- B. 头部温度高, 体温基本正常
- C. 面色潮红、多汗、口唇呈樱桃红色
- D. 早期多汗, 体温可达 40℃ 以上, 继而无汗干热
- E. 皮肤苍白、出冷汗、血压下降、体温基本正常

23. 真题 2014-J090 有机磷农药中毒的机制是()

- A. 胆碱酯酶活性受抑制
- B. 碳氧血红蛋白在体内蓄积
- C. 高铁血红蛋白在体内蓄积
- D. 交感神经过度兴奋
- E. 迷走神经过度兴奋

24. 真题 2018-X021 患者女, 28 岁。因一氧化碳中毒送入院, 护士观察病情时, 应特别警惕的并发症是()

- A. 肺水肿
- B. 脑水肿
- C. 水电解质紊乱
- D. 迟发性脑病
- E. 昏迷

25. 真题 2014-J089 CO 中毒的机制是()

- A. 胆碱酯酶活性受抑制
- B. 碳氧血红蛋白在体内蓄积
- C. 高铁血红蛋白在体内蓄积
- D. 交感神经过度兴奋
- E. 迷走神经过度兴奋

26. 真题 2013-J004 一氧化碳(CO)中毒的主要机制是()

- A. CO 破坏红细胞膜
- B. CO 与血红蛋白结合形成不能携带氧气的 COHb
- C. CO 破坏血红蛋白结构
- D. CO 引起血液凝固性发生改变
- E. CO 对脑细胞造成不可逆损伤

27. 真题 2011-Z019 一氧化碳中毒患者皮肤最常见的颜色是()

- A. 深红色
- B. 青紫色
- C. 苍白色
- D. 深黄色
- E. 樱桃红色

28. 真题 2011-Z001 有机磷农药中毒时, 出现烟碱样症状的表现是()

- A. 头晕
- B. 多汗
- C. 腹痛
- D. 瞳孔缩小
- E. 肌纤维颤动

29. 真题 2018-Z026 患者误服有机磷农药约 100ml, 不久出现昏迷, 双瞳缩小, 呼吸困难, 满肺湿啰音。原因是()

- A. 动眼神经兴奋
- B. 急性肺炎
- C. 急性气管炎
- D. 迷走神经持久兴奋
- E. 急性胃炎

30. 真题 2010-J008 一氧化碳(CO)中毒的主要机制是()

- A. CO 破坏红细胞膜
- B. CO 与血红蛋白结合形成不能携带氧气的 COHb
- C. CO 破坏血红蛋白结构
- D. CO 引起血液凝同性发生改变
- E. CO 对脑细胞造成不可逆损伤

31. 真题 2010-J059 中暑发生的原因不包括()

- A. 环境温度超过 35℃
- B. 湿度小于 60%
- C. 通风不良
- D. 强辐射热
- E. 大量出汗

32. 真题 2011-J095 一氧化碳中毒最先受损的部位是()

- A. 大脑
- B. 心脏
- C. 肾脏
- D. 脾脏
- E. 肺脏

33. 真题 2011-J072 患者, 女, 40 岁。与家人争执后服敌敌畏 100ml, 出现呼吸困难, 瞳孔缩小, 视力模糊, 肌肉颤动。其发病机制是()

- A. 促使乙酰胆碱失活
- B. 肾上腺素过多
- C. 促使胆碱酯酶失活
- D. 去甲肾上腺素过多
- E. 谷丙转氨酶过多

34. 真题 2010-Z055 患者, 男, 48 岁。误服敌敌畏约 100ml, 出现呼吸困难、面肌细颤的原因是()

- A. 肾上腺素过多
- B. 胆碱酯酶活性降低
- C. 胰淀粉酶不足
- D. 乙酰胆碱活性降低
- E. 去甲肾上腺素过多

35. 真题 2017-X030 有机磷农药中毒的诊断不包括()

- A. 特殊大蒜气味
- B. 典型症状与体征
- C. 胃肠道钡餐检查
- D. 有机磷农药接触史
- E. 全血胆碱酯酶活力测定

36. 真题 2010-Z052 患者, 男, 38 岁。因长时间在高温环境中工作, 出现胸闷、口渴、面色苍白、出冷汗, 体温 37.5℃, 血压 11.4/6.6kPA (86/50mmHg), 护理措施错误的是()

- A. 将患者移至阴凉处
- B. 患者取平卧位
- C. 建立静脉通路
- D. 头及四肢冰敷
- E. 口服清凉饮料

37. 真题 2014-X064 患者, 男, 54 岁。因与家人争吵后自杀, 后被家人发现立即送入院检查, 查体: 流涎、肌肉震颤, 瞳孔缩小, 浓烈的大蒜气味。全身胆碱酯酶活力测定为 42%, 诊断是()

- A. 一氧化碳中毒
- B. 安眠药中毒
- C. 有机磷农药中毒
- D. 酒精中毒
- E. 氰化物中毒

38. 真题 2015-Z067 患者, 男, 49 岁, 农民。中午在烈日下劳动, 3 小时后恶心、头晕、头痛, 面色苍白, 大汗, 脉速、呼吸浅快, 意识不清, 血压 79/49mmHg。应考虑的是()

- A. 中毒
- B. 热衰竭
- C. 热痉挛
- D. 热射病
- E. 日射病

39. 真题 2016-X080 患者女, 28 岁。因一氧化碳中毒送入院, 护士观察病情时, 应特别警惕的并发症是()

- A. 水电解质紊乱
- B. 迟发性脑病
- C. 昏迷
- D. 脑水肿
- E. 肺水肿

40. 真题 2016-Z098 属于 CO 中毒的临床表现是()

- A. 面色苍白、大汗、四肢湿冷
- B. 头部温度高, 体温基本正常
- C. 面色潮红、多汗、口唇呈樱桃红色
- D. 早期多汗, 体温可达 40℃ 以上, 继而无汗干热
- E. 皮肤苍白、出冷汗、血压下降、体温基本正常

41. 真题 2015-Z039 急性一氧化碳中毒患者苏醒后, 应继续观察的时间是()

- A. 24 小时

- B. 1 周
- C. 2 周
- D. 1 个月
- E. 2 个月

42. 真题 2015-Z028 重度一氧化碳中毒时, 患者全血的碳氧血红蛋白浓度是()

- A. >10%
- B. >20%
- C. >30%
- D. >40%
- E. >50%

43. 真题 2015-Z012 有机磷农药中毒时瞳孔缩小是由于()

- A. 交感神经兴奋
- B. 毒蕈碱样作用
- C. 迷走神经抑制
- D. 烟碱样作用
- E. 甲状腺素过多

44. 真题 2015-J085 一氧化碳中毒最先受损的部位是()

- A. 大脑
- B. 肝脏
- C. 肾脏
- D. 脾脏
- E. 肺脏

45. 真题 2015-X046 对有机磷农药中毒有诊断价值的检查是()

- A. 碳氧血红蛋白测定
- B. 碱性磷酸酶测定
- C. 氧合血红蛋白测定
- D. 胆碱酯酶活力测定
- E. 血淀粉酶测定

46. 真题 2016-Z003 引起中毒的化学物质的是()

- A. 有机溶剂
- B. 农药
- C. 毒药
- D. 毒物
- E. 毒素

47. 真题 2017-Z043 敌敌畏中毒的临床表现特点是()

- A. 瞳孔缩小, 肺水肿
- B. 瞳孔正常, 肺水肿
- C. 瞳孔放大, 肺水肿
- D. 血压下降, 流涎
- E. 四肢抽搐

48. 真题 2018-J055 有机磷农药中毒时机体受抑制的酶是()

- A. 过氧化物酶
- B. 胆碱酯酶

- C. 细胞色素氧化酶
- D. 单胺氧化酶
- E. 黄嘌呤氧化酶

49. 真题 2018-Z078 中暑热衰竭的主要表现为()

- A. 腓肠肌痉挛, 体温多正常
- B. 头痛、头晕、口渴、皮肤苍白、血压下降, 体温基本正常
- C. 头晕、眼花、耳鸣, 头部温度高, 体温多不升高
- D. 早期头痛、头昏、全身乏力、多汗, 继而体温迅速升高, 可达 40℃
- E. 头痛、头晕、发热

50. 真题 2018-Z079 中暑热痉挛的主要表现为()

- A. 腓肠肌痉挛, 体温多正常
- B. 头痛、头晕、口渴、皮肤苍白、血压下降, 体温基本正常
- C. 头晕、眼花、耳鸣, 头部温度高, 体温多不升高
- D. 早期头痛、头昏、全身乏力、多汗, 继而体温迅速升高, 可达 40℃
- E. 头痛、头晕、发热

51. 真题 2018-Z080 中暑热射病的主要表现为()

- A. 腓肠肌痉挛, 体温多正常
- B. 头痛、头晕、口渴、皮肤苍白、血压下降, 体温基本正常
- C. 头晕、眼花、耳鸣, 头部温度高, 体温多不升高
- D. 早期头痛、头昏、全身乏力、多汗, 继而体温迅速升高, 可达 40℃
- E. 头痛、头晕、发热

52. 真题 2017-J088 一氧化碳中毒最好的氧疗措施是()

- A. 低流量持续吸氧
- B. 高流量间歇吸氧
- C. 湿化瓶内加酒精
- D. 静脉注射双氧水
- E. 高压氧

53. 真题 2017-J090 CO 中毒的机制是()

- A. 胆碱酯酶活性受抑制
- B. 碳氧血红蛋白体内蓄积
- C. 高铁血红蛋白体内蓄积
- D. 交感神经过度兴奋
- E. 迷走神经过度兴奋

54. 真题 2017-J091 有机磷农药中毒的机制是()

- A. 胆碱酯酶活性受抑制
- B. 碳氧血红蛋白体内蓄积
- C. 高铁血红蛋白体内蓄积
- D. 交感神经过度兴奋
- E. 迷走神经过度兴奋

55. 真题 2019-X039 对有机磷农药中毒有诊断价值的检查是()

- A. 碳氧血红蛋白测定
- B. 碱性磷酸酶测定
- C. 氧合血红蛋白测定
- D. 胆碱酯酶活力测定
- E. 血淀粉酶测定

56. 真题 2019-J085 一氧化碳中毒最先受损的部位是()

- A. 大脑
- B. 心脏
- C. 肾脏
- D. 脾脏
- E. 肺脏

57. 真题 2019-X056 现场抢救一氧化碳中毒者的首选措施是()

- A. 给予吸氧
- B. 将其转移到空气新鲜处
- C. 使其平卧
- D. 给予脱水治疗
- E. 开放气道

十. 神经系统疾病病人的护理

1. 模拟题 患者, 男, 患进行性肌营养不良 3 年, 走路左右摇摆, 该患者的步态是()

- A. 醉酒步态
- B. 蹒跚步态
- C. 共济失调步态
- D. 剪刀步态
- E. 间歇性跛行

2. 模拟题 蛛网膜下隙出血最常见的病因是()

- A. 抗凝治疗的并发症
- B. 脑动脉炎
- C. 高血压动脉硬化
- D. 脑血管畸形
- E. 先天性脑动脉瘤破裂

3. 模拟题 患者, 男, 23 岁。觉得大街上人们都在注意他的行动, 对他有敌意, 房子里有人安装了摄像头, 监视他的行动, 有时自言自语、傻笑, 不吃家人做的饭, 害怕饭里有毒, 要自己亲自做饭, 对家人和朋友漠不关心, 父亲病重住院, 患者无动于衷。该患者情感属于()

- A. 欣快
- B. 情感淡漠
- C. 情感高涨
- D. 情感低落
- E. 情感暴发

4. 模拟题 患者, 男, 23 岁。觉得大街上人们都在注意他的行动, 对他有敌意, 房子里有人安装了摄像头, 监视他的行动, 有时自言自语、傻笑, 不吃家人做的饭, 害怕饭里有毒, 要自己亲自做饭, 对家人和朋友漠不关心, 父亲病重住院, 患者无动于衷。该患者思维属于()

- A. 关系妄想
- B. 夸大妄想
- C. 被害妄想
- D. 罪恶妄想
- E. 物理妄想

5. 真题 2018-J005 脑出血最常见的原因是()

- A. 肺心病
- B. 高血压
- C. 心肌炎
- D. 风心病
- E. 冠心病

6. 模拟题 下列不属于吉兰-巴雷综合征处理措施的是()

- A. 应用有效的抗生素
- B. 补充维生素 B1
- C. 静脉注射大剂量免疫球蛋白
- D. 应用肾上腺皮质激素
- E. 补充维生素 B12

7. 模拟 防止吉兰-巴雷综合征患者因呼吸肌麻痹而死亡的有力措施为()

- A. 应用激素
- B. 血浆置换
- C. 应用人工呼吸器
- D. 预防并发症
- E. 治疗各种感染

8. 真题 2017-Z006 癫痫病人可进行的日常活动项目是()

- A. 游泳
- B. 打太极拳
- C. 开汽车
- D. 单独外出
- E. 登高

9. 模拟 偏瘫的病变部位在()

- A. 大脑皮层
- B. 内囊
- C. 脊髓腰段
- D. 脑干
- E. 脊髓前角

10. 模拟 交叉瘫的病变部位在()

- A. 大脑皮层
- B. 内囊
- C. 脊髓腰段
- D. 脑干
- E. 脊髓前角

11. 真题 2018-Z009 癫痫大发作的临床表现特征是()

- A. 局部肌肉节律性抽搐
- B. 吸吮、咀嚼、流涎
- C. 突发突止的意识障碍

- D. 意识丧失、全身抽搐
- E. 无理吵闹、唱歌、脱衣

12. 真题 2013-X015 脑血栓形成的“超早期”治疗时间一般是指发病后的()

- A. 1 小时内
- B. 3 小时内
- C. 6 小时内
- D. 12 小时内
- E. 24 小时内

13. 模拟题 患者,男,23岁。觉得大街上人们都在注意他的行动,对他有敌意,房子里有人安装了摄像头,监视他的行动,有时自言自语、傻笑,不吃家人做的饭,害怕饭里有毒,要自己亲自做饭,对家人和朋友漠不关心,父亲病重住院,患者无动于衷。该患者可能患有()

- A. 癔症
- B. 抑郁症
- C. 焦虑症
- D. 精神分裂症
- E. 阿尔茨海默病

14. 模拟题 患者,男,56岁。晨起时觉上、下肢麻木,但可自行去厕所,回卧室时因左下肢无力而跌倒。护理体检:神志清,左侧上、下肢瘫痪,口眼不歪斜。应首先考虑()

- A. 内囊出血
- B. 脑栓塞
- C. 脑血栓形成
- D. 蛛网膜下隙出血
- E. 脑外伤

15. 真题 2017-X012 可能与原发性癫痫有关的是()

- A. 遗传
- B. 外伤
- C. 脑部肿瘤
- D. 脑血管病
- E. 尿毒症

16. 模拟题 下列关于面神经炎的叙述正确的是()

- A. 本病女性多见于男性
- B. 多为慢性发病
- C. 主要表现为一侧面部表情肌瘫痪
- D. 急性期可进行面肌的主动和被动训练
- E. 本病好发于秋季

17. 模拟题 癫痫发作时不伴有的意识障碍类型是()

- A. 单纯失神发作
- B. 强直阵挛性发作
- C. 简单的部分发作
- D. 复杂的部分发作
- E. 精神运动性兴奋

18. 真题 2013-Z038 Horner (霍纳) 综合征的表现不

包括()

- A. 患侧瞳孔缩小
- B. 患侧上睑下垂
- C. 患侧眼球内陷
- D. 患侧面部无汗
- E. 对侧上肢麻木

19. 模拟题 患者,女,28岁。每次过马路遇到红灯时总有冲动朝疾驰的车跑去,虽然没有这么做过,但这种冲动不断出现,患者非常不安。护士评估时考虑为()

- A. 强迫意向
- B. 强迫性穷思竭虑
- C. 强迫回忆
- D. 强迫思想
- E. 强迫怀疑

20. 模拟题 巴宾斯基征阳性见于()

- A. 锥体束损害
- B. 周围神经损伤
- C. 脑膜炎
- D. 蛛网膜下隙出血
- E. 甲状腺功能亢进

21. 模拟题 治疗三叉神经痛的关键是迅速有效地止痛,临床上常选用的方法有()

- A. 局部涂药
- B. 介入治疗
- C. 针灸
- D. 药物治疗
- E. 理疗

22. 模拟题 患者,男,20岁。确诊为急性脱髓鞘性多发性神经病,其脑脊液检查的特征表现是()

- A. 细胞数增高,糖增加
- B. 蛋白增高,细胞数正常
- C. 蛋白降低,细胞数增高
- D. 细胞数增高,糖正常
- E. 细胞数减少,细菌培养阴性

23. 模拟题 脑缺血患者使用钙拮抗药的目的应除外()

- A. 防止脑血管痉挛
- B. 抑制血小板聚集
- C. 防止心律失常
- D. 阻断自由基危害
- E. 减少钙离子流入脑细胞

24. 模拟题 与阿尔茨海默病发病关系密切的是()

- A. 胆碱能系统功能亢进
- B. 胆碱能系统功能受损
- C. 5-HT系统功能亢进
- D. 5-HT系统功能受损
- E. 黑质纹状功能受损

25. 模拟题 短暂性脑缺血发作(TIA)出现相应的症状及体征,完全恢复最长应在()

- A. 24小时内
- B. 12小时内
- C. 6小时内
- D. 48小时内
- E. 72小时内

26. 模拟题 下列病症中属于吉兰-巴雷综合征患者危及生命的合并症是()

- A. 瘧症发作
- B. 脑神经损伤
- C. 呼吸性酸中毒
- D. 呼吸肌麻痹
- E. 压疮

27. 模拟题 患者,女,56岁。晚餐后洗衣时突然出现剧烈头痛,恶心、喷射状呕吐,被家人送到医院。急行CT检查,大脑外侧裂池呈高密度影。查体:脑膜刺激征阳性,无肢体瘫痪。既往体健。本病最常见的病因为()

- A. 先天性脑动脉瘤
- B. 高血压
- C. 血小板减少
- D. 凝血机制障碍
- E. 血脂过高

28. 模拟题 患者,女,56岁。晚餐后洗衣时突然出现剧烈头痛,恶心、喷射状呕吐,被家人送到医院。急行CT检查,大脑外侧裂池呈高密度影。查体:脑膜刺激征阳性,无肢体瘫痪。既往体健。该病的诊断是()

- A. 脑膜炎
- B. 脑血栓
- C. 脑梗死
- D. 蛛网膜下隙出血
- E. 短暂性脑缺血发作

29. 模拟题 患者,女。在场突然倒地,随后出现四肢痉挛性抽搐,牙关紧闭,疑为癫痫发作急诊。以下哪种检查对帮助诊断最有意义()

- A. 头部CT
- B. 脑血管造影
- C. 脑电图
- D. 脑磁共振
- E. 脑多普勒彩色超声

30. 模拟题 脑桥出血的主要特点为()

- A. 突然意识丧失
- B. 呼吸变深而有鼾声
- C. 脉搏慢而充实
- D. 患侧瞳孔缩小呈针尖样
- E. 以上都不是

31. 真题 2018-Z028 患者女,70岁,有高血压病史25年。突然出现剧烈头痛伴左侧上下肢瘫痪。诊断为“脑出血”。此时正确的护理措施是()

- A. 12小时后给予鼻饲流质
- B. 去枕平卧位

- C. 48 小时内避免搬动
D. 补充血容量
E. 头部热敷
32. 模拟题 癫痫持续状态的药物治疗首选()
A. 双嘧达莫
B. 苯妥英钠
C. 地西洋
D. 水合氯醛
E. 异戊巴比妥钠
33. 模拟题 脑出血患者急性期一般采取何种卧位()
A. 平卧位
B. 侧卧位
C. 头低脚高位
D. 床头抬高 40°
E. 床头抬高 15° ~30°
34. 模拟题 易导致吉兰-巴雷综合征患者死亡的原因是()
A. 呼吸麻痹
B. 脑疝
C. 意识障碍
D. 疼痛
E. 躯体移动障碍
35. 模拟题 血栓形成患者多在睡眠或安静休息时发病是因为()
A. 睡眠时头位过低淤血
B. 血压降低脑缺血
C. 心排出减少脑缺血
D. 四肢静脉血栓堵塞脑血管
E. 血流变慢形成血栓
36. 真题 2013-J041 脑出血最常见的部位是()
A. 脑桥
B. 脑干
C. 大脑半球
D. 内囊
E. 小脑
37. 真题 2013-Z001 正常人瞳孔直径为()
A. 1-2mm
B. 2-3mm
C. 2-5mm
D. 4-5mm
E. 5mm 以上
38. 真题 2011-X033 急性感染性多发性神经根神经炎患者脑脊液的典型改变是()
A. 压力增高
B. 均匀血性
C. 氯化物减少
D. 糖明显增多
E. 蛋白-细胞分离
39. 真题 2011-Z057 患者,女,70 岁。有高血压病史 25 年,突然出现剧烈头痛伴左侧上下肢瘫痪,诊断为“脑出血”。此时正确的护理措施是()
A. 头部热敷
B. 补充血容量
C. 发病 48 小时内避免搬动
D. 12 小时后给予鼻饲饮食
E. 去枕平卧位
40. 真题 2013-J039 属于癫痫发作持续状态的是()
A. 一侧肢体有节律性地抽搐
B. 尖叫一声后意识丧失
C. 在两次服药期间发作
D. 强直阵挛发作,间歇期患者仍意识障碍
E. 连续发作
41. 真题 2013-X001 巴宾斯基征阳性的表现是()
A. 腹壁肌立即收缩
B. 股四头肌收缩,小腿伸展
C. 患者仰卧位,一侧髋关节屈成直角,小腿抬高,膝关节伸达 135° 以内出现抵抗或疼痛
D. 足部拇趾背伸,其余四趾呈扇形展开
E. 患者俯卧位,下肢自然伸直,托起患者头部前屈时,患者两下肢发生不自主的屈曲
42. 真题 2013-Z029 急性感染性多发性神经炎首发症状多数为()
A. 大、小便失禁
B. 双侧下肢无力
C. 一侧肢体感觉障碍
D. 一侧肢体抽搐
E. 复视
43. 真题 2014-J029 关于癫痫发病特点的叙述,不正确的是()
A. 具有突发性和重复性的特点
B. 癫痫持续状态是该病的特殊情况死亡率 50%
C. 是一组由于大脑神经元突然异常放电而造成短暂性大脑功能失常的临床综合征
D. 本脑功能失常可表现为运动、感觉、意识、行为、自主神经等不同障碍
E. 发病机制牵涉到神经系统的内在性质,迄今无全面、一致的了解
44. 真题 2014-X007 诊断急性脑血管病(除蛛网膜下隙出血)首选的检查项目是()
A. 脑脊液检查
B. CT
C. MRI
D. 电生理检查
E. 脑电图
45. 真题 2014-X032 内囊病变引起的瘫痪表现为()
A. 单瘫

- B. 偏瘫
- C. 截瘫
- D. 四肢瘫
- E. 交叉瘫

46. 真题 2011-J028 与原发性癫痫的发生有关的因素是()

- A. 脑膜炎
- B. 脑肿瘤
- C. 脑血管病
- D. 颅脑外伤
- E. 遗传因素

47. 真题 2011-J019 脑出血最常见的部位是()

- A. 脑桥
- B. 脑干
- C. 大脑半球
- D. 内囊
- E. 小脑

48. 真题 2014-J004 脑出血最常见的病因是()

- A. 肺心病
- B. 高血压
- C. 心肌炎
- D. 风心病
- E. 冠心病

49. 真题 2017-J043 患者,男,16岁,在上课时突然意识丧失,全身抽搐,面色发绀,口吐白沫,小便失禁,5~6分钟后意识逐渐清醒,该患者可能是()

- A. 癔症
- B. 低钙抽搐
- C. 癫痫
- D. 低血糖昏迷
- E. 舞蹈病

50. 真题 2010-X049 内囊病变引起的瘫痪表现为()

- A. 单瘫
- B. 偏瘫
- C. 截瘫
- D. 四肢瘫
- E. 交叉瘫

51. 真题 2010-X097 为明确癫痫诊断应做的检查是()

- A. 脑电图
- B. CT 或 MRI
- C. B 超
- D. 脑脊液检查
- E. 免疫学检查

52. 真题 2010-X098 为明确癫痫病因应做的检查是()

- A. 脑电图
- B. CT 或 MRI
- C. B 超
- D. 脑脊液检查

E. 免疫学检查

53. 真题 2010-Z003 癫痫持续状态是指()

- A. 连续的失神发作
- B. 连续大发作,意识持续丧失
- C. 单侧肢体频繁抽搐
- D. 单侧肢体连续发生触电感
- E. 长期用药但经常发作

54. 真题 2011-S064 患者,男,18岁。因癫痫发作突然跌倒。此时急救的首要步骤是()

- A. 口对口人工呼吸
- B. 胸外心脏按压
- C. 氧气吸入
- D. 应用简易呼吸机
- E. 清除呼吸道分泌物

55. 真题 2014-Z053 癫痫大发作时,错误的护理措施是()

- A. 使患者躺下,侧卧位
- B. 松解领扣、腰带
- C. 不可喂水
- D. 牙垫塞入上、下门齿之间
- E. 不能强力按压肢体

56. 真题 2015-X056 脑脊液检查出现蛋白-细胞分离现象的疾病是()

- A. 脑性瘫痪
- B. 化脓性脑膜炎
- C. 结核性脑膜炎
- D. 病毒性脑膜炎
- E. 吉兰-巴雷综合征

57. 真题 2016-Z058 患儿男,9岁。智力低下,既往有“癫痫”病史。发作时出现强烈的点头、屈体样动作,持续此姿势 5-8 秒,常摔伤头部,伴颜面青紫、瞳孔散大。该患儿的发作类型是()

- A. 肌阵挛发作
- B. 强直性发作
- C. 复杂部分性发作
- D. 全面性强直-阵挛发作
- E. 发作性睡病

58. 模拟 脑出血最常见的出血血管是()

- A. 小脑的齿状核动脉
- B. 基底动脉的旁正中动脉
- C. 大脑中动脉的豆纹动脉
- D. 脉络膜前动脉
- E. 前交通动脉

59. 模拟题 吉兰-巴雷综合征常见的病因为()

- A. 病毒感染史
- B. 神经损伤史
- C. 受凉
- D. 链球菌感染

E. 缺氧

60. 模拟题 患者,男,84岁。丧偶2年。自妻子病故后,情绪低落,记忆力明显减退,经常忘记进食或物品放置处,外出找不到回家的路。考虑患者最可能发生的情况是()

- A. 老年精神病
- B. 抑郁症
- C. 大脑慢性缺血改变
- D. 早期阿尔茨海默病
- E. 脑肿瘤

61. 模拟题 蛛网膜下隙出血患者脑脊液检查为()

- A. 脑脊液检查为血性,颅内压高
- B. 脑脊液颜色检查正常
- C. 脑脊液检查有蛋白-细胞分离现象
- D. 脑脊液检查为血性,颅内压正常
- E. 脑脊液检查颜色正常,颅内压高

62. 模拟题 出血性脑梗死患者脑脊液检查为()

- A. 脑脊液检查为血性,颅内压高
- B. 脑脊液颜色检查正常
- C. 脑脊液检查有蛋白-细胞分离现象
- D. 脑脊液检查为血性,颅内压正常
- E. 脑脊液检查颜色正常,颅内压高

63. 真题 2016-Z038 桥脑出血,瞳孔表现为()

- A. 一侧瞳孔散大
- B. 一侧瞳孔缩小
- C. 针尖样瞳孔
- D. 双侧瞳孔对光反应消失
- E. 双侧瞳孔散大固定

64. 真题 2016-X093 为明确癫痫病因应做的检查是()

- A. 脑电图
- B. CT和MRI
- C. B超
- D. 脑脊液检查
- E. 免疫学检查

65. 真题 2015-J017 癫痫大发作时护理措施错误的是()

- A. 扶持患者卧倒
- B. 解开患者衣领、衣扣和腰带
- C. 在患者上下臼齿间放压舌板
- D. 将患者的头部侧向一边
- E. 按压抽搐肢体

66. 真题 2017-J059 脑出血最常见的部位是()

- A. 脑桥
- B. 脑干
- C. 大脑半球
- D. 内囊
- E. 小脑

67. 真题 2015-J041 脑出血最常见的部位是()

- A. 脑桥
- B. 脑干
- C. 大脑半球
- D. 内囊
- E. 小脑

68. 真题 2015-Z001 癫痫患者可进行的日常活动项目是()

- A. 游泳
- B. 太极拳
- C. 开汽车
- D. 单独外出
- E. 登高

69. 真题 2018-J062 控制癫痫持续状态最佳是()

- A. 肌内注射
- B. 舌下含化
- C. 静脉注射
- D. 皮下注射
- E. 口服

70. 真题 2015-Z004 癫痫大发作的临床表现特征是()

- A. 局部肌肉节律性抽搐
- B. 吸吮、咀嚼、流涎
- C. 突发突止的意识障碍
- D. 意识丧失、全身抽搐
- E. 无力吵闹、唱歌、脱衣

71. 真题 2016-J013 短暂性脑缺血发作的主要病因是()

- A. 动脉硬化
- B. 结节性动脉炎
- C. 先天性血管畸形
- D. 风湿性心脏瓣膜病
- E. 持久发作心房颤动

72. 真题 2016-J045 与原发癫痫的发生有关的因素是()

- A. 脑膜炎
- B. 脑肿瘤
- C. 脑血管病
- D. 颅脑外伤
- E. 遗传因素

73. 真题 2016-X031 急性感染性多发性神经根神经炎患者脑脊液的典型改变是()

- A. 压力增高
- B. 均匀血性
- C. 氯化物减少
- D. 糖明显增多
- E. 蛋白细胞分离

74. 真题 2016-X092 为明确癫痫诊断应做的检查是()

- A. 脑电图
- B. CT 和 MRI
- C. B 超
- D. 脑脊液检查
- E. 免疫学检查

75. 真题 2018-X078 急性感染性多发性神经根神经炎患者脑脊液的典型改变是()

- A. 氯化物减少
- B. 蛋白细胞分离
- C. 均匀血性
- D. 压力增高
- E. 糖明显增多

76. 真题 2017-X085 吉兰-巴雷综合征典型的脑脊液改变为()

- A. 血性脑脊液
- B. 蛋白-细胞分离现象
- C. 蛋白含量与细胞数均增高
- D. 浑浊呈毛玻璃状
- E. 淋巴细胞明显增多

77. 真题 2017-S086 患者, 女, 57 岁, 脑出血后一个月, 患者眼睑不能闭合, 尿失禁, 留置有尿管, 每日给予鼻饲、翻身按摩等护理。对患者眼睛最好的保护措施是()

- A. 滴眼药水
- B. 热敷眼睑
- C. 湿纱布覆盖
- D. 按揉到闭合
- E. 盖凡士林纱布

78. 真题 2017-S087 患者, 女, 57 岁, 脑出血后一个月, 患者眼睑不能闭合, 尿失禁, 留置有尿管, 每日给予鼻饲、翻身按摩等护理。对留置的尿管应特别注意做到()

- A. 保持尿管通畅
- B. 定时膀胱冲洗
- C. 据情况更换尿袋
- D. 及时倾倒集尿袋
- E. 定期做尿常规检查

79. 真题 2019-X052 被动体位见于以下哪类病人()

- A. 哮喘
- B. 瘫痪
- C. 肺气肿
- D. 下肢水肿
- E. 肺淤血

80. 真题 2019-X022 癫痫患者强直阵挛性发作时, 不妥的护理措施是()

- A. 将患者就地平卧, 松开领口和裤袋, 用软物垫在患者头下
- B. 移走身边危险物

C. 纱布包裹压舌板放于患者上、下白齿之间, 防止舌咬伤

- D. 肢体抽搐时用力按压
- E. 密切观察病情, 及时执行医嘱给予药物治疗

81. 真题 2019-J060 引起脑出血的最常见原因是()

- A. 高血压
- B. 脑动脉硬化
- C. 颈动脉硬化
- D. 脑动脉瘤
- E. 脑血管畸形

82. 真题 2019-J051 癫痫持续状态是指()

- A. 连续的失神发作
- B. 连续大发作, 意识持续丧失
- C. 单侧肢体频繁抽搐
- D. 单侧肢体连续发生触电感
- E. 长期用药但经常发作

83. 真题 2019-J025 短暂性脑缺血发作的主要病因是()

- A. 动脉硬化
- B. 结节性动脉炎
- C. 先天性血管畸形
- D. 风湿性心脏瓣膜病
- E. 持久发作心房颤动

84. 真题 2019-Z044 癫痫患者脑电图检查前患者准备不包括()

- A. 洗头
- B. 必要时剥夺睡眠
- C. 健康指导
- D. 停用抗癫痫药物
- E. 正常进食