

全国初级护师考试

# 初级护师考试 章节真题及精解

第四篇 妇产科护理学

## 一.女性生殖系统解剖与生理

1. 真题 2010-J005 排卵多发生在下次月经来临前( )

- A. 8 日左右
- B. 11 日左右
- C. 14 日左右
- D. 17 日左右
- E. 20 日左右

2. 真题 2016-J061 关于月经周期调节激素的周期性变化,说法不正确的是( )

- A. FSH 在月经来潮前达到最低水平
- B. LH 在月经来潮前达到最低水平
- C. LH 在排卵 24 小时前达到高峰
- D. 雌激素在月经来潮前达到高峰
- E. 孕激素在月经来潮前降至最低水平

3. 模拟题 保持子宫呈前倾位置的韧带是( )

- A. 前韧带
- B. 副韧带
- C. 圆韧带
- D. 主韧带
- E. 骨盆漏斗韧带

4. 模拟题 月经周期为 32 天的妇女,其排卵日应在来月经后的( )

- A. 第 10 天
- B. 第 12 天
- C. 第 15 天
- D. 第 18 天
- E. 第 21 天

5. 模拟题 不属于胎盘分泌的激素是( )

- A. 雌激素
- B. 雄激素
- C. 孕激素
- D. 绒毛膜促性腺激素
- E. 胎盘生乳素

6. 模拟题 雌激素的生理功能是( )

- A. 使子宫肌肉松弛
- B. 使子宫内膜由增生期变为分泌期
- C. 降低子宫对催产素的敏感性
- D. 使排卵后体温升高
- E. 使阴道上皮增生、角化、成熟

7. 模拟题 骨盆外测量时髂嵴间径正常值为( )

- A. 19~22cm
- B. 20~23cm
- C. 23~26cm
- D. 25~28cm
- E. 26~29cm

8. 模拟题 子宫峡部的下端是( )

- A. 解剖学外口

B. 解剖学内口

C. 组织学外口

D. 组织学内口

E. 子宫颈外口

9. 真题 2016-J041 不属于女性外生殖器的是( )

- A. 阴阜
- B. 阴蒂
- C. 阴道
- D. 小阴唇
- E. 前庭大腺

10. 真题 2015-J088 50 岁女性属于( )

- A. 儿童期
- B. 青春期
- C. 性成熟期
- D. 绝经过渡期
- E. 老年期

11. 真题 2015-J087 36 岁女性属于( )

- A. 儿童期
- B. 青春期
- C. 性成熟期
- D. 绝经过渡期
- E. 老年期

12. 真题 2010-J036 卵子从卵巢排出后,正常受精部位在( )

- A. 输卵管峡部
- B. 输卵管壶腹部与峡部的连接处
- C. 输卵管伞部
- D. 输卵管间质部
- E. 子宫腔

13. 真题 2011-J040 正常骨盆入口平面前后径平均值是( )

- A. 10cm
- B. 11cm
- C. 12cm
- D. 13cm
- E. 13.5cm

14. 真题 2011-J054 有关孕激素的作用,下列叙述正确的是( )

- A. 促进子宫发育
- B. 促使乳腺管增生
- C. 使宫颈黏液变稀薄
- D. 促进阴道上皮角化
- E. 使子宫内膜转化为分泌期

15. 真题 2011-X089 测定有无排卵简单易行的方法是( )

- A. B 超检查
- B. 妊娠试验
- C. 黄体酮实验

- D. 基础体温测定
- E. 女性激素测定

16. 真题 2013-J023 女性受孕的最佳时间是排卵后( )

- A. 12 小时内
- B. 24 小时内
- C. 36 小时内
- D. 48 小时内
- E. 60 小时内

17. 真题 2013-J047 不属于女性外生殖器的是( )

- A. 阴阜
- B. 阴蒂
- C. 阴道
- D. 小阴唇
- E. 前庭大腺

18. 真题 2017-J017 以下胎盘功能, 与绒毛膜促性腺激素(HCG)相关的是( )

- A. 气体交换
- B. 营养物质供应
- C. 排出胎儿代谢产物
- D. 防御功能
- E. 合成功能

19. 真题 2014-J076 已婚女性, 月经规律, 月经周期第 26 天取子宫内膜检查所见: 腺体缩小, 内膜水肿消失, 螺旋小动脉痉挛性收缩, 有坏死, 内膜下血肿。该内膜为月经的( )

- A. 月经期
- B. 增生期
- C. 分泌早期
- D. 分泌期
- E. 月经前期

20. 模拟题 合成胎盘的组织包括( )

- A. 叶状绒毛膜+包蜕膜+真蜕膜
- B. 滑泽绒毛膜+底蜕膜+真蜕膜
- C. 滑泽绒毛膜+包蜕膜+羊膜
- D. 叶状绒毛膜+底蜕膜+羊膜
- E. 叶状绒毛膜+底蜕膜+真蜕膜

21. 真题 2017-J020 正常成人子宫解剖特点是( )

- A. 子宫长约 7~8cm, 宽 4~5cm, 厚 2~3cm
- B. 子宫位于盆腔中央, 坐骨棘以下
- C. 宫体宫颈比例为 1:2
- D. 子宫颈管成椭圆形
- E. 子宫下段下约 7cm

22. 真题 2010-J081 已婚女性, 月经规律, 月经周期第 26 天取子宫内膜检查所见: 腺体缩小, 内膜水肿消失, 螺旋小动脉痉挛性收缩, 有坏死, 内膜下血肿。该内膜为月经的( )

- A. 月经期
- B. 增生期

- C. 分泌早期
- D. 分泌期
- E. 月经前期

23. 真题 2018-J035 已婚女性, 月经规律, 月经周期第 26 天取子宫内膜检查所见: 腺体缩小, 内膜水肿消失, 螺旋小动脉痉挛性收缩, 有坏死, 内膜下血肿, 该内膜为月经的( )

- A. 分泌早期
- B. 月经前期
- C. 分泌期
- D. 增生期
- E. 月经期

24. 真题 2017-J037 使子宫内膜出现增生期变化的激素是( )

- A. 绒毛膜促性腺激素
- B. 雌激素
- C. 生乳素
- D. 孕激素
- E. 雄激素

25. 真题 2018-X049 阴道脱落细胞可来源的部位不包括( )

- A. 卵巢
- B. 盆腔
- C. 腹腔
- D. 输卵管
- E. 子宫腔

26. 真题 2019-Z035 坐骨结节间径的平均值为( )

- A. 9 厘米
- B. 9.3 厘米
- C. 9.5 厘米
- D. 10 厘米
- E. 11 厘米

27. 真题 2019-J079 50 岁女性属于( )

- A. 儿童期
- B. 青春期
- C. 性成熟期
- D. 围绝经期
- E. 老年期

28. 真题 2019-J078 36 岁女性属于( )

- A. 儿童期
- B. 青春期
- C. 性成熟期
- D. 围绝经期
- E. 老年期

## 二. 妊娠期妇女的护理

1. 模拟题 孕妇可感到胎动, B 超可辨男女的妊娠周数

- 是( )
- A. 孕 8 周末  
B. 孕 16 周末  
C. 孕 20 周末  
D. 孕 28 周末  
E. 孕 36 周末
2. 真题 2010-J054 孕妇血容量增加最高峰在( )
- A. 孕 20~22 周  
B. 孕 23~25 周  
C. 孕 26~28 周  
D. 孕 29~31 周  
E. 孕 32~34 周
3. 模拟题 衔接是指胎头( )
- A. 进入中骨盆  
B. 顶骨进入骨盆入口平面  
C. 双顶径进入骨盆入口平面  
D. 顶骨已出骨盆出口平面  
E. 双顶径达中骨盆平面
4. 模拟题 以下不适于妊娠 7 个月以上孕妇的活动是( )
- A. 擦浴  
B. 家务劳动  
C. 泡脚  
D. 淋浴  
E. 盆浴
5. 模拟题 孕妇, 28 岁。产科检查: 可听到胎心, 宫底在脐耻之间。估计该孕妇的孕周为( )
- A. 8 周末  
B. 12 周末  
C. 14 周末  
D. 16 周末  
E. 20 周末
6. 模拟题 妊娠期血液循环系统的生理改变是( )
- A. 血浆蛋白含量降低  
B. 红细胞沉降率减慢  
C. 红细胞总数减少  
D. 血液浓缩  
E. 处于低凝状态
7. 模拟题 胎儿形成的妊娠周数是( )
- A. 10 周  
B. 9 周  
C. 8 周  
D. 12 周  
E. 16 周
8. 真题 2016-Z041 末次月经为 2010 年 11 月 28 日, 推算预产期为( )
- A. 2011 年 8 月 5 号  
B. 2011 年 9 月 5 号  
C. 2011 年 8 月 21 号  
D. 2011 年 9 月 7 号  
E. 2011 年 8 月 13 号
9. 真题 2016-X009 自我监测胎儿安危最适宜的方法是( )
- A. 定期查尿妊娠试验  
B. 胎动计数  
C. 尿雌三醇测定  
D. 胎心电子监护  
E. 自测宫高和腹围
10. 真题 2016-J054 关于正常妊娠期妇女血液成分变化的叙述, 正确的是( )
- A. 血浆减少  
B. 白细胞减少  
C. 中性粒细胞减少  
D. 血沉加快  
E. 血小板减少
11. 真题 2015-J077 某孕妇, 28 岁, 孕 33 周。触诊胎头在腹部右侧, 胎臀在腹部左侧, 胎心在脐周听到。胎先露为( )
- A. 枕先露  
B. 肩先露  
C. 面先露  
D. 足先露  
E. 臀先露
12. 模拟题 胎盘形成的时间是在妊娠后( )
- A. 12 周末  
B. 14 周末  
C. 16 周末  
D. 18 周末  
E. 20 周末
13. 模拟题 患者, 女, 29 岁。平时月经不规律, 2~3 个月 1 次, 在停经 42 天查尿 HCG 阳性, 现停经 14 周, 宫底高度在耻骨上 3 横指, 多普勒未闻及胎心, 此时最适宜进行的检查项目是( )
- A. X 线拍片  
B. 检测尿 HCG  
C. B 超检查  
D. 胎儿监护  
E. 胎儿心电图
14. 真题 2017-X013 女性, 27 岁。已婚, 既往月经规律, 因月经过期 19 天而就诊, 要求明确是否怀孕, 对确诊帮助最大的检查是( )
- A. 超声多普勒  
B. 免疫法测定 HCG  
C. 测宫底高度  
D. 测孕激素  
E. 宫颈粘液涂片镜检

15. 模拟题 胎儿头为身体的一半, B超有心搏的妊娠周数是( )

- A. 孕 8 周末
- B. 孕 16 周末
- C. 孕 20 周末
- D. 孕 28 周末
- E. 孕 36 周末

16. 模拟题 初产妇, 孕 39 周。临产后 1 小时破膜, 应立即采取的措施是( )

- A. 保护会阴
- B. 静脉滴注抗生素
- C. 立即听胎心音
- D. 做好接产准备
- E. 鼓励产妇屏气用力

17. 模拟题 护士指导正常孕妇产前检查的时间正确的是( )

- A. 孕第 12 周进行全面产科检查
- B. 孕 12~20 周每 4 周检查一次
- C. 孕 21~28 周每 3 周检查一次
- D. 孕 29~36 周每 2 周检查一次
- E. 孕 35 周后入院待产

18. 模拟题 初产妇自觉胎动, 多数开始于( )

- A. 妊娠 12~14 周
- B. 妊娠 15~17 周
- C. 妊娠 18~20 周
- D. 妊娠 21~23 周
- E. 妊娠 24~26 周

19. 真题 2013-Z053 产妇, 27 岁。正常阴道分娩, 护士给护生讲解正常的脐带结构是( )

- A. 一条动脉, 一条静脉
- B. 一条动脉, 两条静脉
- C. 两条动脉, 一条静脉
- D. 静脉较粗壁厚
- E. 动脉较细壁薄

20. 模拟题 待产妇, 孕 37 周, 在腹部下方可触及圆而硬的胎头, 胎心在脐下左侧听到, 其胎方位是( )

- A. 枕左前位
- B. 枕右后位
- C. 骶左前位
- D. 骶右前位
- E. 肩左前位

21. 模拟题 患者, 20 岁。平时月经不规律, 摸到腹部包块而就诊, 查尿妊娠反应阳性, 可听到胎心, 宫底在脐耻之间, 估计孕周为( )

- A. 8 周末
- B. 12 周末
- C. 14 周末
- D. 16 周末

E. 20 周末

22. 模拟题 胎方位是指( )

- A. 最先进入骨盆入口的胎儿部分
- B. 胎儿先露部的指示点与母体骨盆的关系
- C. 胎儿纵轴与母体纵轴的关系
- D. 胎儿身体各部位的关系
- E. 胎儿面部与母体横轴的关系

23. 模拟题 子宫峡部随着妊娠的进展逐渐形成子宫下段长约( )

- A. 3~5cm
- B. 6~8cm
- C. 7~10cm
- D. 10~12cm
- E. 15~17cm

24. 真题 2015-J038 孕妇血容量增加的最高峰在( )

- A. 孕 20-22 周
- B. 孕 23-25 周
- C. 孕 26-28 周
- D. 孕 29-31 周
- E. 孕 32-34 周

25. 真题 2018-Z024 某孕妇, 末次月经的时间为 2018 年 2 月 6 日, 其预产期应该是( )

- A. 2018 年 12 月 1 日
- B. 2018 年 11 月 30 日
- C. 2018 年 11 月 13 日
- D. 2018 年 12 月 30 日
- E. 2018 年 12 月 6 日

26. 真题 2015-J034 正常脐带中应含有( )

- A. 1 条静脉, 2 条动脉
- B. 1 条静脉, 1 条动脉
- C. 2 条静脉, 1 条动脉
- D. 2 条静脉, 2 条动脉
- E. 2 条静脉, 3 条动脉

27. 真题 2011-Z022 关于妊娠期妇女的健康指导, 正确的是( )

- A. 妊娠初 3 个月及末 3 个月尿频不需处理
- B. 妊娠期如果出现便秘, 可随意使用缓泻剂
- C. 需要补充铁剂的孕妇, 应在餐前半小时服用
- D. 早孕反应明显的孕妇, 应经常保持空腹状态
- E. 妊娠期间白带增多, 孕妇应每日进行阴道冲洗

28. 真题 2017-Z026 为了改善子宫胎盘血循环, 孕妇卧床休息时一般采取的卧位为( )

- A. 平卧位
- B. 右侧卧位
- C. 左侧卧位
- D. 俯卧位
- E. 头高脚低位

29. 真题 2011-X088 诊断早期妊娠快速、准确的方法是( )

- A. B 超检查
- B. 妊娠试验
- C. 黄体酮实验
- D. 基础体温测定
- E. 女性激素测定

30. 真题 2011-J071 患者,女,28 岁。孕 33 周。触诊胎头在腹部右侧,胎臀在腹部左侧,胎心在脐周听到。则其胎先露为( )

- A. 枕先露
- B. 肩先露
- C. 面先露
- D. 足先露
- E. 臀先露

31. 真题 2011-J056 妊娠期母体生殖系统的生理变化是( )

- A. 外阴变薄,弹性增加
- B. 阴道皱襞减少
- C. 子宫颈分泌物减少
- D. 子宫体明显变软
- E. 足月时子宫容积可达 1000ml

32. 真题 2011-J004 妊娠出现最早、最主要的症状是( )

- A. 尿频
- B. 呕吐
- C. 停经
- D. 乳头刺痛
- E. 乳房轻度胀痛

33. 真题 2010-Z060 初孕妇,平素月经正常,末次月经为 2009 年 5 月 24 日,预产期是( )

- A. 2010 年 2 月 1 日
- B. 2010 年 2 月 3 日
- C. 2010 年 3 月 1 日
- D. 2010 年 3 月 3 日
- E. 2010 年 3 月 11 日

34. 真题 2010-X003 孕妇羊水生化测定,反映胎儿肺成熟度的指标是( )

- A. 肌酐测定
- B. 胆红素测定
- C. 乳酸脱氢酶测定
- D. 卵磷脂与鞘磷脂的比值
- E. 尿素氮测定

35. 真题 2010-J022 正常妊娠 13 周以后孕妇体重平均每周增加( )

- A. 250g
- B. 350g
- C. 450g
- D. 550g
- E. 650g

36. 真题 2013-J001 妊娠最早、最重要的症状是( )

- A. 尿频
- B. 呕吐
- C. 停经
- D. 乳头刺痛
- E. 乳房轻度胀痛

37. 真题 2013-J082 关于正常妊娠期妇女血液成分变化的叙述,正确是( )

- A. 血浆减少
- B. 白细胞减少
- C. 中性粒细胞减少
- D. 红细胞沉降率加快
- E. 血小板减少

38. 真题 2014-Z011 孕妇不需要立即就诊的症状是( )

- A. 寒战发热
- B. 阴道流血
- C. 腹部疼痛
- D. 胎动计数突然增加
- E. 头痛、眼花、胸闷

39. 真题 2014-X084 李某,34 岁。初产妇,第一次产前门诊,主诉自己平时月经规律,28 天 1 次,持续 4 天。现已停经 8 周,极度疲乏,乳房触痛明显。化验报告提示尿妊娠反应(+),此试验的目的是查体内的哪种激素( )

- A. 缩宫素
- B. 黄体酮
- C. 雌激素
- D. 绒毛膜促性腺激素
- E. 黄体生成素

40. 真题 2017-Z036 关于妊娠期妇女的健康指导,正确的是( )

- A. 妊娠初 3 个月及末 3 个月出现尿频不必处理
- B. 妊娠期如果出现便秘时,可随便使用轻泻剂
- C. 需要补充铁剂的孕妇,应在餐前半小时服用
- D. 早孕反应明显的孕妇,应经常保持空腹状态
- E. 妊娠期白带增多,孕妇应每日行阴道冲洗

41. 真题 2014-X083 李某,34 岁。初产妇,第一次产前门诊,主诉自己平时月经规律,28 天 1 次,持续 4 天。现已停经 8 周,极度疲乏,乳房触痛明显。除以上体征,护士应考虑到若该妇女怀孕,其另一个推想体征是( )

- A. 妊娠纹
- B. 胎动感
- C. 恶心
- D. 妊娠斑
- E. 晕厥

42. 真题 2014-J098 孕妇自觉胎动的时间最早在妊娠( )

- A. 8 周末
- B. 18 周末
- C. 20 周末
- D. 28 周末
- E. 36 周末

43. 真题 2014-J097 胚胎发育初具人形的时间是妊娠 ( )

- A. 8 周末
- B. 16 周末
- C. 20 周末
- D. 28 周末
- E. 36 周末

44. 真题 2014-J040 胎儿身体纵轴与母体身体纵轴平行者, 占妊娠足月分娩总数 ( )

- A. 0.25%
- B. 5%
- C. 95%
- D. 97.75%
- E. 99.75%

45. 真题 2013-Z054 提示妊娠最早的临床表现是 ( )

- A. 黑格征
- B. 子宫体变软
- C. 乳房出现蒙氏结节
- D. 停经
- E. 胎心音

46. 真题 2013-Z018 下述哪项胎心属于异常 ( )

- A. 100 次/分
- B. 120 次/分
- C. 130 次/分
- D. 140 次/分
- E. 160 次/分

47. 真题 2013-X040 B 超显像检查, 妊娠几周才可见到妊娠环 ( )

- A. 2 周
- B. 3 周
- C. 4 周
- D. 5 周
- E. 6 周

48. 模拟题 胎头最大的横径是 ( )

- A. 枕下前凶径
- B. 枕额径
- C. 枕颞径
- D. 双顶径
- E. 枕额周径

49. 真题 2013-X100 足月产 ( )

- A. 妊娠 28 周以前分娩
- B. 妊娠满 28 周不满 37 周分娩
- C. 妊娠满 37 周不满 40 周分娩

D. 妊娠满 37 周不满 42 周分娩

E. 妊娠 42 周以后分娩

50. 真题 2017-J069 妊娠期母体变化的描述, 错误的是 ( )

- A. 孕妇的夜尿量 < 日尿量
- B. 妊娠后期睡眠时稍垫高头部利于呼吸
- C. 妊娠末期挤压乳房溢出的稀薄黄色液体为初乳
- D. 孕 14 周起, 孕妇出现 Braxton Hicks 收缩
- E. 孕妇长时间仰卧可出现低血压综合征

51. 真题 2018-J095 胚胎发育初具人形的时间是 ( )

- A. 妊娠 8 周末
- B. 妊娠 16 周末
- C. 妊娠 20 周末
- D. 妊娠 28 周末
- E. 妊娠 36 周末

52. 真题 2018-J096 孕妇自觉胎动的时间最早在 ( )

- A. 妊娠 8 周末
- B. 妊娠 16 周末
- C. 妊娠 20 周末
- D. 妊娠 28 周末
- E. 妊娠 36 周末

53. 真题 2019-J026 组成胎盘的一条静脉和两条动脉是 ( )

- A. 一条脐静脉和一条脐动脉
- B. 一条脐静脉和两条脐动脉
- C. 一条股静脉和两条股动脉
- D. 一条上腔静脉和两条颈动脉
- E. 一条股静脉和两条脐动脉

54. 真题 2019-J011 怀孕后子宫大小由原来的 5ml, 增加到 ( )

- A. 2000ml
- B. 3000ml
- C. 3500ml
- D. 4000ml
- E. 5000ml

55. 真题 2019-J072 足月妊娠子宫容量增大至 ( )

- A. 2500ml
- B. 3000ml
- C. 3500ml
- D. 4000ml
- E. 5000ml

### 三. 分娩期妇女的护理

1. 真题 2011-X052 初产妇, 33 岁, 妊娠 39 周。不规律宫缩 3 小时。B 超检查: 胎头双顶径为 10cm, 该孕妇空腹血糖为 8.2mmol/L 该孕妇最适合的分娩方式是 ( )

- A. 剖宫产
- B. 自然分娩

- C. 胎头吸引
- D. 产钳助产
- E. 会阴侧切

2. 模拟题 枕颞径是( )

- A. 胎头俯屈后以此径通过产道
- B. 鼻根至枕骨隆突的距离, 胎头以此径衔接
- C. 胎头最大的横径
- D. 胎头最大的前后径
- E. 两顶骨间颅缝

3. 模拟题 初产妇, 29岁。孕36周, 现宫口开全近2小时, 胎头最低点在坐骨棘下3cm, 宫缩较前减弱, 胎膜已破, 胎心138次/分, 决定行会阴侧切术。其原因是( )

- A. 胎儿窘迫
- B. 第二产程延长
- C. 早产儿
- D. 头盆不称
- E. 预防感染

4. 模拟题 初产妇, 29岁。孕36周, 现宫口开全近2小时, 胎头最低点在坐骨棘下3cm, 宫缩较前减弱, 胎膜已破, 胎心138次/分, 决定行会阴侧切术。会阴切开的时机是( )

- A. 胎头拨露
- B. 胎头着冠
- C. 产妇屏气用力时
- D. 子宫收缩间歇期
- E. 胎肩娩出时

5. 模拟题 初孕妇, 26岁。妊娠40周, 阵发性腹痛4小时入院待产。检查: 有规律宫缩, 枕左前位, 胎心140次/分, 宫口开大2cm, 胎膜未破, 先露“0”。下列护理措施不恰当的是( )

- A. 入院沐浴更衣
- B. 适当下床活动
- C. 鼓励产妇少量多餐
- D. 鼓励产妇2~4小时排尿一次
- E. 指导产妇卧床休息, 抬高臀部

6. 模拟题 预示孕妇1-2天内即将分娩的可靠的分娩先兆是( )

- A. 见红
- B. 胎儿下降感
- C. 尿频
- D. 食欲好
- E. 宫缩

7. 模拟题 产妇进入第二产程的重要标志是( )

- A. 有排便感
- B. 规律性宫缩
- C. 胎膜破裂
- D. 胎先露下降
- E. 宫口开全

8. 模拟题 孕妇, 29岁。妊娠16周时发现胎儿臀位。护士告知开始干预的最佳时间是( )

- A. 孕20周
- B. 孕24周
- C. 孕28周
- D. 孕30周
- E. 孕36周

9. 模拟题 关于分娩期第一产程的护理, 下列说法错误的是( )

- A. 鼓励产妇少量多次进食
- B. 指导产妇每隔2~4小时自解小便一次
- C. 应监测T、P、R、BP, 10分钟一次
- D. 胎头未入盆, 宫缩不紧, 可在室内活动
- E. 做好心理护理

10. 模拟题 贯穿于分娩全过程的动作是( )

- A. 内旋转
- B. 衔接
- C. 下降
- D. 俯屈
- E. 外旋转

11. 模拟题 枕下前凶径是( )

- A. 胎头俯屈后以此径通过产道
- B. 鼻根至枕骨隆突的距离, 胎头以此径衔接
- C. 胎头最大的横径
- D. 胎头最大的前后径
- E. 两顶骨间颅缝

12. 模拟题 双顶径是( )

- A. 胎头俯屈后以此径通过产道
- B. 鼻根至枕骨隆突的距离, 胎头以此径衔接
- C. 胎头最大的横径
- D. 胎头最大的前后径
- E. 两顶骨间颅缝

13. 真题 2016-X100 第二产程指( )

- A. 从胎儿娩出到胎盘娩出
- B. 从宫颈口开全到胎儿娩出
- C. 从有规律性宫缩到宫口开全
- D. 从有规律性宫缩到胎儿娩出
- E. 从有规律性宫缩到胎儿胎盘娩出

14. 真题 2013-X041 孕38周, 初产妇。骨盆外测量正常, 胎头双顶径8.5cm, 规律宫缩4小时, 宫口开大1cm, 未破膜, 头先露, 此时较合适的处理是( )

- A. 抬高床尾
- B. 做肛门检查, 3小时一次
- C. 静脉滴注催产素
- D. 灌肠刺激宫缩
- E. 采取膀胱截石位

15. 真题 2013-Z055 初孕妇, 28岁。规律性子宫收缩10



小时，宫口开大 8cm，胎心 140 次/分，胎膜未破。首选的护理措施是( )

- A. 肥皂水灌肠
- B. 人工破膜
- C. 立即内诊检查
- D. 继续观察 4 小时
- E. 做剖宫产术前准备

16. 真题 2014-X017 产程划分中，宫颈扩张期是指( )

- A. 从规律宫缩开始至宫口全开
- B. 从规律宫缩至子宫颈扩张
- C. 从宫颈扩张 3cm 至宫口全开
- D. 从规律宫缩至胎儿娩出
- E. 从宫颈口全开至胎儿娩出

17. 真题 2014-Z081 产妇，32 岁。G1P0，孕 40 周，因临产由急诊收入产房，护士为其做产科检查，结果是宫缩规律，宫口开大 10cm，胎心 140 次/分。该产妇已进入第几产程( )

- A. 未进入产程
- B. 进入第一产程
- C. 进入第二产程
- D. 进入第三产程
- E. 进入第四产程

18. 真题 2014-Z082 产妇，32 岁。G1P0，孕 40 周，因临产由急诊收入产房，护士为其做产科检查，结果是宫缩规律，宫口开大 10cm，胎心 140 次/分。该产程护理措施正确的是( )

- A. 灌肠
- B. 导尿
- C. 协助产妇淋浴
- D. 协助产妇上产床做好接生准备
- E. 每 1 小时听胎心 1 次

19. 真题 2015-J093 能使枕额径变为枕下前凶径的动作是( )

- A. 衔接
- B. 下降
- C. 俯屈
- D. 内旋转
- E. 复位

20. 真题 2015-J094 使胎头的矢状缝和中骨盆及出口后径一致的动作是( )

- A. 衔接
- B. 下降
- C. 俯屈
- D. 内旋转
- E. 复位

21. 真题 2015-Z003 决定能否经阴道分娩的重要观察项目是( )

- A. 规律宫缩

B. 宫口扩张程度

C. 胎头下降程度

D. 胎心

E. 胎膜早破

22. 真题 2016-J016 临产后的主要产力是( )

- A. 腹肌收缩力
- B. 膈肌收缩力
- C. 肛提肌收缩力
- D. 子宫收缩力
- E. 阴道收缩力

23. 真题 2016-X099 第一产程指( )

- A. 从胎儿娩出到胎盘娩出
- B. 从宫颈口开全到胎儿娩出
- C. 从有规律性宫缩到宫口开全
- D. 从有规律性宫缩到胎儿娩出
- E. 从有规律性宫缩到胎儿胎盘娩出

24. 真题 2014-X045 枕左前位胎头入盆衔接时的径线是( )

- A. 枕下前凶径
- B. 枕额径
- C. 双颞径
- D. 双顶径
- E. 枕颈径

25. 真题 2018-Z025 某产妇，25 岁，自然分娩一活男婴，会阴左侧切开缝合，助产士应告知该产妇拆线前不能采取的体位是( )

- A. 半坐卧位
- B. 俯卧位
- C. 左侧卧位
- D. 右侧卧位
- E. 平卧位

26. 真题 2017-Z039 第一产程时，若要了解宫口开大情况，一般方法是( )

- A. 腹部检查
- B. 阴道检查
- C. 骨盆检查
- D. 胎心监护
- E. 双合诊

27. 真题 2018-Z042 产妇进入第二产程的标志是( )

- A. 产妇出现排尿困难
- B. 产妇产宫颈口开全
- C. 胎头部分露于阴道口
- D. 产妇有排便感
- E. 产妇屏气向下用力

28. 真题 2018-X076 临产诊断不包括( )

- A. 胎先露部下降
- B. 见红
- C. 进行性子宫颈管消失

- D. 宫颈口扩张
- E. 规律性子宫收缩

29. 真题 2017-X081 经产妇, 3 年前自然分娩一男婴, 体重 3700g, 无难产史, 现孕 40 周, 2 小时前开始规律宫缩, 检查: 宫缩持续 40~50 秒, 间歇期 2~3 分钟, 胎心率 130 次/分, 头先露, 宫口开 4cm, 此时最恰当的处理是( )

- A. 入待产室观察
- B. 温肥皂水灌肠
- C. 给予人工破膜
- D. 静脉滴注缩宫素
- E. 急送产房准备分娩

30. 真题 2019-Z039 关于产程分期的叙述, 正确的是( )

- A. 第一产程初产妇约为 11~12 小时
- B. 第一产程初产妇约需 8~10 小时
- C. 第二产程初产妇约需 2~3 小时
- D. 第二产程经产妇约需 1~2 小时
- E. 第三产程初产妇与经产妇均需 40 分钟

31. 真题 2019-X079 第二产程指( )

- A. 从胎儿娩出到胎盘娩出
- B. 从宫颈口开全到胎儿娩出
- C. 从有规律性宫缩到宫口开全
- D. 从有规律性宫缩到胎儿娩出
- E. 从有规律性宫缩到胎盘娩出

32. 真题 2019-X078 第一产程指( )

- A. 从胎儿娩出到胎盘娩出
- B. 从宫颈口开全到胎儿娩出
- C. 从有规律性宫缩到宫口开全
- D. 从有规律性宫缩到胎儿娩出
- E. 从有规律性宫缩到胎盘娩出

## 四.产褥期的妇女护理

1. 真题 2010-J012 关于母乳喂养的优点, 下列不正确的是( )

- A. 母乳中营养物质丰富, 且比例合适
- B. 喂哺简单, 不易污染
- C. 喂哺操作繁杂, 易污染
- D. 能增强婴儿免疫力
- E. 能增进母婴情感交流

2. 真题 2014-X046 胎盘附着面的子宫内膜完全修复需到产后( )

- A. 2 周
- B. 3 周
- C. 4 周
- D. 5 周
- E. 6 周

3. 真题 2016-Z056 女性, 30 岁。自然分娩一女婴, 产

后 2 日护士发现会阴侧切伤口红肿, 局部湿热敷宜选择的溶液是( )

- A. 75%酒精
- B. 5%碘伏
- C. 2%碘酊
- D. 50%硫酸镁
- E. 1:5000 高锰酸钾

4. 模拟题 临产后适时在宫缩时行肛诊检查, 其目的除外( )

- A. 了解宫颈软硬程度
- B. 了解宫口扩张程度
- C. 确定胎方位
- D. 确定胎头高度
- E. 了解宫缩力度

5. 模拟题 初产妇, 26 岁。顺利分娩后留产房观察, 观察的内容不包括( )

- A. 子宫收缩情况
- B. 阴道出血情况
- C. 血压和脉搏情况
- D. 膀胱是否充盈
- E. 乳汁分泌情况

6. 模拟题 关于产后落实避孕措施的时间是在产后( )

- A. 2 周
- B. 4 周
- C. 6 周
- D. 8 周
- E. 12 周

7. 模拟题 产后血性恶露排出的时间是( )

- A. 1~3 天
- B. 1~7 天
- C. 20 天
- D. 30 天
- E. 50 天

8. 模拟题 产褥期生理表现不正确的是( )

- A. 子宫产后 6 周恢复到正常未孕时大小
- B. 产后如不哺乳, 月经一般在 6~10 周恢复
- C. 平均在产后 4~6 个月恢复排卵
- D. 恶露有腥味, 无臭味
- E. 哺乳期无月经者, 无须避孕

9. 真题 2014-X035 产后乳汁分泌量主要取决于( )

- A. 乳房发育情况
- B. 产妇健康状况
- C. 产后营养状况
- D. 新生儿发育状况
- E. 新生儿的吸吮刺激

10. 真题 2013-Z056 对产妇正确的出院指导是( )

- A. 产后 64 天复查
- B. 坚持母乳喂养 42 天

- C. 哺乳期间无需避孕  
D. 新生儿生理性黄疸持续 1 周左右  
E. 性生活在产后 4 周恢复
11. 模拟题 下列哪项是正常产褥期的表现( )  
A. 产后 24 小时体温超过 38℃  
B. 产后第 1 天宫底达脐平  
C. 产后脉搏一般偏快  
D. 血容量于分娩后 3~4 周恢复至未孕状态  
E. 产后 2 周恶露开始转为浆液性
12. 真题 2010-J060 产褥期变化最大的器官是( )  
A. 乳房  
B. 外阴  
C. 阴道  
D. 子宫  
E. 输卵管
13. 真题 2011-Z007 造成乳头皲裂的主要原因是( )  
A. 婴儿含接姿势不良  
B. 分娩后开奶晚  
C. 未做到按需哺乳  
D. 乳头肿胀  
E. 乳头凹陷
14. 真题 2013-X095 除胎盘附着处外, 子宫腔表面内膜修复所需时间为( )  
A. 产后 10 天  
B. 产后 3 周  
C. 产后 3-4 周  
D. 产后 4-6 周  
E. 产后 6 周
15. 真题 2013-X096 正常产褥期的时间为( )  
A. 产后 10 天  
B. 产后 3 周  
C. 产后 3-4 周  
D. 产后 4-6 周  
E. 产后 6 周
16. 真题 2013-X097 产后子宫进入盆腔, 在腹部摸不到宫底的时间为( )  
A. 产后 10 天  
B. 产后 3 周  
C. 产后 3-4 周  
D. 产后 4-6 周  
E. 产后 6 周
17. 模拟题 某初产妇, 31 岁。顺利经阴道分娩, 产后 7 天, 正常的恶露为( )  
A. 血性恶露  
B. 浆液性恶露  
C. 黏液性恶露  
D. 白色恶露  
E. 无色恶露

18. 真题 2014-J041 妊娠期孕妇循环血量于孕 32-34 周显著增加, 其恢复至正常水平的时间是( )  
A. 孕 29-40 周  
B. 产后 1 周内  
C. 产后 2-6 周  
D. 产后 6-8 周  
E. 产后 8-10 周
19. 真题 2017-Z019 产妇临产后, 助产士应每 2~4 小时嘱其排尿一次, 其目的是避免( )  
A. 膀胱充盈影响宫口扩张  
B. 膀胱充盈影响宫缩  
C. 下降的胎头压迫膀胱  
D. 充盈的膀胱过早地引起屏气  
E. 过度充盈使膀胱受损
20. 真题 2017-Z020 未母乳喂养或未做到及时有效的母乳喂养的产妇, 通常可于产后 3~4d 因乳房血管、淋巴管极度充盈可有发热, 称为( )  
A. 产褥热  
B. 产后热  
C. 泌乳热  
D. 乳腺炎  
E. 产褥感染
21. 真题 2018-X059 关于产褥感染的处理原则, 错误的是( )  
A. 半卧位以利引流  
B. 改善全身一般情况  
C. 禁用肾上腺皮质激素, 以防炎症扩散  
D. 选用有效的抗生素  
E. 胎盘残留者, 应控制感染后清宫
22. 真题 2018-X066 产后督促产妇排尿的时间应为( )  
A. 产后 4~6 小时  
B. 产后 7~8 小时  
C. 产后 1~2 小时  
D. 产后 9~12 小时  
E. 产后 2~3 小时
23. 真题 2019-X007 某产妇, 28 岁, 分娩后第二天, 会阴侧切伤口水肿明显。正确的处理措施为( )  
A. 75%乙醇湿敷  
B. 95%乙醇湿敷  
C. 1%乳酸溶液坐浴  
D. 50%硫酸镁湿热敷  
E. 1:15000 高锰酸钾溶液坐浴

## 五.新生儿保健

1. 真题 2013-J020 新生儿保健重点是发生在出生后( )  
A. 1 周  
B. 2 周

- C. 3周
- D. 4周
- E. 5周

2. 模拟题 出生后能啼哭及吞咽但生命力弱的妊娠周数是( )

- A. 孕8周末
- B. 孕16周末
- C. 孕20周末
- D. 孕28周末
- E. 孕36周末

3. 真题 2010-Z020 足月新生儿出生后开始进行婴儿抚触的最适宜时间是( )

- A. 即刻
- B. 4小时后
- C. 12小时后
- D. 24小时后
- E. 72小时后

## 六. 胎儿宫内窘迫及新生儿窒息的护理

1. 真题 2010-X078 初产妇, 25岁。妊娠39周, 阴道流血1小时入院。产检: 无宫缩, 胎心170次/分, 宫口未开, 臀先露, 羊水Ⅱ度粪染。进一步的处理是( )

- A. 自然分娩
- B. 预防感染
- C. 产钳助产
- D. 立即剖宫产
- E. 静脉滴注缩宫素引产

2. 真题 2013-J038 胎儿窘迫的基本病理生理变化是( )

- A. 缺血缺氧引起的一系列变化
- B. 全身小动脉痉挛
- C. 底蜕膜出血
- D. 胎儿心血管系统功能障碍
- E. 脐带和胎盘异常

3. 真题 2014-X052 足月儿, 产钳助产娩出, 出生时全身皮肤苍白, 呼吸微弱, 心率30次/分, 肌张力松弛。生后首先应采取的措施是( )

- A. 面罩给氧
- B. 胸外心脏按压
- C. 清除口鼻腔分泌物
- D. 注射5%碳酸氢钠和呼吸兴奋剂
- E. 弹足底或刺激皮肤引起啼哭

4. 真题 2015-Z034 抢救新生儿窒息的首要护理措施是( )

- A. 拍打足底刺激呼吸
- B. 快速刺激背部皮肤
- C. 保证呼吸道通畅
- D. 面罩正压给氧
- E. 胸外心脏按压

5. 真题 2015-Z072 初产妇, 26岁。妊娠40周, 宫口开全, 胎先露达坐骨棘平面以下3cm, 胎心突然降至85次/分, 正确的做法是( )

- A. 左侧卧位
- B. 抑制宫缩
- C. 立即剖宫产
- D. 尽快经阴道助产
- E. 进行OCT试验

6. 真题 2016-Z070 初产妇, 孕1产0, 25岁。骨盆外测量正常, 临产10小时, 肛查: 宫口开大9cm, 胎先露S2+, 宫缩时出现胎心下降达100次/分, 宫缩后不能迅速恢复。处理正确的是( )

- A. 不予干涉, 等待自然分娩
- B. 催产素点滴加强宫缩
- C. 立即产钳助娩
- D. 立即剖宫产
- E. 给予温肥皂水灌肠, 刺激宫缩

7. 模拟题 急性胎儿窘迫最敏感的监测指标是( )

- A. 胎心率改变
- B. 胎动改变
- C. 羊水粪染
- D. 胎儿头皮血氧分压的改变
- E. 胎儿头皮血PH下降

8. 模拟题 胎儿宫内窘迫时, 孕妇一般采取的卧位是( )

- A. 平卧位
- B. 左侧卧位
- C. 右侧卧位
- D. 半坐卧位
- E. 膝胸卧位

9. 模拟题 胎儿窘迫时可采取的护理措施不包括( )

- A. 间断吸氧
- B. 给二联药物
- C. 静脉滴注缩宫素, 加速产程
- D. 胎心监护
- E. 取左侧卧位

10. 真题 2018-J047 胎儿窘迫的基本病理( )

- A. 底蜕膜出血
- B. 胎儿心血管系统功能障碍
- C. 脐带和胎盘异常
- D. 全身小动脉痉挛
- E. 缺血缺氧引起的一系列变化

11. 真题 2018-X025 足月儿, 产钳助产娩出, 出生时全身皮肤苍白, 呼吸微弱, 心率30次/分, 肌张力松弛。生后首先应采取的措施是( )

- A. 弹足底或刺激皮肤以引起啼哭

- B. 面罩给氧
- C. 清除口鼻腔分泌物
- D. 注射 5%碳酸氢钠和呼吸兴奋剂
- E. 胸外心脏按压

## 七.妊娠期并发症妇女的护理

1. 模拟题 妊娠高血压综合征时,硫酸镁治疗的主要药理作用是( )

- A. 降压
- B. 解痉
- C. 利尿
- D. 改善肾功能
- E. 消除水肿

2. 模拟题 关于输卵管妊娠,下列哪项是正确的( )

- A. 必须有停经主诉
- B. 妊娠试验阳性,可排除输卵管妊娠
- C. 后穹窿穿刺阴性,可排除输卵管妊娠
- D. 迟早一定发生大出血,均陷入休克
- E. 病程迁延较久者,可因血液凝固与周围器官粘连形成包块

3. 模拟题 异位妊娠的检查方法是( )

- A. 内窥镜检查术
- B. 生殖道细胞学检查
- C. 诊断性刮宫
- D. 输卵管通畅术
- E. 阴道后穹窿穿刺术

4. 真题 2016-X051 简单可靠的诊断异位妊娠破裂的方法是( )

- A. 查血 HCG
- B. 宫腔镜检查
- C. 腹腔镜检查
- D. 盆腔检查
- E. 阴道后穹窿穿刺

5. 模拟题 硫酸镁治疗妊娠期高血压疾病时最早出现的中毒反应是( )

- A. 呼吸 16 次/分
- B. 心率快
- C. 头昏、头痛、胸闷、嗜睡
- D. 尿量少于 25ml/h
- E. 膝腱反射减退甚至消失

6. 模拟题 患者,女,27岁。停经 40 天,轻度腰酸,右腹部疼痛,阴道少量出血,查子宫孕 40 天大小,宫口未开,宫体质软,尿妊娠试验(+),诊断最大可能为( )

- A. 宫外孕
- B. 先兆流产
- C. 葡萄胎
- D. 完全流产
- E. 过期流产

7. 模拟题 宫外孕内出血手术的患者最好输入( )

- A. 全血
- B. 血浆
- C. 自体血
- D. 新鲜全血
- E. 洗涤红细胞

8. 模拟题 妊娠期高血压综合征的治疗原则是( )

- A. 降压、解痉、镇静,合理扩容及利尿,适时终止妊娠
- B. 镇静、解痉、降压,合理扩容及利尿,适时终止妊娠
- C. 合理扩容及利尿,解痉、降压、镇静,适时终止妊娠
- D. 适时终止妊娠,解痉、降压、镇静,合理扩容及利尿
- E. 解痉、降压、镇静,合理扩容及利尿,适时终止妊娠

9. 真题 2013-X068 孕妇,停经 40 天,下腹部阵发性腹痛及阴道流血 1 天,量多伴有血块。妇科检查:子宫稍大,宫口有胚胎组织堵塞。最有效的紧急止血措施是( )

- A. 腹部压迫,排出胚胎组织
- B. 刮宫术
- C. 输血
- D. 注射止血药
- E. 纱布填塞阴道,压迫止血

10. 模拟题 患者,女,28岁。孕 35 周,阴道少量出血 4 小时,伴有剧烈腹痛。检查子宫硬如板状,压痛(+),胎心 112 次/分,胎位未触清。诊断可能性最大的是( )

- A. 前置胎盘
- B. 先兆早产
- C. 急产
- D. 子宫破裂
- E. 胎盘早剥

11. 模拟题 早期流产是指( )

- A. 发生于孕 12 周末以前
- B. 发生于妊娠 42 周及以后
- C. 发生于孕 12 周以后 28 周末以前
- D. 胎盘附着于子宫下段
- E. 发生于孕 28 周末以后 37 周以前

12. 模拟题 某孕妇,宫内孕 25 周。近几天腹部明显增大,腹胀痛,心悸气短。查:子宫大于妊娠月份,胎心不清,B 超检查,羊水量超过 2000ml。为减轻症状最佳的措施是( )

- A. 指导减肥
- B. 应用镇静剂
- C. 应用利尿剂
- D. 取半卧位减轻压迫症状
- E. 人工破膜引产

13. 模拟题 子痫患者护理措施中不正确的是( )

- A. 床边应加床档
- B. 动作要轻巧
- C. 保持呼吸道通畅
- D. 协助患者多翻身, 防止褥疮发生
- E. 平卧, 头偏向一侧

14. 模拟题 胎盘剥离的征象下列描述不正确的是( )

- A. 宫底上升
- B. 子宫呈葫芦形
- C. 外露脐带延长
- D. 阴道突然流血
- E. 用手在耻骨联合上方轻压子宫下段, 宫体上升而外露的脐带不再回缩

15. 模拟题 稽留流产是指( )

- A. 胚胎停止发育, 尚未自然排出
- B. 胚胎停止发育 2 周以上, 尚未自然排出
- C. 胚胎停止发育 4 周以上, 尚未自然排出
- D. 胚胎停止发育 8 周以上, 尚未自然排出
- E. 胚胎停止发育 10 周以上, 尚未自然排出者

16. 模拟题 怀孕满 28 周至不满 37 周生产者称为( )

- A. 早产
- B. 足月产
- C. 过月产
- D. 过期产
- E. 滞产

17. 模拟题 关于胎盘早剥正确的是( )

- A. 胎盘早剥多发生于妊娠 24 周后
- B. 前置胎盘在胎儿娩出后从子宫壁剥离
- C. 正常位胎盘在胎儿娩出前从子宫壁剥离
- D. 分娩期不会发生胎盘早剥
- E. 胎盘早剥对孕妇无影响

18. 模拟题 患者, 女, 29 岁。停经 40 天, 轻度腰酸, 右腹部疼痛, 阴道少量出血, 查子宫孕 40 天大小, 宫口未开, 宫体质软, 尿妊娠试验 (+)。诊断最大可能为( )

- A. 宫外孕
- B. 先兆流产
- C. 葡萄胎
- D. 完全流产
- E. 过期流产

19. 模拟题 患者, 女, 38 岁。妊娠 30 周, 自觉头痛、眼花 1 天, 检查发现: 血压 160/110mmHg, 胎心、胎位正常, 双下肢水肿, 尿蛋白 >0.5/24h。此患者的诊断是先兆子痫。针对首选的治疗药物, 哪项不是应注意观察的内容( )

- A. 血压
- B. 尿量
- C. 呼吸

D. 体温

E. 膝腱反射

20. 模拟题 患者, 女, 38 岁。妊娠 30 周, 自觉头痛、眼花 1 天, 检查发现: 血压 160/110mmHg, 胎心、胎位正常, 双下肢水肿, 尿蛋白 >0.5/24h。此患者的诊断是先兆子痫。首选的治疗药物是( )

- A. 卡托普利
- B. 硫酸镁
- C. 止痛片
- D. 呋塞米
- E. 地西洋

21. 模拟题 患者, 女, 38 岁。妊娠 30 周, 自觉头痛、眼花 1 天, 检查发现: 血压 160/110mmHg, 胎心、胎位正常, 双下肢水肿, 尿蛋白 >0.5/24h。此患者的诊断是先兆子痫。患者出现以上症状的原因是( )

- A. 水钠潴留
- B. 静脉淤血
- C. 全身小动脉痉挛
- D. 动脉硬化
- E. 心功能失代偿

22. 模拟题 异位妊娠破裂出血时, 最有利于诊断的检查是( )

- A. 输卵管畅通术
- B. 诊断性刮宫术
- C. 子宫颈活组织检查术
- D. 阴道后穹窿穿刺术
- E. 阴道及宫颈细胞学检查

23. 模拟题 过期妊娠是指( )

- A. 平时月经周期规律, 妊娠达到 38 周仍未临产
- B. 妊娠达到 39 周仍未临产
- C. 平时月经周期规律, 妊娠达 39 周仍未临产
- D. 平时月经周期规律, 妊娠达 42 周仍未临产
- E. 平时月经周期规律, 妊娠达 40 周仍未临产

24. 真题 2016-Z005 各种流产的临床特点, 正确的是( )

- A. 完全流产: 腹痛, 宫口松
- B. 先兆流产: 宫口未开, 阴道出血量少于月经量
- C. 难免流产: 阴道出血少, 为破水
- D. 不全流产: 宫口闭, 阴道出血减少
- E. 稽留流产: 胚胎或胎儿在宫中已死亡超过 10 周

25. 真题 2018-X026 输卵管妊娠辅助检查, 最简单常用的是( )

- A. CT
- B. B 超
- C. X 线
- D. 腹腔镜
- E. 宫腔镜

26. 真题 2013-J052 晚期流产是指流产发生于( )

- A. 妊娠 12 周至不足 14 周

- B. 妊娠 12 周至不足 24 周
- C. 妊娠 12 周至不足 27 周
- D. 妊娠 12 周至不足 28 周
- E. 妊娠 24 周至不足 32 周

27. 真题 2011-Z012 先兆流产最早出现的症状是( )

- A. 子宫停止增大
- B. 尿妊娠试验阴性
- C. 阵发性腹痛
- D. 少量阴道流血
- E. 子宫颈口扩张

28. 真题 2010-X066 患者, 女, 停经 9 周, 少量阴道流血 3 天, 无腹痛, 子宫符合孕周, 宫口未开。B 超检查: 宫内妊娠, 可见胎心搏动。入院后主要的治疗原则是( )

- A. 保胎治疗
- B. 尽快剖宫
- C. 止血补血
- D. 间断吸氧
- E. 预防感染

29. 真题 2011-X035 硫酸镁治疗妊娠高血压综合征剂量过大时, 最先出现的毒性反应是( )

- A. 头晕、血压过低
- B. 呼吸减慢
- C. 心率减慢
- D. 膝反射减弱或消失
- E. 尿量过少

30. 真题 2011-X006 治疗重度妊娠高血压综合征, 首选的药物是( )

- A. 硫酸镁
- B. 异丙嗪
- C. 氯丙嗪
- D. 苯巴比妥
- E. 异戊巴比妥

31. 真题 2011-J033 妊娠高血压综合征最基本的病理变化是( )

- A. 胎盘绒毛退行性变化
- B. 水钠潴留
- C. 全身小动脉痉挛
- D. 弥散性血管内凝血
- E. 肾小管重吸收功能降低

32. 真题 2011-J012 有关胎盘早剥的叙述, 正确的是( )

- A. 多发生于妊娠 28 周后
- B. 是指前置胎盘在胎儿娩出后从子宫壁剥离
- C. 是指正常位置胎盘在胎儿娩出前从子宫壁剥离
- D. 分娩期不易发生
- E. 对孕妇无影响

33. 真题 2017-X034 患者, 女, 停经 9 周, 少量阴道流血 3 天, 无腹痛, 子宫符合孕月, 宫口未开, B 超检

查: 宫内妊娠, 可见胎心搏动。入院后主要的治疗原则是( )

- A. 保胎治疗
- B. 尽快清宫
- C. 止血补血
- D. 间断吸氧
- E. 预防感染

34. 真题 2017-J034 初孕妇, 妊娠 28 周。近日自感头晕、头痛, 产检时发现血压 158/110mmHg, 尿蛋白(++), 水肿(++), 诊断为子痫前期重度。其基本的病理变化是( )

- A. 水肿
- B. 蛋白尿
- C. 高血压
- D. 全身小动脉痉挛
- E. 宫腔内张力过高

35. 真题 2010-Z058 初孕妇, 28 岁, 38 周。查体: 心率 96 次/分, 血压 160/102mmHg, 无自觉症状, 骨盆正常, 宫口未开。该孕妇的处理, 正确的是( )

- A. 使用硝普钠降压
- B. 立即进行剖宫产
- C. 静脉滴注催产素引产
- D. 使用硫酸镁降压
- E. 鼓励家属多探视

36. 真题 2010-Z050 患者停经 60 天, 少量阴道流血 2 天, 加重伴阵发性下腹疼痛 3 小时。妇科检查: 宫口开大 2cm, 胚胎组织堵塞于宫口, 子宫大小符合孕周。最可能的诊断是( )

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 完全流产
- D. 不全流产
- E. 过期流产

37. 真题 2010-X068 双胎妊娠在分娩期, 第一个胎儿娩出后, 由于子宫突然缩小, 容易发生( )

- A. 前置胎盘
- B. 胎盘早剥
- C. 胎膜早破
- D. 胎儿畸形
- E. 产程缩短

38. 真题 2010-X050 输卵管妊娠辅助检查, 最简单常用的是( )

- A. 腹腔镜
- B. 宫腔镜
- C. B 超
- D. CT
- E. X 线

39. 真题 2010-X040 患者, 女, 30 岁。已婚, 宫内节育器避孕 2 年, 现停经 48 天, 尿妊娠试验(+), 少量

阴道出血3天,突然右下腹剧烈撕裂样疼痛。检查:血压 11/5.3kPA (80/40mmHg),右下腹压痛,反跳痛明显。妇科检查:后穹隆饱满,宫颈举痛(+),双附件触诊不满意。最可能的诊断是( )

- A. 急性阑尾炎
- B. 黄体破裂
- C. 先兆流产
- D. 输卵管妊娠破裂
- E. 卵巢囊肿蒂扭转

40. 真题 2010-X029 胎盘早剥的治疗原则是( )

- A. 保胎至足月
- B. 催产素静脉滴注引产
- C. 及时停止妊娠
- D. 评估胎儿决定分娩方式
- E. 期待疗法

41. 真题 2010-X020 难免流产一旦确诊,应采取的正确措施是( )

- A. 卧床休息,减少刺激
- B. 应用危害小的镇静剂
- C. 清除宫腔残留组织
- D. 促使胚胎及胎盘组织完全排出
- E. 及时进行凝血功能检查

42. 真题 2010-J079 初产妇,妊娠28周。近日自感头晕、头痛,产检时发现血压 158/110mmHg,尿蛋白(++),水肿(++),诊断为子痫前期重度。该病基本的病理变化是( )

- A. 水肿
- B. 蛋白尿
- C. 高血压
- D. 全身小动脉痉挛
- E. 宫腔内张力过高

43. 真题 2013-X043 各种流产的临床特点,哪项是正确的( )

- A. 完全流产:腹痛,宫口松
- B. 先兆流产:宫口未开,阴道出血量少于月经量
- C. 难免流产:阴道出血少,未破水
- D. 不全流产:宫口闭,阴道出血减少
- E. 稽留流产:胚胎或胎儿在宫内已死亡超过10周

44. 真题 2013-X044 李女士停经44天,突然发生剧烈腹痛,伴恶心、呕吐、阴道有少量流血、有排便感。体检:血压 70/50mmHg,下腹压痛(+),宫颈举痛(+),下腹部有移动性浊音,最可能诊断为( )

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 急性阑尾炎
- D. 异位妊娠
- E. 不全流产

45. 真题 2016-X058 重型胎盘早剥,胎盘的剥离面积

为( )

- A. 超过胎盘面积的1/7
- B. 超过胎盘面积的1/6
- C. 超过胎盘面积的1/5
- D. 超过胎盘面积的1/4
- E. 超过胎盘面积的1/3

46. 真题 2015-Z066 某妊娠26周孕妇,因患妊娠期高血压疾病静脉滴注硫酸镁治疗。下列用药前检测的结果中,应停用药物的指征是( )

- A. 血压 150/90mmHg
- B. 呼吸 18次/分
- C. 尿量 20ml/h
- D. 膝反射亢进
- E. 自觉症状减轻

47. 真题 2015-Z060 初产妇,26岁。停经60天,少量阴道流血3天。检查:宫口未开,子宫孕60天大小,HCG(+).最可能的诊断是( )

- A. 先兆流产
- B. 不全流产
- C. 完全流产
- D. 稽留流产
- E. 习惯流产

48. 真题 2015-J071 初产妇,妊娠28周。近日自感头晕头痛,产检时发现血压 158/110mmHg,尿蛋白(++),水肿(++).诊断为子痫前期重度。其基本的病理变化是( )

- A. 水肿
- B. 蛋白尿
- C. 高血压
- D. 全身小动脉痉挛
- E. 宫腔内张力过高

49. 真题 2010-J007 异位妊娠发生的部位最常见于( )

- A. 宫颈
- B. 子宫残角
- C. 腹腔
- D. 卵巢
- E. 输卵管

50. 真题 2015-X084 患者,女,33岁。G1P0,孕38周。妊娠期高血压疾病,子痫前期。突感剧烈腹痛,伴阴道出血而就诊。查体:子宫孕足月大,质硬,压痛,胎心 110次/分。应考虑的诊断是( )

- A. 完全性前置胎盘
- B. 羊水过多
- C. 先兆早产
- D. 胎盘早剥
- E. 先兆子宫破裂

51. 真题 2015-X063 患者,女,G3P0,孕37周。阴道出血3天,无腹痛,出血量似月经量。为明确出血原因,入院后应立即行的检查是( )



- A. 肛门检查
- B. 阴道内诊检查
- C. B超检查
- D. 超声多普勒
- E. 基础体温测定

52. 真题 2014-X048 诊断前置胎盘最可靠而安全的方法是( )

- A. X线腹部平片
- B. 肛门检查
- C. B超检查
- D. 阴道内诊
- E. 听诊下腹部可闻及胎盘杂音

53. 真题 2014-X037 硫酸镁治疗妊娠高血压综合征, 用量过大时最先出现的毒性反应是( )

- A. 头晕、血压过低
- B. 呼吸减慢
- C. 心率减慢
- D. 膝反射减弱或消失
- E. 尿量过少

54. 真题 2014-J066 患者, 女, 32岁。妊娠33周, 突感有较多液体自阴道流出, 胎心70-80次/分, 阴道检查有索条状物脱出宫颈2cm。其胎心异常的最可能原因是( )

- A. 胎头受压
- B. 脐带打结
- C. 脐带脱垂
- D. 脐带先露
- E. 脐绕颈

55. 真题 2014-J055 早期流产最主要的原因是( )

- A. 染色体异常
- B. 内分泌失调
- C. 生殖器异常
- D. 外界不良因素
- E. 免疫因素

56. 真题 2013-Z058 患者急诊入院, 面色苍白, 急性失血性病容。查:BP80/50mmHg, 腹部有明显压痛及反跳痛, 叩诊有明显移动性浊音, 初步诊断为异位妊娠, 准备做剖腹探查, 根据患者情况, 术前护理不妥的是( )

- A. 立即将患者取半卧位
- B. 立即给氧吸入并保暖
- C. 迅速输液
- D. 做好输血准备
- E. 按急诊手术要求做好手术前准备

57. 真题 2013-X065 孕妇孕38周, 突感到剧烈腹痛伴有少量阴道流血。检查: 血压150/110mmHg, 子宫似足月妊娠大小, 硬如木板、有压痛, 胎位不清, 最大的可能是( )

- A. 早产
- B. 临产

- C. 前置胎盘
- D. 胎盘早期剥离
- E. 不完全性子宫破裂

58. 真题 2013-X064 控制子痫状态的首选药物是( )

- A. 冬眠I号
- B. 硫酸镁
- C. 肼酞嗪
- D. 20%甘露醇
- E. 氢氯噻嗪(双氢克尿噻)

59. 真题 2010-J076 患者, 女, 32岁。妊娠33周, 突感有较多液体自阴道流出, 胎心70-80次/分, 阴道检查有条索状物脱出宫颈2cm。其胎心异常的最可能原因为( )

- A. 胎头受压
- B. 脐带打结
- C. 脐带脱垂
- D. 脐带先露
- E. 脐带绕颈

60. 真题 2013-X098 早产( )

- A. 妊娠28周以前分娩
- B. 妊娠满28周不满37周分娩
- C. 妊娠满37周不满40周分娩
- D. 妊娠满37周不满42周分娩
- E. 妊娠42周以后分娩

61. 真题 2013-X099 过期产( )

- A. 妊娠28周以前分娩
- B. 妊娠满28周不满37周分娩
- C. 妊娠满37周不满40周分娩
- D. 妊娠满37周不满42周分娩
- E. 妊娠42周以后分娩

62. 真题 2018-Z065 协助诊断输卵管妊娠破裂内出血既简单又可靠的方法是( )

- A. 宫腔镜检查
- B. 尿妊娠试验
- C. 阴道B超检查
- D. 阴道后穹隆穿刺
- E. 腹腔镜检查

63. 真题 2018-Z066 关于流产的临床特点, 叙述正确的是( )

- A. 完全流产: 腹痛, 宫口松
- B. 稽留流产: 胚胎或胎儿在宫内已死亡超过10周
- C. 难免流产: 阴道出血少, 未破水
- D. 先兆流产: 宫口未开, 阴道出血量少于月经量
- E. 不全流产: 宫口闭, 阴道出血减少

64. 真题 2017-X080 患者女, 停经42天, 突发右下腹撕裂样疼痛1小时, 伴肛门坠胀感, BP80/40mmHg, 全腹压痛, 反跳痛。以右侧为著, 移动浊音阳性, 宫颈举

痛,后穹窿饱满触痛,子宫扪诊不满意,右附件区压痛明显,最简单可靠的诊断方法是( )

- A. 妊娠试验
- B. 阴道后穹窿穿刺
- C. B超检查
- D. 腹腔镜检查
- E. 诊断性刮宫

65. 真题 2019-Z017 羊水量过少是指妊娠足月时羊水量少于( )

- A. 100ml
- B. 300ml
- C. 500ml
- D. 700ml
- E. 900ml

66. 真题 2019-J003 患者,女,32岁。妊娠33周,突感有较多液体自阴道流出,胎心70~80次/分,阴道检查有条索状物脱出宫颈2cm。其胎心异常的最可能原因是( )

- A. 胎头受压
- B. 脐带打结
- C. 脐带脱垂
- D. 脐带先露
- E. 脐带绕颈

67. 真题 2019-J053 有关胎盘早剥的叙述,正确的是( )

- A. 对孕妇无影响
- B. 分娩期不易发生
- C. 是指正常位置胎盘在胎儿娩出前从子宫壁剥离
- D. 是指前置胎盘在胎儿娩出后从子宫壁剥离
- E. 多发生于妊娠28周后

68. 真题 2019-X026 双胎妊娠在分娩期,第一个胎儿娩出,由于子宫突然缩小,容易发生( )

- A. 前置胎盘
- B. 胎盘早剥
- C. 胎膜早破
- D. 胎儿畸形
- E. 产程缩短

69. 真题 2019-X074 输卵管妊娠突然破裂时,首先出现的症状是( )

- A. 板状腹
- B. 恶心、呕吐
- C. 肛门坠胀响
- D. 突然发生持续性腹痛
- E. 突感一侧下腹部撕裂样疼痛

70. 真题 2019-X075 胎盘早剥的主要症状是( )

- A. 板状腹
- B. 恶心、呕吐
- C. 肛门坠胀响
- D. 突然发生持续性腹痛
- E. 突感一侧下腹部撕裂样疼痛

71. 真题 2019-Z007 先兆流产最早出现的症状是( )

- A. 子宫颈口扩张
- B. 少量阴道流血
- C. 阵发性腹痛
- D. 尿妊娠试验阴性
- E. 子宫停止增大

72. 真题 2019-Z027 胎盘早剥不会引起的并发症是( )

- A. 早产
- B. 感染
- C. 胎儿宫内窘迫
- D. 脐带脱垂
- E. 泌尿系感染

## 八. 妊娠期合并症妇女的护理

1. 真题 2011-J027 下列关于糖尿病对孕妇的影响的叙述中不正确的是( )

- A. 受孕率相对高
- B. 流产率相对高
- C. 妊娠期高血压疾病发生率相对高
- D. 手术产率相对高
- E. 羊水过多发生率高

2. 模拟题 患者,女,24岁。因乏力、厌食、恶心、肝大、血清GPT升高就医,诊断为乙型肝炎,住院治疗。患者入院后请你代买洗漱用物,人民币消毒应用( )

- A. 过氧乙酸喷雾
- B. 84喷洒
- C. 甲醛熏蒸
- D. 消毒剂擦拭
- E. 紫外线照射

3. 真题 2016-Z069 患者女,27岁。心脏病病史8年,37周妊娠,剖宫产一活男婴。术后2小时,产妇心率126次/分,床上翻身即感胸闷、气短。护理措施中不正确的是( )

- A. 严密监测生命体征
- B. 限制静脉输液滴速
- C. 吸氧
- D. 无盐半流质饮食
- E. 及时回乳

4. 模拟题 妊娠合并肝炎的孕妇产后的正确处理为( )

- A. 用四环素预防感染
- B. 鼓励母乳喂养
- C. 注射维生素K预防出血
- D. 产妇分娩后回普通病房休息
- E. 产后早期下床活动

5. 模拟题 妊娠合并糖尿病筛查的时间是( )

- A. 妊娠12~14周
- B. 妊娠14~16周
- C. 妊娠16~18周

- D. 妊娠 18~20 周
- E. 妊娠 24~28 周

6. 模拟题 妊娠合并心脏病孕妇为防止产后出血禁用的止血药是( )

- A. 缩宫素
- B. 止血敏
- C. 维生素 K
- D. 麦角新碱
- E. 止血芳酸

7. 模拟题 以下四项中,妊娠合并糖尿病对胎儿的影响不正确的是( )

- A. 新生儿高血糖症
- B. 高胆红素血症
- C. 先天性畸形
- D. 巨大儿
- E. 低体重儿

8. 模拟题 孕妇患重症肝炎时威胁母婴生命的并发症是( )

- A. 妊娠高血压
- B. DIC
- C. 心律失常
- D. 心力衰竭
- E. 糖尿病

9. 真题 2016-X008 决定心脏病患者是否妊娠,最重要的依据是( )

- A. 生育史
- B. 家族史
- C. 心脏病的种类
- D. 心功能分级
- E. 治疗情况

10. 真题 2016-J042 心脏病孕妇最易发心衰的时期是分娩期、产后最初 3 天内和( )

- A. 妊娠 10~34 周
- B. 妊娠 20~32 周
- C. 妊娠 28~40 周
- D. 妊娠 32~34 周
- E. 妊娠 34~36 周

11. 真题 2013-Z089 孕妇王女士, 34 岁。初次怀孕, 孕 16 周发慌、气短, 经检查发现心功能属于 II 级。经过增加产前检查次数, 严密监测孕期经过等, 目前孕 37 周, 自然临产。该产妇的产褥期护理, 正确的是( )

- A. 为避免菌群失调, 不得使用抗生素治疗
- B. 产后的第 5 天, 最容易发生心力衰竭
- C. 为了早期母子感情的建立, 不要让别人帮忙
- D. 积极下床活动, 防止便秘
- E. 住院观察 2 周

12. 真题 2015-Z070 初产妇, 27 岁。36 周妊娠合并心脏病, 心功能 II 级。终止妊娠后, 不正确的护理措施是( )

- A. 回乳
- B. 半卧位
- C. 清淡饮食
- D. 给予镇静剂
- E. 监测生命体征

13. 真题 2011-X073 患者, 女, 30 岁。妊娠 35 周, 有心脏病史, 日常活动即感到胸闷、憋气。该孕妇的治疗措施不正确的是( )

- A. 严密监护
- B. 卧床休息
- C. 宜剖宫产结束妊娠
- D. 产后应用广谱抗生素两周
- E. 产后回乳

14. 真题 2011-Z072 风心病孕妇, 32 岁, 孕 37 周。因有规律宫缩入院。检查: 心率 90 次/分, 心功能 II 级。骨盆、胎位正常, 宫口开大 4cm, 先露部在坐骨棘下 1cm。对该孕妇的处理正确的是( )

- A. 立即进行剖宫产尽快终止妊娠
- B. 在第二产程鼓励产妇屏气用力
- C. 胎儿娩出后用麦角新碱防出血
- D. 在宫口开全之前可注射缩宫素
- E. 产褥期需使用抗生素预防感染

15. 真题 2013-J060 妊娠合并糖尿病产妇所生的新生儿应( )

- A. 按早产儿处理
- B. 尽早口服生理盐水
- C. 观察有无高血糖
- D. 控制饮人奶量
- E. 常规加压吸氧

16. 模拟题 对于妊娠合并心脏病患者, 下列不正确的处理措施是( )

- A. 不宜妊娠者应在 12 周前行人工流产
- B. 孕 20 周后控制食盐
- C. 避免过劳和情绪激动
- D. 心功能 I~II 级者, 应在妊娠 36~38 周入院待产
- E. 心功能 III 级或以上者, 应立即入院治疗

17. 真题 2017-Z017 孕妇 30 岁, 孕 1 产 0 孕 28 周, 诊断为妊娠合并缺铁性贫血, 下列补充铁剂的健康教育内容不正确的是( )

- A. 首选口服制剂
- B. 同时服用维生素 C
- C. 应饭后或餐中服用
- D. 轻度贫血不可下床活动
- E. 出现黑便无需就医

18. 真题 2013-X045 38 岁孕妇, 妊娠 11 周, 休息时仍胸闷、气急。查脉搏 120 次/分, 呼吸 22 次/分, 心界向左侧扩大, 心尖区有 II 级收缩期杂音, 性质粗糙, 肺底有湿性啰音, 处理应是( )

- A. 立即终止妊娠

- B. 控制心力衰竭后终止妊娠
- C. 加强产前监护
- D. 控制心力衰竭后继续妊娠
- E. 限制钠盐摄入

19. 真题 2013-Z087 孕妇王女士, 34 岁。初次怀孕, 孕 16 周发慌、气短, 经检查发现心功能属于 II 级。经过增加产前检查次数, 严密监测孕期经过等, 目前孕 37 周, 自然临产。该产妇在分娩期应注意的问题中, 描述错误的是( )

- A. 常规吸氧
- B. 胎盘娩出后腹部放置沙袋
- C. 采取产钳助产
- D. 注意补充营养
- E. 注意保暖

20. 真题 2013-Z088 孕妇王女士, 34 岁。初次怀孕, 孕 16 周发慌、气短, 经检查发现心功能属于 II 级。经过增加产前检查次数, 严密监测孕期经过等, 目前孕 37 周, 自然临产。该产妇的卧位最好是( )

- A. 平卧位
- B. 右侧卧位
- C. 左侧卧位
- D. 左侧半卧位
- E. 随意卧位

21. 真题 2014-X049 妊娠合并病毒性肝炎, 临近产期有出血倾向可用( )

- A. 缩宫素
- B. 维生素 K
- C. 维生素 C
- D. 卡巴克洛 (安络血)
- E. 维生素 D

22. 真题 2014-Z023 对妊娠合并糖尿病患者的正确护理措施是( )

- A. 指导产后退奶
- B. 指导孕妇限制运动
- C. 指导孕妇口服降糖药
- D. 指导孕妇掌握胰岛素用法
- E. 妊娠至 28 周协助终止妊娠

23. 真题 2014-Z058 妊娠合并心脏病, 产褥期的健康指导正确的是( )

- A. 产后 24 小时内应绝对卧床休息
- B. 产后 48 小时内仍可发生心力衰竭, 产妇应遵医嘱活动
- C. 心功能 II 级或以下可母乳喂养
- D. 需绝育者, 一般在产后 42 天左右施行输卵管结扎术
- E. 母乳喂养的产妇, 常规不服用抗生素

24. 真题 2013-Z059 某孕妇合并乙型病毒性肝炎, 为了防止发生产后出血, 下列护理措施错误的是( )

- A. 产前肌内注射维生素 K
- B. 产前备好抢救物品

- C. 产时缩短第二产程
- D. 产时密切观察, 避免滞产
- E. 胎儿娩出后尽量不使用缩宫素, 因为肝脏损害

25. 真题 2015-X071 某孕妇, 25 岁。G1P0, 早孕出现较重的呕吐。现孕 8 周, 皮肤黏膜苍白, 毛发干燥无光泽, 活动无力, 易头晕。实验室检查: 血红蛋白 70g/L, 血细胞比容 0.15, 血清铁 6.0 $\mu$ mol/L。下列孕期健康宣教内容, 错误的是( )

- A. 给予心理支持, 减少心理应激
- B. 重点评估胎儿宫内生长发育状况
- C. 如果服用铁剂时胃肠道反应较轻, 则不需同服维生素 C 及稀盐酸
- D. 重点监测胎心率变化
- E. 应列为高危妊娠, 加强母儿监护

26. 真题 2017-X024 妊娠合并病毒性肝炎的辅助检查不包括( )

- A. 肝功检查
- B. 肝炎病毒检测
- C. 凝血功能检查
- D. 胎盘功能
- E. 血 hCG 检查

27. 真题 2014-X005 决定心脏病患者是否妊娠, 最重要的是( )

- A. 生育史
- B. 家族史
- C. 心脏病的种类
- D. 心功能分级
- E. 治疗情况

28. 真题 2017-J032 初孕妇, 妊娠 24 周, 有先天性心脏病及心衰病史。该孕妇最易发生心衰的时期是( )

- A. 妊娠 24~25 周
- B. 妊娠 26~28 周
- C. 妊娠 32~34 周
- D. 妊娠 35~36 周
- E. 妊娠 37~38 周

29. 真题 2018-J042 心脏病孕妇最易发心衰的时期是分娩期、产后最初 3 天内和( )

- A. 妊娠 10~34 周
- B. 妊娠 20~32 周
- C. 妊娠 32~34 周
- D. 妊娠 34~36 周
- E. 妊娠 36~38 周

30. 真题 2018-X057 决定心脏病患者是否妊娠, 最重要的依据是( )

- A. 家族史
- B. 心脏病的种类

- C. 治疗情况
- D. 生育史
- E. 心功能分级

31. 真题 2018-X086 肝炎病人眼结膜黄染原因是( )

- A. 血中胆固醇太多
- B. 血中二氧化碳太多
- C. 血中氧含量太少
- D. 血中胆红素增高
- E. 红细胞破坏太多

32. 真题 2018-Z086 患者女, 30 岁。怀孕后被诊断为妊娠合并糖尿病。治疗的首选药物是( )

- A. 胰岛素
- B. 消渴丸
- C. 二甲双胍
- D. 甲苯磺丁尿
- E. 优降糖

33. 真题 2018-Z087 患者女, 30 岁。怀孕后被诊断为妊娠合并糖尿病。孕产期护理措施正确的是( )

- A. 新生儿出生后加用糖水
- B. 本病必须剖宫产结束分娩
- C. 饮食控制对疾病不利
- D. 减少活动保证孕期顺利
- E. 口服降糖药对胎儿无害

34. 真题 2019-Z045 妊娠合并病毒性肝炎的潜在并发症是( )

- A. 肝性脑病
- B. 心力衰竭
- C. 肝硬化
- D. 羊水栓塞
- E. 肝癌

35. 真题 2019-X068 某孕妇, 25 岁。孕 1 产 0, 孕 8 周, 早孕出现较重的呕吐, 皮肤黏膜苍白, 毛发干燥无光泽, 活动无力, 易头晕。实验室检查: 血红蛋白 70g/L, 血细胞比容 0.15, 血清铁 6.0 μmol/L。下列孕期健康宣教内容, 错误的是( )

- A. 给予心理支持, 减少心理应激
- B. 重点评估胎儿宫内生长发育状况
- C. 如果服用铁剂时胃肠道反应较轻, 则不需同服维生素 C
- D. 重点监测胎心率变化
- E. 应列为高危妊娠, 加强母子监护

## 九.异常分娩的护理

1. 真题 2010-X028 关于协调性子宫收缩乏力, 正确的描述是( )

- A. 子宫收缩有正常节律性、极性、对称性, 仅收缩力弱
- B. 产妇自觉持续性腹痛, 无间歇

- C. 容易发生胎儿宫内窘迫
- D. 不宜静脉滴注催产素
- E. 潜伏期宜使用哌替啶

2. 模拟题 下列加强子宫收缩的方法中应专人监护的是( )

- A. 前列腺素应用
- B. 针刺
- C. 地西洋静脉注射
- D. 人工破膜
- E. 缩宫素静脉滴注

3. 模拟题 孕妇分娩过程中出现不协调性子宫收缩乏力, 正确的处理是( )

- A. 静脉滴注催产素
- B. 肌内注射哌替啶(度冷丁)
- C. 阴道助产
- D. 人工破膜
- E. 即刻剖宫产

4. 真题 2014-X050 单纯扁平骨盆, 骨盆外测量小于正常值的径线是( )

- A. 骶耻内径
- B. 骶耻外径
- C. 髂棘间径
- D. 髂嵴间径
- E. 坐骨结节间径

5. 真题 2013-X046 关于催产素静脉滴注, 下列正确的是( )

- A. 用于协调性子宫收缩乏力, 以加强宫缩
- B. 用于胎儿窘迫, 需尽快结束分娩的产妇
- C. 滴注的速度及剂量始终保持一致
- D. 教会孕妇自己调节滴速
- E. 用于经产妇引产更敏感

6. 真题 2011-X001 关于催产素静脉滴注, 正确的是( )

- A. 用于协调性子宫收缩乏力, 以加强宫缩
- B. 用于胎儿窘迫, 需尽快结束分娩的产妇
- C. 滴注的速度及剂量始终保持一致
- D. 教会孕妇自己调节滴速
- E. 用于经产妇引产更敏感

7. 真题 2010-Z059 初产妇, 第二产程延长行胎头吸引, 胎儿体重 4000g, 胎盘娩出后 1 小时阴道出血, 宫底达脐上两横指, 质软, 测量血压为 73/30mmHg, 脉细, 出冷汗。其最可能的出血原因是( )

- A. 胎盘残留
- B. 宫缩乏力
- C. 会阴裂伤
- D. 凝血障碍
- E. 胎盘早剥

8. 真题 2010-X100 明显头盆不称的处理措施为( )

- A. 给予镇静剂

- B. 行剖宫产术
- C. 立即人工破膜
- D. 静脉滴注缩宫素
- E. 等待产程自然进展

9. 真题 2010-X099 不协调性宫缩乏力的首要处理措施为( )

- A. 给予镇静剂
- B. 行剖宫产术
- C. 立即人工破膜
- D. 静脉滴注缩宫素
- E. 等待产程自然进展

10. 真题 2011-Z009 宫口开大 5cm 不再扩张超过 3 小时, 应诊断为( )

- A. 潜伏期延长
- B. 活跃期延长
- C. 第二产程延长
- D. 活跃期停滞
- E. 胎头下降停滞

## 十. 分娩期并发症妇女的护理

1. 真题 2010-X001 有关羊水栓塞的处理, 错误的是( )

- A. 纠正呼吸循环衰竭
- B. 抗过敏
- C. 抗生素预防感染
- D. 防治凝血功能障碍
- E. 等待自然分娩

2. 真题 2018-Z002 不属于羊水栓塞的处理是( )

- A. 持续低流量给氧
- B. 半卧位
- C. 遵医嘱立即静注地塞米松 20~40mg
- D. 如发生在第一产程立即剖宫产结束分娩
- E. 如正在滴注催产素应立即停止

3. 真题 2016-X098 子宫破裂的表现是( )

- A. 子宫出现病理缩腹环, 血尿
- B. 产后宫底逐渐升高, 随后大量血液自阴道流出
- C. 产妇突然感到下腹部剧痛, 随即子宫收缩停止
- D. 产后突然发生寒战, 呼吸困难, 发绀
- E. 胎儿娩出后, 阴道间歇性流出暗红色血液, 胎盘娩出延迟

4. 真题 2016-Z055 28 岁孕妇, 妊娠 35 周, 胎膜早破 12 小时收入院。产科检查: LOT, 未入盆, 胎心率 140 次/分。对该孕妇护理措施错误的是( )

- A. 绝对卧床休息
- B. 取半坐卧位
- C. 密切观察生命体征变化
- D. 保持外阴清洁
- E. 按医嘱给予抗生素

5. 真题 2018-Z003 产后出血导致失血性休克时的补

血原则是( )

- A. 补充同等失血量
- B. 补充 1/2 失血量
- C. 补充 1/3 失血量
- D. 补充 1 倍失血量
- E. 补充 2 倍失血量

6. 模拟题 关于胎膜早破, 下列说法正确的是( )

- A. 孕 40 周(预产期)之前的胎膜破裂
- B. 孕 37 周之前的胎膜破裂
- C. 临产之前的胎膜破裂
- D. 临产后进人活跃期之前的胎膜破裂
- E. 宫颈口开全之前的胎膜破裂

7. 模拟题 妊娠胎膜早破, 为防止脐带脱垂采用的卧位是( )

- A. 半坐卧位
- B. 中凹卧位
- C. 屈膝仰卧位
- D. 头低足高位
- E. 头高足低位

8. 模拟题 居我国产妇死亡原因首位的是( )

- A. 妊娠合并心脏病
- B. 妊娠高血压综合征
- C. 产后出血
- D. 产褥感染
- E. 羊水栓塞

9. 模拟题 胎膜早破采取期待疗法的孕妇, 为促进胎儿肺成熟应用的药物是( )

- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. 雄激素
- D. 盐皮质激素
- E. 糖皮质激素

10. 模拟题 患者, 女, 35 岁。妊娠 36 周胎膜早破, 3 天前自然分娩, 今早发热、腹痛、恶露增加。检查: T38.5℃, P85 次/分, R22 次/分, 宫底平脐。下腹压痛, 恶露量多, 鲜红色。急查 WBC $12.8 \times 10^9/L$ 。中性粒细胞 0.80。该产妇应取的最佳体位是( )

- A. 平卧位
- B. 半坐卧位
- C. 左侧卧位
- D. 右侧卧位
- E. 俯卧位

11. 模拟题 下列关于胎膜早破的护理措施中, 错误的是( )

- A. 立即听胎心并记录破膜时间
- B. 破膜超过 12 小时尚未临产者, 遵医嘱给予抗生素
- C. 卧床休息, 抬高臀部
- D. 若头先露不需观察脐带脱垂情况

E. 观察羊水的性状和颜色

12. 模拟题 下列羊水栓塞的处理措施正确的是( )

- A. 解除肺动脉高压, 纠正缺氧
- B. 立即终止妊娠, 可提高治愈率
- C. 出血不止时, 立即应用肝素抗凝
- D. 慎用肾上腺糖皮质激素
- E. 休克早期禁用低分子右旋糖酐

13. 真题 2017-X010 有关羊水栓塞的处理, 错误的是( )

- A. 纠正呼吸循环衰竭
- B. 抗过敏
- C. 抗生素预防感染
- D. 防止凝血功能障碍
- E. 等待自然分娩

14. 模拟题 发生胎膜破裂时, 孕妇应采取的体位是( )

- A. 半卧位
- B. 站位
- C. 俯卧位
- D. 侧卧位
- E. 截石位

15. 真题 2017-Z012 初产妇, 第二产程延长, 行胎头吸引, 胎体重 4000g, 胎盘娩出后 1 小时阴道出血, 宫底脐上二横指, 质软, 测量血压 73/30mmHg, 脉细, 出冷汗。其最可能的出血原因是( )

- A. 胎盘残留
- B. 宫缩乏力
- C. 会阴损伤
- D. 凝血障碍
- E. 胎盘早剥

16. 真题 2016-X097 先兆子宫破裂的表现是( )

- A. 子宫出现病理缩复环, 血尿
- B. 产后宫底逐渐升高, 随后大量血液自阴道流出
- C. 产妇突然感到下腹部剧痛, 随即子宫收缩停止
- D. 产后突然发生寒战, 呼吸困难, 发绀
- E. 胎儿娩出后, 阴道间歇性流出暗红色血液, 胎盘娩出延迟

17. 真题 2015-Z061 产妇, 26 岁。孕期常规检查无异常, 第二产程破膜后突然咳嗽, 烦躁, 呼吸困难, 随即昏迷, 血压 50/30mmHg, 休克。该产妇可能发生了( )

- A. 子宫破裂
- B. 胎盘早剥
- C. 产时子痫
- D. 羊水栓塞
- E. 胎儿窘迫

18. 真题 2010-J027 产后出血指胎儿娩出后 24 小时内阴道出血量超过( )

- A. 300ml
- B. 400ml
- C. 500ml

D. 600ml

E. 700ml

19. 真题 2015-J079 某孕妇, 34 岁。孕 29 周, G1P0, 主诉“胎动感觉不清 1 周”入院。经人工破膜及催产素静脉滴注娩出一死婴后即开始出现大量阴道出血, 经人工剥离胎盘及使用宫缩剂后仍无效果, 出血不止, 无血凝块。其出血原因可能是( )

- A. 软产道损伤
- B. 胎盘残留
- C. 产后宫缩乏力
- D. 子宫腔内感染
- E. 凝血功能障碍

20. 真题 2010-Z038 与发生羊水栓塞无关的因素是( )

- A. 急产
- B. 胎膜早破
- C. 催产素引产
- D. 活跃期延长
- E. 前置胎盘

21. 真题 2011-J084 某产妇, 胎儿娩出后, 立即出现阴道活动性出血。量多, 呈鲜红色, 有血凝块。子宫平脐、宫体较硬。最可能的出血原因是( )

- A. 宫缩乏力
- B. 胎盘粘连
- C. 胎盘植入
- D. 软产道损伤
- E. 凝血功能障碍

22. 真题 2011-X061 某初产妇妊娠 34 周发生胎膜早破, 胎心 140 次/分, 应立即采取的措施是( )

- A. 卧床休息抬高臀部
- B. 经腹羊膜腔输液
- C. 给予地塞米松
- D. 应用抗生素
- E. 终止妊娠

23. 真题 2011-X065 经产妇, 34 岁。妊娠足月临产, 胎儿胎盘娩出后, 出现间歇性阴道流血, 量较多, 血液凝固, 检查子宫宫体柔软, 进一步的处理原则是( )

- A. 加强宫缩
- B. 防治感染
- C. 补充凝血因子
- D. 清除残留胎盘
- E. 缝合软产道裂伤

24. 真题 2011-Z027 预防产后出血的措施, 不正确的是( )

- A. 密切观察宫缩情况
- B. 适时做会阴侧切术
- C. 胎儿娩出前注射缩宫素
- D. 产后留产房观察 2 小时
- E. 督促产妇及时排空膀胱

25. 真题 2018-Z021 28 岁孕妇,妊娠 35 周,胎膜早破 12 小时收入院。产科检查: LOT, 未入盆。胎心率 140 次/分。对该孕妇护理措施错误的是( )

- A. 绝对卧床休息
- B. 保持外阴清洁
- C. 密切观察生命体征变化
- D. 按医嘱给予抗生素
- E. 取半坐卧位

26. 真题 2017-J021 产后出血指胎儿娩出后 24 小时内阴道出血量超过( )

- A. 300ml
- B. 400ml
- C. 500ml
- D. 600ml
- E. 700ml

27. 真题 2011-Z041 孕期末达 35 周出现胎膜早破, 最恰当的处理是( )

- A. 立即引产
- B. 立即剖宫产
- C. 应用宫缩抑制剂延长孕期
- D. 不必用糖皮质激素催胎肺成熟
- E. 监测感染状态, 一旦发现感染, 及时终止妊娠

28. 真题 2011-Z049 35 岁产妇, 妊娠 36 周胎膜早破, 3 天前自然分娩, 今早发热、腹痛、恶露增加。检查: T38.5℃, P85 次/分, R22 次/分, 宫底平脐。下腹压痛, 恶露量多, 鲜红色。急查 WBC $12.8 \times 10^9/L$ , 中性粒细胞 0.80。该产妇应取的最佳体位是( )

- A. 平卧位
- B. 半坐卧位
- C. 左侧卧位
- D. 右侧卧位
- E. 俯卧位

29. 真题 2014-J015 产后出血指胎儿娩出后 24 小时内阴道出血超过( )

- A. 300ml
- B. 400ml
- C. 500ml
- D. 600ml
- E. 700ml

30. 真题 2014-X068 患者, 女, 30 岁。孕 39+6 周时临产, 第一产程破膜后宫缩仍乏力, 遵医嘱给予催产素 2.5U+5%GS500ml 静脉滴注, 于第二产程患者突然出现烦躁不安、气促、呼吸困难、发绀, 医生考虑是羊水栓塞。此时最佳处理是( )

- A. 行鼻导管给氧
- B. 停止滴注催产素
- C. 剖宫产结束分娩
- D. 安抚患者稳定情绪
- E. 向家属解释患者病情

31. 真题 2014-Z042 不属于羊水栓塞处理的是( )

- A. 持续低流量给氧
- B. 半卧位
- C. 遵医嘱立即静脉注射地塞米松 20-40mg
- D. 如发生在第一产程, 应立即剖宫产结束分娩
- E. 如正在滴注催产素应立即停止

32. 真题 2010-J085 某孕妇, 34 岁。孕 29 周, G1P0, “胎动感觉不清” 1 周入院, 经人工破膜及催产素点滴娩出一死婴, 即开始出现大量阴道出血, 经人工剥离胎盘及使用宫缩剂后仍无效果, 出血不止, 无凝血块。其出血原因可能是( )

- A. 软产道损伤
- B. 胎盘残留
- C. 产后宫缩乏力
- D. 子宫腔内感染
- E. 凝血功能障碍

33. 真题 2015-Z007 产后出血导致失血性休克时的补血原则是( )

- A. 补充同等失血量
- B. 补充 1/2 失血量
- C. 补充 1/3 失血量
- D. 补充 1 倍失血量
- E. 补充 2 倍失血量

34. 真题 2013-J035 羊水栓塞多发生在( )

- A. 妊娠早期流产
- B. 妊娠中期流产
- C. 妊娠晚期流产
- D. 分娩期破膜后
- E. 产后 24 小时内

35. 真题 2014-X051 下述不支持胎膜早破诊断的是( )

- A. 阴道持续性流液
- B. 宫缩时肛查触不到前羊膜囊
- C. 羊水涂片镜检可见羊齿状结晶
- D. 阴道排液酸碱试纸检查呈弱酸性
- E. 羊水涂片染色可见毳毛

36. 真题 2018-Z049 产后大出血的护理措施, 不正确的是( )

- A. 保暖、吸氧
- B. 观察生命体征及尿量
- C. 建立静脉通路
- D. 遵医嘱使用有效的止血药物
- E. 子宫切除

37. 真题 2017-X059 因子宫收缩乏力引起的产后出血, 首选的止血措施为( )

- A. 按摩子宫
- B. 给予止血药
- C. 子宫次全切



- D. 结扎盆腔血管止血
- E. 无菌纱布条填塞宫腔

38. 真题 2018-X064 患者女, G1P0, 孕 34+3 周。无任何诱因突感有较多液体自阴道流出, 产科检查: 无宫缩, 胎先露高浮, 考虑胎膜早破。护士指导患者应绝对卧床, 采取的最佳卧位是( )

- A. 平卧位
- B. 右侧卧位
- C. 俯卧位
- D. 左侧卧位
- E. 抬高臀部

39. 真题 2018-J066 下列居我国产妇死亡原因首位的是( )

- A. 妊娠合并心脏病
- B. 产后出血
- C. 妊娠高血压综合征
- D. 产褥感染
- E. 羊水栓塞

## 十一. 产后并发症妇女的护理

1. 真题 2014-Z077 初产妇, 足月顺产后 3 天, 体温 38.9℃, 子宫体轻压痛, 恶露量多且有臭味。该产妇首先考虑为( )

- A. 急性输卵管炎
- B. 血栓性静脉炎
- C. 急性子宫内膜炎
- D. 急性盆腔腹膜炎
- E. 急性盆腔结缔组织炎

2. 真题 2014-Z078 初产妇, 足月顺产后 3 天, 体温 38.9℃, 子宫体轻压痛, 恶露量多且有臭味。患者休息时应采取的最佳体位为( )

- A. 半卧位
- B. 平卧位
- C. 左侧卧位
- D. 右侧卧位
- E. 头低脚高位

3. 真题 2016-X012 治疗产褥感染选择抗生素的依据是( )

- A. 感染部位、程度
- B. 患者全身症状
- C. 阴道分泌物性质
- D. 细菌培养和药敏试验结果
- E. 分娩方式

4. 模拟题 产后血性恶露一般持续( )

- A. 9~10 天
- B. 7~8 天
- C. 5~6 天
- D. 3~4 天
- E. 1~2 天

5. 模拟题 关于产褥感染下列说法错误的是( )

- A. 分娩后生殖道感染
- B. 产科操作是感染的诱因
- C. 仅需氧菌是致病菌
- D. 自身免疫力低也是诱因
- E. 产后 3~7 天出现的感染

6. 真题 2015-Z078 某女性, 25 岁。工作压力大, 婚后意外怀孕, 该孕妇整个孕期精神紧张烦躁, 于妊娠 35 周因胎儿宫内窘迫手术产一女婴。产后第 2 天丈夫因公出差, 其开始精神不振, 常常失眠, 于是向心理医生求助, 心理医生诊断为产后抑郁。该产妇发生产后抑郁的心理因素不包括( )

- A. 社交能力不良
- B. 手术分娩
- C. 情绪不稳定
- D. 对承担母亲角色的不适应
- E. 缺少家庭支持

7. 真题 2015-Z077 某女性, 25 岁。工作压力大, 婚后意外怀孕, 该孕妇整个孕期精神紧张烦躁, 于妊娠 35 周因胎儿宫内窘迫手术产一女婴。产后第 2 天丈夫因公出差, 其开始精神不振, 常常失眠, 于是向心理医生求助, 心理医生诊断为产后抑郁。产后抑郁一般发生在( )

- A. 产后 3-4 天
- B. 产后 1 周
- C. 产后 2 周
- D. 产后 3 周
- E. 产后 4 周

8. 真题 2013-Z060 产褥感染的护理不妥的是( )

- A. 防治交叉感染, 进行床边隔离
- B. 产妇平卧, 臀部抬高
- C. 体温超过 38℃ 应停止哺乳
- D. 保证营养摄入
- E. 保持外阴清洁

9. 真题 2011-X053 产妇, 28 岁。胎膜早破, 自然分娩后第 3 天。查体: 体温 39℃, 下腹疼痛, 恶露血性、浑浊。有臭味, 宫底平脐, 宫体压痛。白细胞  $17 \times 10^9 / L$ , 中性粒细胞 80%。最主要的处理原则是( )

- A. 心理护理
- B. 加强营养
- C. 控制感染
- D. 高热护理
- E. 严密观察

10. 真题 2010-Z063 一产妇, 足月妊娠, G1P1, 因滞产行会阴侧切+产钳术, 产后 8 小时宫底上升达脐上, 在宫底下方触及一囊性物, 首先考虑的是( )

- A. 宫腔内积血
- B. 尿潴留
- C. 胎盘残留

- D. 胎膜残留
- E. 卵巢囊肿

11. 真题 2010-Z035 蜕膜残留致晚期产后出血, 宫腔刮出物病理检查不包括的组织是( )

- A. 绒毛
- B. 坏死蜕膜
- C. 纤维素
- D. 玻璃样变的蜕膜细胞
- E. 红细胞

12. 真题 2014-X029 晚期产后出血是指分娩多长时间后, 在产褥期内发生子宫大量出血( )

- A. 2 小时
- B. 8 小时
- C. 12 小时
- D. 16 小时
- E. 24 小时

13. 真题 2017-X018 产妇发生产褥感染时, 应采取的最佳体位是( )

- A. 平卧位
- B. 半卧位
- C. 侧卧位
- D. 截石位
- E. 头低脚高位

14. 真题 2017-Z041 关于产后沮丧的临床表现, 正确的是( )

- A. 产妇出现行为紊乱
- B. 产妇出现自我伤害
- C. 产妇常有幻觉出现
- D. 表现现为焦虑、疲劳
- E. 产妇常有意识障碍

15. 真题 2018-Z058 产妇, 28 岁。产后一周出现情绪低落, 认为孩子出生后家人不如以前关心自己, 心情压抑悲伤, 经常冲家人发脾气。下列叙述错误的是( )

- A. 产后抑郁只需要进行心理治疗
- B. 分娩后体内雌激素突然下降可能是产后抑郁的促发因素
- C. 护理人员要鼓励产妇宣泄、抒发自己的心理感受
- D. 注意安全保护, 防止产妇发生伤害行为
- E. 社会心理因素是造成产后抑郁的主要原因

16. 真题 2017-X078 初产妇, 剖宫产术后 10 天, 突然阴道大量流血 4 小时, 入院时血压 80/85mmHg, 心率 110 次/分, 血红蛋白 60g/L, 首要的处理原则是( )

- A. 加强宫缩
- B. 预防感染
- C. 抢救休克
- D. 静脉输入缩宫素
- E. 按摩子宫

17. 真题 2019-Z038 产褥感染的临床表现不包括( )

- A. 急性外阴炎
- B. 急性子宫内膜炎
- C. 急性输卵管炎
- D. 血栓性静脉炎
- E. 慢性盆腔炎

18. 真题 2019-X008 晚期产后出血是指分娩多长时间后, 在产褥期内发生子宫大量出血( )

- A. 2 小时
- B. 8 小时
- C. 12 小时
- D. 16 小时
- E. 24 小时

## 十二. 妇科护理病历

1. 真题 2013-X066 有关妇科双合诊检查, 错误的是( )

- A. 先排空膀胱
- B. 取膀胱截石位
- C. 适于所有妇科患者
- D. 用具一定消毒, 防止交叉感染
- E. 是妇科最常用检查方法

## 十三. 女性生殖系统炎症病人护理

1. 模拟题 患者, 女, 35 岁。因下肢骨折感染入院治疗, 应用抗生素 12 天, 自觉外阴瘙痒, 分泌物增多。应首先考虑( )

- A. 慢性阴道炎
- B. 细菌性阴道炎
- C. 外阴阴道假丝酵母菌病
- D. 滴虫性阴道炎
- E. 非特异性外阴瘙痒

2. 模拟题 多用于慢性宫颈炎颗粒增生的药物是( )

- A. 20%~50%的硝酸银溶液
- B. 雌激素软膏
- C. 制霉菌素
- D. 2%~4%的碳酸氢钠溶液
- E. 10%的铬酸溶液

3. 模拟题 老年性阴道炎局部用药首选的药物是( )

- A. 20%~50%的硝酸银溶液
- B. 雌激素软膏
- C. 制霉菌素
- D. 2%~4%的碳酸氢钠溶液
- E. 10%的铬酸溶液

4. 模拟题 慢性宫颈炎的典型临床症状为( )

- A. 白带增多
- B. 外阴瘙痒
- C. 外阴疼痛
- D. 外阴灼热感
- E. 外阴湿疹

5. 模拟题 滴虫性阴道炎的治愈标准是( )

- A. 白带涂片检查阴性
- B. 月经干净后复查白带连续 3 次阴性
- C. 治疗后复查白带连续 3 次阴性
- D. 月经干净后复查白带连续 3 个月阴性
- E. 以上都不是

6. 模拟题 下列哪项不是淋病的临床表现( )

- A. 淋病的潜伏期为 2 周
- B. 淋病早期局限于下生殖道、尿道
- C. 淋菌沿生殖道黏膜上行传播, 易引起尿道旁腺炎、前庭大腺炎、颈管炎
- D. 淋病可上行引起子宫内膜炎、急性输卵管炎、输卵管卵巢囊肿、盆腔脓肿
- E. 淋病经血行传播可引起全身性淋菌性疾病

7. 真题 2018-X006 获得性免疫缺陷综合征常用的治疗药物不包括( )

- A. 抗病毒药物
- B. 干扰素
- C. 免疫刺激剂
- D. 性激素
- E. 抗生素

8. 模拟题 巴氏 V 级表明是( )

- A. 正常的阴道涂片
- B. 炎症, 细胞核普遍增大
- C. 癌细胞
- D. 可疑癌, 细胞核增大
- E. 高度可疑癌, 细胞具有恶性改变

9. 真题 2017-X007 宫颈息肉的最佳治疗方法是( )

- A. 激光
- B. 局部应用消炎药
- C. 宫颈锥切
- D. 息肉摘除术
- E. 中药治疗

10. 模拟题 巴氏 II 级表明是( )

- A. 正常的阴道涂片
- B. 炎症, 细胞核普遍增大
- C. 癌细胞
- D. 可疑癌, 细胞核增大
- E. 高度可疑癌, 细胞具有恶性改变

11. 模拟题 巴氏 I 级表明是( )

- A. 正常的阴道涂片
- B. 炎症, 细胞核普遍增大
- C. 癌细胞
- D. 可疑癌, 细胞核增大
- E. 高度可疑癌, 细胞具有恶性改变

12. 模拟题 适用于假丝酵母菌性阴道炎的药物是( )

- A. 20%~50%的硝酸银溶液

B. 雌激素软膏

- C. 制霉菌素
- D. 2%~4%的碳酸氢钠溶液
- E. 10%的铬酸溶液

13. 模拟题 滴虫性阴道炎治疗期间注意事项中, 下列哪项不对( )

- A. 治疗期间避免性交
- B. 被褥、内裤勤洗晒
- C. 已婚男女同时治疗
- D. 白带检查阴性为治愈
- E. 哺乳期禁用甲硝唑口服

14. 模拟题 患者, 女, 58 岁。绝经 2 年阴道出血无任何不适。妇检: 宫颈糜烂充血, 子宫略大, 附件(-), 阴道脱落细胞检查为巴氏 I 级。为进一步确诊, 应选的检查是( )

- A. 血 CA125 测定
- B. 腹腔镜
- C. 分段诊刮术
- D. 阴道镜
- E. 阴道后穹隆穿刺术

15. 模拟题 关于滴虫性阴道炎临床表现正确的是( )

- A. 外阴瘙痒, 红肿
- B. 悬滴法找到白细胞增多
- C. 阴道 pH4.5
- D. 阴道黏膜上附着白带, 擦后露出红肿黏膜面
- E. 稀薄泡沫状白带增多

16. 模拟题 女性生殖器结核最常见的是( )

- A. 输卵管结核
- B. 子宫颈结核
- C. 盆腔腹膜结核
- D. 子宫内膜结核
- E. 卵巢结核

17. 真题 2011-X070 患者, 女, 因下腹及腰骶部疼痛不适, 近 2 个月伴白带量增多就诊。妇检: 宫颈中度糜烂, 接触性出血。正确的处理应是( )

- A. 物理治疗
- B. 药物治疗
- C. 宫颈锥切术
- D. 暂时观察, 定期随访
- E. 排除宫颈癌后再行治疗

18. 模拟题 患者, 女, 28 岁。阴道分泌物增多 2 个月, 性交后出血 2 次就诊。妇科检查见宫颈重度糜烂乳突型, 宫体大小正常, 双附件未见异常, 宫颈刮片巴氏 II 级。该患者最佳治疗方法是( )

- A. 中药治疗
- B. 局部药物治疗
- C. 激光治疗
- D. 宫颈锥切术
- E. 子宫全切术

19. 模拟题 患者,女,28岁。阴道分泌物增多2个月,性交后出血2次就诊。妇科检查见宫颈重度糜烂乳突型,宫体大小正常,双附件未见异常,宫颈刮片巴氏Ⅱ级。宫颈重度糜烂是指( )

- A. 糜烂面占整个宫颈面积的1/3以下
- B. 糜烂面占整个宫颈面积的1/3
- C. 糜烂面占整个宫颈面积的1/3~1/2
- D. 糜烂面占整个宫颈面积的1/2~2/3
- E. 糜烂面占整个宫颈面积的2/3以上

20. 模拟题 治疗外阴尖锐湿疣不正确的是( )

- A. 妊娠36周前,病灶小、位于外阴者可局部药物治疗
- B. 涂药前用2%的丁卡因贴敷
- C. 可用电灼或冷冻
- D. 切割疣体
- E. 配偶或性伴侣需同时治疗

21. 模拟题 下列针对滴虫性阴道炎患者指导措施正确的是( )

- A. 性生活后行阴道分泌物检查效果更好
- B. 哺乳期妇女口服甲硝唑不影响哺乳
- C. 2%碳酸氢钠坐浴后阴道用药效果更好
- D. 治疗期间禁止进入公共游泳池
- E. 性生活不受影响

22. 真题 2014-J082 患者,女,28岁。今日感外阴痒,阴道分泌物增多就诊。妇科检查:白带呈豆渣样,阴道黏膜红肿并附有白膜。考虑感染的病原体是( )

- A. 支原体
- B. 苍白螺旋体
- C. 假丝酵母菌
- D. 阴道毛滴虫
- E. 淋病奈瑟菌

23. 真题 2017-Z021 患者女,35岁,已婚。因“外阴瘙痒1周,白带增多,有臭味”前来就诊。经检查确诊为滴虫性阴道炎,以下护理措施不正确的是( )

- A. 嘱患者注意个人卫生,勿与他人共用浴盆、浴巾
- B. 患者的内裤、浴巾应煮沸5~10分钟以杀灭滴虫
- C. 治疗期间避免性生活或同房时使用避孕套
- D. 嘱患者的性伴侣应同时治疗
- E. 嘱患者于月经干净后复查白带,未查见滴虫,视为治愈

24. 真题 2013-X047 慢性宫颈炎的治疗,不合适的方法是( )

- A. 电熨治疗
- B. 冷冻治疗
- C. 激光治疗
- D. 局部上药
- E. 全身应用大剂量的抗生素

25. 真题 2013-J094 外阴阴道假丝酵母菌病患者行阴道冲洗应选用( )

- A. 2%~4%碳酸氢钠溶液
- B. 1%乳酸溶液
- C. 1:15000高锰酸钾溶液
- D. 0.9%生理盐水
- E. 0.5%碘伏溶液

26. 真题 2013-J093 滴虫阴道炎患者行阴道冲洗时应选用( )

- A. 2%~4%碳酸氢钠溶液
- B. 1%乳酸溶液
- C. 1:15000高锰酸钾溶液
- D. 0.9%生理盐水
- E. 0.5%碘伏溶液

27. 真题 2013-J013 慢性子宫颈炎临床最常见的病理类型是( )

- A. 宫颈细胞非典型增生
- B. 宫颈腺体囊肿
- C. 宫颈息肉
- D. 宫颈肥大
- E. 宫颈糜烂

28. 真题 2011-Z043 可导致婴幼儿表现楔状齿、鞍鼻的是( )

- A. 梅毒
- B. 淋病
- C. 艾滋病
- D. 尖锐湿疣
- E. 细菌性阴道炎

29. 真题 2011-J030 由苍白螺旋体感染所致的疾病是( )

- A. 淋病
- B. 梅毒
- C. 宫颈癌
- D. 尖锐湿疣
- E. 生殖器疱疹

30. 真题 2010-Z011 阴道分泌物呈灰黄色、稀薄泡沫状,伴外阴及阴道瘙痒,可见于( )

- A. 老年性阴道炎
- B. 外阴阴道假丝酵母菌病
- C. 慢性宫颈炎
- D. 滴虫阴道炎
- E. 盆腔炎

31. 真题 2015-X041 急性盆腔炎的主要治疗手段是( )

- A. 物理疗法
- B. 手术治疗
- C. 卧床休息
- D. 抗生素治疗
- E. 活血化瘀和清热解毒

32. 真题 2015-X058 适宜滴虫生长的阴道pH值是( )

- A. 3.5~4.2

- B. 4.4~5.0
- C. 5.2~6.6
- D. 6.8~7.4
- E. 7.5~8.0

33. 模拟题 患者，女，47岁。有糖尿病史，近2周发现外阴痒，白带多，检查：白带黏稠，典型豆腐渣样，阴道壁充血，宫颈光滑。局部清洗选( )

- A. 1%乳酸
- B. 0.9%氯化钠
- C. 2%石炭酸
- D. 2%~4%碳酸氢钠
- E. 1:5000高锰酸钾

34. 模拟题 未婚青年女性滴虫性阴道炎首选的治疗是( )

- A. 阴道内塞入乙酰肿胺
- B. 阴道内塞入甲硝唑
- C. 阴道内塞入咪康唑
- D. 口服甲硝唑片
- E. 口服曲古霉素

35. 模拟题 阴道毛滴虫适宜生长的阴道环境是( )

- A. pH<5
- B. PH5.2~6.6
- C. PH6.0~6.5
- D. pH6.5~7.5
- E. pH>7.5

36. 真题 2016-X047 与尖锐湿疣有关的病毒是( )

- A. 风疹病毒
- B. 腮腺炎病毒
- C. 带状疱疹病毒
- D. 人乳头瘤病毒
- E. 人类免疫缺陷病毒

37. 真题 2016-J087 外阴阴道假丝酵母菌感染患者白带的性状是( )

- A. A. 稀薄泡沫状白带
- B. B. 脓性白带
- C. C. 豆渣样白带
- D. D. 血性白带
- E. E. 黄水状白带

38. 真题 2016-J086 滴虫性阴道炎的典型症状是( )

- A. 稀薄泡沫状白带
- B. 脓性白带
- C. 豆渣样白带
- D. 血性白带
- E. 黄水状白带

39. 真题 2017-Z035 慢性宫颈炎的主要症状是( )

- A. 不孕
- B. 外阴瘙痒
- C. 下腹坠痛

- D. 外阴灼热感
- E. 阴道分泌物增多

40. 真题 2015-Z054 患者，女，31岁。白带增多伴瘙痒3天，为黄绿色稀薄泡沫样，悬滴法查到滴虫。护士在指导患者自我护理、用药方法及切断传染途径的同时，还应告知在月经干净后复查滴虫连续几次阴性为治愈标准( )

- A. 2次
- B. 3次
- C. 4次
- D. 5次
- E. 6次

41. 真题 2015-J063 患者，女，34岁。1周来觉外阴瘙痒，有豆渣样白带。查体：阴道黏膜红肿，附有白色膜状物，易剥离。引起该病的病原体为( )

- A. 阴道毛滴虫
- B. 大肠埃希菌
- C. 苍白密螺旋体
- D. 白色假丝酵母菌
- E. 金黄色葡萄球菌

42. 真题 2010-J078 患者，女，28岁。近日感外阴痒、阴道分泌物增多就诊。妇科检查：白带呈豆渣样，阴道黏膜红肿并附有白膜。考虑感染的病原体是( )

- A. 支原体
- B. 苍白螺旋体
- C. 假丝酵母菌
- D. 阴道毛滴虫
- E. 淋病奈瑟菌

43. 真题 2017-X046 由于盆腔内邻近器官炎症经过直接蔓延导致盆腔炎的病原体主要是( )

- A. 淋病奈瑟菌
- B. 沙眼衣原体
- C. 梅毒螺旋体
- D. 大肠埃希菌
- E. 结核杆菌

44. 真题 2017-X057 治疗梅毒的首选药物是( )

- A. 阿奇霉素
- B. 红霉素
- C. 青霉素
- D. 万古霉素
- E. 克林霉素

45. 真题 2018-X062 慢性盆腔炎术后第1天，患者宜取的体位是( )

- A. 半卧位
- B. 俯卧位
- C. 平卧位
- D. 侧卧位
- E. 头低脚高位

46. 真题 2017-J070 患者女, 34 岁。1 周来觉得外阴瘙痒, 有豆渣样白带。查体: 阴道粘膜红肿, 附有白色膜状物, 易剥离。引起该病的病原体为( )

- A. 阴道毛滴虫
- B. 大肠埃希菌
- C. 苍白密螺旋体
- D. 白色假丝酵母菌
- E. 金黄色葡萄球菌

47. 真题 2018-J088 滴虫阴道炎的典型症状是( )

- A. 稀薄泡沫状白带
- B. 脓性白带
- C. 豆渣样白带
- D. 血性白带
- E. 黄水状白带

48. 真题 2018-J089 外阴阴道假丝酵母菌病的白带特征为( )

- A. 稀薄泡沫状白带
- B. 脓性白带
- C. 豆渣样白带
- D. 血性白带
- E. 黄水状白带

49. 真题 2019-Z081 滴虫阴道炎的典型阴道分泌物呈( )

- A. 脓性
- B. 血性
- C. 黄水样
- D. 豆渣样
- E. 稀薄泡沫浓状

50. 真题 2019-Z080 急性淋病阴道分泌物多呈( )

- A. 脓性
- B. 血性
- C. 黄水样
- D. 豆渣样
- E. 稀薄泡沫浓状

51. 真题 2019-Z001 阴道分泌物呈灰黄色、稀薄泡沫状, 伴外阴及阴道瘙痒, 可见于( )

- A. 老年性阴道炎
- B. 外阴阴道假丝酵母菌病
- C. 慢性宫颈炎
- D. 滴虫阴道炎
- E. 盆腔炎

52. 真题 2019-X070 关于女性生殖道感染的防御机制, 正确的叙述是( )

- A. 阴道 pH 值在 4.5~5.5 之间
- B. 外阴与阴道毗邻
- C. 输卵管的细长解剖结构
- D. 外阴皮肤为柱状上皮
- E. 子宫颈黏液栓的形成

53. 真题 2019-Z082 外阴阴道假丝酵母菌病的典型阴道分泌物呈( )

- A. 脓性
- B. 血性
- C. 黄水样
- D. 豆渣样
- E. 稀薄泡沫浓状

## 十四. 月经失调病人护理

1. 模拟题 患者, 女, 25 岁。已婚, 有原发性痛经史, 1 年内不考虑生育, 其原发性痛经的治疗用药最好是( )

- A. 口服镇静药
- B. 口服镇痛药
- C. 口服避孕药
- D. 口服前列腺素合成酶抑制剂
- E. 注射麻醉药

2. 模拟题 围绝经综合征的临床表现为( )

- A. 约 1/3 的妇女会发生比较明显的症状
- B. 卵巢功能衰退, 月经不规则, 有血性白带
- C. 血管舒缩功能失调, 血压持续增高, 尤以舒张压升高明显
- D. 阵发性潮热、易发生动脉粥样硬化、心肌梗死、眩晕、情绪易激动、月经紊乱
- E. 患阿尔茨海默病的风险比男性低

3. 模拟题 关于痛经, 以下叙述错误的是( )

- A. 原发性痛经生殖器官无器质性病变
- B. 痛经可能与前列腺素分泌有关
- C. 痛经可持续 1-2 天
- D. 痛经多发于无排卵型功血
- E. 痛经者可用解痉药

4. 模拟题 下列关于功能性子宫出血的说法不正确的是( )

- A. 黄体萎缩不全, 月经周期缩短
- B. 常见无排卵型功血
- C. 妇科检查生殖器无器质性病变
- D. 排卵型功血多发生于育龄期妇女
- E. 可由神经分泌机制紊乱造成

5. 模拟题 有关黄体发育不全, 下述哪项是正确的( )

- A. 多见于青春期女性
- B. 基础体温单相
- C. 月经周期缩短
- D. 经期延长
- E. 体温下降缓慢

6. 模拟题 子宫内膜不规则脱落月经改变是( )

- A. 月经周期正常, 但经期延长
- B. 月经间隔时间正常, 经期流血时间长
- C. 周期、经期、月经量都不正常
- D. 突然大量出血, 并发痛经

E. 月经周期无规律

7. 模拟题 患者,女,32岁。1年来经期延长至9~10天,经量增多,月经周期正常,盆腔检查无异常,基础体温呈双相型,但下降缓慢。诊断为功血,其发生的原因可能是( )

- A. 下丘脑-垂体-卵巢轴发育不完善
- B. 先天性卵巢发育异常
- C. 黄体萎缩不全
- D. 黄体发育不全
- E. 卵巢功能衰退

8. 模拟题 无排卵性功血月经改变是( )

- A. 月经周期正常,但经期延长
- B. 月经间隔时间正常,经期流血时间长
- C. 周期、经期、月经量都不正常
- D. 突然大量出血,并发痛经
- E. 月经周期无规律

9. 真题 2016-J080 患者女,48岁。主诉经期延长。平常月经规律,近4个月来月经期长达10天,且出血量多,妇科检查未见异常,诊断为功血,此种情况最佳的止血方法是( )

- A. 止血药
- B. 雌激素
- C. 雄激素
- D. 刮宫术及送病理检查
- E. 中草药

10. 模拟题 患者继发性闭经1年,孕激素试验阴性,雌激素试验阴性,提示闭经的可能原因是( )

- A. 子宫性
- B. 卵巢性
- C. 垂体性
- D. 丘脑下部
- E. 其他内分泌功能异常

11. 模拟题 无排卵性功能失调性子宫出血的特点是( )

- A. 多发于青春期,出血无规律
- B. 黄体发育较好,但萎缩过程延长
- C. 黄体期孕激素分泌不足,月经周期缩短
- D. 月经中期有少量出血
- E. 排卵正常,雌激素水平较低

12. 真题 2018-J012 患者,女,15岁。月经来潮1年,周期不规则,2~3个月行经1次,经期8~10天,经量多,无经期疼痛,呈贫血貌,应首先考虑为( )

- A. 排卵性功血
- B. 卵巢肿瘤
- C. 无排卵性功血
- D. 子宫肌瘤
- E. 子宫内膜炎

13. 模拟题 子宫内膜不规则脱落的特点是( )

- A. 多发于青春期,出血无规律

B. 黄体发育较好,但萎缩过程延长

C. 黄体期孕激素分泌不足,月经周期缩短

D. 月经中期有少量出血

E. 排卵正常,雌激素水平较低

14. 模拟题 患者,女,28岁。月经紊乱,月经周期20天左右,曾流产2次,妇科检查:子宫正常,双侧附件未见异常。导致月经紊乱的原因是( )

- A. 卵巢无排卵
- B. 黄体功能不足
- C. 垂体功能低下
- D. 卵巢功能衰退
- E. 子宫内膜不规则脱落

15. 真题 2016-X067 患者女,16岁。青春期功血,医生给予性激素调整月经周期。护士给患者进行健康指导,正确的是( )

- A. 按时按量服用性激素
- B. 如感冒可暂时停药
- C. 血止后药量每天递减
- D. 调整月经应2个周期
- E. 每次减量不超过原剂量1/2

16. 真题 2011-J055 子宫内膜不规则脱落的直接发病机制是( )

- A. 黄体过早衰退
- B. 黄体萎缩不全
- C. 黄体发育不良
- D. 无黄体形成
- E. 无排卵

17. 真题 2011-X054 25岁妇女,已婚,原发性痛经史,1年内不考虑生育,其原发性痛经的治疗用药最好是( )

- A. 口服镇静药
- B. 口服镇痛药
- C. 口服避孕药
- D. 口服前列腺素合成酶抑制剂
- E. 注射麻醉药

18. 真题 2013-J008 不属于继发性闭经的是( )

- A. 下丘脑性闭经
- B. 垂体性闭经
- C. 卵巢性闭经
- D. 输卵管性闭经
- E. 子宫性闭经

19. 真题 2013-X048 未婚女性,20岁。主诉经期腹痛剧烈,月经来潮时需服镇痛药并卧床休息。平时月经周期规律,基础体温呈双相。肛门检查:子宫前倾前屈、稍小、硬度正常,无压痛,两侧附件(-),分泌物白色透明。本病例最可能的诊断是( )

- A. 子宫内膜炎
- B. 子宫腺肌病
- C. 输卵管炎
- D. 子宫肌瘤

E. 痛经

20. 真题 2014-J056 青春期功血患者遵医嘱首选的治疗是( )

- A. 止血
- B. 调整周期
- C. 促进排卵
- D. 减少经量
- E. 防止内膜病变

21. 真题 2014-J085 患者,女,15岁。月经来潮1年,周期不规则,2-3个月行经1次,经期8-10天,经量多,无经期疼痛,呈贫血貌。应首先考虑( )

- A. 子宫内膜炎
- B. 无排卵性功血
- C. 排卵性功血
- D. 子宫肌瘤
- E. 卵巢肿瘤

22. 真题 2014-X036 对功能失调性子宫出血的患者进行妇科检查,可见其子宫( )

- A. 比正常小
- B. 正常大小
- C. 如孕2周大
- D. 如孕4周大
- E. 如孕6周大

23. 真题 2015-J035 继发性闭经是指月经初潮后,因某种病理性原因停经在( )

- A. 6个月以上
- B. 5个月以上
- C. 4个月以上
- D. 3个月以上
- E. 2个月以上

24. 真题 2015-J089 常用于闭经的辅助检查不包括( )

- A. 基础体温测定
- B. 卵巢活检
- C. 阴道脱落细胞检查
- D. 子宫内膜诊刮
- E. 宫颈黏液检查

25. 真题 2015-J090 对功血患者具有诊断和治疗双重作用的措施是( )

- A. 基础体温测定
- B. 卵巢活检
- C. 阴道脱落细胞检查
- D. 子宫内膜诊刮
- E. 宫颈黏液检查

26. 模拟题 绝经期妇女治疗骨质疏松,首选药物是( )

- A. 1, 25-(OH) 2D3
- B. 雌激素
- C. PTH
- D. TNF

E. IL-6

27. 真题 2018-X040 青春期无排卵性功血的治疗原则是( )

- A. 缩短月经周期
- B. 调整垂体与性腺功能
- C. 减少月经量、调整周期
- D. 止血、调整周期、促进排卵
- E. 减少月经量

28. 真题 2017-X072 患者女,50岁,近1年月经周期缩短,经期延长,此次月经量多且持续10日,查体:子宫稍大,稍软,此时首先考虑的止血措施是( )

- A. 给予雌激素
- B. 立即行缩宫素
- C. 给予氨甲苯酸
- D. 给予大量黄体酮
- E. 给予大量丙酸睾酮

29. 真题 2019-X053 排卵性功血的治疗原则是( )

- A. 防止子宫内膜病变
- B. 恢复黄体功能
- C. 积极止血
- D. 调整周期
- E. 促排卵

30. 真题 2019-J065 患者女,48岁。主诉经期延长,平常月经规律,近4个月来月经期长达10天。且出血量多,妇科检查未见异常,诊断为功血,最佳止血方法是( )

- A. 止血药
- B. 雌激素
- C. 雄激素
- D. 刮宫术及送病理检查
- E. 中草药

## 十五.妊娠滋养细胞疾病病人的护理

1. 真题 2010-J037 关于葡萄胎的说法,正确的是( )

- A. 病因尚不清楚
- B. 是一种恶性病变
- C. 多为部分性葡萄胎
- D. 常侵入肌层,发生远处转移
- E. 病理特点为滋养细胞增生,间质内血管增生明显

2. 模拟题 紫蓝色结节为( )

- A. 大量绒毛膜促性腺激素刺激卵巢颗粒细胞及卵泡膜细胞形成
- B. 妊娠后胎盘绒毛滋养细胞增生,绒毛呈水泡状
- C. 卵巢黄体直径超过3cm以上者
- D. 侵蚀性葡萄胎阴道转移症状
- E. 葡萄胎组织侵入子宫肌层或转移至子宫以外

3. 模拟题 葡萄胎为( )

- A. 大量绒毛膜促性腺激素刺激卵巢颗粒细胞及卵泡膜



细胞形成

- B. 妊娠后胎盘绒毛滋养细胞增生，绒毛呈水泡状
- C. 卵巢黄体直径超过 3cm 以上者
- D. 侵蚀性葡萄胎阴道转移症状
- E. 葡萄胎组织侵人子宫肌层或转移至子宫以外

4. 模拟题 良、恶性葡萄胎的主要区别是( )

- A. 阴道流血出现的迟早
- B. 子宫增大程度
- C. 体内 HCG 的含量
- D. 葡萄胎病变有无超出子宫范围
- E. 患者身体状况的好坏

5. 模拟题 恶性葡萄胎与绒毛膜癌的主要鉴别点是( )

- A. 继发良性葡萄胎后的时间
- B. 症状轻重
- C. 体内 HCG 浓度高低
- D. 有无黄素囊肿
- E. 病理切片中有无绒毛结构

6. 模拟题 患者，女，23 岁。患葡萄胎住院，予清宫治疗，术后即将出院，嘱患者应避孕的时间最少是( )

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 4 年
- E. 5 年

7. 真题 2016-Z087 葡萄胎的随访时间是( )

- A. 2 年
- B. 3 年
- C. 4 年
- D. 5 年
- E. 5 年以上

8. 真题 2016-J095 侵蚀性葡萄胎治疗以何种方式为主( )

- A. 清宫术
- B. 引产
- C. 药物流产
- D. 手术切除子宫
- E. 化疗

9. 真题 2010-Z036 绒癌患者如果出现胸闷、憋气，可能发生( )

- A. 肺转移
- B. 肝转移
- C. 脑转移
- D. 肾转移
- E. 脾转移

10. 真题 2011-J061 关于绒毛膜癌病理改变，下列叙述正确的是( )

- A. 为蜕膜组织，未见绒毛结构
- B. 腺体增生，并有不典型细胞

C. 绒毛结构及滋养细胞增生和分化不良

D. 滋养细胞极度不规则增生，未见绒毛结构

E. 滋养细胞增生，间质水肿，间质内胎源性血管消失

11. 真题 2013-J063 良性葡萄胎病变局限于( )

- A. 肺
- B. 宫腔
- C. 盆腔
- D. 腹腔
- E. 子宫肌层

12. 真题 2013-J079 病理检查可见绒毛结构的疾病是( )

- A. 宫颈癌
- B. 子宫内膜癌
- C. 侵蚀性葡萄胎
- D. 绒毛膜癌
- E. 外阴癌

13. 真题 2013-X067 26 岁妇女，停经 12 周，阴道不规则流血 10 余天，量不多，暗红色，血中伴有小水泡物。妇科检查：BP150/90mmHg，子宫前倾，如孕 4 个月大，两侧附件可触到鹅卵大、囊性、活动良好、表面光滑的肿物。本病例最可能诊断是( )

- A. 双胎妊娠
- B. 妊娠合并子宫肌瘤
- C. 妊娠合并卵巢囊肿
- D. 先兆流产
- E. 葡萄胎

14. 真题 2014-J052 绒毛膜癌患者最常见的转移部位是( )

- A. 肺
- B. 脑
- C. 肝
- D. 阴道
- E. 膀胱

15. 真题 2014-X055 葡萄胎清宫术前备用物品中哪项不需要( )

- A. 配血备用
- B. 催产素
- C. 雌激素制剂
- D. 抢救药品及物品
- E. 大号吸管

16. 真题 2014-Z030 葡萄胎清宫术后随访时间至少为( )

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 4 年
- E. 5 年

17. 真题 2016-J094 一旦发现葡萄胎, 应尽快行( )

- A. 清宫术
- B. 引产
- C. 药物流产
- D. 手术切除子宫
- E. 化疗

18. 模拟题 患者, 女, 26 岁。停经 12 周, 阴道不规则流血 10 余天, 量不多, 暗红色, 血中伴有小水泡物。检查: BP150/90mmHg, 子宫前倾, 如孕 4 个月大, 两侧附近可触到鹅卵大、囊性、活动良好、表面光滑的肿物。本病例最可能诊断是( )

- A. 双胞胎妊娠
- B. 妊娠合并子宫肌瘤
- C. 妊娠合并卵巢囊肿
- D. 先兆流产
- E. 葡萄胎

19. 真题 2018-Z051 侵蚀性葡萄胎患者若发生阴道转移时, 典型的体征为( )

- A. 阴道粘膜溃疡
- B. 阴道粘膜充血
- C. 阴道粘膜水肿
- D. 阴道粘膜附有白色膜状物
- E. 阴道粘膜紫蓝色结节

20. 真题 2017-J093 诊断葡萄胎最重要的辅助检查是( )

- A. B 超检查
- B. 宫颈刮片
- C. 分段诊刮
- D. 绒毛膜促性腺激素测定
- E. 宫颈活组织检查

21. 真题 2018-X096 葡萄胎的病理特点是( )

- A. 子宫腔内绒毛水泡状水肿和滋养细胞增生
- B. 子宫肌内水泡状组织, 有绒毛结构, 滋养细胞增生、分化不良
- C. 子宫肌内滋养细胞极度不规则增生, 周围大片出血、坏死, 绒毛结构消失
- D. 子宫腔内可见毛发、油脂, 有时可见牙齿或骨质
- E. 子宫腔内可见菜花样肿块

22. 真题 2018-X097 绒毛膜癌病理特点是( )

- A. 子宫腔内绒毛水泡状水肿和滋养细胞增生
- B. 子宫肌内水泡状组织, 有绒毛结构, 滋养细胞增生、分化不良
- C. 子宫肌内滋养细胞极度不规则增生, 周围大片出血、坏死, 绒毛结构消失
- D. 子宫腔内可见毛发、油脂, 有时可见牙齿或骨质
- E. 子宫腔内可见菜花样肿块

23. 真题 2019-Z003 绒癌患者如果出现胸闷、憋气, 可能发生( )

- A. 肺转移

B. 肝转移

C. 脑转移

D. 肾转移

E. 脾转移

24. 真题 2019-J081 侵蚀性葡萄胎治疗以何种方式为主( )

- A. 清宫术
- B. 引产
- C. 药物流产
- D. 手术切除子宫
- E. 化疗

25. 真题 2019-J080 一旦发现葡萄胎, 应尽快行( )

- A. 清宫术
- B. 引产
- C. 药物流产
- D. 手术切除子宫
- E. 化疗

## 十六. 妇科腹部手术病人的护理

1. 真题 2018-Z001 常以性激素分泌紊乱为首发症状, 为低度恶性的卵巢肿瘤, 多发于 45~55 岁妇女, 其病理改变为( )

- A. 无性细胞瘤
- B. 颗粒细胞瘤
- C. 未成熟畸胎瘤
- D. 黏液性囊腺瘤
- E. 浆液性囊腺瘤

2. 真题 2010-Z019 子宫内膜异位症典型的临床表现为( )

- A. 不孕
- B. 性交痛
- C. 月经失调
- D. 自然流产率增加
- E. 继发性渐进性痛经

3. 真题 2011-X067 患者, 女, 48 岁。接触性出血 1 个月, 检查: 宫颈糜烂重度。要排除宫颈癌, 首先应进行的普查方法是( )

- A. B 超检查
- B. 阴道镜检查
- C. 分段诊断性刮宫
- D. 子宫颈活体组织检查
- E. 子宫颈刮片细胞学检查

4. 模拟题 患者, 女, 31 岁。已婚, 月经正常。妇科检查发现: 子宫大小正常, 右侧附件及一拳头大小、表面光滑、活动的囊性包块, 最大的可能是( )

- A. 卵巢恶性肿瘤
- B. 卵巢良性肿瘤
- C. 子宫肌瘤
- D. 黄素囊肿

E. 早期妊娠

5. 模拟题 患者,女,45岁。因月经过多继发贫血2年,妇科检查:宫颈轻度糜烂,子宫如孕3个月大小,凹凸不平,双附件正常。该患者最可能的诊断是( )

- A. 功能失调性子宫出血
- B. 子宫肌瘤
- C. 妊娠
- D. 子宫颈癌
- E. 子宫内膜癌

6. 模拟题 患者,女,45岁。因月经过多继发贫血2年,妇科检查:宫颈轻度糜烂,子宫如孕3个月大小,凹凸不平,双附件正常。该患者月经过多的原因是( )

- A. 营养不良
- B. 自主神经紊乱
- C. 子宫内膜面积增大
- D. 激素分泌紊乱
- E. 造血功能障碍

7. 模拟题 治疗卵巢肿瘤的主要方法是( )

- A. 孕激素治疗
- B. 化疗
- C. 放疗
- D. 手术治疗
- E. 综合治疗

8. 模拟题 子宫内膜癌的检查方法( )

- A. 内窥镜检查术
- B. 生殖道细胞学检查
- C. 诊断性刮宫
- D. 输卵管通畅术
- E. 阴道后穹窿穿刺术

9. 模拟题 卵巢功能的检查方法是( )

- A. 内窥镜检查术
- B. 生殖道细胞学检查
- C. 诊断性刮宫
- D. 输卵管通畅术
- E. 阴道后穹窿穿刺术

10. 模拟题 关于子宫肌瘤临床表现,下列说法错误的是( )

- A. 子宫颈部肌瘤少见
- B. 各种肌瘤以肌壁间肌瘤最多见
- C. 各类肌瘤均引起月经量增多
- D. 绝经后肌瘤有萎缩趋向
- E. 症状的轻重与肌瘤部位及数目、大小有关

11. 模拟题 王女士,50岁。不规则阴道流血、流液半年。检查:宫颈为菜花样组织,子宫体大小正常,活动差,考虑为宫颈癌,应做哪项检查( )

- A. 宫颈刮片细胞学检查
- B. 阴道镜检查

C. 分段诊刮

D. 宫颈和颈管活组织检查

E. 碘试验

12. 模拟题 患者,女,32岁。已婚,未育,继发性痛经呈进行性加重,腰骶及下腹部疼痛。医生诊断为子宫内膜异位症,采取期待治疗,护士指导患者随访的时间是( )

- A. 2个月随访一次
- B. 8个月随访一次
- C. 3~6个月随访一次
- D. 1年随访一次
- E. 2年随访一次

13. 模拟题 关于宫颈癌患者临床表现的描述中错误的是( )

- A. 早期宫颈癌患者可无自觉症状
- B. 患者一旦患病,则出现阴道大量出血
- C. 晚期患者可出现大量脓性或米汤样恶臭白带
- D. 宫颈癌的癌前病变称为宫颈上皮内瘤样病变
- E. 多发生于育龄期和老年女性

14. 真题 2013-X049 女性,42岁。因接触性出血就诊,检查结果为重度宫颈糜烂。要排除宫颈癌,首选的检查是( )

- A. 子宫颈刮片
- B. 子宫颈活检
- C. 子宫颈黏液检查
- D. 阴道镜检查
- E. 诊断性刮宫

15. 模拟题 患者,女,30岁。经确诊患有畸胎瘤,经手术回病房后2小时出现血压升高、心率过快、肌紧张、呼吸急促、出汗等症状。引起以上症状的原因是( )

- A. 心脏病
- B. 心理紧张
- C. 感染
- D. 强烈疼痛
- E. 尿潴留

16. 模拟题 子宫内膜异位症的典型症状为( )

- A. 不孕
- B. 月经异常
- C. 性交不适
- D. 继发性痛经
- E. 下腹痛

17. 模拟题 患者年龄分布呈现双峰状的肿瘤是( )

- A. 子宫肌瘤
- B. 子宫颈癌
- C. 子宫内膜癌
- D. 卵巢恶性肿瘤
- E. 子宫内膜异位症

18. 模拟题 子宫切除患者手术前留置导尿管的目的是

( )

- A. 保持会阴部清洁干燥
- B. 收集无菌尿标本做细菌培养
- C. 测定残余尿
- D. 避免术中误伤膀胱
- E. 避免术后泌尿系统感染

19. 真题 2017-X017 患者女, 经产妇, 39 岁。一年来月经量增多, 经期持续 4~14 天。检查: 子宫如孕 3 个月大小, 凹凸不平, 双附件无异常, 血红蛋白 90g/L。诊断为子宫肌瘤, 恰当的处理为( )

- A. 随访观察
- B. 手术治疗
- C. 放射治疗
- D. 中药治疗
- E. 激素治疗

20. 模拟题 宫颈癌筛选最好采用的检查技术是( )

- A. 输卵管畅通术
- B. 诊断性刮宫术
- C. 子宫颈活组织检查术
- D. 阴道后穹窿穿刺术
- E. 阴道及宫颈细胞学检查

21. 模拟题 患者, 女, 36 岁。自述心慌、怕热、易饿、多汗, 检查双侧甲状腺对称性弥漫性肿大, 突眼, 心率 128 次/分, 基础代谢率 (BMR) 测定为 +45%。患者拟行手术治疗, 术前为抑制甲状腺素的释放, 并使腺体缩小变硬, 常用的药物是( )

- A. 复方碘化钾溶液
- B. 普萘洛尔 (心得安)
- C. 他巴唑
- D. 丙硫氧嘧啶
- E. 地西泮 (安定)

22. 模拟题 57 岁妇女, 绝经 10 年出现阴道不规则流血。妇检: 宫颈光滑, 宫体稍大, 质软, 活动良, 附件(-)。经检查确诊为宫体癌 II 期, 首选的治疗方法为( )

- A. 化学疗法
- B. 放射疗法
- C. 子宫全切术
- D. 手术和放射疗法相结合
- E. 孕激素治疗

23. 模拟题 57 岁妇女, 绝经 10 年出现阴道不规则流血。妇检: 宫颈光滑, 宫体稍大, 质软, 活动良, 附件(-)。为进一步确诊, 需做的检查项目是( )

- A. 双合诊
- B. 三合诊
- C. 宫颈刮片
- D. 分段诊刮
- E. 宫颈细胞学检查

24. 模拟题 57 岁妇女, 绝经 10 年出现阴道不规则流血。妇检: 宫颈光滑, 宫体稍大, 质软, 活动良, 附件

(-)。初步诊断宫体癌, 最支持诊断的依据为( )

- A. 57 岁
- B. 绝经后阴道不规则流血
- C. 宫体大
- D. 阴道黏膜菲薄
- E. 宫颈光滑

25. 模拟题 宫颈癌的早期筛查方法是( )

- A. 内窥镜检查术
- B. 生殖道细胞学检查
- C. 诊断性刮宫
- D. 输卵管通畅术
- E. 阴道后穹窿穿刺术

26. 模拟题 确诊宫颈癌最可靠的辅助检查方法是( )

- A. 宫颈刮片细胞学检查
- B. 碘试验
- C. 宫颈和宫颈管活体组织检查
- D. 阴道镜检查
- E. B 型超声

27. 真题 2015-J010 子宫颈癌的好发部位是( )

- A. 宫颈阴道部
- B. 宫颈鳞柱状上皮交界处
- C. 子宫颈管内
- D. 子宫峡部
- E. 子宫颈外口

28. 真题 2015-X077 患者, 女, 52 岁。单位体检发现子宫肌瘤。妇科检查: 子宫小于 2 个月妊娠大小, 患者无不适主诉。考虑最佳的处理方法是( )

- A. 药物治疗
- B. 定期随访
- C. 子宫肌瘤切除术
- D. 次全子宫切除术
- E. 行全子宫切除术

29. 真题 2015-X072 患者, 女, 65 岁。阴道分泌物增多伴出血 3 个月。经宫颈病理等检查临床诊断为宫颈鳞状细胞癌 I a 期。应行( )

- A. 全身化学治疗
- B. 手术治疗
- C. 宫颈物理治疗
- D. 宫颈局部用药
- E. 肿瘤细胞减灭术

30. 真题 2014-X056 女性, 40 岁。月经量增多, 月经周期缩短 2 年。妇科检查, 子宫增大约妊娠 3 个月大小, 质硬, 凹凸不平, 双附件(-)。最可能的诊断是( )

- A. 功能失调性子宫出血
- B. 子宫内膜癌
- C. 子宫颈癌
- D. 子宫肌瘤
- E. 围绝经期

31. 真题 2013-Z061 子宫颈癌的早期症状是( )

- A. 腹部包块
- B. 绝经后出血
- C. 接触性出血
- D. 阴道排液
- E. 腹痛

32. 真题 2011-Z048 常以性激素分泌紊乱为首发症状, 为低度恶性的卵巢肿瘤, 多发于 45-55 岁妇女, 可诊断为( )

- A. 无性细胞瘤
- B. 颗粒细胞瘤
- C. 未成熟畸胎瘤
- D. 黏液性囊腺癌
- E. 浆液性囊腺癌

33. 真题 2011-X049 可疑宫颈癌患者进行碘试验的目的是( )

- A. 预防碘过敏
- B. 选择治疗方法
- C. 筛查早期宫颈癌
- D. 确定肿瘤的临床分期
- E. 确定活组织取材部位

34. 真题 2011-J010 子宫颈癌的好发部位是( )

- A. 宫颈阴道部
- B. 宫颈鳞-柱状上皮交界处
- C. 子宫颈管内
- D. 宫峡部
- E. 子宫颈外口

35. 真题 2010-X067 患者, 女, 65 岁。阴道分泌物增多伴出血 3 个月, 经宫颈病理等检查临床诊断为宫颈鳞状细胞癌 IA 期, 应行( )

- A. 全身化学治疗
- B. 手术治疗
- C. 宫颈物理治疗
- D. 宫颈局部用药
- E. 肿瘤细胞减灭术

36. 真题 2010-X063 患者, 女, 经产妇, 39 岁。1 年来经量增多, 经期持续 4-14 天。检查: 子宫如孕 3 个月大小, 凹凸不平, 双附件无异常, 血红蛋白 90g/L, 诊断为子宫肌瘤。恰当的处理为( )

- A. 随访观察
- B. 手术治疗
- C. 放射治疗
- D. 中药治疗
- E. 激素治疗

37. 真题 2010-J100 可发生于任何年龄, 死亡率为妇科恶性肿瘤之首的是( )

- A. 子宫肌瘤
- B. 子宫颈癌

- C. 子宫内膜癌
- D. 卵巢恶性肿瘤
- E. 子宫内膜异位症

38. 真题 2010-J099 患病年龄分布呈现双峰状的肿瘤是( )

- A. 子宫肌瘤
- B. 子宫颈癌
- C. 子宫内膜癌
- D. 卵巢恶性肿瘤
- E. 子宫内膜异位症

39. 真题 2015-Z033 术前需要涂甲紫的妇科手术是( )

- A. 全子宫切除术
- B. 子宫肌瘤剔除术
- C. 阴式子宫切除术
- D. 卵巢囊肿剔除术
- E. 阴道前后壁修补术

40. 真题 2016-J051 妇科恶性肿瘤中死亡率最高的是( )

- A. 卵巢癌
- B. 子宫颈癌
- C. 子宫内膜癌
- D. 前庭大腺癌
- E. 外阴癌

41. 模拟题 下列不属于卵巢黄素囊肿特点的是( )

- A. 多为双侧
- B. 偶可发生急性扭转
- C. 囊肿壁厚
- D. 由 HCG 刺激产生
- E. 多见于葡萄胎或绒毛膜癌

42. 模拟题 较常见的卵巢良性肿瘤为( )

- A. 颗粒细胞瘤
- B. 卵泡膜细胞瘤
- C. 纤维瘤
- D. 变异性细胞-间质细胞瘤
- E. 无性细胞瘤

43. 真题 2010-J057 子宫肌瘤发生的相关因素是( )

- A. 早婚早育, 性生活紊乱
- B. 高血压, 糖尿病, 肥胖
- C. 体内雌激素水平过高
- D. 饮食因素
- E. 环境因素

44. 真题 2016-Z088 子宫颈癌术后随访时间是( )

- A. 2 年
- B. 3 年
- C. 4 年
- D. 5 年
- E. 5 年以上

45. 真题 2016-Z071 患者女, 35 岁。单位查体可疑子宫肌瘤, 到医院就诊。妇科检查: 子宫处可扪及有蒂与子宫相连球状物, 质地较硬。此患者的子宫肌瘤最可能是( )

- A. 肌壁间肌瘤
- B. 黏膜下肌瘤
- C. 浆膜下肌瘤
- D. 子宫颈肌瘤
- E. 阔韧带肌瘤

46. 真题 2016-X035 子宫肌瘤小, 无症状或已接近绝经期的病人应( )

- A. 随访观察
- B. 全子宫切除术
- C. 放疗
- D. 化疗
- E. 全子宫及双附件切除术

47. 真题 2015-Z063 患者, 女, 38 岁。子宫内位异位症病史 1 年。该患者最主要的临床表现是( )

- A. 痛经
- B. 腹泻
- C. 性交痛
- D. 月经淋漓不尽
- E. 持续性下腹部疼痛

48. 真题 2018-J063 子宫肌瘤发生的相关因素是( )

- A. 环境因素
- B. 早婚早育, 性生活紊乱
- C. 体内雌激素水平过高
- D. 高血压, 糖尿病, 肥胖
- E. 饮食因素

49. 真题 2017-J092 诊断子宫内膜癌的首选方法是( )

- A. B 超检查
- B. 宫颈刮片
- C. 分段诊刮
- D. 绒毛膜促性腺激素测定
- E. 宫颈活组织检查

50. 真题 2018-X098 确定宫颈癌前期病变和宫颈癌最可靠的方法是( )

- A. 宫颈刮片细胞学检查
- B. 碘试验
- C. 氮激光肿瘤固有荧光诊断法
- D. 阴道镜检查
- E. 宫颈和宫颈管活组织病理检查

51. 真题 2018-X099 早期发现宫颈癌的重要方法是( )

- A. 宫颈刮片细胞学检查
- B. 碘试验
- C. 氮激光肿瘤固有荧光诊断法
- D. 阴道镜检查
- E. 宫颈和宫颈管活组织病理检查

52. 真题 2019-X024 关于子宫肌瘤的治疗方法, 不正确的是( )

- A. 近绝经期症状不明显定期观察
- B. 肌瘤生长迅速需手术
- C. 妊娠期肌瘤红色变性可暂不手术
- D. 青年妇女尚未生育者可不作手术
- E. 黏膜下有蒂肌瘤行阴道内摘除

53. 真题 2019-Z070 妇科腹部手术备皮范围正确的是( )

- A. 上至剑突, 下至两大腿上 1/3, 两侧至腋中线包括会阴部
- B. 上至剑突, 下至两大腿上 1/3, 两侧至腋中线不包括会阴部
- C. 上至乳头, 下至两大腿上 1/3, 两侧至腋中线包括会阴部
- D. 上至剑突, 下至两大腿上 1/2, 两侧至腋中线包括会阴部
- E. 上至剑突, 下至两大腿上 1/2, 两侧至腋中线不包括会阴部

54. 真题 2019-J012 子宫颈癌的好发部位是( )

- A. 宫颈阴道部
- B. 宫颈鳞-柱状上皮交界处
- C. 子宫颈管内
- D. 子宫峡部
- E. 子宫颈外口

## 十七. 外阴、阴道手术病人的护理

1. 真题 2011-X063 患者, 女, 30 岁。因不慎跌倒, 导致外阴裂伤, 右侧大阴唇裂口约 3cm, 活动性出血, 下列处理错误的是( )

- A. 建立静脉通道
- B. 给予止血药物
- C. 给予抗感染药物
- D. 给予止痛药
- E. 阴道塞纱布止血

2. 模拟题 子宫脱垂 III 度是指( )

- A. 宫颈外口距处女膜缘 < 4cm, 未达处女膜缘
- B. 宫颈已达处女膜缘, 阴道口可见子宫颈
- C. 宫颈脱出阴道口, 宫体仍在阴道内
- D. 宫颈及部分宫体已脱出阴道口
- E. 宫颈及宫体全部脱出阴道口外

3. 模拟题 患者, 女, 65 岁, 患有 II 度子宫脱垂, 合并阴道前后壁膨出, 行阴式子宫全切术加阴道前后壁修补术, 术后护理措施正确的是( )

- A. 术后 3 天可以盆浴
- B. 保持外阴部清洁
- C. 术后进普通饮食
- D. 术后取头高足低位
- E. 1 个月后可参加正常劳动

4. 真题 2016-X055 外阴癌最常发生的部位是( )

- A. 阴阜
- B. 阴蒂
- C. 阴道
- D. 大阴唇
- E. 小阴唇

5. 真题 2015-X061 患者,女,60岁。外阴菜花样肿物,经病理检查为外阴鳞状细胞癌 I 期,未见转移征象。该患者的治疗首选( )

- A. 手术治疗
- B. 化学药物治疗
- C. 放射治疗
- D. 手术+放射治疗
- E. 手术+化疗

6. 真题 2014-X057 子宫脱垂是指子宫颈外口达( )

- A. 坐骨结节水平以上
- B. 坐骨结节水平以下
- C. 坐骨棘水平以上
- D. 坐骨棘水平以下
- E. 骶尾骨以下

7. 真题 2014-J054 外阴局部损伤易形成水肿的部位是( )

- A. 阴阜
- B. 小阴唇
- C. 大阴唇
- D. 阴蒂
- E. 阴道前庭

8. 模拟题 阴道灌洗适用于( )

- A. 产褥期
- B. 月经期
- C. 全子宫切除术前
- D. 会阴侧切术后
- E. 昏迷卧床患者

9. 真题 2017-X011 患者女,60岁子宫脱垂 I 度轻型,下列治疗原则正确的是( )

- A. 加强运动
- B. 手术治疗
- C. 放射治疗
- D. 使用子宫托
- E. 增强腹压

10. 真题 2018-X023 子宫脱垂非手术治疗适用于( )

- A. 合并阴道膨出
- B. I 度
- C. III 度
- D. 合并直肠膨出
- E. II 度

11. 真题 2018-J079 外阴阴道术后患者应采取半卧位

的是( )

- A. 外阴癌术后
- B. 盆腔修补术后
- C. 阴道前后壁修补术后
- D. 外阴根治术
- E. 处女膜闭锁及有子宫的先天性无阴道

## 十八.不孕症妇女护理

1. 真题 2016-J071 患者女,29岁。婚后4年,性生活正常,未避孕,未孕,月经正常。经检查男方精液正常,女方宫颈糜烂, B 超检查子宫黏膜下肌瘤,双附件正常,基础体温双向,该患者不孕的原因可能是( )

- A. 子宫内膜异位症
- B. 子宫肌瘤
- C. 无排卵
- D. 黄体发育不全
- E. 黄体萎缩不全

2. 真题 2010-J039 女性不孕因素中最常见的因素是( )

- A. 排卵障碍
- B. 输卵管因素
- C. 子宫因素
- D. 宫颈因素
- E. 阴道因素

3. 真题 2016-Z036 试管婴儿的主要适应证是( )

- A. 无排卵
- B. 无精症
- C. 免疫性不孕
- D. 输卵管不通
- E. 子宫发育不良

4. 真题 2015-Z055 28岁已婚女性,性生活正常,婚后3年未孕。护士在指导其提高受孕率技巧时应除外( )

- A. 减轻精神压力,保持健康状态
- B. 与伴侣加强沟通
- C. 性交前、中、后使用阴道润滑剂
- D. 性交后卧床抬高臀部
- E. 排卵期适当增加性交次数

5. 真题 2014-X058 女方生殖器官不孕病因的检查中,下列最有诊断价值的项目是( )

- A. 超声检查
- B. 内分泌检查
- C. 子宫输卵管碘油造影
- D. 宫腔镜腹腔镜联合检查
- E. 腹腔镜检查

6. 真题 2018-Z005 下列提高妊娠率的措施中,错误的是( )

- A. 性交时避免精神紧张
- B. 性交后立即入厕
- C. 性交后适当抬高臀部

- D. 排卵期增加性交次数
- E. 注重营养, 增强体质

7. 真题 2014-J068 29 岁不孕症患者, 夫妇双方检查: 男方精液常规结果正常, 女方连续测定基础体温呈单相型。该患者不孕的原因是( )

- A. 自身免疫
- B. 同种免疫
- C. 卵巢无排卵
- D. 宫颈管狭窄
- E. 慢性输卵管炎

8. 真题 2013-X078 患者, 女, 30 岁。发育良好, 婚后 2 年未孕, 经检查基础体温双相, 子宫内膜病理为分泌期改变。男方精液常规检查为正常。上述检查发现有异常, 应采用的治疗方案是( )

- A. 异常部位活检送病理
- B. 氯米芬促排卵
- C. 抗感染治疗
- D. 输卵管通液治疗
- E. 服己烯雌酚

9. 真题 2013-X077 患者, 女, 30 岁。发育良好, 婚后 2 年未孕, 经检查基础体温双相, 子宫内膜病理为分泌期改变。男方精液常规检查为正常。该患者需要做的进一步检查是( )

- A. 输卵管通畅检查
- B. 女性激素测定
- C. 阴道镜检查
- D. 腹腔镜检查
- E. B 超监测卵泡发育

10. 真题 2011-Z070 患者, 女, 33 岁。因卵巢功能障碍给予辅助生育治疗。使用促排卵药物后出现下腹胀痛、腹水、胸水, B 超示卵巢明显增大。该患者首先考虑( )

- A. 输卵管妊娠破裂
- B. 药物过敏
- C. 多胎妊娠
- D. 卵巢过度刺激综合征
- E. 卵巢肿瘤

11. 真题 2010-Z043 下列提高妊娠率的措施中, 错误的是( )

- A. 性交时避免精神紧张
- B. 性交后立即如厕
- C. 性交后适当抬高臀部
- D. 排卵期增加性交次数
- E. 注重营养, 增强体质

12. 模拟题 对不孕症进行诊断性刮宫的时间为( )

- A. 月经来潮 24 小时内
- B. 月经来潮 48 小时内
- C. 月经来临前
- D. 月经末期
- E. 排卵期

13. 真题 2017-J078 试管婴儿是指( )

- A. 人工授精 (AI)
- B. 体外受精与胚胎移植 (IVF-ET)
- C. 配子输卵管内移植 (GIFT)
- D. 配子宫腔内移植 (GIUT)
- E. 配子经阴道输卵管内移植 (TV-GIFT)

14. 真题 2019-Z009 患者, 女, 33 岁。因卵巢功能障碍给予辅助生育技术治疗。使用促排卵药物后出现下腹胀痛、腹水、胸水, B 超示卵巢明显增大, 该患者首先考虑( )

- A. 输卵管妊娠破裂
- B. 药物过敏
- C. 多胎妊娠
- D. 卵巢过度刺激综合征
- E. 卵巢肿瘤

15. 真题 2019-J041 卵巢因素导致不孕的根本原因是( )

- A. 不排卵
- B. 多囊卵巢
- C. 卵裂异常
- D. 影响受精
- E. 精卵结合异常

## 十九. 计划生育妇女的护理

1. 真题 2010-Z092 口服药物流产适用于( )

- A. 孕 7 周内
- B. 孕 7-10 周
- C. 孕 11-14 周
- D. 孕 15-24 周
- E. 孕 25-28 周

2. 真题 2016-X095 人工流产术中, 受术者感到下腹部撕裂样疼痛, 术者探测宫腔有“无底”感觉, 应考虑为( )

- A. 吸宫不全
- B. 术后感染
- C. 子宫穿孔
- D. 羊水栓塞
- E. 人工流产综合征

3. 真题 2016-X096 人工流产术后 2 周仍有阴道流血, 量较多, 应考虑为( )

- A. 吸宫不全
- B. 术后感染
- C. 子宫穿孔
- D. 羊水栓塞
- E. 人工流产综合征

4. 模拟题 建议哺乳期妇女首选的避孕方法是( )

- A. 长效口服避孕药



- B. 探亲避孕药
- C. 安全期避孕法
- D. 工具避孕法
- E. 短效口服避孕药

5. 模拟题 下列有关口服避孕药的指导, 错误的是( )

- A. 哺乳期妇女不宜服用避孕药
- B. 需妥善保管口服避孕药
- C. 注射避孕针剂时, 注意将安瓿中药液吸尽
- D. 注射避孕针后应观察 15 分钟方可离开
- E. 计划受孕者, 停药后即可受孕

6. 模拟题 放置宫内节育器后出现腰酸腹胀的原因是( )

- A. 节育器与宫腔大小或形态不符
- B. 宫腔感染
- C. 肠痉挛
- D. 节育器嵌顿
- E. 节育器异位

7. 真题 2016-X094 人工流产术中, 受术者出现面色苍白、出汗、心率缓慢, 应考虑为( )

- A. 吸宫不全
- B. 术后感染
- C. 子宫穿孔
- D. 羊水栓塞
- E. 人工流产综合征

8. 真题 2016-J038 育龄妇女放置宫内节育器的时间, 不恰当的是( )

- A. 月经干净 3~7 天
- B. 产后 3 个月
- C. 剖宫产术后 1 年
- D. 哺乳期排除早孕者
- E. 人工流产术后出血少、宫腔长度 < 10cm 者

9. 真题 2010-Z093 人工流产钳刮术适用于( )

- A. 孕 7 周内
- B. 孕 7-10 周
- C. 孕 11-14 周
- D. 孕 15-24 周
- E. 孕 25-28 周

10. 真题 2011-J080 患者, 女, 48 岁。2 年来月经周期不规则, 持续时间长, 经量增加。咨询避孕措施, 应指导其选用( )

- A. 阴茎套
- B. 长效避孕针
- C. 宫内节育器
- D. 安全期避孕
- E. 短效口服避孕药

11. 真题 2013-J005 目前我国育龄妇女采用的主要避孕措施是( )

- A. 安全期避孕
- B. 宫内节育器
- C. 短效口服避孕药
- D. 速效避孕药
- E. 皮下埋置缓释系统避孕药

12. 真题 2013-X050 避孕及防止性传播疾病最好的措施是( )

- A. 皮下埋植药物
- B. IUD
- C. 阴道隔膜加杀精药
- D. 安全期避孕法
- E. 避孕套加避孕药膏

13. 真题 2013-Z062 护士指导妇女放置宫内节育器的时间, 正确的是( )

- A. 月经来潮前 1 天
- B. 月经来潮前 3-7 天
- C. 月经干净后 1 天
- D. 月经干净后 3-7 天
- E. 非月经期的任何时间

14. 真题 2013-Z063 放置宫内节育器术中及术后的处理错误的是( )

- A. 术中随时观察受术者的情况
- B. 嘱术后者如有出血多、腹痛、发热等情况随时就诊
- C. 术后休息 3 天
- D. 1 周内禁止性生活
- E. 术后于 1、3、6 个月及 1 年, 分别复查 1 次

15. 真题 2014-J075 患者, 女, 48 岁。2 年来月经周期不规则, 持续时间长, 经量增加。咨询避孕措施, 应指导其选用( )

- A. 阴茎套
- B. 长效避孕针
- C. 宫内节育器
- D. 安全期避孕
- E. 短效口服避孕药

16. 真题 2014-J083 32 岁女士, 已婚。口服避孕药进行避孕已 2 年, 因工作忙当晚漏服, 护士告知补服时间为性交后( )

- A. 3 小时内
- B. 6 小时内
- C. 9 小时内
- D. 12 小时内
- E. 24 小时内

17. 真题 2014-X059 口服避孕药的作用正确的是( )

- A. 使子宫内膜发生无菌性炎症反应
- B. 使宫颈黏液变稀薄, 不利于精子通过
- C. 影响精子获能

- D. 抑制排卵
- E. 改变宫腔内环境

18. 真题 2014-X060 女, 30 岁。G2P1, 妊娠 60 天需终止妊娠, 最常用的方法是( )

- A. 钳刮术
- B. 吸宫术
- C. 静脉滴注催产素
- D. 利凡诺羊膜腔内注射
- E. 药物流产

19. 真题 2015-J047 育龄健康妇女服用短效口服避孕药物的副作用不包括( )

- A. 类早孕反应
- B. 月经改变
- C. 体重增加
- D. 色素沉着
- E. 腰酸、腹胀

20. 真题 2016-J017 目前我国育龄妇女采用的主要避孕措施是( )

- A. 安全期避孕
- B. 宫内节育器
- C. 短效口服避孕药
- D. 速效避孕药
- E. 皮下埋植缓释系统避孕药

21. 模拟题 葡萄胎患者随访期间, 宜选用避孕方式是( )

- A. 阴茎套
- B. 放置宫内节育器
- C. 避孕药
- D. 安全期
- E. 体外排精

22. 真题 2019-X082 人工流产术后 2 周仍有阴道流血较多, 应考虑为( )

- A. 吸宫不全
- B. 术后感染
- C. 子宫穿孔
- D. 羊水栓塞
- E. 人工流产综合征

23. 真题 2019-X081 人工流产术中, 受术者感到下腹撕裂样疼痛, 术者探测宫腔有“无底”感觉, 应考虑为( )

- A. 吸宫不全
- B. 术后感染
- C. 子宫穿孔
- D. 羊水栓塞
- E. 人工流产综合征

24. 真题 2019-X080 人工流产术中, 受术者出现面色苍白、出汗、心率缓慢, 应考虑为( )

- A. 吸宫不全

- B. 术后感染
- C. 子宫穿孔
- D. 羊水栓塞
- E. 人工流产综合征

25. 真题 2019-J043 患者, 女, 48 岁, 2 年来月经期不规则, 持续时间长, 经量增加, 咨询避孕措施, 应指导其选用( )

- A. 阴茎套
- B. 长效避孕针
- C. 宫内节育器
- D. 安全期避孕
- E. 短效口服避孕药

## 二十. 妇女保健

1. 真题 2017-J097 36 岁女性属于( )

- A. 儿童期
- B. 青春期
- C. 性成熟期
- D. 围绝经期
- E. 老年期

2. 真题 2017-J098 50 岁女性属于( )

- A. 儿童期
- B. 青春期
- C. 性成熟期
- D. 围绝经期
- E. 老年期

## 二十一. 妇产科常用护理技术

1. 真题 2014-X061 一般情况下可做阴道灌洗的时期是( )

- A. 月经期
- B. 妊娠期
- C. 产褥期
- D. 排卵期
- E. 阴道流血期

## 二十二. 妇产科诊疗及手术病人护理

1. 模拟题 宫腔镜检查的适应症不正确的是( )

- A. 宫内节育器的定位与取出
- B. 宫内异物取出
- C. 输卵管粘连的治疗
- D. 子宫异常出血的探查
- E. 早期宫内妊娠

2. 模拟题 输卵管通畅试验的适宜时间为( )

- A. 月经来潮前 10 天
- B. 排卵前 24 小时
- C. 排卵后 48 小时
- D. 月经干净后 3~7 天
- E. 月经干净后 10 天

3. 模拟题 会阴部手术时, 皮肤消毒下列哪项忌用( )

- A. 0.5%氯己定醇
- B. 0.5%PVP-碘
- C. 2.5%碘酊
- D. 0.1%苯扎溴胺
- E. 0.1%硫柳汞酊

4. 真题 2015-X083 初产妇, 28岁。24小时前行会阴侧切术分娩一男婴, 会阴水肿明显。护理措施错误的是( )

- A. 会阴擦洗
- B. 评估会阴切口
- C. 95%酒精湿热敷
- D. 50%硫酸镁湿热敷
- E. 会阴切口患侧卧位

5. 真题 2015-X076 初产妇, 33岁, 妊娠39周。不规则宫缩3小时。B超检查: 胎头双顶径为10cm。该孕妇最适合的分娩方式是( )

- A. 剖宫产
- B. 自然分娩
- C. 胎头吸引
- D. 产钳助产
- E. 会阴侧切

6. 真题 2016-X045 正常会阴侧切切口拆线时间为产后( )

- A. 1~2天
- B. 2~3天
- C. 3~5天
- D. 5~6天
- E. 7天

7. 真题 2015-X052 需立即进行剖宫产术的征象是出现( )

- A. 生理性缩复环
- B. 病理性缩复环
- C. 痉挛性狭窄环
- D. 协调性宫缩乏力
- E. 不协调性宫缩乏力

8. 真题 2014-X062 会阴后侧切开缝合完毕, 最重要的是( )

- A. 行肛门指诊
- B. 行阴道检查
- C. 清点器械纱布
- D. 消毒皮肤黏膜
- E. 给予抗生素预防感染

9. 模拟题 分段诊刮顺序是( )

- A. 先刮宫颈外口, 后刮宫颈内口
- B. 先刮宫颈内口, 后刮宫颈外口
- C. 先刮宫腔, 后刮宫颈管
- D. 先刮宫颈管, 后刮宫腔

E. 由内向外, 按顺序刮出

10. 真题 2010-X065 初产妇, 剖宫产后第6天顺利出院。护士交代其产后复查的时间是( )

- A. 产后2周
- B. 产后3周
- C. 产后4周
- D. 产后5周
- E. 产后6周