

全国初级护师考试

# 初级护师考试 章节真题及精解

第五篇 儿科护理学

## 二.小儿保健

1. 真题 2016-Z001 下列疫苗需要皮内注射的是( )

- A. 卡介苗
- B. 乙肝疫苗
- C. 脊髓灰质炎减毒活疫苗
- D. 百白破缓和制剂
- E. 麻疹减毒活疫苗

2. 真题 2014-Z062 卡介苗初种年龄是( )

- A. 出生后 2-3 天
- B. 2 个月以上
- C. 3 个月以上
- D. 8 个月以上
- E. 1 岁以上

3. 真题 2015-J007 儿童 5 岁时的体重按公式粗略估计为( )

- A. 13kg
- B. 14kg
- C. 15kg
- D. 16kg
- E. 18kg

4. 真题 2018-J003 女性进入青春期的标志是( )

- A. 乳房丰满
- B. 阴毛、腋毛生长
- C. 月经初潮
- D. 皮下脂肪增多
- E. 声调变高

5. 真题 2015-J021 大多数婴儿会叫“爸爸”、“妈妈”的时期是( )

- A. 3-4 个月
- B. 5-6 个月
- C. 7-8 个月
- D. 10-12 个月
- E. 1.5 岁

6. 真题 2015-J037 最能反映小儿体格生长, 营养状况的指标是( )

- A. 身长
- B. 头围
- C. 体重
- D. 胸围
- E. 皮下脂肪

7. 真题 2015-Z013 正常情况下, 7 个月的小儿尚未接种过的疫苗是( )

- A. 卡介苗
- B. 麻疹疫苗
- C. 脊髓灰质炎疫苗
- D. 乙肝疫苗
- E. 百白破疫苗

8. 真题 2015-Z090 卡介苗的接种方法是( )

- A. 上臂三角肌肌内注射
- B. 左上臂三角肌上端外缘皮下注射
- C. 左上臂三角肌下端外缘皮内注射
- D. 右前臂掌侧中、下 1/3 交界处皮内注射
- E. 右前臂掌侧中、上 1/3 交界处皮内注射

9. 真题 2015-Z092 乙肝疫苗的接种方法是( )

- A. 上臂三角肌肌内注射
- B. 左上臂三角肌上端外缘皮下注射
- C. 左上臂三角肌下端外缘皮内注射
- D. 右前臂掌侧中、下 1/3 交界处皮内注射
- E. 右前臂掌侧中、上 1/3 交界处皮内注射

10. 真题 2017-J008 新生儿期是指( )

- A. 自出生脐带结扎起至生后 7 天
- B. 自出生脐带结扎起至生后 28 天
- C. 胎龄满 28 周至出生后 30 天
- D. 出生后到满 30 天
- E. 出生后到满 100 天

11. 真题 2018-J009 5 岁小儿, 按年龄阶段划分属于( )

- A. 婴儿期
- B. 幼儿期
- C. 学龄前期
- D. 学龄期
- E. 青春期

12. 真题 2014-J067 4 个月婴儿, 母乳喂养, 来儿保门诊咨询, 家长述说婴儿除喂奶外, 已加喂鱼肝油、菜水及米面糊, 现应指导家长再添加的辅食为( )

- A. 面条
- B. 蛋黄
- C. 碎肉
- D. 饼干
- E. 馒头

13. 真题 2017-J010 小儿年龄阶段的划分中, 婴儿期是指( )

- A. 出生~28 天
- B. 出生~1 岁
- C. 2~3 岁
- D. 4~5 岁
- E. 6~7 岁

14. 真题 2014-J036 小儿前囟晚闭最常见于( )

- A. 脱水
- B. 甲状腺功能亢进
- C. 佝偻病
- D. 小头畸形
- E. 极度消瘦

15. 真题 2014-X066 反映骨骼发育的重要指标是( )

- A. 体重

- B. 身长
- C. 出牙早迟
- D. 囟门闭合情况
- E. 头围与胸围比例

16. 真题 2011-J018 正常小儿前卤闭合的时间最迟不超过( )

- A. 3-4 个月
- B. 5-6 个月
- C. 12 个月
- D. 18 个月
- E. 24 个月

17. 真题 2010-J075 4 个月婴儿, 母乳喂养, 来儿保门诊咨询, 家长述说婴儿除喂奶外, 已加喂鱼肝油、菜水及米面糊, 现应指导家长再添加的辅食为( )

- A. 面条
- B. 蛋黄
- C. 碎肉
- D. 饼干
- E. 馒头

18. 真题 2011-J073 6 岁小儿, 实测体重 23kg, 则其体重较正常体重值( )

- A. 偏少 1kg
- B. 增多 1kg
- C. 增多 2kg
- D. 增多 3kg
- E. 增多 5kg

19. 真题 2011-J074 5 个月小儿, 已添加菜汁、米汤, 母亲带其到儿保门诊健康咨询, 此时应指导家长给该小儿的辅食是( )

- A. 蛋黄
- B. 饼干
- C. 肉末
- D. 馒头
- E. 软饭

20. 真题 2013-J036 出生时存在, 而数月后消失的神经反射是( )

- A. 角膜反射
- B. 腹壁反射
- C. 握持反射
- D. 吞咽反射
- E. 膝腱反射

21. 真题 2013-J040 2 岁以内小儿乳牙数目正确的计算方法是( )

- A. 月龄-(2-4)
- B. 月龄-(4-6)
- C. 月龄-(2-8)
- D. 月龄-(2-10)
- E. 月龄-(6-12)

22. 真题 2013-J056 不属于小儿生长发育规律的是( )

- A. 生长发育的连续性
- B. 生长发育的阶段性的
- C. 各系统器官发育的平衡性
- D. 生长发育的个体差异
- E. 生长发育的顺序性

23. 真题 2013-Z064 某小儿, 重 9.6kg, 身长 75cm, 头围 46cm, 其年龄是( )

- A. 8 个月
- B. 10 个月
- C. 12 个月
- D. 14 个月
- E. 16 个月

24. 真题 2014-J035 小儿头围与胸围几乎相等的月龄是( )

- A. 6 个月
- B. 8 个月
- C. 10 个月
- D. 12 个月
- E. 18 个月

25. 真题 2016-J088 添加鱼肝油的月龄是( )

- A. 1~2 个月
- B. 3~4 个月
- C. 5~6 个月
- D. 7~9 个月
- E. 10~12 个月

26. 真题 2016-J069 健康查体, 小儿已萌出乳牙 18 颗, 头围 48cm。估计其最可能的年龄是( )

- A. 3 岁
- B. 2 岁
- C. 18 个月
- D. 12 个月
- E. 10 个月

27. 真题 2016-J090 添加肉末的月龄是( )

- A. 1~2 个月
- B. 3~4 个月
- C. 5~6 个月
- D. 7~9 个月
- E. 10~12 个月

28. 真题 2016-J089 添加蛋黄的月龄是( )

- A. 1~2 个月
- B. 3~4 个月
- C. 4~6 个月
- D. 7~9 个月
- E. 10~12 个月

29. 真题 2010-J032 正常小儿 20 颗乳牙出齐的时间为( )

- A. 1岁
- B. 1岁半
- C. 2岁半
- D. 3岁
- E. 3岁半

30. 模拟题 新生儿呼吸频率为( )

- A. 40~44次/分
- B. 20次/分
- C. 22次/分
- D. 24次/分
- E. 30次/分

31. 模拟题 小儿脑脊液蛋白总量为( )

- A. 0.1~0.2g/L
- B. 0.2~0.4g/L
- C. 0.3~0.6g/L
- D. 0.6~0.8g/L
- E. 0.8~1.0g/L

32. 真题 2014-X072 脊髓灰质炎减毒活疫苗初种次数为( )

- A. 1次
- B. 2次
- C. 3次
- D. 4次
- E. 5次

33. 模拟题 患儿,女,2岁。体重10kg,身高80cm,腹壁皮下脂肪厚度0.7cm,皮肤稍苍白。请判断该小儿的营养状况( )

- A. 重度营养不良
- B. 中度营养不良
- C. 轻度营养不良
- D. 正常
- E. 超重

34. 真题 2011-J002 有关婴儿期辅食添加原则,下列叙述不正确的是( )

- A. 由少到多
- B. 由粗到细
- C. 由稀到稠
- D. 由单一到多种
- E. 循序渐进

35. 模拟题 小儿,女,5岁。健康体检。父母咨询科学育儿知识,关心儿童的营养与热能供给问题。若计算小儿的热能需要量,应除外的项目是( )

- A. 食欲
- B. 基础代谢
- C. 活动所需
- D. 排泄
- E. 生长发育需要

36. 模拟题 小儿,女,5岁。健康体检。父母咨询科

学育儿知识,关心儿童的营养与热能供给问题。若小儿发热(38℃),应给予的最适饮食是( )

- A. 高蛋白、脂肪饮食
- B. 要素饮食
- C. 半流质饮食
- D. 流质饮食
- E. 低维生素饮食

37. 真题 2018-J033 小儿头围与胸围几乎相等的月龄是( )

- A. 8个月
- B. 10个月
- C. 18个月
- D. 12个月
- E. 6个月

38. 模拟题 患儿,女,1岁。来医院查体,体重8.5kg,身高75cm,头围46cm,囟门未闭合,家长焦急地询问护士,正常情况下小儿囟门闭合最迟的时间。护士答小儿囟门闭合最迟的时间应是( )

- A. 12个月
- B. 14个月
- C. 16个月
- D. 18个月
- E. 24个月

39. 模拟题 某小儿,出生体重为3.5kg,现体重为7kg,按公式计算其月龄为( )

- A. 3个月
- B. 5个月
- C. 6个月
- D. 8个月
- E. 10个月

40. 模拟题 2~3岁小儿呼吸频率为( )

- A. 40~44次/分
- B. 20次/分
- C. 22次/分
- D. 24次/分
- E. 30次/分

41. 模拟题 患儿,女,5岁。因胃部不适,需服用健胃宝,护士应指导患者( )

- A. 饭前服
- B. 用吸管服用
- C. 服药时加糖,中和苦味
- D. 饭后服
- E. 服药后多喝水

42. 模拟题 用未加热的牛奶喂养婴儿可能导致( )

- A. 铁利用障碍
- B. 铁丢失过多
- C. 生长发育快
- D. 铁摄入不足

E. 铁转运障碍

43. 模拟题 患儿, 5 个月。牛乳喂养, 家长来院咨询可添加的辅食是( )

- A. 果汁
- B. 碎肉
- C. 蛋黄
- D. 软饭
- E. 饼干

44. 模拟题 患儿, 女, 1 岁。来医院查体, 体重 8.5kg, 身高 75cm, 头围 46cm, 囟门未闭合, 家长焦急地询问护士, 正常情况下小儿囟门闭合最迟的时间。小儿囟门闭合延迟的常见原因是( )

- A. 脑萎缩
- B. 小脑畸形
- C. 发育不良
- D. 胆红素脑病
- E. 维生素 D 缺乏性佝偻病

45. 模拟题 2 岁小儿脉搏正常值为( )

- A. 100~120 次/分
- B. 120~140 次/分
- C. 110~130 次/分
- D. 80~100 次/分
- E. 70~90 次/分

46. 模拟题 极低出生胎儿体重是指( )

- A. 出生 1 小时内体重不足 2500g
- B. 出生 1 小时内体重不足 2000g
- C. 出生 1 小时内体重不足 1500g
- D. 出生 1 小时内体重不足 1300g
- E. 出生 1 小时内体重不足 1000g

47. 模拟题 某冬日, 一母亲咨询: 晨起见自己 8 个月女儿尿液呈乳白色, 其余无异常。其尿液呈乳白色的原因可能是( )

- A. 脓尿
- B. 尿酸结晶
- C. 盐类结晶
- D. 乳糜尿
- E. 蛋白尿

48. 模拟题 小儿原始反射中消失最晚的反射是( )

- A. 吞咽反射
- B. 呼吸反射
- C. 瞳孔反射
- D. 吸吮反射
- E. 颈肢反射

49. 模拟题 患儿, 女, 1 岁。来医院查体, 体重 8.5kg, 身高 75cm, 头围 46cm, 囟门未闭合, 家长焦急地询问护士, 正常情况下小儿囟门闭合最迟的时间。护士应给予的健康指导是( )

- A. 预防感染
- B. 减少户外活动
- C. 加强户外活动
- D. 增加脂肪摄入
- E. 增加蛋白质摄入

50. 模拟题 患儿, 女, 1 岁。来医院查体, 体重 8.5kg, 身高 75cm, 头围 46cm, 囟门未闭合, 家长焦急地询问护士, 正常情况下小儿囟门闭合最迟的时间。护士在与家长交流中, 发现家长给患儿添加辅食不够, 应给予的膳食指导是( )

- A. 米糊、菜泥、蛋黄
- B. 米粥、动物血、水果泥
- C. 烂面、肝泥、蛋
- D. 粥、肉末、肝泥
- E. 稠粥、面条、碎肉、豆制品

51. 模拟题 1 岁时小儿的身长(高)是( )

- A. 75cm
- B. 85cm
- C. 46cm
- D. 48cm
- E. 40cm

52. 模拟题 小儿, 女, 5 岁。健康体检。父母咨询科学育儿知识, 关心儿童的营养与热能供给问题。若小儿输液治疗拔针时, 针孔出血不易停止, 可能缺乏的营养素是( )

- A. 维生素 C
- B. 维生素 K
- C. 维生素 B<sub>6</sub>
- D. 钾离子
- E. 钙离子

53. 模拟题 1 岁时小儿的头围是( )

- A. 75cm
- B. 85cm
- C. 46cm
- D. 48cm
- E. 40cm

54. 真题 2018-J049 正常小儿前囟闭合的时间最迟为( )

- A. 12 个月
- B. 24 个月
- C. 18 个月
- D. 34 个月
- E. 56 个月

55. 模拟题 1 岁时小儿的胸围是( )

- A. 75cm
- B. 85cm
- C. 46cm
- D. 48cm
- E. 40cm

56. 模拟题 4~6岁小儿( )
- 出现生理性贫血
  - 血白细胞分类中中性粒细胞与淋巴细胞比例相等#
  - 血红细胞较天、染色较深
  - 出现生理性溶血
  - 血中有少量有核红细胞
57. 模拟题 14个月婴儿,在儿科门诊检查,下列哪项情况视为发育异常( )
- 前囟未闭
  - 乳牙未萌生
  - 不能说出3个字构成的句子
  - 不会自己穿鞋
  - 不会表示要大小便
58. 模拟题 小儿,女,5岁。健康体检。父母咨询科学育儿知识,关心儿童的营养与热能供给问题。若小儿近日上呼吸道感染,体温38.5℃(比平日高出2℃),其基础代谢率比平时增高( )
- 5%
  - 10%
  - 12%
  - 15%
  - 26%
59. 真题 2018-J053 6个月小儿,已添加菜汁、米汤,母亲带其到儿保门诊健康咨询,此时应指导家长给该小儿的辅食是( )
- 蛋黄
  - 馒头
  - 肉末
  - 饼干
  - 软饭
60. 模拟题 小儿第一次口服脊髓灰质炎疫苗的时间为( )
- 出生时
  - 生后1个月
  - 生后2个月
  - 生后3个月
  - 生后4个月
61. 真题 2010-J045 婴儿运动功能发育中,开始摇头的月龄是( )
- 3个月
  - 4个月
  - 5个月
  - 6个月
  - 7个月
62. 模拟题 下列哪一项符合牙齿的一般正常发育( )
- 乳牙共24颗
  - 最晚于8个月开始出乳牙
  - 乳牙最晚于1.5岁出齐
  - 2岁以内乳牙数=月龄-(4~6)
  - 8岁开始出第1颗恒牙
63. 模拟题 小儿发育最早的系统是( )
- 循环系统
  - 呼吸系统
  - 神经系统
  - 生殖系统
  - 淋巴系统
64. 模拟题 婴儿为了补充铁剂,最早需要添加的辅助食品是( )
- 蛋黄
  - 蔬菜
  - 粥
  - 新鲜水果
  - 牛奶
65. 模拟题 患儿,男,7岁。身高、体重均远远低于其同龄儿,为了解其骨骼发育情况,应做的检查是( )
- 血常规
  - 胸部X线摄片
  - 肝功能
  - 腰椎穿刺
  - 腕部X线照片
66. 模拟题 测量上臂围评估5岁以下小儿营养状况正确的是( )
- >11.5cm的为营养良好
  - >13.5cm的为营养良好
  - <12.5cm的为营养中等
  - <11.5cm的为营养中等
  - <11.5cm的为营养不良
67. 真题 2010-J024 小儿生长发育的顺序规律为( )
- 由远到近
  - 由下到上
  - 由细到粗
  - 由低级到高级
  - 由复杂到简单
68. 模拟题 关于1岁小儿体格正常发育,下列描述正确的是( )
- 身高60cm
  - 体重8kg
  - 头围52cm
  - 乳牙4颗
  - 前囟门未闭
69. 模拟题 初乳中含量较多的免疫因子是( )
- IgG
  - IgD
  - SIgA
  - IgM
  - IgE

70. 真题 2017-J068 出生时存在, 且永不消失的神经反射是( )

- A. 吸吮反射
- B. 觅食反射
- C. 拥抱反射
- D. 握持反射
- E. 吞咽反射

71. 真题 2017-J094 正常 6 个月婴儿运动发育应达到的标准是( )

- A. 会翻身
- B. 能独坐
- C. 会爬行
- D. 会独立行走
- E. 会上下台阶

72. 真题 2017-J095 正常 1 周岁小儿运动发育应达到的标准是( )

- A. 会翻身
- B. 能独坐
- C. 会爬行
- D. 会独立行走
- E. 会上下台阶

73. 真题 2017-J096 正常 3 个月婴儿运动发育应达到的标准是( )

- A. 会翻身
- B. 能独坐
- C. 会爬行
- D. 会独立行走
- E. 会上下台阶

74. 真题 2019-J052 我国围生期是指( )

- A. 妊娠第 28 周到出生后第 1 月
- B. 妊娠第 28 周到出生后第 2 周
- C. 妊娠第 28 周到出生后第 3 周
- D. 妊娠第 28 周到出生后第 2 月
- E. 妊娠第 28 周到出生后第 1 周

75. 真题 2019-J004 婴儿添加辅食的添加原则错误的是( )

- A. 从粗到细
- B. 从少到多
- C. 由稀到稠
- D. 由单一到多种
- E. 循序渐进

### 三.新生儿和患病新生儿的护理

1. 真题 2016-Z052 某产妇夏季自然分娩一足月新生儿。产后 2 天, 用厚包被包裹婴儿, 母乳头凹陷, 未进行人工喂养。现该新生儿出现多汗, 体温 39℃。首先考虑的是( )

- A. 新生儿肺炎
- B. 新生儿脐炎
- C. 新生儿败血症
- D. 新生儿免疫功能不全
- E. 新生儿脱水热

2. 模拟题 重症新生儿硬肿症复温的要求是( )

- A. 迅速复温
- B. 4~8 小时内体温恢复正常
- C. 8~12 小时内体温恢复正常
- D. 12~24 小时内体温恢复正常
- E. 24~48 小时内体温恢复正常

3. 模拟题 属于新生儿病态反应的是( )

- A. 生后 5 天, 体重下降 8%
- B. 生后 1 天出现黄疸, 并逐渐严重
- C. 生后 5 天, 女婴出现乳腺肿大
- D. 生后 1 天, 口腔齿龈切缘上有黄白色斑点
- E. 生后 5 天, 女婴阴道出少量血液

4. 模拟题 新生儿颅内出血时, 为降低颅内压, 在尚无脑疝时宜选用( )

- A. 20%甘露醇
- B. 地塞米松
- C. 呋塞米(速尿)
- D. 50%葡萄糖液
- E. 氢化可的松

5. 真题 2017-J005 新生儿窒息紧急处理首先应( )

- A. 口对口呼吸
- B. 用酒精擦胸部
- C. 脐静脉注入三联药物
- D. 氧气吸入
- E. 清理呼吸道

6. 模拟题 容易发生新生儿寒冷损伤综合征的情况应除外( )

- A. 早产低体重
- B. 新生儿败血症
- C. 母乳性黄疸
- D. 新生儿体温过低
- E. 新生儿窒息

7. 真题 2016-J065 新生儿破伤风的感染途径一般为( )

- A. 宫内
- B. 产道
- C. 脐带
- D. 呼吸道
- E. 消化道

8. 模拟题 患儿, 2 个月。发热 2 天, 体温 38.9~39.8℃, 面色苍白、呻吟、呼吸困难, 呼吸 55~65 次/分, 心率 160~180 次/分, 心音低钝, 肝肋下 2cm, 双肺可闻及中量的细小啰音, X 线片示双肺大小不等的片状阴影, WBC $13 \times 10^9/L$ , 此患儿应用抗生素的时间一般为( )

- A. 7~10 天
- B. 10~14 天
- C. 体温正常后
- D. 体温正常后 3 天
- E. 临床症状消失后 3 天

9. 模拟题 足月新生儿，出生 6 天。生后第 3 天出现皮肤黄染，无发热，精神状态好，心、肺（-），脐（-），血清胆红素  $17 \mu\text{mol/L}$ 。正确的处理为（）

- A. 光照疗法
- B. 给予苯巴比妥
- C. 输注白蛋白
- D. 应用抗生素
- E. 暂不需要治疗

10. 模拟题 患儿，女，32 周。早产，小于胎龄儿，出生后出现哭声异常、阵发性青紫、肢体抖动，实验室检查：血糖  $1.7\text{mmol/L}$ ，诊断为新生儿低血糖。常见病因是（）

- A. 足月儿
- B. 巨大儿
- C. 早产儿
- D. 过渡期新生儿
- E. 过期产新生儿

11. 真题 2014-X047 新生儿出生后体重下降，能恢复到出生时体重的时间是（）

- A. 2-3 天
- B. 4-6 天
- C. 7-10 天
- D. 11-14 天
- E. 15-21 天

12. 模拟题 患儿，女，32 周。早产，小于胎龄儿，出生后出现哭声异常、阵发性青紫、肢体抖动，实验室检查：血糖  $1.7\text{mmol/L}$ ，诊断为新生儿低血糖。如果患儿不能经口进食，需要静脉补充葡萄糖，其维持血糖的速率是（）

- A.  $1\sim 2\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{min})$
- B.  $3\sim 4\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{min})$
- C.  $4\sim 5\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{min})$
- D.  $6\sim 8\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{min})$
- E.  $9\sim 10\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{min})$

13. 模拟题 患儿，女，早产儿。胎龄 32 周，出生后 6 天，近 3 天患儿哭声减弱，活动减少，拒乳，反应低下。肛温  $<30^\circ\text{C}$ ，双面颊、肩部、臀部、下腹部、大腿及小腿外侧皮肤发硬，属重度新生儿寒冷损伤综合征。恢复正常体温需要的时间是（）

- A. 1~2 小时
- B. 2~4 小时
- C. 4~8 小时
- D. 8~10 小时
- E. 12~24 小时

14. 真题 2011-S008 新生儿病室适宜的温度是（）

- A.  $16\sim 18^\circ\text{C}$
- B.  $18\sim 22^\circ\text{C}$
- C.  $22\sim 24^\circ\text{C}$
- D.  $24\sim 26^\circ\text{C}$
- E.  $26\sim 28^\circ\text{C}$

15. 真题 2017-J012 足月顺产男婴，产后 3 天，皮肤黄染，哺乳后有溢乳现象，可能的原因是（）

- A. 肝功能不健全
- B. 胆道发育不良
- C. 凝血因子缺乏
- D. 生理性黄疸
- E. 病理性黄疸

16. 模拟题 早产儿，女，出生后第 3 天出现哭声弱，吸吮无力，两下肢硬肿，精神弱，皮肤黄染，肛温  $32^\circ\text{C}$ 。患儿突然心率下降，从鼻腔涌出血性分泌物，肺部闻及湿啰音，可能出现的情况是（）

- A. 低血糖
- B. 休克
- C. 败血症
- D. 肺出血
- E. 急性肾衰竭

17. 模拟题 早产儿，女，出生后第 3 天出现哭声弱，吸吮无力，两下肢硬肿，精神弱，皮肤黄染，肛温  $32^\circ\text{C}$ 。目前对该患儿最有效的措施是（）

- A. 静脉滴注葡萄糖
- B. 静脉注射 20%甘露醇
- C. 输新鲜全血
- D. 气管插管
- E. 快速补液，纠正休克

18. 真题 2016-Z054 某新生儿，出生 1 分钟 Apgar 评分为 3 分，首要的抢救措施是（）

- A. 人工呼吸
- B. 胸外按压
- C. 清理呼吸道
- D. 5%碳酸氢钠脐静脉注入
- E. 保暖

19. 模拟题 新生儿黄疸在生后 24 小时内出现并迅速加重，应首先考虑（）

- A. 生理性黄疸
- B. 新生儿败血症
- C. 新生儿肝病
- D. 新生儿溶血病
- E. 先天性胆道闭锁

20. 模拟题 一被弃女婴，被人从路旁捡回，抱至医院时哭声弱。体检：双下肢、臀部皮肤发凉、硬肿，呈紫红色。临床诊断为新生儿硬肿症。其首位的护理诊断是（）

- A. 营养不足：与热能摄入不足有关

- B. 体温过低：与寒冷有关  
C. 感染的危险：与免疫功能低下有关  
D. 气体交换受损：与窒息有关  
E. 潜在并发症：肺出血
21. 模拟题 关于新生儿寒冷损伤综合征，下列处理措施哪项不妥( )  
A. 积极治疗原发病  
B. 尽量减少肌肉注射  
C. 应快速复温  
D. 合理喂养  
E. 预防感染
22. 模拟题 患儿，女，足月儿。生后5天，母乳喂养。出生第3天食奶量明显减少，第4天皮肤出现黄染而就诊。体检：体温37.8℃，脐部周围皮肤红肿，诊断为新生儿脐炎。此疾病最常见的病原菌是( )  
A. 破伤风杆菌  
B. 铜绿假单胞菌  
C. 克雷白杆菌  
D. 金黄色葡萄球菌  
E. 表皮葡萄球菌
23. 模拟题 具有下列哪种情况的围产儿称高危儿( )  
A. 臀位娩出儿  
B. 足月小样儿  
C. 高危孕妇的新生儿  
D. 小于胎龄儿  
E. 以上都是
24. 模拟题 患者，女，28岁。因第二产程延长，行胎头吸引助产，胎儿娩出时脐带绕颈2周，Apgar评分3分，首要的紧急措施是( )  
A. 气管插管吸出黏液  
B. 口对口人工呼吸  
C. 脐静脉注射碳酸氢钠  
D. 注射呼吸中枢兴奋药  
E. 面罩吸氧
25. 模拟题 患儿，女，生后5天。近日来巩膜、皮肤黄染明显，来医院就诊。查体：体温36.8℃、脉搏132次/分，呼吸35次/分，精神、食欲及大小便均正常。其黄疸可能是( )  
A. 病理性黄疸  
B. 生理性黄疸  
C. 胆道闭锁  
D. 新生儿脐炎  
E. 新生儿败血症
26. 模拟题 早产儿，女，出生后第3天出现哭声弱，吸吮无力，两下肢硬肿，精神弱，皮肤黄染，肛温32℃。对该患儿的处理，下列哪项不妥( )  
A. 逐步复温  
B. 密切观察病情  
C. 6~12小时恢复正常体温  
D. 预防感染  
E. 早期哺喂时要耐心，经口喂奶，提供足够的热量
27. 模拟题 关于新生儿护理，错误的是( )  
A. 出生后可用消毒植物油去除胎脂  
B. 面部出现苍白或青紫应立即清理呼吸道  
C. 为防止呕吐应予侧卧位  
D. 娩出5分钟后行Apgar评分  
E. 哺乳后稍休息片刻再更换尿布
28. 真题 2017-J024 女婴6天，其母换尿片时发现其阴道流出少量血性分泌物而向护士咨询，护士正确的解释是( )  
A. 细菌性阴道炎所致  
B. 真菌性阴道炎所致  
C. 阴道粘膜肿胀所致  
D. 阴道腺未成熟所致  
E. 出生后母体雌激素影响中断所致
29. 模拟题 下列对婴儿易发生溢乳的原因描述正确的是( )  
A. 胃较垂直  
B. 幽门括约肌发育较差  
C. 胃容量小  
D. 贲门括约肌发育较好  
E. 胃呈水平位，贲门发育差，幽门括约肌发育好
30. 模拟题 小儿肺部易发生感染的主要内因是( )  
A. 呼吸中枢不健全  
B. 黏膜纤毛运动差  
C. 胸腔小而肺相对较大  
D. 肺含血量丰富，含气量小  
E. 肋骨呈水平位，呼吸运动度小
31. 模拟题 新生儿体液分布的特点是( )  
A. 细胞内液较婴儿高  
B. 血浆比例较高  
C. 液体总量占体重百分比比较低  
D. 间质液比例较高  
E. 细胞外液占体重百分比比较低
32. 模拟题 下列属于新生儿出现生理性黄疸原因的是( )  
A. 新生儿胆道狭窄  
B. 新生儿其他来源的胆红素生成少  
C. 新生儿形成胆红素的周期延长  
D. 出生后过多的红细胞破坏  
E. 肝脏形成胆红素能力强
33. 模拟题 2~3个月小儿( )  
A. 出现生理性贫血  
B. 血白细胞分类中中性粒细胞与淋巴细胞比例相等  
C. 血红细胞较天、染色较深  
D. 出现生理性溶血

E. 血中有少量有核红细胞

34. 模拟题 患儿,男,日龄2天。上腭中线和齿龈部有黄白色斑点,称为“马牙”,护理的方法是( )

- A. 挑破
- B. 用软布擦净
- C. 抗炎治疗
- D. 不需处理,可自行消失
- E. 用制霉菌素甘油

35. 模拟题 患儿,女,孕33周顺产。出生后第3天开始出现哭声弱,吸吮无力,两下肢硬肿,精神弱,皮肤黄染,体温32℃。对该患儿的处理下列哪项不妥( )

- A. 立即放入30℃暖箱内保暖
- B. 密切监测体温
- C. 6~12小时内恢复正常体温
- D. 严格无菌操作,预防感染
- E. 早期哺乳时要耐心,多喂奶,提供足够的热量

36. 模拟题 新生儿缺血缺氧性脑病,惊厥发作时首选的药物是( )

- A. 苯巴比妥钠
- B. 地西洋
- C. 苯妥英钠
- D. 5%水合氯醛
- E. 丙戊酸钠

37. 模拟题 患儿,女,日龄3天。因双下肢及臀部硬肿入院,测体温32℃,腋-肛温差为“0”。拟采用暖箱进行复温,起始温度应为( )

- A. 26℃
- B. 28℃
- C. 30℃
- D. 32℃
- E. 34℃

38. 模拟题 某新生女婴,出生后第4天,下列评估提示异常的是( )

- A. 体温37℃
- B. 脐带未脱落
- C. 体重比出生时下降12%
- D. 阴道外口少量血迹
- E. 皮肤轻度黄染

39. 模拟题 早产儿,日龄2天。出生1分钟Apgar评分4分,今晨抽搐2次,哭声尖,阵发青紫,拒乳,前囟饱满,脑脊液化验呈均匀血性,蛋白含量明显增高,查血钙2.2mmol/L,血糖2.2mmol/L,血白细胞 $1.3 \times 10^9/L$ ,中性粒细胞60%。最可能的诊断是( )

- A. 新生儿低钙血症
- B. 新生儿低血糖症
- C. 新生儿颅内出血
- D. 新生儿缺血缺氧性脑病
- E. 新生儿化脓性脑膜炎

40. 模拟题 足月儿生理性黄疸持续时间是出生后( )

- A. 2~3天
- B. 4~5
- C. 7天左右
- D. 14天左右
- E. 18天左右

41. 真题 2018-J036 足月儿生理性黄疸持续时间应小于( )

- A. 6周
- B. 5周
- C. 4周
- D. 3周
- E. 2周

42. 模拟题 小儿发生生理性贫血的时期是( )

- A. 生后2~3个月
- B. 生后4~5个月
- C. 生后6~7个月
- D. 生后8~9个月
- E. 生后10~12个月

43. 模拟题 患儿,3岁。化脓性脑膜炎。诊断为肺炎。链球菌感染,病原菌明确后,抗生素治疗的疗程为( )

- A. 1周
- B. 7~10天
- C. 10~14天
- D. 1个月
- E. 45天

44. 模拟题 患女。早产,母乳喂养,经过10天观察,身体状况良好,医生通知家长接其出院。护士应给予家长的正确指导是( )

- A. 培养良好的生活习惯
- B. 训练按时排便
- C. 及早添加辅食
- D. 预防感染
- E. 预防外伤

45. 真题 2017-S039 新生儿病室适宜的温度是( )

- A. 16℃~18℃
- B. 18℃~22℃
- C. 22℃~24℃
- D. 24℃~26℃
- E. 26℃~28℃

46. 模拟题 早产儿,日龄1天。有窒息史,生后1天出现烦躁不安,脑性尖叫,应考虑为( )

- A. 新生儿败血症
- B. 新生儿化脓性脑膜炎
- C. 新生儿颅内出血
- D. 新生儿破伤风
- E. 新生儿肺炎

47. 模拟题 下列反射仅在新生儿出生时存在,以后逐

渐消失的是( )

- A. 角膜反射
- B. 膝腱反射
- C. 腹壁反射
- D. 拥抱反射
- E. 吞咽反射

48. 模拟题 新生儿颅内出血入院当日护理措施错误的是( )

- A. 保持室内安静
- B. 头肩抬高  $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- C. 为患儿洗澡
- D. 观察生命体征
- E. 必要时给予鼻饲

49. 模拟题 小儿体重增长变化的过程中, 哪项不正确( )

- A. 出生体重男轻女重
- B. 生后第 1 周内可出现生理性体重下降
- C. 2 岁到 12 岁前每年体重稳步增长
- D. 年龄越小体重增长越快
- E. 正常同年龄、同性别小儿的体重存在着个体差异

50. 真题 2010-J009 新生儿特殊生理状态不包括( )

- A. 生理性黄疸
- B. 新生儿假月经
- C. 生理性体重下降
- D. 生理性乳腺肿大
- E. 新生儿体温降低

51. 真题 2011-J075 新生儿, 胎龄 35 周, 出生体重 2000g, 按新生儿分类应属于( )

- A. 足月儿
- B. 足月小样儿
- C. 正常体重儿
- D. 低出生体重儿
- E. 极低出生体重儿

52. 真题 2011-J093 新生儿生理性黄疸消退的时间是( )

- A. 出生 1-2 天
- B. 出生 2-3 天
- C. 出生 5-6 天
- D. 出生 1 周内
- E. 出生 2 周内

53. 真题 2011-J094 新生儿生理性黄疸出现的时间是( )

- A. 出生 1-2 天
- B. 出生 2-3 天
- C. 出生 5-6 天
- D. 出生 1 周内
- E. 出生 2 周内

54. 真题 2011-X034 新生儿寒冷损伤综合征复温的原则是( )

- A. 迅速复温
- B. 先快后慢
- C. 先慢后快
- D. 逐步复温
- E. 4-8 小时内体温恢复正常

55. 真题 2011-X066 足月儿, 生后 9 天黄疸加重, 体温不升, 拒奶, 呕吐, 精神萎靡, 前囟平, 面色发灰, 心肺检查未见异常, 脐带已脱落, 脐窝有少许脓性分泌物, 肝肋下 2cm, 质软, 脾肋下 1cm, 为明确诊断, 最有意义的检查是( )

- A. 血型
- B. 血常规
- C. 尿常规
- D. 血培养
- E. 血清胆红素

56. 真题 2011-Z074 一男婴, 足月臀位助产娩出。全身皮肤青紫, 心率 70 次/分, 呼吸表浅且不规则, 四肢软瘫, 刺激喉部稍有反射, Apgar 评分为( )

- A. 3 分
- B. 4 分
- C. 5 分
- D. 6 分
- E. 7 分

57. 真题 2013-J031 正常足月新生儿出现生理性黄疸的时间在出生后( )

- A. 24 小时内
- B. 24-48 小时
- C. 48-72 小时
- D. 4 天以后
- E. 5 天以后

58. 真题 2013-J042 护士发现新生儿口腔黏膜腭中线和齿根切缘处有黄白色小斑点, 正确的护理措施是( )

- A. 不必处理
- B. 用力擦净
- C. 手术切除
- D. 涂制霉菌素
- E. 用无菌针头挑破

59. 真题 2013-X042 新生儿娩出后 1 分钟内情况: 四肢青紫, 吸痰器清理呼吸道时患儿有恶心表现, 四肢稍弯曲, 心搏 90 次/分, 呼吸浅、慢、不规则, 新生儿评分应得( )

- A. 0 分
- B. 2 分
- C. 4 分
- D. 6 分
- E. 8 分

60. 真题 2013-X051 男婴, 日龄 8 天, 旧法接生。2 天前哭闹易惊, 吮奶困难, 继而面肌及全身肌肉阵发性痉挛, 首先考虑为( )

- A. 新生儿败血症
- B. 新生儿颅内出血
- C. 新生儿硬肿症
- D. 新生儿脑膜炎
- E. 新生儿破伤风

61. 真题 2011-J024 下列情况中一般不会发生新生儿寒冷损伤综合征的是( )

- A. 早产低体重
- B. 新生儿败血症
- C. 母乳性黄疸
- D. 保暖不当
- E. 感染窒息

62. 真题 2010-Z091 黄疸 1 周内出现, 黄疸退而复出, 并进行性加重, 发热伴有全身中毒症状。最可能的诊断是( )

- A. 新生儿肝炎
- B. 母乳性黄疸
- C. 先天性胆道畸形
- D. 新生儿溶血病
- E. 新生儿败血症

63. 真题 2018-X056 新生儿硬肿症的首要护理措施是( )

- A. 复温
- B. 局部处理
- C. 保持气道通畅
- D. 供给能量合剂
- E. 预防感染

64. 真题 2010-Z090 生后 24 小时内出现黄疸, 最可能的诊断是( )

- A. 新生儿肝炎
- B. 母乳性黄疸
- C. 先天性胆道畸形
- D. 新生儿溶血病
- E. 新生儿败血症

65. 真题 2010-J080 患儿, 1 岁半。发热、流涕 3 天, 今日外耳道流出少量脓性分泌物, 考虑为中耳炎。其易患中耳炎的原因是( )

- A. 后鼻道狭窄
- B. 鼻腔相对较小
- C. 鼻窦口相对较大
- D. 咽鼓管宽、短、直
- E. 喉部较长, 呈漏斗状

66. 真题 2010-J091 早产儿的护理措施中不正确的是( )

- A. 合适的温、湿度
- B. 尽早输液、输血

- C. 合理喂养
- D. 注意保暖
- E. 预防感染

67. 真题 2018-J059 早产儿易出现体温降低的原因是( )

- A. 体表面积小
- B. 汗腺功能旺盛
- C. 皮下脂肪多
- D. 棕色脂肪少
- E. 肌肉组织少

68. 真题 2010-J092 足月新生儿的护理措施中不正确的是( )

- A. 合适的温、湿度
- B. 尽早输液、输血
- C. 合理喂养
- D. 注意保暖
- E. 预防感染

69. 真题 2010-X019 新生儿缺氧缺血性脑病脑水肿严重时应选用( )

- A. 25%葡萄糖
- B. 10%氧化钠
- C. 呋塞米
- D. 地塞米松
- E. 20%甘露醇

70. 真题 2010-X091 诊断新生儿败血症最有意义的检查是( )

- A. 血胆红素测定
- B. 胃液振荡试验
- C. 血常规检查
- D. 肝功能检查
- E. 血液培养

71. 模拟题 新生儿出生后开始排出胎粪的正常时间是( )

- A. 12 小时内
- B. 16 小时内
- C. 20 小时内
- D. 32 小时内
- E. 48 小时内

72. 真题 2010-X092 诊断新生儿肺透明膜病较有意义的检查是( )

- A. 血胆红素测定
- B. 胃液振荡试验
- C. 血常规检查
- D. 肝功能检查
- E. 血液培养

73. 真题 2010-Z072 早产儿, 日龄 2 天。出生时有窒息, 现拒乳, 口吐白沫, 呼吸急促, 发绀, T37.2℃, 肺部呼吸音粗。该患儿最可能是( )

- A. 新生儿败血症
- B. 新生儿肺炎
- C. 新生儿肺透明膜病
- D. 新生儿颅内出血
- E. 新生儿缺血缺氧性脑病

74. 真题 2010-Z089 生后 1-3 周出现黄疸，进行性加重，大便呈陶土色，肝脏增大。最可能的诊断是( )

- A. 新生儿肝炎
- B. 母乳性黄疸
- C. 先天性胆道畸形
- D. 新生儿溶血病
- E. 新生儿败血症

75. 真题 2015-X018 新生儿破伤风发作时，最先受累的肌肉是( )

- A. 咀嚼肌
- B. 面肌
- C. 上肢肌
- D. 下肢肌
- E. 呼吸肌

76. 真题 2015-X022 新生儿窒息复苏步骤不包括( )

- A. 清理呼吸道、建立呼吸
- B. 维持正常循环
- C. 药物治疗
- D. 评价
- E. 预防感染

77. 真题 2015-X032 新生儿寒冷损伤综合征复温的原则是( )

- A. 迅速复温
- B. 先快后慢
- C. 自然复温
- D. 逐步复温
- E. 4-8 小时内体温恢复正常

78. 真题 2015-X049 Apgar 评分的判断项目包括( )

- A. 呼吸、心率、神经反射、皮肤温度、喉反射
- B. 呼吸、心率、肌张力、喉反射、皮肤颜色
- C. 呼吸、心率、肌张力、神经反射、皮肤温度
- D. 呼吸、心率、肌张力、喉反射、皮肤温度
- E. 呼吸、心率、神经反射、皮肤颜色、四肢张力

79. 真题 2015-J033 新生儿硬肿症最先出现硬肿的部位是( )

- A. 面颊部
- B. 上肢
- C. 躯干
- D. 小腿
- E. 臀部

80. 真题 2015-J064 女婴，出生 6 天，其母换尿片时发现其阴道流出少量血性分泌物而向护士咨询。护士正确的解释是( )

- A. 细菌性阴道炎所致
- B. 真菌性阴道炎所致
- C. 阴道黏膜肿胀所致
- D. 阴道腺未成熟所致
- E. 出生后母体雌激素影响中断所致

81. 真题 2015-J066 新生儿，胎龄 35 周，出生时体重 2000g。该新生儿分类应属于( )

- A. 足月儿
- B. 足月小样儿
- C. 正常体重儿
- D. 低出生体重儿
- E. 极低出生体重儿

82. 真题 2015-Z036 某新生儿黄疸在出生后 2-3 天出现，4-5 天最明显，10-14 天消退，应考虑是( )

- A. 新生儿胆红素脑病
- B. ABO 溶血
- C. 新生儿胆道闭锁
- D. 新生儿生理性黄疸
- E. 婴儿肝炎综合征

83. 真题 2016-J032 正常足月新生儿出现生理性黄疸的时间在出生后( )

- A. 24 小时内
- B. 24-48 小时
- C. 48-72 小时
- D. 4 天以后
- E. 5 天以后

84. 真题 2016-J047 护士发现新生儿口腔黏膜腭中线和齿龈切缘处有黄白色小斑点，正确的护理措施是( )

- A. 不必处理
- B. 用力擦净
- C. 手术切除
- D. 涂制霉菌素
- E. 用无菌针头挑破

85. 真题 2016-J062 婴儿开始出现生理性流涎常在生后( )

- A. 1~2 个月
- B. 3~4 个月
- C. 5~6 个月
- D. 7~8 个月
- E. 9~10 个月

86. 真题 2014-Z100 新生儿肺透明膜病的表现特点是( )

- A. 拥抱反射活跃
- B. 鼻翼扇动、发绀
- C. 进行性呼吸困难
- D. 烦躁不安、易激惹
- E. 意识不清，肌张力低下

87. 真题 2014-Z099 新生儿重度缺血缺氧性脑病的表

现特点是( )

- A. 拥抱反射活跃
- B. 鼻翼扇动、发绀
- C. 进行性呼吸困难
- D. 烦躁不安、易激惹
- E. 意识不清,肌张力低下

88. 真题 2013-Z057 关于正常足月新生儿护理内容,下列正确的是( )

- A. 为防止溢乳,哺乳后将婴儿头抬高仰卧
- B. 母乳喂养者应定时哺乳
- C. 出生后保留胎脂 2 天
- D. 黄疸出现过早、程度重,为病理性黄疸
- E. 新生儿乳腺肿大应挤出乳汁

89. 真题 2013-Z065 对蓝光照射哪项护理不正确( )

- A. 保证液体补给,不能经口喂养者保证静脉输液
- B. 若单面光照,不要勤翻身
- C. 患儿需戴护眼罩
- D. 患儿需系好尿布,脱光衣服
- E. 要正确记录蓝光灯管使用时间

90. 真题 2017-J081 正常婴儿每日尿量为( )

- A. 100~200ml
- B. 200~300ml
- C. 300~400ml
- D. 400~500ml
- E. 500~600ml

91. 真题 2011-Z062 早产儿,日龄 1 天。有窒息史,烦躁不安。突然出现高声尖叫。初步诊断颅内出血。应采取的体位是( )

- A. 平卧位
- B. 半卧位
- C. 头低足高位
- D. 头偏向一侧
- E. 头肩抬高 15°~30°

92. 真题 2017-J082 早产儿是指( )

- A. 胎龄满 37 周不满 42 周,体重大于 2500g 的新生儿
- B. 胎龄大于 37 周而体重小于 2500g 的新生儿
- C. 胎龄大于 37 周而体重大于 2500g 的新生儿
- D. 胎龄不足 37 周的新生儿
- E. 胎龄为 37 周的新生儿

93. 真题 2016-X081 患儿女,2 天。体温 38.1℃,吃奶好,精神萎靡。血常规:白细胞  $25 \times 10^9/L$ ,诊断为新生儿败血症。对于该患儿的治疗正确的是( )

- A. 做血培养,等待结果,然后选用抗生素
- B. 选用一种抗生素,避免发生菌群失调
- C. 血培养阴性,病情好转即可停药
- D. 血培养阳性,疗程至少需要 5~7 天
- E. 若患儿出现并发症,则需治疗 3 周以上

94. 真题 2018-J083 下列情况中一般不会发生新生儿

寒冷损伤综合征的是( )

- A. 新生儿败血症
- B. 早产、低体重
- C. 感染和窒息
- D. 保暖不当
- E. 母乳性黄疸

95. 真题 2014-J095 早产儿的护理措施中,不正确的是( )

- A. 合适的温、湿度
- B. 尽早输液、输血
- C. 合理喂养
- D. 注意保暖
- E. 预防感染

96. 真题 2018-J084 新生儿生理性黄疸开始出现的时间是( )

- A. 出生 1~2 天
- B. 出生 2~3 天
- C. 出生 5~6 天
- D. 出生 8~9 天
- E. 出生 10 天

97. 真题 2014-J096 足月新生儿的护理措施中,不正确的是( )

- A. 合适的温、湿度
- B. 尽早输液、输血
- C. 合理喂养
- D. 注意保暖
- E. 预防感染

98. 真题 2018-J085 新生儿生理性黄疸开始消退的时间是( )

- A. 出生 1~2 天
- B. 出生 2~3 天
- C. 出生 5~6 天
- D. 出生 8~9 天
- E. 出生 10 天

99. 真题 2019-J033 新生儿肺透明膜病的主要病因是( )

- A. 肺间质炎症
- B. 肺实质炎症
- C. 肺间质纤维化
- D. 缺乏肺表面活性物质
- E. 肺表面物质增多所致

100. 真题 2019-J044 早产儿缺乏肺泡表面活性物质可引起( )

- A. 肺气肿
- B. 肺水肿
- C. 呼吸暂停
- D. 坠积性肺炎
- E. 肺透明膜病

101. 真题 2019-J075 新生儿第一次排出胎粪时间为出生后( )

- A. 24 小时内
- B. 2~3 天
- C. 3~4 天
- D. 4~6 天
- E. 7~10 天

102. 真题 2019-J076 大多数新生儿最早出现生理性黄疸的时间是( )

- A. 24 小时内
- B. 出生后 2~3 天
- C. 出生后 4~5 天
- D. 出生后 5~7 天
- E. 出生后 7~9 天

103. 真题 2019-J077 足月新生儿生理性黄疸开始消退的时间是( )

- A. 24 小时内
- B. 出生后 2~3 天
- C. 出生后 4~5 天
- D. 出生后 5~7 天
- E. 出生后 7~9 天

104. 真题 2019-Z046 新生儿出生后 1 分钟 Apgar 评分的正常值是( )

- A. 12~14
- B. 10~12
- C. 8~10
- D. 6~8
- E. 4~6

#### 四.营养性疾病患儿的护理

1. 模拟题 维生素 D 缺乏性佝偻病患儿,最常见的骨骼改变是( )

- A. 鞍形颅
- B. 脊柱侧弯
- C. “O”形腿
- D. 颅骨软化
- E. 肋骨串珠

2. 模拟题 婴儿佝偻病的主要病因是( )

- A. 饮食中缺钙
- B. 甲状旁腺素缺乏
- C. 缺乏维生素 A
- D. 缺乏维生素 D
- E. 食物中钙、磷比例不当

3. 真题 2016-X064 患儿男, 3 岁。体重超过同龄儿童 50%, 所需热量应较理想体重至少减少( )

- A. 10%
- B. 20%
- C. 30%
- D. 40%

E. 50%

4. 模拟题 以下哪项佝偻病表现是由骨样组织堆积造成的( )

- A. 肋缘外翻
- B. “O”形腿
- C. 手镯征
- D. “乒乓头”试验阳性
- E. 肋膈沟

5. 模拟题 佝偻病颅骨软化多见于( )

- A. 早产儿
- B. 新生儿
- C. 1~3 个月婴儿
- D. 3~6 个月婴儿
- E. 9~12 个月婴儿

6. 模拟题 营养不良患儿最初的表现是( )

- A. 体重减轻
- B. 体重不增
- C. 低血糖
- D. 心音低钝
- E. 体温降低

7. 模拟题 肋骨串珠及郝氏沟多见于( )

- A. 1~2 个月
- B. 3~4 个月
- C. 6~10 个月
- D. 1 岁左右
- E. 3 岁以后

8. 模拟题 患儿, 男, 6 个月。冬季出生, 人工喂养, 睡眠不安、易激惹、多汗。近日户外活动增多, 突然出现惊厥, 约 10 秒, 抽搐停止后, 精神、食欲无异常。可能的诊断是( )

- A. 癫痫
- B. 低血糖
- C. 高热惊厥
- D. 营养不良
- E. 手足搐搦症

9. 模拟题 婴儿期引起无热惊厥最常见的病因是( )

- A. 呼吸道感染
- B. 脑脓肿
- C. 重症肺炎
- D. 脑积水
- E. 低钙血症

10. 模拟题 有关产褥感染, 下列说法正确的是( )

- A. 指产后生殖道感染
- B. 多为单种细菌感染
- C. 凡产褥期体温升高均为生殖器官感染所致
- D. 产后未发生产褥感染者, 宫颈内培养不出细菌
- E. 细菌感染不可能来自产道

11. 模拟题 预防佝偻病的措施不妥的是( )
- 婴儿期多服用钙片
  - 多到户外晒太阳
  - 多食维生素 D 的食物
  - 每天口服维生素 D400~800IU
  - 冬季肌内注射维生素 D10 万~20 万 IU 一次
12. 模拟题 营养不良患儿皮下脂肪消耗的顺序是( )
- 躯干-臀部-四肢-腹部-面颊
  - 四肢-躯干-臀部-面颊
  - 腹部-躯干-臀部-四肢-面颊
  - 面颊-腹部-四肢-躯干-臀部
  - 躯干-腹部-臀部-面颊
13. 模拟题 维生素 D 缺乏性手足搐搦症窒息时( )
- 口服维生素 D
  - 将舌尖拉出口外
  - 给抗惊厥药
  - 在上、下磨牙间放压舌板
  - 注射维生素 D
14. 模拟题 维生素 D 缺乏性手足搐搦症惊厥时( )
- 口服维生素 D
  - 将舌尖拉出口外
  - 给抗惊厥药
  - 在上、下磨牙间放压舌板
  - 注射维生素 D
15. 模拟题 婴儿开始补充维生素 D 的时间是( )
- 生后 1 周
  - 生后 2 周
  - 生后 3 周
  - 生后 4 周
  - 生后 2 个月
16. 模拟题 患儿, 6 个月。体重 5kg, 生后母乳喂养, 未加辅食, 体检:精神可, 面色苍白, 腹部皮下脂肪 0.3cm, 肌肉稍松弛。如患儿夜间突然出冷汗, 面色苍白, 神志不清, 脉搏缓慢, 呼吸暂停, 首先考虑( )
- 呼吸衰竭
  - 低血糖症
  - 感染性休克
  - 心力衰竭
  - 低钙血症
17. 模拟题 患儿, 6 个月。体重 5kg, 生后母乳喂养, 未加辅食, 体检:精神尚可, 面色苍白, 腹部皮下脂肪 0.3cm, 肌肉稍松弛。该患儿开始每天供给能量应为( )
- 250~330kJ/kg
  - 100~165kJ/kg
  - 165~230kJ/kg
  - 150~200kJ/kg
  - 180~250kJ/kg
18. 模拟题 患儿, 6 个月。体重 5kg, 生后母乳喂养,

- 未加辅食, 体检:精神可, 面色苍白, 腹部皮下脂肪 0.3cm, 肌肉稍松弛。最可能的诊断是( )
- 正常儿
  - 佝偻病
  - 轻度营养不良
  - 中度营养不良
  - 重度营养不良
19. 模拟题 营养不良主要是因为缺乏( )
- 能量和(或)水
  - 能量和(或)脂肪
  - 能量和(或)糖
  - 能量和(或)蛋白质
  - 能量和(或)维生素
20. 模拟题 预防维生素 D 中毒的关键措施是( )
- 定期测体重
  - 定期测血钙
  - 间断应用维生素 D
  - 严格按医嘱用药
  - 严密观察, 及时发现中毒
21. 模拟题 观察营养性缺铁性贫血患儿铁剂疗效, 早期最可靠的指标是( )
- 面色改变
  - 食欲情况
  - 心率快慢
  - 血红蛋白量
  - 网织红细胞升高
22. 真题 2013-X080 新生儿家长向护士咨询如何服用维生素 D 预防佝偻病, 护士对其进行指导。每天服用维生素 D 的剂量是( )
- 100IU
  - 200IU
  - 300IU
  - 400IU
  - 1000IU
23. 真题 2013-X079 新生儿家长向护士咨询如何服用维生素 D 预防佝偻病, 护士对其进行指导。小儿开始服用维生素 D 的时间是( )
- 生后立即
  - 生后 2 周
  - 生后 2 月
  - 生后 4 月
  - 生后半年
24. 真题 2013-X052 营养不良导致代谢异常不包括以下哪项( )
- 血糖偏低
  - 血清胆固醇降低
  - 血清清蛋白降低
  - 血钠、血钾偏低
  - 白细胞降低

25. 真题 2011-Z020 维生素 D 缺乏性手足搐搦症患儿使用钙剂时, 静脉注射时间应( )

- A. 小于 10 分钟
- B. 大于 10 分钟
- C. 小于 5 分钟
- D. 大于 5 分钟
- E. 大于 3 分钟

26. 真题 2011-X064 3 个月小儿易激惹、烦躁、睡眠不安、易惊、夜啼、多汗、枕秃。最可能是维生素 D 缺乏性佝偻病的哪一期( )

- A. 激期
- B. 初期
- C. 维生素 D 治疗中
- D. 恢复期
- E. 后遗症期

27. 真题 2011-X047 小儿肥胖症减轻体重的重要手段是( )

- A. 少量多餐
- B. 运动疗法
- C. 心理治疗
- D. 药物治疗
- E. 高蛋白饮食

28. 真题 2010-Z069 患儿, 1 岁半, 多汗、烦躁。查体: 方颅、鸡胸、“O”型腿, 化验血钙、磷均低。应考虑为( )

- A. 佝偻病初期
- B. 佝偻病激期
- C. 佝偻病恢复期
- D. 佝偻病后遗症期
- E. 先天性佝偻病

29. 真题 2010-X060 早期确定营养不良的重要检查是( )

- A. 生长激素水平测定
- B. 血清清蛋白浓度测定
- C. 血清胆固醇浓度测定
- D. 血清胆碱酯酶活性测定
- E. 胰岛素样生长因子 1 水平测定

30. 真题 2013-Z066 营养不良的并发症不包括( )

- A. 缺铁性贫血
- B. 营养不良性水肿
- C. 多种维生素缺乏
- D. 大脑发育不全
- E. 自发性低血糖

31. 真题 2014-Z045 3-6 个月患儿, 维生素 D 缺乏性佝偻病多见的骨骼改变是( )

- A. 方颅
- B. 颅骨软化
- C. 肋骨串珠

D. 手镯、脚镯征

E. 下肢畸形

32. 真题 2015-X069 患儿, 男, 4 个月。人工喂养, 睡眠时常烦躁哭闹, 难以入眠。查体: 体重 6kg, 体温 37.9℃, 有枕秃及颅骨软化, 诊断为“佝偻病”。给予维生素 D330 万 IU 肌肉注射后突然发生全身抽搐 3 次, 每次 20-60 秒, 发作停止后精神如常。查血清离子钙为 1.0mmol/L, 血清总钙为 1.8mmol/L。该患儿发生抽搐的原因是( )

- A. 酸中毒
- B. 热性惊厥
- C. 癫痫发作
- D. 血清钙减少
- E. 缺乏维生素 D

33. 模拟题 患儿, 男, 3 个月。易激惹、烦躁、夜啼, 头部多汗, 常摇头擦枕, 出现枕秃。临床确诊为维生素 D 缺乏性佝偻病, 该患儿属于( )

- A. 初期
- B. 极期
- C. 晚期
- D. 活动期
- E. 后遗症期

34. 模拟题 患儿, 女, 1 岁半。诊断为佝偻病激期。为避免其“O”形腿加重, 此时应注意的预防措施是( )

- A. 补充维生素 D
- B. 补充钙剂
- C. 多晒太阳
- D. 减少行走
- E. 外矫形术

35. 模拟题 肥胖是指体重超过标准体重的( )

- A. 5%
- B. 10%
- C. 12%
- D. 15%
- E. 20%

36. 真题 2016-Z068 患儿男, 18 个月。多汗、烦躁。查体: 方颅、鸡胸、“O”型腿。实验室检查示血钙、磷均低。最可能的诊断是( )

- A. 佝偻病初期
- B. 佝偻病激期
- C. 佝偻病恢复期
- D. 佝偻病后遗症期
- E. 先天性佝偻病

37. 真题 2017-Z037 患儿女, 1 岁。因反复抽搐急诊入院, 来院时全身肌肉痉挛, 双手握拳, 两眼上翻。首先应采取的护理措施是( )

- A. 立即开放静脉通路, 滴注抗生素预防感染
- B. 控制高热, 物理降温
- C. 密切观察患儿呼吸、心率

- D. 准备好气管插管工具
- E. 平卧，头偏向一侧，清除口鼻分泌物

38. 真题 2016-Z043 3-6 个月患儿，维生素 D 缺乏性佝偻病多见的骨骼改变是( )

- A. 方颅
- B. 颅骨软化
- C. 肋骨串珠
- D. 手镯、脚镯征
- E. 下肢畸形

39. 真题 2016-X036 小儿肥胖病主要的治疗手段是( )

- A. 不控制食物总量的摄入
- B. 培养良好的饮食习惯
- C. 控制饮食，进行有效的运动
- D. 解除患儿的心理负担
- E. 多吃饱腹感明显的食物

40. 真题 2015-Z017 佝偻病患儿早期主要表现为( )

- A. 方颅
- B. 颅骨软化
- C. 前囟晚闭
- D. 出牙延迟
- E. 睡眠不安，多汗，枕秃

41. 真题 2015-X080 患儿，男，20 个月。其母主诉夜间多哭闹、多汗、易惊、近日频发手足肌肉痉挛成弓状，昨夜间突然意识不清、四肢抽动，两眼上翻，持续 10 秒左右。其处理措施，错误的是( )

- A. 补充维生素 D
- B. 增加户外活动，多晒太阳
- C. 应用水合氯醛抗惊厥
- D. 静脉注射钙剂时需快速推注
- E. 保持呼吸道通畅

42. 真题 2010-X009 维生素 D 缺乏性手足搐搦症发作时急救处理首选的是( )

- A. 葡萄糖酸钙静脉滴注
- B. 甘露醇快速静脉滴注
- C. 维生素 D<sub>3</sub> 肌肉注射
- D. 高浓度氧面罩吸入
- E. 地西洋肌肉注射

43. 真题 2017-Z044 下列维生素 D 中，生物活性最强的是( )

- A. 胆骨化醇
- B. 麦角骨化醇
- C. 25-羟胆骨化醇
- D. 1,25 二羟胆骨化醇
- E. 24,25-羟胆骨化醇

44. 真题 2018-J057 血浆蛋白质水平降低属于( )

- A. 能量缺乏型营养不良
- B. 混合型营养不良
- C. 低蛋白型营养不良

- D. 蛋白质-能量缺乏型营养不良
- E. 消瘦型营养不良

45. 真题 2017-X074 患儿男，4 个月，人工喂养，睡眠时常烦躁哭闹，难以入眠，查体：体重 6 公斤，体温 37.9℃，有枕秃及颅骨软化，诊断为佝偻病，给予维生素 D30 万 IU 肌肉注射后突发全身抽搐 3 次，每次约 20~60 秒，发作停止后精神如常，查血清离子钙为 1.0mmol/L，血清总钙为 1.8mmol/L，该患儿发生抽搐的原因是( )

- A. 酸中毒
- B. 热性惊厥
- C. 癫痫发作
- D. 血清钙减少
- E. 缺乏维生素 D

46. 真题 2018-Z088 患儿男，5 个月。出生于北方 11 月份，人工喂养，未添加辅食、盗汗、烦躁、睡眠不安、夜间啼哭 1 周、诊断为维生素 D 缺乏性佝偻病。该患儿目前处于疾病的( )

- A. 暴发期
- B. 后遗症期
- C. 恢复期
- D. 初期
- E. 激期

47. 真题 2018-Z089 患儿男，5 个月。出生于北方 11 月份，人工喂养，未添加辅食、盗汗、烦躁、睡眠不安、夜间啼哭 1 周、诊断为维生素 D 缺乏性佝偻病。护士在对家长进行健康指导时，错误的是( )

- A. 按时遵医嘱使用维生素
- B. 尽量坚持口服维生素 D
- C. 避免过早、过久地坐、站、走
- D. 冬季室内活动时无需开窗以防着凉，阳光透过即可
- E. 定期领患儿进行室外活动

48. 真题 2018-Z090 患儿男，5 个月。出生于北方 11 月份，人工喂养，未添加辅食、盗汗、烦躁、睡眠不安、夜间啼哭 1 周、诊断为维生素 D 缺乏性佝偻病。该患儿口服维生素 D 治疗量后一个月，改剂量为每日( )

- A. 400IU
- B. 50IU
- C. 250IU
- D. 300IU
- E. 200IU

49. 真题 2018-X091 属于儿童轻度肥胖的为( )

- A. 超过正常体重 20%
- B. 超过正常体重 20%~29%
- C. 超过正常体重 30%~49%
- D. 超过正常体重 50%
- E. 超过正常体重 60%

50. 真题 2018-X092 属于儿童中度肥胖的为( )

- A. 超过正常体重 20%

- B. 超过正常体重 20%~29%
- C. 超过正常体重 30%~49%
- D. 超过正常体重 50%
- E. 超过正常体重 60%

51. 真题 2018-X093 属于儿童重度肥胖的为( )

- A. 超过正常体重 20%
- B. 超过正常体重 20%~29%
- C. 超过正常体重 30%~49%
- D. 超过正常体重 50%
- E. 超过正常体重 60%

52. 真题 2019-Z069 营养不良的患儿皮下脂肪消减的顺序是( )

- A. 躯干-臀部-四肢-腹部-面颊部
- B. 面颊部-腹部-躯干-臀部-四肢
- C. 腹部-躯干-臀部-四肢-面颊部
- D. 四肢-躯干-臀部-腹部-面颊部
- E. 臀部-躯干-四肢-腹部-面颊部

53. 真题 2019-X034 患儿女, 7 个月。因“反复发作性抽搐 2 天”就诊。足月顺产, 人工喂养, 户外活动少。查体: 神志清, 精神尚好, 体重 8kg; 前囟 2cm×2cm, 平坦; 颈无抵抗, 心肺无异常; 四肢肌张力正常, 病理反射未引出。实验室检查: 血钙 1.25mmol/l, 血清 25-(OH)D<sub>3</sub>下降, 最可能的诊断是( )

- A. 维生素 D 缺乏性佝偻病
- B. 原发性癫痫
- C. 缺氧缺血性脑病
- D. 颅内感染
- E. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症

54. 真题 2019-X003 小儿肥胖病主要的治疗手段是( )

- A. 不控制食物总量的摄入
- B. 培养良好的饮食习惯
- C. 控制饮食, 进行有效的运动
- D. 接触患儿的心理负担
- E. 多吃饱腹感明显的食物

## 五. 消化系统疾病患儿的护理

1. 真题 2010-J013 秋季腹泻最常见的病原体是( )

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 耶尔森菌
- D. 轮状病毒
- E. 柯萨奇病毒

2. 真题 2014-Z063 2 个月患儿, 人工喂养, 近 2 天口腔黏膜上出现白色乳凝块样物, 不痛, 用棉签不易拭去, 强行剥脱后, 局部黏膜潮红粗糙, 有渗血。最可能的疾病是( )

- A. 单纯性口腔炎
- B. 鹅口疮
- C. 疱疹性口腔炎

- D. 溃疡性口腔炎
- E. 卡他性口腔炎

3. 真题 2016-Z072 患儿男, 7 个月。因肺炎住院, 应用抗生素治疗 2 周, 近 2 日见患儿口腔黏膜有白色乳凝状物, 不易擦去, 考虑为鹅口疮。其护理措施错误的是( )

- A. 用 5%碳酸氢钠溶液口腔护理
- B. 局部可涂制霉菌素
- C. 涂药前应先清洗口腔
- D. 食具等用后应煮沸消毒
- E. 护理患儿前后应洗手

4. 模拟题 患儿, 男, 11 个月。因呕吐、腹泻 3 天来院, 初步诊断为婴儿腹泻伴脱水。考虑该患儿为等渗性脱水, 补液治疗首选的液体是( )

- A. 等张含钠液
- B. 1/2 张含钠液
- C. 1/3 张含钠液
- D. 1/4 张含钠液
- E. 1/5 张含钠液

5. 模拟题 患儿, 男, 11 个月。因呕吐、腹泻 3 天来院, 初步诊断为婴儿腹泻伴脱水。患儿经 6 小时补液治疗后, 脱水基本纠正, 开始排尿, 但又出现精神萎靡、腹胀、肠鸣音减弱、心音低钝、心率增快, 护士考虑该患儿可能是( )

- A. 低钙血症
- B. 低钾血症
- C. 低镁血症
- D. 低钠血症
- E. 酸中毒未纠正

6. 模拟题 疱疹性口腔炎的病原体是( )

- A. 链球菌
- B. 白色念珠菌
- C. 单纯疱疹病毒
- D. 柯萨奇病毒
- E. 腺病毒

7. 模拟题 患儿, 男, 11 个月。因呕吐、腹泻 3 天来院, 初步诊断为婴儿腹泻伴脱水。如患儿需补充 10%氯化钾 6ml, 稀释需要的溶液量至少为( )

- A. 50ml
- B. 100ml
- C. 150ml
- D. 200ml
- E. 250ml

8. 模拟题 对于腹泻并伴脱水的患儿, 首选的检查项目是( )

- A. B 超
- B. 血常规
- C. 心电图
- D. 血电解质

E. 胸部 X 线检查

9. 模拟题 患儿, 3 个月。近 2 天发生腹泻, 大便每日 5~6 次, 呈黄绿色稀便, 内有奶瓣和泡沫, 为防止患儿发生脱水选择( )

- A. 静脉补充林格液
- B. 少量多次饮温开水
- C. 少量多次给予米汤
- D. 少量多次喂服 ORS 液
- E. 静脉补充 10%葡萄糖溶液

10. 模拟题 重型腹泻患儿呕吐频繁时, 禁食的时间一般为( )

- A. 6 小时
- B. 8 小时
- C. 10 小时
- D. 12 小时
- E. 14 小时

11. 模拟题 患儿, 男, 1 岁。被诊断为低钙血症。护士遵医嘱静脉注射 10%葡萄糖酸钙治疗时需注意观察的是( )

- A. 防止心动过缓, 保持心率 > 80 次/分
- B. 防止心动过缓, 保持心率 > 110 次/分
- C. 防止心动过缓, 保持心率 > 105 次/分
- D. 防止心动过速, 保持心率 < 100 次/分
- E. 防止心动过速, 保持心率 < 120 次/分

12. 模拟题 7 个月婴儿, 喂稀饭后发生腹泻 3 天, 稀水样便 7~8 次/天, 量中等, 偶吐奶, 尿量略减少, 前囟及眼窝稍凹陷。下列哪项措施不恰当( )

- A. 立即口服抗生素
- B. 限制哺乳次数, 缩短哺乳时间
- C. 给予口服补液盐
- D. 暂停辅食
- E. 观察生命体征及大便情况

13. 模拟题 关于腹泻婴儿的饮食护理, 下述哪项不正确( )

- A. 吐泻严重者应禁食 1 天, 并禁水
- B. 母乳喂养者可继续哺乳, 暂停辅食
- C. 双糖酶显著缺乏者慎用糖类食品
- D. 病毒性肠炎应暂停乳类, 改为豆制代乳品
- E. 人工喂养者, 可给等量米汤或水稀释的牛奶或脱脂奶

14. 模拟题 小儿肠套叠的粪便特点是( )

- A. 鲜血便
- B. 脓血便
- C. 黏液脓血便
- D. 血粪混合便
- E. 果酱样黏液血便

15. 真题 2017-2015 患儿, 5 个月。家长诉患儿爱流口水, 查体见齿龈部有白色乳状凝块物, 不易擦去, 擦拭

时患儿无明显不适感。最可能的诊断是( )

- A. 齿龈炎
- B. 鹅口疮
- C. 溃疡性口炎
- D. 生理性表现
- E. 磨牙

16. 模拟题 腹泻患者的饮食要求, 错误的是( )

- A. 少渣
- B. 高纤维素
- C. 易消化
- D. 流食
- E. 半流食

17. 模拟题 患儿, 女, 4 个月。腹泻 4 天, 每天 10 余次蛋花汤样便。查体: 前囟、眼窝凹陷明显, 皮肤弹性差。四肢凉, 血钠 110mmol/L。应输入的溶液张力为( )

- A. 1/3 张含钠溶液
- B. 1/2 张含钠溶液
- C. 1/4 张含钠溶液
- D. 1/5 张含钠溶液
- E. 等张溶液

18. 真题 2016-X071 患儿男, 8 个月。呕吐、腹泻 3 天入院。烦躁、口渴, 前囟明显凹陷, 口唇黏膜干燥, 皮肤弹性较差, 尿量明显减少。血清钠 135mmol/L。第 1 天补液宜用( )

- A. 2: 1 液
- B. 2: 3: 1 液
- C. 4: 3: 2 液
- D. ORS 液
- E. 生理盐水

19. 真题 2016-J050 婴儿易发生溢乳的最主要原因是( )

- A. 胃较垂直
- B. 胃容量小
- C. 胃逆蠕动
- D. 胃排空时间长
- E. 贲门括约肌松弛

20. 真题 2015-Z065 患儿, 5 个月。家长诉患儿爱流口水, 查体见齿龈部有白色乳凝块物, 不易擦去。擦拭时患儿无明显不适感。最可能的诊断是( )

- A. 齿龈炎
- B. 鹅口疮
- C. 溃疡性口腔炎
- D. 生理性表现
- E. 磨牙

21. 真题 2010-J077 患儿, 男, 2 岁。人工喂养, 4 天前咳嗽、发热、腹泻。体检: 体温 38.6℃, 中度脱水, 患儿在补液中突发抽搐, 持续约 1 分钟。抽搐最可能的原因是( )

- A. 高热惊厥

- B. 急性心力衰竭
- C. 低钙血症
- D. 低钠血症
- E. 中毒性脑病

22. 真题 2010-X062 患儿, 3 个月。腹泻 2 日, 呈黄绿色稀便, 有奶瓣和泡沫, 为纠正轻度脱水, 应选择( )

- A. 少量多次饮温开水
- B. 少量多次给予糖水
- C. 静脉补充林格液
- D. 少量多次喂服 ORS 液
- E. 静脉补充 10%葡萄糖溶液

23. 真题 2011-J088 单纯疱疹性口腔炎的病原体是( )

- A. 细菌
- B. 病毒
- C. 真菌
- D. 原虫
- E. 支原体

24. 真题 2011-J089 鹅口疮的病原体是( )

- A. 细菌
- B. 病毒
- C. 真菌
- D. 原虫
- E. 支原体

25. 真题 2011-X029 有关鹅口疮的治疗, 错误的是( )

- A. 2%碳酸氢钠溶液清洗口腔
- B. 积极治疗原发病
- C. 局部涂龙胆紫
- D. 加大抗生素剂量
- E. 局部涂制霉菌素液

26. 真题 2011-Z056 患儿, 男, 生后第 10 天发现口腔黏膜出现小片状白色乳凝块样物, 不易擦拭, 周围黏膜正常。进食、精神尚可。引起该病的病原微生物是( )

- A. 单纯疱疹病毒
- B. 链球菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 肺炎链球菌
- E. 白色念珠菌

27. 真题 2011-Z063 患儿, 8 个月, 腹泻伴中度脱水, 经补液后现已排尿, 剩余液体有 200ml, 需用 10%氯化钾溶液静脉补钾, 最多给( )

- A. 3ml
- B. 6ml
- C. 9ml
- D. 12ml
- E. 15ml

28. 真题 2011-Z066 患儿, 男, 42 天。因“腹胀 5 天, 便血伴呕血 1 天”就诊。查体 患儿精神差, 面色苍白, 呼吸浅促, 心肺无异常, 腹胀明显, 肠鸣音消失, X 线

片显示小肠充气、肠管扩张。该患儿最有可能为( )

- A. 急性重型腹泻
- B. 咽下综合征
- C. 急性坏死性小肠结肠炎
- D. 细菌性痢疾
- E. 急性病毒性肠炎

29. 真题 2015-J069 患儿, 男, 8 个月。11 月中旬入院, 其入院前 2 天出现发热、咳嗽, 随后呕吐 3 次, 大便呈黄色水样, 10 余次/天, 黏液少, 无腥臭。体检: T39℃, 精神萎靡, 前囟及眼窝凹陷, 哭泪少, 皮肤弹性略差, 咽稍充血, 心肺检查无异常, 大便检查(-)。引起腹泻的病原体最可能是( )

- A. 轮状病毒
- B. 铜绿假单胞菌
- C. 白色假丝酵母菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 致病性大肠埃希菌

30. 真题 2014-Z068 腹泻患儿, 预防臀红最主要的护理措施是( )

- A. 暴露臀部皮肤
- B. 俯卧位
- C. 大便后及时清洗臀部
- D. 勤换尿布
- E. 臀部涂爽身粉

31. 真题 2014-J059 引起夏季小儿腹泻的病原体主要是( )

- A. 致病性大肠杆菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 轮状病毒
- D. 变形杆菌
- E. 柯萨奇病毒

32. 真题 2013-X054 患儿, 3 个月。腹泻 2 日, 呈黄绿色稀便, 有奶瓣和泡沫, 为纠正轻度脱水, 应选择( )

- A. 少量多次饮温开水
- B. 少量多次给予糖水
- C. 静脉补充林格液
- D. 少量多次喂服 ORS 液
- E. 静脉补充 10%葡萄糖溶液

33. 真题 2013-X053 ORS (口服补液盐) 液的成分中电解质含量最多的是( )

- A. 氯化钠
- B. 氯化钾
- C. 氯化钙
- D. 葡萄糖
- E. 枸橼酸钠

34. 真题 2013-J069 秋季腹泻最常见的病原体是( )

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 耶尔森菌

- D. 轮状病毒
- E. 柯萨奇病毒

35. 模拟题 疱疹性口腔炎与鹅口疮的共同特点是( )

- A. 发热
- B. 口腔黏膜损伤
- C. 疼痛、流涎
- D. 淋巴结肿大
- E. 进食困难

36. 真题 2015-X074 患儿,男,3个月。腹泻2天,呈黄绿色稀便,有奶瓣和泡沫。为纠正轻度脱水,应选择( )

- A. 少量多次饮温开水
- B. 少量多次给予糖水
- C. 静脉补充林格液
- D. 少量多次喂服 ORS 液
- E. 静脉补充 10%葡萄糖液

37. 真题 2014-X075 患儿男,2岁。精神萎靡,眼窝明显凹陷,哭时泪少,口唇干燥,皮肤弹性差,尿量明显减少,被诊断为中度脱水,该患儿失水占体重的百分比是( )

- A. 5%以下
- B. 5%-10%
- C. 10%-20%
- D. 20%-30%
- E. 30%-40%

38. 真题 2018-Z050 患儿男,生后第10天发现口腔黏膜出现小片状白色乳凝块样物,不易擦拭,周围黏膜正常。进食、精神尚可。引起该病的病原微生物是( )

- A. 链球菌
- B. 单纯疱疹病毒
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 肺炎链球菌
- E. 白色念珠菌

39. 真题 2018-X065 患儿,3个月。腹泻2日,呈黄绿色稀便,有奶瓣和泡沫,为纠正轻度脱水,应选择( )

- A. 少量多次饮温开水
- B. 静脉补充 10%葡萄糖溶液
- C. 少量多次喂服 ORS 液
- D. 静脉补充林格液
- E. 少量多次给予糖水

40. 真题 2017-X068 可以判断腹泻患儿脱水性质的检查是( )

- A. 血钾测定
- B. 血钠测定
- C. 血糖测定
- D. 血清蛋白测定
- E. CO<sub>2</sub>结合力测定

41. 真题 2018-X079 ORS(口服补液盐)液的成分中电解

质含量最多的是( )

- A. 葡萄糖
- B. 碳酸氢钠
- C. 氯化钾
- D. 氯化钠
- E. 氯化钙

42. 真题 2017-J084 下列哪种口腔炎患儿应注意与健康儿隔离( )

- A. 鹅口疮
- B. 口角炎
- C. 疱疹性口腔炎
- D. 单纯性口腔炎
- E. 溃疡性口腔炎

43. 真题 2019-X089 慢性腹泻病程为( )

- A. 2周以内
- B. 3周以内
- C. 2周~2个月
- D. 2个月以上
- E. 半年以上

44. 真题 2019-J031 关于预防新生儿臀红的措施,不正确的是( )

- A. 勤换尿布
- B. 避免尿液和粪便长时间刺激
- C. 垫塑料布防止床单潮湿
- D. 大便后用温水洗净臀部
- E. 包裹不可过松或过紧

45. 真题 2019-J032 婴儿肠管的总长度约为( )

- A. 身长的1倍
- B. 身长的2倍
- C. 身长的3倍
- D. 身长的4倍
- E. 身长的6倍

46. 真题 2019-X067 判断腹泻患儿脱水性质的主要检查是( )

- A. 血清钙
- B. 血清钾
- C. 血清钠
- D. 血清镁
- E. CO<sub>2</sub>结合力

47. 真题 2019-X088 迁延性腹泻病程为( )

- A. 1周以内
- B. 2周以内
- C. 2周~2个月
- D. 2个月以上
- E. 半年以上

## 六.呼吸系统疾病患儿的护理

1. 真题 2010-J033 小儿急性上呼吸道感染最常见的病原体是( )

- A. 细菌
- B. 真菌
- C. 病毒
- D. 支原体
- E. 衣原体

2. 模拟题 按病理分类婴幼儿最常见的肺炎是( )

- A. 大叶性肺炎
- B. 支气管肺炎
- C. 间质性肺炎
- D. 干酪性肺炎
- E. 原虫性肺炎

3. 模拟题 小儿疱疹性咽峡炎的病原体是( )

- A. 鼻病毒
- B. 腺病毒
- C. 流感病毒
- D. 柯萨奇病毒
- E. 单纯疱疹病毒

4. 模拟题 患儿,女,2岁。1天前,出现发热、声音嘶哑、喉鸣、吸气性呼吸困难,双肺可闻及喉传导音或管状呼吸音,心率加快,护士考虑该患儿最可能的诊断是( )

- A. 喘憋性肺炎
- B. 支气管哮喘
- C. 急性感染性喉炎
- D. 支气管肺炎合并心力衰竭
- E. 腺病毒性肺炎合并心力衰竭

5. 模拟题 患儿,男,2岁。被诊断为“急性感染性喉炎”,患儿出现喉鸣和吸气性呼吸困难、烦躁不安、口唇发绀,双眼圆睁,头面出汗,肺部呼吸音明显减弱,心音低钝。此患儿喉梗阻的程度为( )

- A. I度
- B. II度
- C. III度
- D. IV度
- E. V度

6. 模拟题 婴儿期引起高热惊厥最常见的病因是( )

- A. 呼吸道感染
- B. 脑脓肿
- C. 重症肺炎
- D. 脑积水
- E. 低钙血症

7. 模拟题 婴幼儿易患呼吸道感染的免疫因素是呼吸道黏膜缺少( )

- A. SIgA
- B. IgM
- C. IgG
- D. IgE

E. IgD

8. 模拟题 患儿,8岁。4天前出现发热、咳嗽,体温最高达39℃,咳嗽呈阵发性刺激性干咳,体检:肺部呼吸音增粗。胸部X线:大片密度增高影;血清冷凝集试验呈阳性。引起该患儿肺部病变的病原体最可能是( )

- A. 肺炎链球菌
- B. 肺炎支原体
- C. 流感嗜血杆菌
- D. 呼吸道合胞病毒
- E. 金黄色葡萄球菌

9. 模拟题 急性喉炎出现下列哪项症状时,应及时输入足量的广谱抗生素( )

- A. 发热
- B. 声音嘶哑
- C. 呼吸困难
- D. 喉鸣
- E. 犬吠样咳嗽

10. 模拟题 小儿咽结合膜热的病原体是( )

- A. 腺病毒
- B. 单纯疱疹病毒
- C. 柯萨奇A组病毒
- D. 呼吸道合胞病毒
- E. 水痘-带状疱疹病毒

11. 真题 2016-X082 患儿女,6个月。高热,中毒症状明显。呻吟,双肺有中细湿啰音,诊断为支气管肺炎,其抗生素应用至体温正常后( )

- A. 1-2天
- B. 3-4天
- C. 5-7天
- D. 8-10天
- E. 11-14天

12. 真题 2016-J034 小儿急性上呼吸道感染最常见的病原体是( )

- A. 细菌
- B. 真菌
- C. 病毒
- D. 支原体
- E. 衣原体

13. 真题 2010-X010 对小儿肺炎诊断最有意义的检查是( )

- A. 血常规
- B. 胸部X线
- C. 痰细菌培养
- D. 咽拭子涂片
- E. 纤维支气管镜

14. 真题 2010-X056 新生儿胎粪吸入性肺炎X线显示( )

- A. 两肺大片状阴影

- B. 肺门哑铃状阴影
- C. 两肺密布钙化点
- D. 两肺肺气肿
- E. 两肺肺不张

15. 真题 2010-Z046 患儿, 5 岁。发热、咳嗽 6 天, T38℃, 呼吸 24 次/分, 肺部可闻及细湿啰音, 痰液黏稠, 不易咳出。该患儿的主要护理措施是( )

- A. 立即物理降温
- B. 嘱患儿勿进食过饱
- C. 给予适量止咳药
- D. 定时雾化吸入、排痰
- E. 室内湿度应保持 45%

16. 真题 2011-J081 患儿, 8 岁。4 天前出现发热、咳嗽, 体温最高达 39℃, 咳嗽呈阵发性刺激性干咳。体检: 肺部呼吸音增粗。胸部 X 线: 大片密度增高影, 血清冷凝集试验呈阳性。引起该患儿肺部病变的病原体最可能是( )

- A. 革兰阴性杆菌
- B. 肺炎支原体
- C. 流感嗜血杆菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 呼吸道合胞病毒

17. 真题 2011-X082 患儿, 男, 8 个月。发热、咳嗽及呼吸困难 4 天, 呈弛张热。查体: 精神萎靡, 皮肤可见荨麻疹样皮疹, 白细胞明显升高, 有核左移, 胸片呈现多发性小脓肿样阴影。该患儿最可能的疾病是( )

- A. 腺病毒性肺炎
- B. 金黄色葡萄球菌肺炎
- C. 真菌性肺炎
- D. 支原体肺炎
- E. 呼吸道合胞病毒肺炎

18. 真题 2011-X083 患儿, 男, 8 个月。发热、咳嗽及呼吸困难 4 天, 呈弛张热。查体: 精神萎靡, 皮肤可见荨麻疹样皮疹, 白细胞明显升高, 有核左移, 胸片呈现多发性小脓肿样阴影。该患儿出现了呼吸困难加重, 烦躁不安, 高热, 面色青灰, 左肺叩诊实音, 可能发生了( )

- A. 中毒性脑病
- B. 脑水肿
- C. 肺水肿
- D. 肺脓肿
- E. 脓胸

19. 真题 2011-X084 患儿, 男, 8 个月。发热、咳嗽及呼吸困难 4 天, 呈弛张热。查体: 精神萎靡, 皮肤可见荨麻疹样皮疹, 白细胞明显升高, 有核左移, 胸片呈现多发性小脓肿样阴影。抗感染首选( )

- A. 甲硝唑
- B. 利巴韦林
- C. 病毒唑
- D. 新青霉素 II

E. 制霉菌素

20. 真题 2011-X085 患儿, 男, 8 个月。发热、咳嗽及呼吸困难 4 天, 呈弛张热。查体: 精神萎靡, 皮肤可见荨麻疹样皮疹, 白细胞明显升高, 有核左移, 胸片呈现多发性小脓肿样阴影 3 天后, 患儿呼吸困难突然加重, 明显烦躁不安, 面色青紫, 呼吸 60 次/分, 左上肺叩诊鼓音, 听诊呼吸音减弱, 最可能出现的并发症是( )

- A. 脓胸
- B. 脓气胸
- C. 心力衰竭
- D. 肺实变
- E. 渗出性胸膜炎

21. 真题 2011-Z059 患儿, 6 个月。患支气管肺炎, 半天来突然烦躁不安, 喘憋加重, 口周青紫。体检: 呼吸 68 次/分, 心率 180 次/分, 心音低钝, 两肺细湿啰音增多, 叩诊无异常, 肝肋下 3.5cm。最可能发生( )

- A. 急性心力衰竭
- B. 脓胸
- C. 脓气胸
- D. 肺大疱
- E. 肺不张

22. 真题 2015-J067 患儿 1.5 岁, 发热、流涕 3 天。今日外耳道流出少量脓性分泌物, 考虑为中耳炎。其易患中耳炎的原因是( )

- A. 后鼻道狭窄
- B. 鼻腔相对较小
- C. 鼻窦口相对较大
- D. 咽鼓管宽、短、直
- E. 喉部较长, 呈漏斗状

23. 真题 2015-J062 患儿, 男, 2 岁。因“发热、犬吠样咳嗽、声嘶 1 天, 夜间症状较重”就诊。查体可见三凹征, 吸气性喉鸣, 咽部充血。最可能的诊断是( )

- A. 急性支气管炎
- B. 急性感染性喉炎
- C. 咽结合膜热
- D. 疱疹性咽峡炎
- E. 毛细支气管炎

24. 真题 2014-Z032 小儿毛细支气管炎好发年龄是( )

- A. 2 岁以内
- B. 3 岁-4 岁
- C. 5 岁-7 岁
- D. 7 岁-12 岁
- E. 各年龄组

25. 真题 2014-X027 重症肺炎患儿静脉给抗生素, 用药时间应持续至体温正常后( )

- A. 1-2 天
- B. 3-4 天
- C. 3-5 天
- D. 5-7 天

E. 8-10 天

26. 真题 2014-J074 患者, 男, 11 岁。一个月前因发热、咳嗽, 胸闷, 行抗感染治疗 1 周好转。今日因再次发热、气促、胸痛入院。查体: 体温 38.5℃, 血压 135/85mmHg, 脉搏 118 次/分, 呼吸 25 次/分, 右侧呼吸音减弱, 叩诊上部为鼓音, 下部浊音。为明确诊断应进行的检查不包括( )

- A. CT 检查
- B. 胸腔穿刺
- C. B 超检查
- D. 胸部正位片
- E. 血液常规检查

27. 真题 2013-J073 婴儿的呼吸类型是( )

- A. 腹膈式呼吸
- B. 胸腹式呼吸
- C. 胸式呼吸
- D. 抽泣样呼吸
- E. 点头样呼吸

28. 真题 2011-Z060 患儿, 男, 1 岁半。因低热、流涕 1 天, 咳嗽、烦躁半小时就诊。呈犬吠样咳, 伴有声音嘶哑、吸气性喉鸣。T38.1℃, 咽部充血, 心肺无异常。首先应考虑( )

- A. 急性支气管炎
- B. 支气管肺炎
- C. 支气管哮喘
- D. 急性感染性喉炎
- E. 先天性喉喘鸣

29. 模拟题 患儿, 男, 6 个月。支气管肺炎, 半天来突然烦躁不安, 口唇发绀, 有鼻翼翕动及三凹征。体检: 呼吸 72 次/分, 心率 180 次/分, 心音低钝, 两肺大量细湿啰音, 肝肋下 3.5cm, 护士判断该患儿最可能并发( )

- A. 脓胸
- B. 肺不张
- C. 脓气胸
- D. 肺大泡
- E. 急性心力衰竭

30. 真题 2018-Z041 预防上呼吸道感染患儿发生惊厥的主要措施是( )

- A. 按医嘱应用镇静剂
- B. 保持安静、减少刺激
- C. 按医嘱应用抗生素
- D. 积极控制体温
- E. 密切观察及时发现惊厥前兆

31. 真题 2018-J086 小儿肺炎最常见的致病菌为( )

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 肺炎链球菌
- C. 柯萨奇病毒
- D. 呼吸道合胞病毒

E. 腺病毒

32. 真题 2018-J087 咽-结合膜热最常见的致病菌为( )

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 肺炎链球菌
- C. 柯萨奇病毒
- D. 呼吸道合胞病毒
- E. 腺病毒

33. 真题 2019-J005 患儿, 2 岁半。发热、流涕 4 天, 今日外耳道流出少量脓性分泌物, 考虑为中耳炎。其易患中耳炎的原因是( )

- A. 后鼻道狭窄
- B. 鼻腔相对较小
- C. 鼻窦口相对较大
- D. 咽鼓管宽、短、直
- E. 喉部较长, 呈漏斗状

## 七. 循环系统疾病患儿的护理

1. 真题 2010-Z075 患儿, 男, 2 岁。体检发现胸骨左缘第 2 肋间有响亮的连续性机器样杂音, 伴震颤, 传导广泛, P2 亢进, 周围血管征阳性。该患儿最可能的诊断是( )

- A. 动脉导管未闭
- B. 室间隔缺损
- C. 肺动脉狭窄
- D. 房间隔缺损
- E. 法洛四联症

2. 模拟题 患儿, 男, 7 岁。先天性心脏病, 已用地高辛维持治疗近 5 个月, 因上呼吸道感染并发充血性心力衰竭, 按医嘱使用毛花苷 C (西地兰), 出现恶心、呕吐、视物模糊, 上述临床表现的原因可能是( )

- A. 上呼吸道感染加重病情
- B. 胃肠道感染
- C. 急性心力衰竭加重
- D. 强心苷中毒的反应
- E. 先心病的表现

3. 模拟题 下列不属于法洛四联症临床表现的是( )

- A. 杵状指
- B. 潜伏青紫
- C. 发育滞后
- D. 蹲踞现象
- E. 缺氧发作

4. 模拟题 法洛四联症患儿突然昏厥抽搐的原因是( )

- A. 长期脑缺氧
- B. 合并脑膜炎
- C. 合并脑脓肿
- D. 合并脑血栓
- E. 肺动脉漏斗部肌肉痉挛

5. 模拟题 法洛四联症患儿蹲踞舒适的原因是( )

- A. 心脑血管增加  
B. 肺静脉回心血量增加  
C. 增加体循环阻力，减少右向左分流，增加肺血量  
D. 缓解漏斗部痉挛  
E. 以上均不是
6. 模拟题 引起学龄期儿童心力衰竭的常见原因是( )  
A. 中毒性心肌炎  
B. 病毒性心肌炎  
C. 风湿性心脏病  
D. 心律失常  
E. 心包炎
7. 真题 2016-Z066 患儿男，8个月。室间隔缺损，因咳嗽3日收治，半小时前患儿突发面色灰白，烦躁不安，呼吸困难，心率180次/分，呼吸60次/分，肝脏肋下可触及。最可能的原因是( )  
A. 急性呼吸衰竭  
B. 急性心力衰竭  
C. 肺水肿  
D. 病毒性心肌炎  
E. 急性重型肝炎
8. 真题 2015-Z069 患儿，男，3个月。出生后3个月开始哭闹时有青紫，后逐渐加重，有昏厥史。最可能的诊断是( )  
A. 房间隔缺损  
B. 室间隔缺损  
C. 法洛四联症  
D. 肺动脉狭窄  
E. 动脉导管未闭
9. 真题 2011-J031 婴儿生后持续青紫，最可能患有( )  
A. 房间隔缺损  
B. 室间隔缺损  
C. 肺动脉狭窄  
D. 法洛四联症  
E. 动脉导管未闭
10. 真题 2011-Z006 法洛四联症的主要临床特征不包括( )  
A. 肺动脉狭窄  
B. 室间隔缺损  
C. 主动脉骑跨  
D. 房间隔缺损  
E. 右心室肥厚
11. 真题 2013-J048 最常见的青紫型先天性心脏病是( )  
A. 室间隔缺损  
B. 房间隔缺损  
C. 肺动脉狭窄  
D. 大血管错位  
E. 法洛四联症

12. 真题 2013-X056 护理法洛四联症患者，要注意保证入量，防止脱水，其目的是( )  
A. 防止便秘  
B. 防止休克  
C. 防止血栓栓塞  
D. 防止心力衰竭  
E. 防止肾衰竭
13. 真题 2013-Z068 属于右向左分流型先心病的是( )  
A. 房间隔缺损  
B. 法洛四联症  
C. 室间隔缺损  
D. 动脉导管未闭  
E. 右位心
14. 真题 2017-J013 最常见的左向右分流型先天性心脏病是( )  
A. 房间隔缺损  
B. 室间隔缺损  
C. 动脉导管未闭  
D. 法洛四联症  
E. 主动脉狭窄
15. 真题 2014-X076 小儿高血压的标准是( )  
A. 收缩压高于标准血压30mmHg  
B. 收缩压高于标准血压20mmHg  
C. 收缩压高于标准血压15mmHg  
D. 舒张压高于标准血压30mmHg  
E. 舒张压高于标准血压20mmHg
16. 真题 2015-X048 法洛四联症患者缺氧发作时，应立即采取的体位是( )  
A. 平卧位  
B. 侧卧位  
C. 半坐位  
D. 膝胸卧位  
E. 头低脚高位
17. 真题 2015-J048 左向右分流型先天性心脏病最易并发( )  
A. 脑脓肿  
B. 肺炎  
C. 体格发育障碍  
D. 脑血栓形成  
E. 亚急性细菌性心内膜炎
18. 真题 2014-J080 急性肾小球肾炎患儿，10岁，入院体检时测得上肢收缩压为125mmHg。该患儿血压较正常值升高( )  
A. 5mmHg  
B. 10mmHg  
C. 15mmHg  
D. 20mmHg  
E. 25mmHg

19. 模拟题 存活婴儿中最常见的青紫型先天性心脏病是( )

- A. 室间隔缺损
- B. 房间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 右位心

20. 真题 2016-J081 患儿男, 3岁。自1岁起出现活动后气促、乏力, 常喜下蹲位, 发绀, 胸骨左缘第2~4肋间闻及III级收缩期杂音, 可见杵状指。最可能的原因是( )

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 法洛四联症
- D. 动脉导管未闭
- E. 右位心

21. 真题 2014-Z069 属于左向右分流型先心病的是( )

- A. 房间隔缺损
- B. 大血管错位
- C. 肺动脉缩窄
- D. 主动脉缩窄
- E. 法洛四联症

22. 真题 2017-Z027 患儿出现以下哪种畸形时会呈现持续发绀( )

- A. 室内隔缺损(VSD)
- B. 动脉导管未闭(PDA)
- C. 房间隔缺损(ASD)
- D. 肺动脉瓣狭窄(PS)
- E. 法洛四联症(TOF)

23. 真题 2018-Z039 1岁半小儿心尖搏动位于( )

- A. 左侧第五肋间, 锁骨中线处
- B. 左侧第四肋间, 锁骨中线外侧
- C. 左侧第四至第五肋间, 锁骨中线处
- D. 左侧第五肋间, 锁骨中线外侧
- E. 左侧第四肋间, 锁骨中线处

24. 真题 2018-J052 关于小儿心率次数的叙述, 正确的是( )

- A. 新生儿正常心率为140~150次/分
- B. 1岁以内小儿正常心率为130~140次/分
- C. 4~7岁小儿正常心率为100~120次/分
- D. 2~3岁小儿正常心率为120~130次/分
- E. 8~14岁小儿正常心率为70~90次/分

25. 真题 2019-J027 最常见的右向左分流型先天性心脏病是( )

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症

E. 主动脉狭窄

## 八. 血液系统疾病患儿的护理

1. 真题 2010-X088 患儿, 男, 9个月。人工喂养, 面色苍白1个月, 肝脾增大, 红细胞大小不等, 以小为主, 中心淡染区扩大, 白细胞及血小板正常。最可能的疾病为( )

- A. 营养性缺铁性贫血
- B. 营养性巨幼细胞性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 生理性贫血
- E. 地中海贫血

2. 模拟题 患儿, 女, 生后1天, 足月顺产, 于生后第2天出现黄疸, 肝脾不大, 母亲血型为“O”型, 患儿为“A”型; 患儿血清胆红素 $260\mu\text{mol/L}$ 。为患儿行蓝光疗法时应( )

- A. 裸体
- B. 戴眼罩
- C. 穿单衣、系尿布
- D. 穿单衣、系尿布、戴眼罩
- E. 裸体、系尿布、戴眼罩

3. 模拟题 患儿, 女, 生后1天, 足月顺产, 于生后第2天出现黄疸, 肝脾不大, 母亲血型为“O”型, 患儿为“A”型; 患儿血清胆红素 $260\mu\text{mol/L}$ 。本病最严重的并发症为( )

- A. 贫血
- B. 水肿
- C. 硬肿
- D. 核黄疸
- E. 酸中毒

4. 模拟题 患儿, 女, 6岁。今日突发双下肢、臀部紫红色斑, 高出皮肤, 压不褪色, 发痒, 伴低热、乏力、关节痛, 2周前有上呼吸道感染史。判断患儿可能发生了( )

- A. 过敏性紫癜
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 血友病
- D. 特发性血小板减少性紫癜
- E. 药物过敏

5. 模拟题 贫血患儿, 活动量稍大时气促、心悸,  $\text{Hb}40\text{g/L}$ , 该患儿的贫血程度是( )

- A. 轻度
- B. 中度
- C. 重度
- D. 极重度
- E. 正常

6. 模拟题 婴儿缺铁性贫血的病因主要是( )

- A. 铁利用不良
- B. 铁摄入不足

- C. 铁吸收不良
- D. 慢性失血
- E. 缺乏叶酸

7. 模拟题 患儿, 1岁半。诊断为“营养性缺铁性贫血”, 需口服铁剂治疗。护士对家长进行应用铁剂的指导, 其中不正确的是。( )

- A. 注意观察药物反应, 可能有恶心、排k异常等
- B. 应在两餐之间服药, 减少对胃肠道的刺激
- C. 可与牛奶同时服用, 利于铁剂吸收
- D. 可用吸管服药, 以减轻牙齿染黑
- E. 患儿大便呈黑色是正常现象, 停药后恢复正常

8. 模拟题 缺铁性贫血患者经铁剂治疗至血红蛋白正常后, 仍需继续服用铁剂多长时间( )

- A. 立即停止
- B. 1个月
- C. 2~3个月
- D. 1.5~2个月
- E. 2个月

9. 模拟题 属于血小板输注禁忌证的是( )

- A. 肿瘤化疗后的血小板减少
- B. 体外循环
- C. 血栓性血小板减少性紫癜
- D. 肿瘤放疗后的血小板减少
- E. 肝移植手术

10. 模拟题 口服铁剂应该( )

- A. 剂量大不要紧
- B. 可和茶水同服
- C. 饭前服用
- D. 警惕黑便
- E. 液体铁剂要用吸管

11. 模拟题 巨幼细胞贫血患儿, 出现神经系统症状的主要原因是( )

- A. 叶酸缺乏
- B. 维生素 B12 缺乏
- C. 叶酸和维生素 B12 缺乏
- D. 铁缺乏
- E. G-6-PD 缺乏

12. 模拟题 原发性血小板减少性紫癜的主要治疗是( )

- A. 抗感染治疗
- B. 肾上腺皮质激素治疗
- C. 大量维生素治疗
- D. 1, 6-磷酸果糖治疗
- E. 补充铁剂治疗

13. 模拟题 防止早产儿发生缺铁性贫血, 给予铁剂的时间是( )

- A. 1个月
- B. 2个月
- C. 3个月

- D. 4个月
- E. 5个月

14. 模拟题 缺铁性贫血患者较常见的受损害部位是( )

- A. 呼吸道
- B. 淋巴结
- C. 尿道
- D. 消化道
- E. 皮肤、黏膜

15. 模拟题 患儿, 男, 6个月。生后母乳喂养, 未及时添加辅食。诊断为营养性巨幼红细胞性贫血, 主要病因是( )

- A. 铁摄入不足
- B. 锌摄入不足
- C. 食物中缺少维生素 C
- D. 维生素 B12 及叶酸供给不足
- E. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏

16. 模拟题 患儿, 女, 生后1天, 足月顺产, 于生后第2天出现黄疸, 肝脾不大, 母亲血型为“O”型, 患儿为“A”型; 患儿血清胆红素  $260 \mu\text{mol/L}$ 。最有可能的诊断是( )

- A. 新生儿肝炎
- B. 母乳性黄疸
- C. 生理性黄疸
- D. Rh 溶血病
- E. ABO 血型不合溶血

17. 真题 2018-J017 缺铁性贫血发病率最高的年龄段为( )

- A. 2~3岁
- B. 新生儿
- C. 出生6个月~2岁
- D. 出生6个月内
- E. 3~5岁

18. 模拟题 18个月的小儿, 一直母乳喂养, 未添加辅食, 查体: 口唇及睑结膜苍白, Hb90g/L, 血涂片见红细胞体积小, 含色素低, 该患儿可能是( )

- A. 感染性贫血
- B. 生理性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 缺铁性贫血
- E. 巨幼细胞性贫血

19. 真题 2018-X017 营养性巨幼红细胞性贫血特有的临床表现是( )

- A. 神经、精神症状
- B. 心率增快
- C. 疲乏无力
- D. 食欲不振
- E. 红细胞减少

20. 真题 2016-Z057 女婴, 4个月。足月顺产。护士在

家访时,为预防小儿营养性缺铁性贫血,应重点指导家长( )

- A. 母乳喂养
- B. 添加鱼肝油
- C. 服用铁剂
- D. 添加蛋黄
- E. 添加水果

21. 真题 2010-X089 患儿,男,9个月。人工喂养,面色苍白1个月,肝脾增大,红细胞大小不等,以小为主,中心淡染区扩大,白细胞及血小板正常。应给予的最佳治疗是( )

- A. 注射铁剂
- B. 口服二价铁
- C. 口服叶酸
- D. 注射维生素 B12
- E. 输全血

22. 真题 2010-X090 患儿,男,9个月。人工喂养,面色苍白1个月,肝脾增大,红细胞大小不等,以小为主,中心淡染区扩大,白细胞及血小板正常。该患儿的护理措施中不正确的是( )

- A. 及时添加绿叶蔬菜
- B. 及时添加动物肝脏及蛋黄
- C. 铁剂和牛奶、钙片同服
- D. 肌内注射铁剂时部位要深
- E. 铁剂应在两餐间服用

23. 真题 2018-Z020 患儿女,7个月。感冒后出现全身皮肤、粘膜散在出血点,多为针尖大小,分布不均,以四肢为多,并有鼻出血。血化验:血小板为  $20 \times 10^9/L$ ,红细胞及白细胞正常。诊断为特发性血小板减少性紫癜。该患儿护理措施中错误的是( )

- A. 给予肾上腺皮质激素治疗
- B. 密切观察患儿呼吸、脉搏、神志等
- C. 禁止尖锐、多刺的食物
- D. 忌服阿司匹林药物
- E. 鼓励患儿多运动

24. 真题 2010-Z048 患儿,女,7个月。感冒后出现全身皮肤、黏膜散在出血点,多为针尖大小,分布不均,以四肢为多,并有鼻出血。血化验:血小板为  $20 \times 10^9/L$ ,红细胞及白细胞正常,诊断为特发性血小板减少性紫癜。该患儿护理措施中错误的是( )

- A. 给予肾上腺皮质激素治疗
- B. 密切观察患儿呼吸、脉搏、神志等
- C. 忌服阿司匹林药物
- D. 鼓励患儿多运动
- E. 禁食尖锐、多刺的食物

25. 真题 2011-J005 婴幼儿最常见的贫血是( )

- A. 铅中毒性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 营养性混合性贫血
- D. 营养性缺铁性贫血

E. 慢性溶血性贫血

26. 真题 2011-J029 新生儿发生生理性贫血的时期是( )

- A. 生后 2~3 个月
- B. 生后 4~5 个月
- C. 生后 6~7 个月
- D. 生后 8~9 个月
- E. 生后 10~12 个月

27. 真题 2011-X086 小儿营养性缺铁性贫血应主要补充( )

- A. 钾盐
- B. 叶酸
- C. 铁剂
- D. 钙剂
- E. 蛋白质

28. 真题 2011-X087 小儿营养性巨幼红细胞性贫血应主要补充( )

- A. 钾盐
- B. 叶酸
- C. 铁剂
- D. 钙剂
- E. 蛋白质

29. 真题 2011-Z051 患儿,女,4岁。面色苍白。辅助检查示: Hb85g/L,血清铁蛋白减少。诊断为小细胞低色素性贫血。对该患儿应用铁剂治疗时,错误的做法是( )

- A. 应从小剂量开始,逐渐增加到全量
- B. 为减少对胃的刺激,应在两餐之间服用
- C. 为促进铁的吸收,可与果汁同服.
- D. 为促进铁的吸收,可与牛奶同服
- E. 为防止牙齿被染黑,服药后应漱口

30. 真题 2013-J034 营养性缺铁性贫血最常见的病因是( )

- A. 铁摄入不足
- B. 铁吸收不良
- C. 慢性失血
- D. 慢性腹泻
- E. 肝脏疾病

31. 真题 2013-X057 关于应用铁剂的描述中应除外( )

- A. 补充铁剂疗程为 3-6 个月
- B. 长期服用可致铁中毒
- C. 应从小剂量开始
- D. 可与维生素 C 同服
- E. 如出现黑便立即停药

32. 真题 2014-X077 6-14 岁小儿血红蛋白正常值的下限是( )

- A. 80g/L

- B. 90g/L
- C. 100g/L
- D. 110g/L
- E. 120g/L

33. 真题 2014-Z006 缺铁性贫血患儿应用铁剂治疗,最先出现的血液改变是( )

- A. 血红蛋白增加
- B. 皮肤苍白消失
- C. 网织红细胞增加
- D. 头晕、乏力症状消失
- E. 肝、脾恢复正常大小

34. 真题 2015-J070 患儿, 8 个月。单纯母乳喂养。诊断为营养性巨幼红细胞性贫血。其主要病因是( )

- A. 铁摄入不足
- B. 锌摄入不足
- C. 食物中缺少维生素 C
- D. 维生素 B<sub>12</sub>及叶酸供给不足
- E. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏

35. 真题 2016-J007 婴幼儿最常见的贫血是( )

- A. 铅中毒性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 营养性混合性贫血
- D. 营养性缺铁性贫血
- E. 慢性溶血性贫血

36. 模拟题 患儿有溶血性贫血可出现( )

- A. 出现生理性贫血
- B. 血白细胞分类中中性粒细胞与淋巴细胞比例相等
- C. 血红细胞较大、染色较深
- D. 出现生理性溶血
- E. 血中有少量有核红细胞

37. 真题 2017-J054 小儿营养性贫血好发年龄( )

- A. 胎儿期
- B. 新生儿期
- C. 婴幼儿期
- D. 学龄前期
- E. 学龄期

38. 真题 2018-Z059 营养室制定的含有瘦肉、蛋黄、猪肝、黑木耳的菜谱适合下列哪类血液病患者( )

- A. 过敏性紫癜
- B. 缺铁性贫血
- C. 急性白血病
- D. 慢性再生障碍性贫血
- E. 特发性血小板减少性紫癜

39. 真题 2017-X095 小儿营养性缺铁性贫血应主要补充( )

- A. 钾盐
- B. 叶酸
- C. 铁剂

- D. 钙剂
- E. 蛋白质

40. 真题 2017-X096 小儿营养性巨幼红细胞性贫血应主要补充( )

- A. 钾盐
- B. 叶酸
- C. 铁剂
- D. 钙剂
- E. 蛋白质

41. 真题 2019-X064 缺铁性贫血患儿血液检查特点是( )

- A. 红细胞数量减少
- B. 网织红细胞减少
- C. 血清铁蛋白增多
- D. 血清总铁结合力下降
- E. 红细胞中心淡染区扩大

## 九. 泌尿系统疾病患儿的护理

1. 真题 2010-J010 婴幼儿尿路感染最主要的感染途径是( )

- A. 血源感染
- B. 上行感染
- C. 淋巴感染
- D. 直接感染
- E. 邻近器官蔓延

2. 真题 2017-Z002 小儿肾病综合征常见的并发症是( )

- A. 水肿、感染、高胆固醇血症
- B. 低蛋白血症、血栓形成、肾功能衰竭
- C. 感染、血栓形成、电解质紊乱
- D. 低蛋白血症、高血压脑病、电解质紊乱
- E. 水肿、肾功能衰竭、高血压脑病

3. 真题 2016-J040 与急性肾小球肾炎发病有密切关系的病原体是( )

- A. 链球菌
- B. 葡萄球菌
- C. 支原体
- D. 病毒
- E. 真菌

4. 真题 2015-S072 患者, 男, 55 岁。体重 60kg, 急性肾小球肾炎, 轻度水肿。患者每天的饮食中食盐的摄入量应低于( )

- A. 0.5g
- B. 1g
- C. 1.5g
- D. 2g
- E. 2.5g

5. 真题 2010-J049 急性链球菌感染后引发的肾小球

肾炎主要的致病菌是( )

- A. A组 $\alpha$ 溶血性链球菌
- B. B组 $\alpha$ 溶血性链球菌
- C. A组 $\beta$ 溶血性链球菌
- D. B组 $\beta$ 溶血性链球菌
- E. 草绿色链球菌

6. 真题 2015-S073 患者,男,55岁。体重60kg,急性肾小球肾炎,轻度水肿。患者每天的饮食中蛋白质的摄入量应低于( )

- A. 40g
- B. 50g
- C. 60g
- D. 70g
- E. 80g

7. 真题 2015-Z045 小儿肾病综合征常见的并发症是( )

- A. 水肿、感染、高胆固醇血症
- B. 低蛋白血症、血栓形成、肾衰竭
- C. 感染、血栓形成、电解质紊乱
- D. 低蛋白血症、高血压脑病、电解质紊乱
- E. 水肿、肾衰竭、高血压脑病

8. 真题 2016-J036 婴幼儿急性肾功能衰竭时少尿的诊断是24h尿量少于( )

- A. 200ml
- B. 300ml
- C. 400ml
- D. 500ml
- E. 600ml

9. 真题 2016-Z018 小儿泌尿道感染的主要途径是( )

- A. 上行感染
- B. 血源性感染
- C. 直接蔓延
- D. 外伤后感染
- E. 尿路畸形和梗阻

10. 模拟题 患儿,男,7岁。水肿,尿少,肉眼血尿3天。BP135/100mmHg,眼睑及下肢水肿。尿常规尿蛋白(++),红细胞满视野/高倍镜。经治疗病情好转,能恢复正常生活的指标是( )

- A. Addis计数正常
- B. 血压正常
- C. 尿常规正常
- D. 无水肿
- E. 血沉正常

11. 模拟题 对确定尿路感染有决定意义的是( )

- A. 尿细菌培养及菌落计数阳性
- B. 尿路刺激征
- C. 尿中白细胞增多
- D. 腰痛及肾区叩痛
- E. 体温升高,白细胞总数增加

12. 模拟题 肾病综合征的患儿突发腰痛、血尿、少尿,可能的原因是( )

- A. 肾静脉血栓
- B. 急性肾衰竭
- C. 血压增高
- D. 感染加重
- E. 慢性肾衰竭

13. 模拟题 患儿,男,6岁。以急性肾炎收入院。近2天出现水肿、尿少加重。晨起自诉头晕、恶心、视物不清,应考虑发生( )

- A. 严重循环充血
- B. 高血压脑病
- C. 急性肾衰竭
- D. 感染加重
- E. 心力衰竭

14. 模拟题 患儿,女,14岁。近半月出现全身水肿,血压110/70mmHg。检查:尿蛋白(+++),透明管型2~3个/HP,血红蛋白110g/L,24小时尿蛋白>3.5g。为明确病变类型,应进行的辅助检查为( )

- A. 尿液检查
- B. 血液检查
- C. 肾功能检查
- D. 肾活检病理检查
- E. 肾B超检查

15. 真题 2015-J008 小儿尿路感染最主要的感染途径为( )

- A. 上行感染
- B. 直接感染
- C. 下行感染
- D. 血源感染
- E. 淋巴感染

16. 真题 2014-Z070 急性肾小球肾炎最主要的临床表现是( )

- A. 蛋白尿、氮质血症、高血压
- B. 水肿、少尿、血尿、高血压
- C. 水肿、少尿、蛋白尿、血尿
- D. 水肿、少尿、高血压、蛋白尿
- E. 血尿、少尿、高血压、氮质血症

17. 真题 2010-Z067 患儿,男,8岁。因眼睑水肿伴有头痛、头晕入院尿蛋白(++),血压130/90mmHg,初诊为“急性肾小球肾炎”。下列处理最重要的是( )

- A. 无盐饮食
- B. 低蛋白饮食
- C. 利尿、消肿、降压
- D. 记出入液量
- E. 肌内注射青霉素

18. 真题 2011-J046 急性肾小球肾炎属于下列哪种性质的疾病( )

- A. 细菌感染后免疫反应性疾病
- B. 细菌直接感染肾脏
- C. 病毒直接感染肾脏
- D. 单侧肾脏化脓性炎症
- E. 双侧肾脏化脓性炎症

19. 真题 2011-X079 患儿, 女, 14 岁。近半月出现全身水肿, 血压 110/70mmHg。检查: 尿蛋白(+++), 透明管型 2-3 个/HP, 血红蛋白 110g/L, 24 小时尿蛋白 >3.5g。最可能的诊断是( )

- A. 急性肾炎
- B. 慢性肾衰
- C. 慢性肾炎
- D. 肾盂肾炎
- E. 肾病综合征

20. 真题 2011-X080 患儿, 女, 14 岁。近半月出现全身水肿, 血压 110/70mmHg。检查: 尿蛋白(+++), 透明管型 2-3 个/HP, 血红蛋白 110g/L, 24 小时尿蛋白 >3.5g。为明确病变类型, 应进行的辅助检查为( )

- A. 尿液检查
- B. 血液检查
- C. 肾功能检查
- D. 肾活检病理检查
- E. 肾 B 超检查

21. 真题 2011-X081 患儿, 女, 14 岁。近半月出现全身水肿, 血压 110/70mmHg。检查: 尿蛋白(+++), 透明管型 2-3 个/HP, 血红蛋白 110g/L, 24 小时尿蛋白 >3.5g。应用泼尼松和环磷酰胺治疗后, 尿蛋白仍为(+++), 水肿无减轻。最好采用( )

- A. 加大泼尼松(强的松)剂量
- B. 换用地塞米松
- C. 输入血浆或低分子右旋糖酐
- D. 加用环孢素 A
- E. 加用吲哚美辛(消炎痛)

22. 真题 2011-Z025 肾病综合征患儿水肿或高血压时, 应选择的饮食是( )

- A. 高蛋白饮食
- B. 低盐饮食
- C. 高脂肪饮食
- D. 高纤维饮食
- E. 低钾饮食

23. 真题 2013-J029 婴幼儿尿路感染最主要的感染途径是( )

- A. 血源感染
- B. 上行感染
- C. 淋巴感染
- D. 直接感染
- E. 邻近器官蔓延

24. 真题 2013-X058 急性肾炎小儿可以恢复上学的标准是( )

- A. 血压正常
- B. 红细胞沉降率正常
- C. 尿常规正常
- D. 尿阿迪计数正常
- E. 抗“O”滴定度正常

25. 真题 2013-Z090 患儿, 男, 4 岁。因肾病综合征入院, 表现有水肿、蛋白尿, 目前无感染迹象。患儿入院后, 护士为他制定护理计划, 下列哪项不妥( )

- A. 每日测量体重
- B. 绝对卧床休息
- C. 详细记出入量
- D. 不限制液体摄入
- E. 蛋白摄入量为每天 2g/kg

26. 真题 2013-Z091 患儿, 男, 4 岁。因肾病综合征入院, 表现有水肿、蛋白尿, 目前无感染迹象。为了帮助患儿减轻眼睑水肿, 护士最好采取下列哪种方法( )

- A. 抬高患儿床头
- B. 缩短患儿看电视的时间
- C. 用生理盐水冲洗患儿眼睛
- D. 冷敷患儿双眼, 每日数次
- E. 建议患儿多卧床休息

27. 真题 2014-J072 患儿, 男, 8 岁。2 周前患上呼吸道感染, 近 2 日来颜面浮肿, 尿少, 尿为浓茶色, 诊断为急性肾小球肾炎。患儿感染的致病菌最可能是( )

- A. A 组 β-溶血性链球菌
- B. 甲型链球菌
- C. 草绿色链球菌
- D. 肺炎链球菌
- E. 粪链球菌

28. 模拟题 患儿, 10 岁。急性肾小球肾炎, 入院体检时测得上肢收缩压为 125mmHg, 该患儿血压较正常值增高( )

- A. 5mmHg
- B. 10mmHg
- C. 15mmHg
- D. 20mmHg
- E. 25mmHg

29. 真题 2018-Z033 急性肾小球肾炎的主要临床表现为( )

- A. 前驱感染、血尿、水肿、蛋白尿、高血压
- B. 前驱感染、血尿、水肿、蛋白尿
- C. 前驱感染、水肿、蛋白尿
- D. 水肿、低蛋白血症、高血压、血尿
- E. 前驱感染、水肿、蛋白尿、高血压

30. 真题 2018-J034 患儿男, 8 岁, 2 周前患上呼吸道感染, 近 2 日来颜面浮肿, 尿少, 尿为浓茶色。诊断为急性肾小球肾炎, 患儿感染的致病菌最可能是( )

- A. 草绿色链球菌
- B. 粪链球菌

- C. 甲型链球菌
- D. 肺炎链球菌
- E. A 组 β-溶血性链球菌

31. 真题 2017-X038 患者, 男, 5 岁。单纯性肾病诱导缓解首选药物是( )

- A. 抗生素
- B. 利尿剂
- C. 低分子右旋糖酐
- D. 强的松
- E. 环磷酰胺

32. 真题 2019-Z031 急性肾小球肾炎患儿在急性期每日食盐摄入量为( )

- A. 1~2g
- B. 3~4g
- C. 5~6g
- D. 7~8g
- E. 9~10g

33. 真题 2019-Z029 患儿, 男, 5 岁。因面部水肿 2 周, 诊肾病综合征入院。现患儿阴囊皮肤薄而透明, 水肿明显。应及时采取的措施是( )

- A. 用丁字带托起阴囊, 并保持干燥
- B. 严格限制入水量
- C. 绝对卧床休息
- D. 低盐饮食
- E. 无需处理

34. 真题 2019-J028 小儿尿道感染最常见的病菌是( )

- A. 大肠埃希菌
- B. 变形杆菌
- C. 克利伯杆菌
- D. 大肠杆菌
- E. 革兰阳性球菌

## 十. 神经系统疾病患儿的护理

1. 真题 2010-J019 婴儿化脓性脑膜炎, 脑膜刺激征出现较晚是因为( )

- A. 脑膜炎症反应轻
- B. 神经系统发育不完善
- C. 机体反应差
- D. 囟门未闭所起的缓冲作用
- E. 颈部肌肉不发达

2. 真题 2015-J092 小脑受累引起的脑瘫为( )

- A. 痉挛型
- B. 混合型
- C. 共济失调型
- D. 手足徐动型
- E. 肌张力低下型

3. 真题 2015-Z050 患儿, 6 个月。诊断化脓性脑膜炎。经正规治疗后, 脑脊液正常, 但头围进行性增大。该患

儿可能合并了( )

- A. 脑积水
- B. 脑出血
- C. 脑室管膜炎
- D. 中毒性脑病
- E. 慢性脑膜炎

4. 真题 2016-X068 患儿男, 5 岁。幼儿园老师反映上课时不停摇椅, 多跑动, 不专心, 不能完成手工作业, 但智力正常。最可能的诊断是( )

- A. 脑性瘫痪
- B. 注意缺陷多动障碍
- C. 多发性神经根神经炎
- D. 癫痫小发作
- E. 大脑发育不全

5. 真题 2016-Z065 患者男, 7 个月。发热、咳嗽 5 天, 呕吐 2 天, 抽搐 1 天。嗜睡, 前囟饱满, 双肺少许细湿啰音, 克氏征(-)、布氏征(-)。血白细胞  $17 \times 10^9/L$ , 中性粒细胞 0.66, 淋巴细胞 0.34; 脑脊液混浊, 白细胞  $1000 \times 10^6/L$ , 中性粒细胞为多, 蛋白质  $2g/L$ , 糖  $2.3mmol/L$ , 氯化物  $105mmol/L$ 。最可能的诊断是( )

- A. 化脓性脑膜炎
- B. 病毒性脑膜炎
- C. 结核性脑膜炎
- D. 中毒性脑病
- E. 脑性瘫痪

6. 真题 2016-Z091 流行性乙型脑炎的传播途径是( )

- A. 母婴传播
- B. 空气传播
- C. 虫媒传播
- D. 血液传播
- E. 粪-口传播

7. 模拟题 患儿, 男, 2 岁。因发热、头痛半天入院。查体: 患儿精神差, 有恶心、呕吐现象。脑脊液检查: 压力高, 外观浑浊, WBC 高, 以中性粒细胞为主, 蛋白升高, 糖和氯化物下降。入院时最有可能的诊断是( )

- A. 化脓性脑膜炎
- B. 病毒性脑膜炎
- C. 病毒性脑炎
- D. 急性多发性神经根炎
- E. 败血症

8. 模拟题 患儿, 男, 2 岁。因发热、头痛半天入院。查体: 患儿精神差, 有恶心、呕吐现象。脑脊液检查: 压力高, 外观浑浊, WBC 高, 以中性粒细胞为主, 蛋白升高, 糖和氯化物下降。上述疾病的主要致病菌是( )

- A. 脑膜炎奈瑟菌
- B. 柯萨奇病毒
- C. 结核杆菌
- D. 腮腺炎病毒
- E. 肺炎支原体

9. 模拟题 急性感染性多发性神经根神经炎血清免疫球蛋白显著增高的是( )

- A. IgA
- B. IgM
- C. IgE
- D. IgG
- E. IgD

10. 模拟题 小儿首选的止痉药是( )

- A. 地西洋
- B. 苯妥英钠
- C. 苯巴比妥钠
- D. 复方氯丙嗪
- E. 10%水合氯醛

11. 模拟题 化脓性脑膜炎患儿脑脊液外观特点为( )

- A. 清晰透明
- B. 毛玻璃样
- C. 浑浊或呈脓性
- D. 呈血性浑浊
- E. 静置 24 小时有网状薄膜形成

12. 模拟题 下列实验室检查中符合化脓性脑膜炎的一项是( )

- A. 脑脊液外观清亮, 白细胞  $100 \times 10^6/L$
- B. 脑脊液外观呈毛玻璃样, 白细胞  $500 \times 10^6/L$
- C. 脑脊液外观浑浊, 白细胞  $1000 \times 10^6/L$
- D. 糖和氯化物升高, 蛋白下降
- E. 糖和氯化物下降, 蛋白下降

13. 模拟题 患儿, 男, 10 个月。体温  $39^{\circ}C$ , 同时伴面色发甜, 48 小时前出现抽搐, 吃奶后呈喷射性呕吐。查体: 颈项强直, 此时最有价值的辅助检查为( )

- A. 脑血管造影检查
- B. 脑脊液检查
- C. 头颅 CT
- D. 脑电图
- E. 磁共振检查

14. 真题 2015-J091 锥体系受累引起的脑瘫为( )

- A. 痉挛型
- B. 混合型
- C. 共济失调型
- D. 手足徐动型
- E. 肌张力低下型

15. 真题 2015-X005 病毒性脑炎患儿急性颅内压升高有脑疝先兆时, 首先使用的药物是( )

- A. 20%甘露醇静脉注射
- B. 50%葡萄糖静脉注射
- C. 呋喃苯胺酸肌内注射
- D. 50%甘油口服
- E. 地塞米松静脉注射

16. 真题 2010-Z057 患儿, 4 岁。因发热、呕吐, 先烦

躁后精神萎靡及抽搐 2 次入院, 考虑“化脓性脑膜炎”。对患儿的护理措施, 正确的是( )

- A. 患儿输液速度宜快, 防止休克
- B. 只许物理降温, 不许药物降温
- C. 高蛋白、低热量、高维生素饮食
- D. 保持安静, 头侧位以防窒息
- E. 尽量少饮水

17. 真题 2011-J097 锥体系受累引起的脑瘫为( )

- A. 痉挛型
- B. 混合型
- C. 共济失调型
- D. 手足徐动型
- E. 肌张力低下型

18. 真题 2011-J098 小脑受累引起的脑瘫为( )

- A. 痉挛型
- B. 混合型
- C. 共济失调型
- D. 手足徐动型
- E. 肌张力低下型

19. 真题 2011-Z097 脑瘫患儿康复治疗的重点是( )

- A. 呼吸功能维持
- B. 皮肤护理
- C. 营养支持
- D. 预防感染
- E. 功能训练

20. 真题 2011-Z098 吉兰-巴雷综合征患儿呼吸肌麻痹时的护理要点是( )

- A. 呼吸功能维持
- B. 皮肤护理
- C. 营养支持
- D. 预防感染
- E. 功能训练

21. 真题 2013-J072 注意缺陷多动障碍的病因是( )

- A. 病因不明确
- B. 与受惊有关
- C. 与遗传有关
- D. 与环境有关
- E. 与教育有关

22. 真题 2013-X059 治疗小儿化脓性脑膜炎, 病原菌明确后使用敏感性抗生素的时间至少是( )

- A. 3-7 天
- B. 7-10 天
- C. 2-3 周
- D. 4-5 周
- E. 5-6 周

23. 真题 2013-X060 男, 6 个月。左耳流脓 2 天后出现高热、抽搐 2 次。查体: 左外耳道牵涉性疼痛, 前囟紧张, 脑膜刺激征阳性。最可能诊断为中耳炎合并( )

- A. 败血症
- B. 病毒性脑炎
- C. 化脓性脑膜炎
- D. 脑脓肿
- E. 高热惊厥

24. 真题 2014-J087 患儿,女,3个月。因发热、惊厥1天入院,查体:克氏征、布氏征阳性,腰穿脑脊液外观透明,白细胞计数  $50 \times 10^6/L$ ,以淋巴细胞为主,潘氏试验(-),糖  $54.0\text{mmol/L}$ ,氯化物  $120\text{mmol/L}$ 。最可能的病因是( )

- A. 病毒性脑膜炎
- B. 结核性脑膜炎
- C. 化脓性脑膜炎
- D. 流行性乙型脑炎
- E. 急性感染性多发性神经根炎

25. 真题 2014-X085 男,6个月。吐奶拒食,嗜睡2天。查体:面色青灰,前囟紧张,脐部少许脓性分泌物。该患儿最可能的医疗诊断是( )

- A. 病毒性脑炎
- B. 化脓性脑膜炎
- C. 脑脓肿
- D. 颅内出血
- E. 脐炎

26. 真题 2014-X086 男,6个月。吐奶拒食,嗜睡2天。查体:面色青灰,前囟紧张,脐部少许脓性分泌物。为确诊最重要的检查是( )

- A. 血常规
- B. 尿常规
- C. 脑脊液检查
- D. 脑CT
- E. 脐分泌物培养

27. 真题 2014-X087 男,6个月。吐奶拒食,嗜睡2天。查体:面色青灰,前囟紧张,脐部少许脓性分泌物。该患儿的护理措施哪项错误( )

- A. 术后2小时可抱起喂奶
- B. 密切观察生命体征
- C. 去枕平卧6小时
- D. 观察局部有无出血现象
- E. 如颅内压高可按医嘱使用脱水剂

28. 真题 2014-Z007 脑性瘫痪最常见的类型是( )

- A. 痉挛型
- B. 手足徐动型
- C. 共济失调型
- D. 强直型
- E. 混合型

29. 真题 2017-J029 患儿男,10个月,诊断为“化脓性脑膜炎”。今晨出现烦躁不安。喷射性呕吐,右眼斜视,前囟饱满,肌张力增高,呼吸节律不整。遵医嘱使

用甘露醇降低颅内压,下列护理措施正确的是( )

- A. 发现甘露醇药液有结晶,不能使用
- B. 15分钟内快速静脉输完药液
- C. 可与其他药液经同一静脉通道同时输入
- D. 20%甘露醇,一般4~8小时给药一次
- E. 不能静脉推注

30. 真题 2014-Z041 化脓性脑膜炎最易出现的并发症是( )

- A. 硬脑膜下积液
- B. 脑室管膜炎
- C. 智力低下
- D. 脑积水
- E. 脑疝

31. 模拟题 患儿,男,1岁。呈昏睡状,引出有病理意义的神经反射是( )

- A. 颈强直
- B. 膝腱反射
- C. 瞳孔反射
- D. 巴宾斯基征
- E. 提睾反射

32. 真题 2017-Z051 脑瘫患儿康复治疗的重点是( )

- A. 呼吸功能维持
- B. 皮肤护理
- C. 营养支持
- D. 预防感染
- E. 功能训练

33. 真题 2017-Z052 吉兰巴雷综合征患儿呼吸的护理重点是( )

- A. 呼吸功能维持
- B. 皮肤护理
- C. 营养支持
- D. 预防感染
- E. 功能训练

34. 真题 2017-X055 可能引起脑性瘫痪母体方面的因素不包括( )

- A. 高血压
- B. 糖尿病
- C. 腹部外伤
- D. 接触放射线
- E. 核黄疸

35. 真题 2018-Z055 患儿男,3岁。幼儿园老师反映该患儿在学习和玩耍时经常心不在焉,注意力不集中,离位行走。干扰其他小朋友活动。诊断为注意力缺陷多动障碍。针对该患儿进行心理护理时,错误的是( )

- A. 患儿出现攻击行为时,无需特殊制止
- B. 避免打骂、呵斥患儿
- C. 发现患儿优点应积极表扬
- D. 学校及家长共同教育,共同管理患儿

E. 引导患儿遵守公共秩序

36. 真题 2019-Z010 患儿,男,6个月。化脓性脑膜炎,经正统治疗后,脑脊液正常,但头围进行性增大。该患儿最可能合并了( )

- A. 脑积水
- B. 脑出血
- C. 脑室管膜炎
- D. 中毒性脑病
- E. 慢性脑膜炎

37. 真题 2019-X019 患儿男,5岁,幼儿园老师反映上课时不停摇椅,多跑动,不专心,不能完成手工作业,但智力正常,最可能的诊断是( )

- A. 脑性瘫痪
- B. 注意缺陷多动障碍
- C. 多发性神经根神经炎
- D. 癫痫小发作
- E. 大脑发育不全

## 十一. 结缔组织疾病患儿的护理

1. 真题 2018-X001 过敏性紫癜主要累及的部位不包括( )

- A. 皮肤
- B. 消化道
- C. 关节
- D. 肾脏
- E. 心脏

2. 模拟题 皮肤黏膜淋巴结综合征最具特征性的临床表现是( )

- A. 上呼吸道感染
- B. 腹泻
- C. 杨梅舌
- D. 口腔及咽部黏膜弥漫性发红
- E. 指(趾)端膜状脱皮

3. 真题 2010-Z044 皮肤黏膜淋巴结综合征治疗时首选的药物是( )

- A. 青霉素
- B. 阿司匹林
- C. 丙种球蛋白
- D. 潘生丁
- E. 辅酶

4. 真题 2016-Z053 患儿女,6岁。因“无明显诱因出现下肢、臀部对称性皮肤紫癜,伴恶心、呕吐一周”就诊。查毛细血管脆性试验阳性,外周白细胞数、血小板计数、出血和凝血时间正常,骨髓检查正常。最可能的诊断是( )

- A. 过敏性紫癜
- B. 血友病
- C. 弥漫性血管内凝血(DIC)
- D. 风湿性关节炎

E. 特发性血小板减少性紫癜

5. 模拟题 下列符合川崎病皮疹特点的是( )

- A. 呈对称性
- B. 荨麻疹样皮疹
- C. 可有水疱
- D. 以环形红斑多见
- E. 呈离心性

6. 模拟题 风湿热的特征性表现为( )

- A. 环形红斑
- B. 关节疼痛
- C. 不规则发热
- D. 血沉增快
- E. 心电图 P-R 延长

7. 模拟题 皮肤黏膜淋巴结综合征可出现( )

- A. 超声心动图示冠状动脉扩张
- B. 毛细血管脆性试验阳性
- C. 血象红细胞大小不等
- D. X线示关节腔变窄,关节面融合
- E. 血淀粉酶升高

8. 真题 2016-X024 风湿热最严重的临床表现是( )

- A. 环形红斑
- B. 舞蹈病
- C. 腹痛
- D. 关节炎
- E. 全心炎

9. 真题 2015-X050 过敏性紫癜主要累及的部位不包括( )

- A. 皮肤
- B. 消化道
- C. 关节
- D. 肾脏
- E. 心脏

10. 真题 2011-Z073 7岁患儿,突然发现双下肢,胸腹部大量红斑,高出皮面,压之不褪色,发痒,双膝关节痛。1周前曾患“感冒”。该患儿可能的疾病是( )

- A. 过敏性紫癜
- B. 风湿性关节炎
- C. 血友病
- D. 特发性血小板减少性紫癜
- E. 急性肾炎

11. 真题 2013-X061 控制小儿风湿热复发首选的药物是( )

- A. 败血症
- B. 氯霉素
- C. 链霉素
- D. 阿司匹林
- E. 长效青霉素

12. 真题 2013-Z071 11 岁男童, 因双下肢皮肤出现紫红色出血点来院就诊, 经检查确诊为过敏性紫癜。目前该患儿双下肢及臀部出现大量紫癜, 此时护士除应采取保护措施保护患儿皮肤外, 还应当注意预防( )

- A. 心脏损害
- B. 体温过高
- C. 口唇干裂
- D. 消化道出血
- E. 淋巴结肿大

13. 真题 2013-Z072 11 岁男童, 因双下肢皮肤出现紫红色出血点来院就诊, 经检查确诊为过敏性紫癜。近日该患儿主诉腹痛、恶心, 同时发现大便变黑, 其应当采取( )

- A. 禁食
- B. 半流食
- C. 无渣饮食
- D. 低盐饮食
- E. 低蛋白饮食

14. 真题 2014-Z064 患儿, 男, 7 岁。1 周前患儿双下肢突然出现密集紫癜样皮疹, 皮疹突出皮肤表面, 呈对称分布, 伴有痒感, 数天后皮疹逐渐消退, 昨晚进食鱼虾后皮疹又再次出现, 并伴有脐周明显疼痛和恶心呕吐, 查大便隐血试验阳性。该患儿最可能的疾病是( )

- A. 急性肠炎
- B. 暴发性脑膜炎
- C. 特发性血小板减少性紫癜
- D. 皮肤黏膜淋巴结综合征
- E. 过敏性紫癜

15. 真题 2014-Z083 10 岁男童, 因双下肢皮肤出现紫红色出血点来院就诊, 经检查确诊为过敏性紫癜。目前该患儿双下肢及臀部出现大量紫癜, 此时护士除应采取保护措施保护患儿皮肤外, 还应当注意预防( )

- A. 心脏损害
- B. 体温过高
- C. 口唇干裂
- D. 消化道出血
- E. 淋巴结肿大

16. 真题 2014-Z084 10 岁男童, 因双下肢皮肤出现紫红色出血点来院就诊, 经检查确诊为过敏性紫癜。近日该患儿主诉腹痛、恶心, 同时发现大便变黑, 其应当采取( )

- A. 禁食
- B. 半流食
- C. 无渣饮食
- D. 低盐饮食
- E. 低蛋白饮食

17. 模拟题 过敏性紫癜可出现( )

- A. 超声心动图示冠状动脉扩张
- B. 毛细血管脆性试验阳性
- C. 血象红细胞大小不等

- D. X 线示关节腔变窄, 关节面融合
- E. 血淀粉酶升高

18. 模拟题 儿童类风湿可出现( )

- A. 超声心动图示冠状动脉扩张
- B. 毛细血管脆性试验阳性
- C. 血象红细胞大小不等
- D. X 线示关节腔变窄, 关节面融合
- E. 血淀粉酶升高

19. 真题 2017-X023 过敏性紫癜首发症状是( )

- A. 皮肤紫癜
- B. 关节炎
- C. 腹痛
- D. 血尿
- E. 蛋白尿

20. 真题 2018-Z067 过敏性紫癜患儿常见的首发症状为( )

- A. 皮肤紫癜
- B. 牙龈出血
- C. 血尿、蛋白尿
- D. 关节肿痛
- E. 腹痛

21. 真题 2019-Z024 与风湿热的发病有关的病原体是( )

- A. 白色念珠菌
- B. 绿脓杆菌
- C. 大肠杆菌
- D. 溶血性链球菌
- E. 葡萄球菌

22. 真题 2019-X035 风湿热的主要表现不包括( )

- A. 心脏炎
- B. 环形红斑
- C. 舞蹈病
- D. 关节畸形
- E. 多发性关节炎

## 十二. 常见传染病患儿的护理

1. 真题 2018-J001 关于麻疹的流行病学特点, 不正确的是( )

- A. 病人是唯一的传染源, 前驱期和出疹期均有传染性
- B. 以呼吸道飞沫传播为主
- C. 病后获持久免疫力
- D. 恢复期病人存在携带病毒的现象
- E. 主动免疫是预防麻疹的重要措施

2. 模拟题 患儿, 5 岁。发热伴腮腺肿大 2 天, 诊断“流行性腮腺炎”。对其密切接触的孪生弟弟应检疫( )

- A. 3 天
- B. 5 天
- C. 7 天

- D. 2周
- E. 3周

3. 模拟题 猩红热患儿解除隔离的指征是( )

- A. 咽拭子培养1次阴性
- B. 咽拭子培养3次阴性
- C. 咽拭子培养2次阴性
- D. 症状消失后10天
- E. 症状消失后14天

4. 模拟题 引起中毒型细菌性痢疾出现休克的毒素是( )

- A. 肠毒素
- B. 内毒素
- C. 细胞毒素
- D. 神经毒素
- E. 类毒素

5. 模拟题 菌痢患者的粪便可呈( )

- A. 脓血样
- B. 果酱样
- C. 米泔水样
- D. 柏油样
- E. 白陶土样

6. 模拟题 中毒型细菌性痢疾最早出现的症状是( )

- A. 腹泻
- B. 惊厥
- C. 嗜睡
- D. 高热
- E. 循环衰竭

7. 模拟题 迅速控制菌痢流行最主要的措施是( )

- A. 加强门诊工作
- B. 及时隔离治疗患者
- C. 洗手
- D. 定期消毒
- E. 口服痢疾减毒活疫苗

8. 模拟题 下列表现中对麻疹具有早期诊断意义的是( )

- A. 发热
- B. 麻疹黏膜斑
- C. 典型皮疹
- D. 淋巴结肿大
- E. 检测到麻疹IgG型抗体

9. 模拟题 发热、流涕、结膜充血、口腔黏膜斑等特点符合( )

- A. 水痘
- B. 重症肺炎
- C. 百日咳
- D. 麻疹
- E. 猩红热

10. 真题 2017-2008 甲类传染病是指( )

- A. 鼠疫、狂犬病
- B. 鼠疫、黑热病
- C. 炭疽、狂犬病
- D. 鼠疫、霍乱
- E. 霍乱、狂犬病

11. 模拟题 全身散在斑丘疹、疱疹等特点符合( )

- A. 水痘
- B. 重症肺炎
- C. 百日咳
- D. 麻疹
- E. 猩红热

12. 模拟题 发热、全身皮肤充血、鸡皮样皮疹等特点符合( )

- A. 水痘
- B. 重症肺炎
- C. 百日咳
- D. 麻疹
- E. 猩红热

13. 模拟题 关于检疫期限正确的是( )

- A. 从接触传染源之日起, 至相当于该病的最短潜伏期止
- B. 从接触传染源之日起, 至相当于该病的最长潜伏期止
- C. 从最后接触传染源之日起, 至相当于该病的最短潜伏期止
- D. 从最后接触传染源之日起, 至相当于该病的最长潜伏期止
- E. 从最后接触传染源之日起, 至相当于该病的平均潜伏期止

14. 模拟题 患儿, 男, 5岁。发热1天, 轻咳, 家长给予磺胺类药物口服, 次日热不退, 头痛, 全身出现弥漫性针尖样大小的红色皮疹。若患儿3天后出现腹痛, 多汗, 膝、踝、肘、腕等关节出现红、肿、热、痛, 最可能的并发症是( )

- A. 脑炎
- B. 脑脓肿
- C. 急性风湿热
- D. 肾病
- E. 泌尿系统感染

15. 模拟题 流行性腮腺炎的流行特点为( )

- A. 发病以夏、秋季为高峰
- B. 感染后一般能获得持久的免疫力
- C. 发病率高, 取决于当地的经济情况、个人卫生情况
- D. 春季发病
- E. 发病具有周期性

16. 模拟题 治疗儿童中毒性菌痢不宜选用的抗生素是( )

- A. 阿米卡星

- B. 卡那霉素
- C. 头孢噻肟
- D. 诺氟沙星
- E. 氨苄西林

17. 模拟题 猩红热的病原体为( )

- A. 草绿色链球菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 表皮葡萄球菌
- D. A 组  $\beta$  型溶血性链球菌
- E. 白色念珠菌

18. 模拟题 水痘的特点是( )

- A. 发热 3~4 天, 热退疹出
- B. 发热当天出疹, 之后伴有水疱疹
- C. 发热 1~2 天后出斑丘疹, 枕后淋巴结肿大
- D. 发热 3~4 天后出斑丘疹, 疹退后米糠样脱屑, 色素沉着
- E. 发热后第 2 天出疹, 全身皮肤充血退后有大片脱皮

19. 模拟题 麻疹的特点是( )

- A. 发热 3~4 天, 热退疹出
- B. 发热当天出疹, 之后伴有水疱疹
- C. 发热 1~2 天后出斑丘疹, 枕后淋巴结肿大
- D. 发热 3~4 天后出斑丘疹, 疹退后米糠样脱屑, 色素沉着
- E. 发热后第 2 天出疹, 全身皮肤充血退后有大片脱皮

20. 模拟题 流行性腮腺炎( )

- A. 以学龄儿童多见
- B. 儿童及青壮年多见
- C. 普遍易感, 以 1~6 岁儿童多见
- D. 6 个月以内者很少患病
- E. 以 1~3 岁儿童多见

21. 模拟题 中毒型细菌性痢疾( )

- A. 以学龄儿童多见
- B. 儿童及青壮年多见
- C. 普遍易感, 以 1~6 岁儿童多见
- D. 6 个月以内者很少患病
- E. 以 1~3 岁儿童多见

22. 模拟题 麻疹患儿无并发症者具有传染性的时段为( )

- A. 出疹前
- B. 出疹前 10 天至出疹后 5 天
- C. 出疹前 5 天至出疹后 5 天
- D. 出疹前 10 天至出疹后 10 天
- E. 出疹前 5 天至出疹后 10 天

23. 模拟题 患儿, 5 岁。诊为猩红热, 青霉素皮试呈阳性, 患儿应选用的抗生素是( )

- A. 红霉素
- B. 链霉素

- C. 头孢噻肟
- D. 万古霉素
- E. 头孢氨苄

24. 模拟题 治疗水痘首选( )

- A. 干扰素
- B. 吗啉胍(病毒净)
- C. 金刚烷胺
- D. 利巴韦林(病毒唑)
- E. 阿昔洛韦

25. 模拟题 下列关于麻疹治疗护理的注意事项中, 错误的是( )

- A. 隔离休息
- B. 及早使用抗生素预防并发症
- C. 居室通风良好, 保持适宜的温湿度
- D. 注意口咽鼻的护理
- E. 病程发热期间应给予清淡易消化饮食

26. 模拟题 发热 3~4 天出疹的是( )

- A. 麻疹
- B. 流行性腮腺炎
- C. 风疹
- D. 水痘
- E. 猩红热

27. 模拟题 发热后第 1 天出疹的是( )

- A. 麻疹
- B. 流行性腮腺炎
- C. 风疹
- D. 水痘
- E. 猩红热

28. 模拟题 患儿, 7 岁。突然高热、惊厥 1 次, 于 7 月 20 日入院, 入院体温 39.5℃, 面色苍白, 四肢厥冷, 意识不清, 粪检结果为脓细胞 8~10 个/高倍视野。考虑的诊断为( )

- A. 中毒型细菌性痢疾
- B. 腮腺炎并发脑炎
- C. 水痘并发脑炎
- D. 高热惊厥
- E. 麻疹并发脑炎

29. 真题 2017-X028 确诊中毒型细菌性痢疾最有价值的检查是( )

- A. 粪便镜检
- B. 血白细胞计数
- C. 粪便细菌培养
- D. 咽拭子细菌培养
- E. 血清特异性抗体检查

30. 模拟题 患儿, 男, 5 岁。发热 1 天, 轻咳, 家长给予磺胺类药物口服, 次日热不退, 头痛, 全身出现弥漫性针尖样大小的红色皮疹。该患儿皮肤护理禁用的措施是( )

- A. 剪短患儿指甲
- B. 肥皂水清洗皮肤
- C. 勤换内衣
- D. 消毒剪刀修剪脱皮
- E. 避免皮肤受到摩擦

31. 模拟题 患儿,男,5岁。发热1天,轻咳,家长给予磺胺类药物口服,次日热不退,头痛,全身出现弥漫性针尖样大小的红色皮疹。该患儿最可能的诊断是( )

- A. 麻疹
- B. 水痘
- C. 猩红热
- D. 流行性腮腺炎
- E. 流行性脑脊髓膜炎

32. 模拟题 猩红热帕氏线常见的部位是( )

- A. 面部
- B. 头颈部
- C. 腰腹部
- D. 大腿外侧
- E. 腋窝、肘窝

33. 真题 2014-Z027 水痘患儿的隔离时间至少为( )

- A. 疱疹全部结痂后3天
- B. 疱疹全部结痂后7天
- C. 疱疹全部消失后
- D. 出疹后7天
- E. 出疹后14天

34. 真题 2014-J061 关于麻疹流行病学特点的叙述,错误的是( )

- A. 患者是唯一的传染源
- B. 主要通过飞沫传播
- C. 发病高峰在7-9月份
- D. 病后获得持久免疫
- E. 出疹前5天至出疹后5天均有传染性

35. 真题 2014-J027 咽-结合膜热的病原体是( )

- A. 腺病毒
- B. 柯萨奇病毒
- C. 埃可病毒
- D. 鼻病毒
- E. 流感病毒

36. 真题 2013-Z100 水痘( )

- A. 发热3-4天,热退疹出
- B. 发热当天出疹,之后伴有水疱疹
- C. 发热1-2天后出斑丘疹,枕后淋巴结肿大
- D. 发热3-4天后出斑丘疹,疹退后米糠样脱屑,色素沉着
- E. 发热后第2天出疹,全身皮肤充血,疹退后有大量脱皮

37. 真题 2013-Z099 麻疹( )

- A. 发热3-4天,热退疹出

- B. 发热当天出疹,之后伴有水疱疹
- C. 发热1-2天后出斑丘疹,枕后淋巴结肿大
- D. 发热3-4天后出斑丘疹,疹退后米糠样脱屑,色素沉着
- E. 发热后第2天出疹,全身皮肤充血,疹退后有大量脱皮

38. 真题 2013-Z070 水痘为自限性疾病,其病程一般是( )

- A. 3天
- B. 5天
- C. 7天
- D. 10天
- E. 15天

39. 真题 2013-X062 麻疹的隔离期是( )

- A. 隔离至出疹后5天
- B. 隔离至出疹后10天
- C. 隔离至疹退后5天
- D. 隔离至疹退后10天
- E. 隔离至疹退后14天

40. 真题 2013-J045 猩红热的主要传播途径是( )

- A. 水源污染
- B. 食物污染
- C. 伤口分泌物
- D. 产道恶露
- E. 空气飞沫

41. 真题 2011-Z021 麻疹病毒主要的传播途径是( )

- A. 消化道
- B. 血液
- C. 接触
- D. 呼吸道
- E. 虫媒

42. 真题 2011-X071 患儿,4岁。高热8小时、呕吐4次、惊厥2次于8月中旬入院。查体: T40℃,BP46/18mmHg,昏睡,皮肤呈花纹状,肢端冷,面色苍白,腮腺不大,心、肺、腹检查未见异常,腱反射亢进,为明确诊断,最有意义的检查是( )

- A. 脑脊液检查
- B. 血气分析
- C. 血常规及培养
- D. 大便常规及培养
- E. 大便培养找原虫

43. 真题 2018-X041 患儿男,8岁。食欲不振,8小时后右耳周围肿痛,同学中有类似患者。查体肿大以右耳垂为中心,皮肤发热,触之坚韧有弹性,疼痛,张口及咀嚼时加重。最可能的诊断是( )

- A. 急性淋巴结炎
- B. 急性上呼吸道感染
- C. 麻疹
- D. 化脓性中耳炎

E. 流行性腮腺炎

44. 真题 2011-X055 患者,男,32岁。于午饭后突然发热 38.3℃,腹痛。随即排便,大便呈脓样,有里急后重,诊断为菌痢。大便化验结果可用于确诊本病的是( )

- A. 红细胞满视野
- B. 白细胞>15个/高倍视野
- C. 柏油样
- D. 米泔水样
- E. 鲜血便

45. 真题 2011-X012 确诊中毒性细菌性痢疾最有价值的检查是( )

- A. 粪便镜检
- B. 血白细胞计数
- C. 粪便细菌培养
- D. 咽拭子细菌培养
- E. 血清特异性抗体检查

46. 真题 2011-J059 关于麻疹病毒的生物学特性,正确的是( )

- A. 是 DNA 病毒
- B. 血清型不稳定
- C. 加热易被破坏
- D. 不耐寒
- E. 对一般消毒剂不敏感

47. 真题 2010-Z031 腮腺炎患者腮腺肿大的特点,不正确的是( )

- A. 以耳垂为中心
- B. 边缘清晰
- C. 表面皮肤不红
- D. 肿痛一周左右消退
- E. 局部皮肤紧张发亮

48. 真题 2010-Z030 下列疾病出疹时,不宜物理降温的是( )

- A. 麻疹
- B. 风疹
- C. 幼儿急疹
- D. 猩红热
- E. 药物疹

49. 真题 2015-X031 确诊中毒型细菌性痢疾最有价值的检查是( )

- A. 粪便镜检
- B. 血白细胞计数
- C. 粪便细菌培养
- D. 咽拭子细菌培养
- E. 血清特异性抗体检查

50. 真题 2015-X070 患儿,男,5岁。发热伴腮腺肿大 2天,诊断为“流行性腮腺炎”。该患儿适宜的护理措施是( )

- A. 易消化的半流质饮食
- B. 禁用盐水漱口
- C. 可口的酸辣食物
- D. 少饮水
- E. 局部热敷

51. 模拟题 水痘皮疹的特点是( )

- A. 无痒感
- B. 分批出现
- C. 呈离心性分布
- D. 躯干少,四肢多
- E. 不出现在口腔、睑结膜、生殖器等处

52. 真题 2017-J050 患儿男,猩红热,为保护学校班内其他易感人群,应对其进行医学观察的时间为( )

- A. 14天
- B. 10天
- C. 7天
- D. 5天
- E. 3天

53. 模拟题 患儿,男,7岁。被诊断为细菌性痢疾,经治疗目前临床症状已消失,该患儿何时可以上学。( )

- A. 目前即可
- B. 临床症状消失后 3天
- C. 1次便培养阴性
- D. 连续 2次便培养阴性
- E. 连续 3次便培养阴性

54. 模拟题 患者,女,15岁。发热、头痛 4天,呕吐 1次,入院体检:嗜睡,颈抵抗感,浅反射消失,深反射亢进。脑脊液压力偏高,白细胞数  $0.2 \times 10^9/L$ ,糖和氯化物正常,考虑为流行性乙型脑炎。其传染源是( )

- A. 患者
- B. 猪
- C. 狗
- D. 鼠
- E. 带菌者

55. 模拟题 流行性腮腺炎的传染期为( )

- A. 腮腺肿大前 6天至发病后 5天或更长
- B. 腮腺肿大开始至腮腺肿胀消失
- C. 腮腺肿大前 7天至肿大后 7天
- D. 腮腺肿大前 6天至发病后 9天
- E. 腮腺肿大开始至腮腺肿胀消退后 9天

56. 真题 2016-Z090 麻疹的主要传播途径是( )

- A. 母婴传播
- B. 空气传播
- C. 虫媒传播
- D. 血液传播
- E. 粪-口传播

57. 真题 2018-Z053 麻疹最具有早期诊断价值的表现是( )

- A. 接触麻疹患儿 10~14 天后发热
- B. 结膜充血、畏光流泪及眼睑浮肿
- C. 耳后、发际出现淡红色充血性斑丘疹
- D. 全身淋巴结肿大
- E. 白色麻疹粘膜斑（柯氏斑）

58. 真题 2016-Z089 中毒型细菌性痢疾的传播途径是（ ）

- A. 母婴传播
- B. 空气传播
- C. 虫媒传播
- D. 血液传播
- E. 粪-口传播

59. 真题 2016-X072 患儿男，8 岁。食欲不振，8 小时后右耳周围肿痛，同学中有类似患者。查体：肿大以耳垂为中心，皮肤发热，触之坚韧有弹性，疼痛，张口及咀嚼时加重。最可能的诊断是（ ）

- A. 麻疹
- B. 化脓性中耳炎
- C. 急性淋巴结炎
- D. 流行性腮腺炎
- E. 急性上呼吸道感染

60. 真题 2016-X022 水痘患儿注射丙种球蛋白的主要作用是（ ）

- A. 缩短病程
- B. 防止继发感染
- C. 预防后遗症
- D. 防止复发
- E. 防止并发症

61. 真题 2016-J015 猩红热患儿进行病原学检查时，在治疗前多用（ ）

- A. 大便培养
- B. 尿培养
- C. 咽拭子培养
- D. 血培养
- E. 皮肤渗出物培养

62. 真题 2015-Z015 猩红热的特征性体征是（ ）

- A. 发热
- B. 咽峡炎
- C. 帕氏线
- D. 头痛
- E. 关节炎

63. 真题 2015-J028 水痘的传播途径是（ ）

- A. 食物传播
- B. 虫媒传播
- C. 土壤传播
- D. 呼吸道传播
- E. 消化道传播

64. 真题 2010-X006 粪便镜检大量脓细胞提示（ ）

- A. 细菌性痢疾
- B. 肠胃炎
- C. 溃疡病
- D. 胰腺炎
- E. 肠炎

65. 真题 2017-X064 患者，男，5 岁。发热伴腮腺肿大 2 天，诊断为“流行性腮腺炎”，该患儿适宜的护理措施是（ ）

- A. 给予易消化的半流质饮食
- B. 禁用盐水漱口
- C. 进食可口的酸辣食物
- D. 少饮水
- E. 局部热敷

66. 真题 2018-Z072 中毒型细菌性痢疾的传播途径是（ ）

- A. 母婴传播
- B. 空气传播
- C. 虫媒传播
- D. 血液传播
- E. 粪-口传播

67. 真题 2018-Z073 麻疹的主要传播途径是（ ）

- A. 母婴传播
- B. 空气传播
- C. 虫媒传播
- D. 血液传播
- E. 粪-口传播

68. 真题 2018-Z074 流行性乙型脑炎的传播途径是（ ）

- A. 母婴传播
- B. 空气传播
- C. 虫媒传播
- D. 血液传播
- E. 粪-口传播

69. 真题 2017-S080 患者男，28 岁。因足底外伤，继而发热、惊厥、牙关紧闭呈苦笑面容入院。诊断为破伤风。该患者应采取的隔离种类为（ ）

- A. 接触隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 肠道隔离
- D. 保护性隔离
- E. 昆虫隔离

70. 真题 2017-S081 患者男，28 岁。因足底外伤，继而发热、惊厥、牙关紧闭呈苦笑面容入院。诊断为破伤风。该患者换下的敷料应（ ）

- A. 先清洗后消毒
- B. 先灭菌后清洗
- C. 先清洗后暴晒
- D. 先暴晒再灭菌
- E. 焚烧

71. 真题 2019-Z011 水痘患儿的隔离时间至少为( )

- A. 疱疹全部结痂后 3 天
- B. 疱疹全部结痂后 7 天
- C. 疱疹全部消失后
- D. 出疹后 7 天
- E. 出疹后 14 天

72. 真题 2019-X005 水痘的皮疹特点是( )

- A. 皮肤弥漫性红疹
- B. 疹间无正常皮肤
- C. 皮疹按斑疹、丘疹、疱疹、结痂的顺序演变
- D. 出血性皮疹
- E. 糠皮样脱屑

73. 真题 2019-J036 传染病的基本特征不包括( )

- A. 有病原体
- B. 有传染性
- C. 有流行性、地方性
- D. 感染后有免疫
- E. 有阶段性

74. 真题 2019-Z025 患儿, 男, 5 岁。中毒型细菌性痢疾, 全身症状重, 肠道反应轻, 确诊此病最有力的证据为( )

- A. 黏液脓血便
- B. 有相关接触史
- C. 血常规检查白细胞增高
- D. 粪便标本培养出痢疾杆菌
- E. 粪便镜检可见大量\*细胞

### 十三. 小儿结核病的护理

1. 真题 2010-Z002 做结核菌素试验后多长时间看结果( )

- A. 24-36 小时
- B. 48-72 小时
- C. 3-4 周
- D. 5-8 周
- E. 20 分钟

2. 模拟题 预防小儿结核病的有效措施是( )

- A. 控制传染源
- B. 口服异烟肼
- C. 卡介苗接种
- D. 用肾上腺皮质激素
- E. 积极锻炼身体

3. 模拟题 下列药物中能引起球后视神经炎的是( )

- A. 异烟肼
- B. 利福平
- C. 喷托维林
- D. 对氨基水杨酸钠
- E. 乙胺丁醇

4. 模拟题 患儿, 男, 2 岁。高热、咳嗽, 伴疱疹性结膜炎和结节性红斑, 有结核病密切接触史, 疑为急性粟粒性肺结核, 拟行结核菌素试验。对该患儿进行纯蛋白衍生物 (PPD) 试验宜选用的结核菌素单位为( )

- A. 1 结核菌素单位
- B. 5 结核菌素单位
- C. 10 结核菌素单位
- D. 50 结核菌素单位
- E. 100 结核菌素单位

5. 模拟题 患儿, 男, 2 岁。高热、咳嗽, 伴疱疹性结膜炎和结节性红斑, 有结核病密切接触史, 疑为急性粟粒性肺结核, 拟行结核菌素试验。结核菌素试验反应结果显示局部硬结平均直径为 16mm, 应记录为( )

- A. (-)
- B. (+)
- C. (++)
- D. (+++)
- E. (++++)

6. 模拟题 PPD 皮肤试验结果 (+) 局部反应是( )

- A. 硬结直径 < 5mm
- B. 硬结直径 5~9mm
- C. 硬结直径 10~19mm
- D. 硬结直径 > 20mm
- E. 硬结直径 > 20mm 伴水痕及局部坏死

7. 模拟题 未曾接种卡介苗的 3 岁以下儿童, 结核菌素呈强阳性表示( )

- A. 机体反应性差
- B. 需接种卡介苗
- C. 患有活动性结核病
- D. 曾有结核菌感染
- E. 严重营养不良

8. 真题 2018-J007 预防小儿结核病的最有效方法( )

- A. 隔离患儿
- B. 禁止随地吐痰
- C. 预防性服药
- D. 接种卡介苗
- E. 定期查体

9. 模拟题 结核性脑膜炎患儿出现最早的表现是( )

- A. 嗜睡
- B. 高热
- C. 性情改变
- D. 剧烈头痛
- E. 脑膜刺激征

10. 模拟题 患者, 男, 31 岁。午后低热、盗汗、乏力 2 个月。近 1 周高热、咳嗽、咳痰, 痰中带血。痰涂片查结核分枝杆菌阳性。给予链霉素抗结核治疗。链霉素出现皮肤过敏的常见表现不包括( )

- A. 斑丘疹
- B. 荨麻疹

- C. 猩红热样皮疹
- D. 紫癜
- E. 溃疡

11. 真题 2016-Z079 患者女, 2 岁。发热、盗汗, 食欲不振、消瘦、无力来诊。胸部 X 线片见两侧肺野有分布均匀、大小一致粟粒状阴影, 结核菌素试验阳性。该患儿抗结核治疗的时间至少是( )

- A. 6 个月
- B. 9 个月
- C. 1 年
- D. 1 年半
- E. 2 年

12. 真题 2016-Z078 患者女, 2 岁。发热、盗汗, 食欲不振、消瘦、无力来诊。胸部 X 线片见两侧肺野有分布均匀、大小一致粟粒状阴影, 结核菌素试验阳性。该患儿正确的诊断是( )

- A. 浸润性肺结核
- B. 急性粟粒型肺结核
- C. 支气管淋巴结核
- D. 原发性肺结核
- E. 结核性胸膜炎

13. 真题 2016-X041 诊断肺结核的方法中, 最可靠的是( )

- A. 胃液分析
- B. 胸部 X 线片
- C. 结核菌素试验
- D. 红细胞沉降率检查
- E. 痰结核菌检查

14. 真题 2010-Z056 患儿, 女, 2 岁。低热 2 个月, 伴有咳嗽, 精神欠佳, 食欲差, 夜间多汗, 体温 38℃, 颈部淋巴结肿大, 质硬, 无压痛, 心、肺听诊无异常。最可能的疾病是( )

- A. 传染性单核细胞增多症
- B. 支气管肺炎
- C. 亚急性坏死性淋巴结炎
- D. 原发型肺结核
- E. 支原体肺炎

15. 真题 2011-X056 患儿, 4 岁。诊断为原发性肺结核。服利福平治疗 1 个月后出现食欲下降, 疲乏无力。巩膜稍黄染。此时应( )

- A. 输新鲜全血
- B. 加用利尿药物
- C. 加用升白细胞药物
- D. 利福平的正常治疗反应, 不必处理
- E. 加用保肝药物, 并改用其他抗结核药物

16. 真题 2011-Z035 小儿结核性脑膜炎早期临床表现中主要的症状是( )

- A. 性情的改变
- B. 持续性头痛

- C. 喷射性呕吐
- D. 反复惊厥
- E. 明显的脑膜刺激征

17. 真题 2013-J054 小儿肺结核最常见类型是( )

- A. 原发型肺结核
- B. 粟粒型肺结核
- C. 浸润性肺结核
- D. 结核性胸膜炎
- E. 结核性脑膜炎

18. 真题 2013-X063 结核性脑膜炎脑脊液的典型改变是( )

- A. 外观透明或毛玻璃样
- B. 白细胞升高
- C. 白细胞分类以淋巴细胞为主
- D. 糖和氯化物同时降低
- E. 蛋白升高

19. 真题 2014-Z061 患儿, 2 岁。近 1 个月低热、咳嗽, 夜间多汗, 消瘦, 胸片可见“哑铃状” 双侧阴影, 结核菌素试验(+++), 未种过卡介苗, 最可能的诊断是( )

- A. 结核性胸膜炎
- B. 纤维空洞型肺结核
- C. 原发型肺结核
- D. 干酪性肺结核
- E. 粟粒型肺结核

20. 真题 2018-Z019 患者女, 25 岁。近 2 月轻度咳嗽, 咳白色粘痰, 内带血丝。午后低热, 面颊潮红, 疲乏无力。常有心悸、盗汗, 较前消瘦。X 线胸片检查: 发现右上肺第二肋部有云雾状阴影, 无透光区。痰菌 3 次检验阴性。对于该患者不必要的护理措施是( )

- A. 给予高热量、高维生素和高蛋白饮食
- B. 按医嘱给予抗结核药物治疗观察药物不良反应
- C. 住院隔离治疗
- D. 做好保健指导
- E. 室内开窗通风

21. 真题 2015-J059 患儿, 男, 8 岁。诊断为原发型肺结核。经治疗后其病理转归最可能是( )

- A. 吸收好转
- B. 产生空洞
- C. 血行播散
- D. 淋巴播散
- E. 病灶蔓延扩大

22. 真题 2016-J027 小儿结核病的主要传播途径是( )

- A. 虫媒
- B. 皮肤
- C. 呼吸道
- D. 消化道
- E. 血液

23. 真题 2016-X017 抗结核标准化疗方案的疗程一般

属( )

- A. 3-6 个月
- B. 6-9 个月
- C. 9-12 个月
- D. 12-18 个月
- E. 18-36 个月

24. 模拟题 患者,男,31岁。午后低热、盗汗、乏力2个月。近1周高热、咳嗽、咳痰,痰中带血。痰涂片查结核分枝杆菌阳性。给予链霉素抗结核治疗。长期应用链霉素,最常见的毒性反应是( )

- A. 周围神经炎
- B. 肝损害
- C. 眩晕、听力障碍
- D. 高尿酸血症
- E. 视神经炎

25. 真题 2015-Z091 结核菌素试验的方法是( )

- A. 上臂三角肌肌内注射
- B. 左上臂三角肌上端外缘皮下注射
- C. 左上臂三角肌下端外缘皮内注射
- D. 左前臂掌侧中、下1/3交界处皮内注射
- E. 右前臂掌侧中、上1/3交界处皮内注射

26. 真题 2016-X070 患儿女,3岁。出生时曾接种卡介苗,最近 PPD 试验局部皮肤红肿,硬结直径为 21mm。下列情况可能性较大的是( )

- A. 卡介苗接种后反应
- B. 曾经有结核感染
- C. 有活动性结核
- D. 皮肤局部感染
- E. 皮肤激惹反应

27. 模拟题 1个月小儿未接种过卡介苗,结核菌素试验呈阳性表示( )

- A. 受过结核感染,但不一定有活动病灶
- B. 本内有新的结核病灶
- C. 免疫力强,不会感染结核
- D. 未受过结核感染、
- E. 结核病态反应初期

28. 真题 2018-Z036 患儿,3岁。4周前患麻疹,近1周末发热,体温 39℃,咳嗽,气促,双肺呼吸音粗,未闻啰音,结核菌素试验阳性。X线胸片:双肺均匀分布大小一致的点状阴影。可能的诊断是( )

- A. 麻疹肺炎
- B. 金黄色葡萄球菌肺炎
- C. 急性粟粒性肺结核
- D. 支气管肺炎
- E. 原发性肺结核

29. 真题 2018-X072 儿童肺结核的主要类型是( )

- A. 支气管内膜结核
- B. 原发型肺结核
- C. 干酪性肺炎

- D. 继发型肺结核
- E. 急性粟粒性肺结核

30. 真题 2019-Z048 原发性肺结核的转归最常见的是( )

- A. 形成干酪性肺炎
- B. 导致结核性胸膜炎
- C. 形成粟粒性肺结核
- D. 导致支气管内膜结核
- E. 病灶钙化或形成硬结

31. 真题 2019-X027 患儿女,6岁,不规则中等度发热,乏力,食欲差1月余。查体:消瘦。T38℃,肝肋下3cm,脾肋下2cm。X线胸片:双肺广泛分布“粟粒”大小的结节状阴影,伴右肺门影扩大。最可能的诊断是( )

- A. 粟粒性肺结核
- B. 原发型肺结核
- C. 小叶性干酪性肺炎
- D. 粟粒性肺结核+干酪性肺炎
- E. 原发型肺结核+粟粒性肺结核

32. 真题 2019-J001 肾脏的结核的病灶来自于( )

- A. 肺结核
- B. 肠结核
- C. 骨结核
- D. 脑部
- E. 淋巴结核

## 十四.常见急症患儿的护理

1. 真题 2010-X012 新生儿控制惊厥首选药物为( )

- A. 苯巴比妥
- B. 水合氯醛
- C. 苯妥英钠
- D. 地西洋
- E. 氯丙嗪

2. 模拟题 呼吸衰竭低氧血症伴高碳酸血症患者应用( )

- A. 高压吸氧
- B. 酒精湿化吸氧
- C. 间歇吸氧
- D. 高浓度吸氧
- E. 低流量、低浓度持续吸氧

3. 真题 2016-X063 患儿男,1岁。高热惊厥入院,治疗1周痊愈出院。出院前对其家长进行健康教育的重点是( )

- A. 合理的喂养方法
- B. 体格锻炼的方法
- C. 惊厥预防及急救措施
- D. 预防接种的时间
- E. 门诊复查的时间

4. 真题 2015-J005 小儿呼吸心搏骤停的主要直接原

因是( )

- A. 窒息
- B. 严重外伤
- C. 心肌炎
- D. 电解质紊乱
- E. 急性失血

5. 真题 2015-X040 诊断小儿心搏骤停的依据不包括( )

- A. 心音消失
- B. 意识丧失、瞳孔散大
- C. 颈动脉、桡动脉搏动消失, 血压测不到
- D. 心电图示心室颤动或心电活动消失
- E. 持续昏迷

6. 真题 2014-X073 患儿, 男, 4 个月。反复抽搐 3 天, 抽搐期间神志不清, 伴高热烦躁。临床诊断为化脓性脑膜炎。惊厥发作期间首选药物为( )

- A. 苯巴比妥
- B. 水合氯醛
- C. 地西洋
- D. 20% 甘露醇
- E. 复方氯丙嗪

7. 真题 2014-J049 小儿高热惊厥常见的病因是( )

- A. 颅内感染
- B. 颅内占位性病变
- C. 颅外感染
- D. 低钙血症
- E. 脱水

8. 真题 2010-Z068 患儿, 女, 10 个月。因高热惊厥入院, 经治疗后准备出院, 对其家长健康指导的重点是( )

- A. 物理降温的方法
- B. 体格锻炼的方法
- C. 合理喂养的方法
- D. 惊厥的预防及急救
- E. 按时预防接种

9. 真题 2010-Z049 患儿, 女, 6 个月。患肺炎 7 天, 突然出现呼吸困难, 面色苍白。查体: 心率 240 次/分, 心音低钝, 肝脏肋下 3cm, 尿少, 下肢水肿。患儿最可能是( )

- A. I 型呼吸衰竭
- B. II 型呼吸衰竭
- C. 心力衰竭
- D. 心源性休克
- E. 急性肾衰竭

10. 真题 2010-X059 强心苷治疗小儿心力衰竭时须立即停药的指征是( )

- A. 心率少于 100 次/分
- B. 心率超过 140 次/分
- C. 心电图显示 T 波倒置
- D. 心电图显示 S-T 段下移
- E. 心电图显示室性期前收缩

11. 真题 2018-J018 小儿呼吸心跳骤停的主要直接原因是( )

- A. 电解质紊乱
- B. 窒息
- C. 严重外伤
- D. 急性贫血
- E. 心肌炎

12. 真题 2018-J019 下列可引起心跳、呼吸骤停的是( )

- A. 心房扑动
- B. 室性早搏
- C. 心室颤动
- D. 心房颤动
- E. 房性早搏

13. 真题 2019-Z042 患儿, 男, 6 个月。支气管肺炎, 半天来突然烦躁不安, 喘憋加重, 口周青紫, 呼吸 68 次/分, 心率 108 次/分, 心音低钝, 两肺细湿啰音增多, 叩诊无异常; 肝肋下 3.5cm, 该患儿最可能发生了( )

- A. 急性心力衰竭
- B. 脓脑
- C. 脓气胸
- D. 肺大泡
- E. 肺不张

14. 真题 2019-Z041 患儿, 女, 18 个月, 因发热 6 个小时来院就诊, 查体: 患儿意识清楚, 舌红, 急性热病容, 体温 39.1℃, 就诊时患儿突发抽搐, 双目凝视, 意识丧失, 立即按压人中, 约 1 分钟后患儿意识恢复, 抽搐停止, 引起患儿抽搐最可能的原因是( )

- A. 高热惊厥
- B. 低钙惊厥
- C. 颅内感染
- D. 癫痫
- E. 高血压脑病

15. 真题 2019-X055 患儿男, 1 岁。因高热惊厥入院, 治疗 1 周痊愈出院。出院前对其家长进行健康教育重点是( )

- A. 合理的喂养方法
- B. 体格锻炼的方法
- C. 惊厥预防及急救措施
- D. 预防接种的时间
- E. 门诊复查的时间

16. 真题 2019-X028 关于急性颅内压增高患儿的临床表现, 正确的叙述是( )

- A. 晨起头痛较轻
- B. 婴儿发病早期头痛明显
- C. 早期表现为血压降低, 继而脉率增快
- D. 晨起呕吐不明显
- E. 上视丘受压可产生落日眼

17. 真题 2019-J034 患者，男，57 岁。急性肾功能衰竭少尿期，出现呼吸困难，头痛，软瘫，腹胀，心电图示：T 波高尖，QT 期间延长。该患者最可能发生了（ ）
- A. 低钾血症
  - B. 高钾血症
  - C. 水中毒
  - D. 尿毒症
  - E. 酸中毒