

· · · · ·

初级护师考试 章节真题及精解

·

一.绪论

1. 真题 2013-J087 以下哪项行为不属于护士行为规范要求的内容()
 - A. 积极与患者进行有效的沟通
 - B. 积极与患者亲属进行沟通
 - C. 积极化解患者与医务人员的矛盾
 - D. 积极帮助患者选择治疗方案
 - E. 积极协助患者进行康复
2. 真题 2013-S025 护士的首要职责是()
 - A. 提供健康照顾
 - B. 协调护理工作
 - C. 传授健康知识
 - D. 护理研究工作
 - E. 进行沟通交流
3. 真题 2011-S049 我国将护士教育列入中等护理专业教育的时间是()
 - A. 1918 年
 - B. 1938 年
 - C. 1943 年
 - D. 1950 年
 - E. 1985 年
4. 真题 2010-J002 护理道德监督的方式不包括()
 - A. 舆论监督
 - B. 制度监督
 - C. 传统习俗
 - D. 社会监督
 - E. 自我监督
5. 真题 2013-S065 不属于心理素质的是()
 - A. 自尊、自爱、自律
 - B. 有较强的适应能力
 - C. 有事业心和进取心
 - D. 胸怀宽容豁达
 - E. 乐观、情绪稳定
6. 真题 2011-S025 世界卫生组织决定提出“2000 年人人享有卫生保健”的时间是()
 - A. 1977 年
 - B. 1978 年
 - C. 1981 年
 - D. 1994 年
 - E. 1995 年
7. 真题 2016-S040 医院内的临床护理工作主要包括基础护理和()
 - A. 护理科研
 - B. 社区护理
 - C. 护理管理
 - D. 专科护理
 - E. 护理教育
8. 真题 2011-S054 患者, 男, 40 岁。车祸伤及双腿, 入院后医生立即给予伤口处理、骨折固定, 护士给予吸氧, 建立静脉通路, 测量生命体征, 配合医生实施救护。在实施系统的整体护理中, 这属于哪个阶段护理的特点()
 - A. 以疾病为中心阶段
 - B. 以患者为中心阶段
 - C. 以医生为中心阶段
 - D. 以人为中心阶段
 - E. 以人的健康为中心阶段
9. 真题 2014-S005 保持乐观、开朗、稳定的情绪, 宽容豁达的胸怀, 建立良好的人际关系, 属于对护士哪一方面的要求()
 - A. 思想素质
 - B. 文化素质
 - C. 专业素质
 - D. 心理素质
 - E. 体态素质
10. 真题 2013-S064 全国范围举行首届护士执业考试的时间是()
 - A. 1954 年 6 月 1 日
 - B. 1980 年 6 月 1 日
 - C. 1993 年 6 月 1 日
 - D. 1995 年 6 月 1 日
 - E. 1998 年 6 月 1 日
11. 真题 2016-S044 近代护理形成的时间为()
 - A. 17 世纪中叶
 - B. 18 世纪初
 - C. 18 世纪中叶
 - D. 19 世纪中叶
 - E. 20 世纪初
12. 真题 2010-J001 基础护理的基本医德要求是()
 - A. 积极主动, 善于学习
 - B. 热情周到, 提供服务
 - C. 遵守纪律, 严于律己
 - D. 准确及时, 执行医嘱
 - E. 勇于开拓, 不断进取
13. 真题 2011-J086 基础护理的宗旨是()
 - A. 为患者创造一个花钱最少的方法
 - B. 为患者创造一个恢复最快的训练方法
 - C. 为患者创造一个接受治疗的最佳身心状态
 - D. 为患者创造一个最舒适的环境
 - E. 为患者创造一个最直接的医患沟通平台
14. 模拟题 下列关于护士的仪表礼仪, 表述正确的是()
 - A. 护士不可以化妆
 - B. 护士不应留长发
 - C. 护士工作应穿工作服

- D. 护士的正确坐姿是坐在椅子前的 1/3 或 1/4 处
- E. 护士在不影响工作的前提下, 可以佩戴戒指

15. 模拟题 下列有关护理学科历史事件的描述, 正确的是()

- A. 1912 年国际护士会确定国际护士节的时间
- B. 18 世纪中叶开始形成近代护理学
- C. 1920 年南丁格尔逝世
- D. 1840 年南丁格尔创立了世界第一所护士学校
- E. 1855 年中国成立了第一所护士学校

16. 模拟题 有关护理工作方式说法正确的是()

- A. 个案护理费时费力, 不适用于临床
- B. 功能制护理分工明确且有利于护患交流
- C. 小组制护理可以增强护士责任感
- D. 责任制护理明确且节省人力
- E. 综合护理是综合应用几种工作方式, 为服务对象提供护理服务

17. 模拟题 功能制护理的特点不包括()

- A. 以工作为中心的护理方式
- B. 分工不明确, 不利于按护士能力分工
- C. 有利于提高护士技能操作熟练程度
- D. 易产生疲劳、厌烦情绪, 工作满意度降低
- E. 护患之间缺乏沟通和理解

18. 真题 2018-S017 对急诊科护士的组织和技术管理不包括()

- A. 标准化
- B. 最优化
- C. 制度化
- D. 程序化
- E. 规律化

19. 真题 2018-S018 国际护士会于 1899 年成立, 其当时的地点是在()

- A. 美国华盛顿
- B. 瑞士日内瓦
- C. 法国巴黎
- D. 英国伦敦
- E. 意大利罗马

20. 真题 2017-S029 慎独修养属于护士素质中的()

- A. 心理素质
- B. 体态素质
- C. 专业素质
- D. 科学文化素质
- E. 思想道德素质

21. 真题 2017-J030 关于护士的基本任务错误的是()

- A. 增进健康
- B. 预防疾病
- C. 保护环境
- D. 恢复健康
- E. 减轻痛苦

22. 真题 2018-J048 关于护士的行为规范, 叙述错误的是()

- A. 工作严谨、慎独、对执业行为负责
- B. 密切察病情化
- C. 尊重关心爱护患者
- D. 没有对医嘱的审查责任
- E. 为患者提供优质服务

23. 真题 2017-S067 国际红十字会设立南丁格尔奖章, 作为各国优秀护士的最高荣誉奖章, 其颁发的频率是()

- A. 每年一次
- B. 每两年一次
- C. 每三年一次
- D. 每四年一次
- E. 每五年一次

24. 真题 2017-S074 南丁格尔指出: “护理使千差万别的病人都能达到治疗康复的最佳身心状态, 这本身就是一项最精致的艺术”, 其理论思想是()

- A. 护理是助人的活动
- B. 护理是科学与艺术的结合
- C. 照顾是护理的核心和永恒的主题
- D. 护理是一门专业, 一门技术
- E. 护理是一个过程, 其方法是护理程序

25. 真题 2019-S062 近代护理形成的时间为()

- A. 18 世纪中叶
- B. 18 世纪初
- C. 17 世纪中叶
- D. 19 世纪中叶
- E. 20 世纪初

26. 真题 2019-S036 慎独修养属于护士素质中的()

- A. 心理素质
- B. 思想道德素质
- C. 专业素质
- D. 科学文化素质
- E. 体态素质

27. 真题 2019-S023 南丁格尔创建世界第一所护士学校的时间是()

- A. 1840 年
- B. 1854 年
- C. 1860 年
- D. 1888 年
- E. 1890 年

28. 真题 2019-S057 护士的心理素质不包括()

- A. 稳定的情绪
- B. 良好的忍耐力
- C. 较强的适应能力
- D. 较强的实践能力
- E. 高度的同情心

二.护理学基本概念

1. 真题 2015-S039 20 世纪 80 年代以来, 影响健康的最主要因素是()
 - A. 环境因素
 - B. 遗传因素
 - C. 生物学因素
 - D. 生活方式
 - E. 医疗保健服务
2. 真题 2010-S002 以人为中心, 以护理程序为基础, 以现代护理观为指南, 对人实施从生理、心理和社会各个方面的护理, 从而达到最佳健康状况的护理是()
 - A. 个案护理
 - B. 功能制护理
 - C. 小组护理
 - D. 责任制护理
 - E. 整体护理
3. 真题 2015-S043 对整体护理的正确理解是()
 - A. 服务对象是生病的人
 - B. 贯穿于人生命的全过程
 - C. 为患者提供健康促进服务
 - D. 为患者提供全面帮助和照顾
 - E. 把患者看作统一的功能整体
4. 真题 2015-S045 关于环境与护理的叙述, 不正确的是()
 - A. 人的内环境是指机体各器官功能与调节机制的运转状态
 - B. 人的内环境相对稳定, 一般不会随外界环境的变化而变化
 - C. 社会环境是人们为了满足物质和精神文化生活的需要而创设的环境
 - D. 治疗性环境是适合患者恢复身心健康的环境
 - E. 舒适和安全是创设治疗性环境要考虑的主要因素
5. 真题 2016-S027 “健康新视野”提出, 未来工作方向的侧重点是()
 - A. 生命的培育
 - B. 生命的保护
 - C. 健康的保护
 - D. 晚年的生活质量
 - E. 从疾病转向健康促进方面
6. 真题 2016-S046 对人类健康保障起决定作用的因素是优良的()
 - A. 生理环境
 - B. 心理环境
 - C. 自然环境
 - D. 社会环境
 - E. 治疗性环境
7. 真题 2016-S049 最佳健康模式的提出者是()
 - A. Roy

- B. Dunn
 - C. Henderson
 - D. Orlando
 - E. Oram
8. 真题 2014-S009 护理学的 4 个基本概念指的是()
 - A. 预防、治疗、护理、环境
 - B. 患者、健康、社会、护理
 - C. 人、环境、健康、预防
 - D. 患者、预防、治疗、护理
 - E. 人、环境、健康、护理
 9. 真题 2013-S057 须考虑舒适和安全两个主要因素的环境是()
 - A. 人文环境
 - B. 社会环境
 - C. 外环境
 - D. 治疗性环境
 - E. 医院物理环境
 10. 真题 2013-S054 关于人的成长与发展的叙述, 正确的是()
 - A. 人基本的态度、气质、生活方式不会受到婴幼儿期心理社会发展的影响
 - B. 成长与发展中, 生理的发展先于心理的发展
 - C. 遗传和环境因素是影响成长与发展的两个最基本因素
 - D. 人的成长发展是一个连续、匀速进行的过程
 - E. 发展是生命中不可预期的改变
 11. 真题 2010-S003 不属于护理理论四个基本概念的是()
 - A. 人
 - B. 健康
 - C. 保健
 - D. 环境
 - E. 护理
 12. 真题 2010-S018 最佳健康模式强调的是()
 - A. 促进健康与预防疾病
 - B. 治疗疾病与康复护理
 - C. 恢复健康与减轻痛苦
 - D. 维持健康与预防疾病
 - E. 治疗疾病与减轻不适
 13. 真题 2011-S042 对整体护理的正确理解是()
 - A. 服务对象是生病的人
 - B. 贯穿于人生命的全过程
 - C. 为患者提供健康促进服务
 - D. 为患者提供全面的帮助和照顾
 - E. 把患者看作统一的功能整体
 14. 真题 2011-S091 病室内湿度过低易引起患者()
 - A. 食欲减弱
 - B. 肌肉紧张

- C. 气闷不适
- D. 头痛、失眠
- E. 口干、咽痛

15. 真题 2011-S092 病室内湿度过高易引起患者()

- A. 食欲减弱
- B. 肌肉紧张
- C. 气闷不适
- D. 头痛、失眠
- E. 口干、咽痛

16. 真题 2013-S024 最佳健康模式强调的是()

- A. 促进健康与预防疾病
- B. 治疗疾病与康复护理
- C. 恢复健康与减轻痛苦
- D. 维持健康与预防疾病
- E. 治疗疾病与减轻不适

17. 真题 2013-S030 病房湿度过低时,患者可表现为()

- A. 呼吸道黏膜干燥、咽痛
- B. 憋气、闷热
- C. 肌肉紧张
- D. 食欲不振、耳鸣
- E. 尿量增多

18. 模拟题 艾瑞克森将人格发展分为几个阶段()

- A. 4 期
- B. 5 期
- C. 6 期
- D. 7 期
- E. 8 期

19. 模拟题 整体护理的宗旨是()

- A. 为患者提供服务
- B. 以工作目标为中心
- C. 帮助患者恢复健康
- D. 以护理对象为中心
- E. 帮助健康的人保持健康

20. 模拟题 病毒性肝炎患者入院行卫生处置时,衣服的最佳处理方法是()

- A. 包好存放在住院处
- B. 交家属带回家
- C. 消毒后交患者保管
- D. 消毒后存放在住院处
- E. 日光暴晒后存放病室

21. 模拟题 WHO 对健康定义的说法是除无躯体疾病外还要有()

- A. 完整心理状态和良好社会适应能力
- B. 良好的生理、心理及适应环境的动态平衡状态
- C. 人和环境协调一致和良好的社会适应能力
- D. 完整的生理、心理状态和良好的社会适应能力
- E. 良好的心理状态和适应复杂环境变化的能力

22. 真题 2018-S023 护理学中对“护理”概念的理解正确的是()

- A. 护理服务的对象是患病的人
- B. 护士和患者的关系是管理与服从的关系
- C. 护理是有目的、有组织的被动性活动
- D. 护理工作的中心内容是随时间推移而变化
- E. 护理实践是以经验为基础的活动

23. 真题 2018-J046 护士对呼吸病区进行护理质量问卷调查,某患者拒绝填表,护士坚持让该患者填写,其行为违反了患者的()

- A. 匿名权
- B. 知情权
- C. 隐私权
- D. 公平权
- E. 自主权

24. 真题 2019-S042 南丁格尔指出“护理使千差万别”的患者都能达到治疗康复的最佳身心状态,这本身就是一项最精致的艺术”,其理论思想是()

- A. 照顾是护理的核心和永恒的主题
- B. 护理是助人的活动
- C. 护理是一个过程,其方法是护理程序
- D. 护理是科学与艺术的结合
- E. 护理是一门专业,一门技术

25. 真题 2019-S019 护理学基本概念的核心是()

- A. 人
- B. 环境
- C. 护理
- D. 健康
- E. 病人

26. 真题 2019-S004 导致人体产生耳鸣,血压升高的噪声值超过()

- A. 50db
- B. 60db
- C. 70db
- D. 80db
- E. 90db

三.护理学相关理论

1. 真题 2010-S026 根据马斯洛的理论,对人类基本需要各层次间关系的理解,正确的是()

- A. 需要层次上移后满足需要的差异性很小
- B. 不同层次的需要会出现重叠甚至颠倒
- C. 所有需要都必须立即和持续地给予满足
- D. 不同层次的需要的位置是固定不变的
- E. 各需要层次有其独立性,不会相互影响

2. 模拟题 主动性对内疚的危机应在()

- A. 口腔期
- B. 肛门期

- C. 性蕾期
- D. 潜伏期
- E. 青春期

3. 真题 2015-J055 “医乃至精至微之事”所蕴含的医疗卫生职业的内在要求是()

- A. 严谨求实, 精益求精
- B. 廉洁自律, 恪守医德
- C. 爱岗敬业, 团结协作
- D. 优质服务, 医患和谐
- E. 乐于奉献, 热心公益

4. 模拟题 人表达自身所体验的喜、怒、哀、乐的需要属于()

- A. 生理性需要
- B. 知识性需要
- C. 社会性需要
- D. 精神性需要
- E. 情绪性需要

5. 模拟题 小李是工科大四的学生, 因骨关节结核住入外科病区, 面临毕业与考研的压力, 他时常表现出烦躁不安、沮丧和焦虑, 该患者为()

- A. 患者角色行为缺如
- B. 患者角色行为强化
- C. 患者角色行为消退
- D. 患者角色行为冲突
- E. 患者角色行为退化

6. 真题 2011-S065 患者, 女, 50岁。计划次日行“胃大部切除术”, 今晚辗转反侧, 难以入眠应优先解决的需要是()

- A. 生理需要
- B. 安全需要
- C. 爱与归属的需要
- D. 自尊的需要
- E. 自我实现的需要

7. 模拟题 按艾瑞克森心理社会发展学说, 解决好自我认同对角色混乱的危机应在()

- A. 口腔期
- B. 肛门期
- C. 性蕾期
- D. 潜伏期
- E. 青春期

8. 真题 2018-S007 下列压力源不属于心理社会因素的是()

- A. 考试
- B. 火灾
- C. 结婚
- D. 发热
- E. 搬迁

9. 真题 2011-S068 患者, 男, 42岁。因肺炎住院, 治疗后病情有所好转, 但这时他的妻子意外骨折, 他立即出院去照顾妻子和孩子, 他的这种行为是()

- A. 角色行为冲突
- B. 角色行为缺如
- C. 角色行为强化
- D. 角色行为消退
- E. 角色行为改变

10. 模拟题 患者, 女性, 50岁。面部烧伤恢复期, 面部留有瘢痕。患者常有自卑感, 不愿见人。护士应特别注意满足患者需要的层次是()

- A. 生理的需要
- B. 安全的需要
- C. 爱与归属的需要
- D. 尊重的需要
- E. 自我实现的需要

11. 真题 2016-S053 患者女, 50岁。面部烧伤, 恢复期, 面部留有疤痕, 病人常有自卑感, 不愿见人。护士应特别注意满足病人需要的层次是()

- A. 生理的需要
- B. 安全的需要
- C. 爱与归属的需要
- D. 尊重的需要
- E. 自我实现的需要

12. 真题 2015-S100 角色行为冲突指()

- A. 在现实生活中的社会位置及相应的权利、义务和行为规范
- B. 没有进入患者角色, 不承认自己是患者, 不能很好地配合医疗和护理
- C. 患者与其患病前的各种角色发生心理冲突而引起行为的不协调
- D. 安于患者角色, 对自我能力表示怀疑, 产生退缩和依赖心理
- E. 适应患者角色后, 由于某种原因, 又重新承担起本应免除的社会角色的责任

13. 真题 2015-S099 角色行为缺如指()

- A. 在现实生活中的社会位置及相应的权利、义务和行为规范
- B. 没有进入患者角色, 不承认自己是患者, 不能很好地配合医疗和护理
- C. 患者与其患病前的各种角色发生心理冲突而引起行为的不协调
- D. 安于患者角色, 对自我能力表示怀疑, 产生退缩和依赖心理
- E. 适应患者角色后, 由于某种原因, 又重新承担起本应免除的社会角色的责任

14. 真题 2016-S038 根据马斯洛的理论, 对人类基本需要各层次间关系的理解, 正确的是()

- A. 需要层次上移后满足需要的差异性很小

- B. 不同层次的需要会出现重叠甚至颠倒
- C. 所有需要都必须立即和持续地给予满足
- D. 不同层次的需要的位置是固定不变的
- E. 各需要层次有其独立性，不会相互影响

15. 真题 2016-S011 被誉为“现代心理学之父”的是()

- A. 贝塔朗菲
- B. 弗洛伊德
- C. 艾瑞克森
- D. 皮亚杰
- E. 马斯洛

16. 真题 2015-S098 角色行为强化指()

- A. 在现实生活中的社会位置及相应的权利、义务和行为规范
- B. 没有进入患者角色，不承认自己是患者，不能很好地配合医疗和护理
- C. 患者与其患病前的各种角色发生心理冲突而引起行为的不协调
- D. 安于患者角色，对自我能力表示怀疑，产生退缩和依赖心理
- E. 适应患者角色后，由于某种原因，又重新承担起本应免除的社会角色的责任

17. 真题 2016-S042 按皮亚杰的观点，以自我为中心，单方面考虑问题的儿童处于()

- A. 感觉运动期
- B. 前运思期
- C. 具体运思期
- D. 形式运思期
- E. 运思期

18. 真题 2016-S051 患儿男，7岁。在学校的历次考试中均不及格，常受伙伴的嘲笑和家长的责骂，按照艾瑞克森学说，长此以往患儿将出现的负性社会心理发展结果是()

- A. 鄙视他人
- B. 攻击他人
- C. 纵容自己
- D. 自卑失望退缩
- E. 过于依从别人

19. 真题 2016-S074 患者男，65岁。因直肠癌入院。患者步入病房，精神和睡眠较差。3天后在全麻下行直肠癌根治术。有腹部人工肛门。经治疗和护理于手术后第十天出院。患者术前主要的护理问题是()

- A. 自理缺陷
- B. 完全性尿失禁
- C. 排便失禁
- D. 有受伤的危险
- E. 焦虑

20. 真题 2010-S034 对奥伦提出的三种护理补偿系统的理解，正确的是()

- A. 当患者自理能力完全丧失时，应用支持教育系统
- B. 部分补偿系统应用于患者自理能力丧失时
- C. 三种补偿系统中只有支持-教育系统需患者参与自理活动
- D. 全补偿系统要求患者参与自理活动
- E. 支持-教育系统是患者有能力学习自理方法，但必须在护士帮助下完成

21. 真题 2017-S018 指导护士评估患者健康状况，预测患者需要的理论是()

- A. 学习的理论
- B. 信息交流理论
- C. 人的基本需要层次理论
- D. 人、环境、健康与护理的理论
- E. 疾病系统论

22. 真题 2010-S043 患者，男，55岁。脑血管意外，长期卧床，无自理能力，根据奥瑞姆的自理模式，这时护士提供的护理应属于的补偿系统是()

- A. 全补偿系统
- B. 部分补偿系统
- C. 支持系统
- D. 教育系统
- E. 辅助系统

23. 真题 2010-S063 患者，男，50岁。2小时前因突感胸闷，胸骨后疼痛就诊，心电图显示有急性前壁心肌梗死，收入院治疗。护理体检：神志清，合作，心率108次/分，律齐。患者在住院过程中，床边摆满了亲朋好友送来的鲜花，使他得到了()

- A. 生理的需要
- B. 安全的需要
- C. 爱与归属的需要
- D. 尊重的需要
- E. 自我实现的需要

24. 真题 2010-S064 患者，男，50岁。2小时前因突感胸闷，胸骨后疼痛就诊，心电图显示有急性前壁心肌梗死，收入院治疗。护理体检：神志清，合作，心率108次/分，律齐。患者目前需要满足的需要是()

- A. 生理的需要
- B. 安全的需要
- C. 爱与归属的需要
- D. 尊重的需要
- E. 自我实现的需要

25. 真题 2010-S065 患者，男，50岁。2小时前因突感胸闷，胸骨后疼痛就诊，心电图显示有急性前壁心肌梗死，收入院治疗。护理体检：神志清，合作，心率108次/分，律齐。责任护士将患者安置在离治疗室距离较近的床位，告诉其生命体征正常，一切都在检测之中，请患者安心休息，这是为了满足患者的()

- A. 生理的需要
- B. 安全的需要
- C. 爱与归属的需要

- D. 尊重的需要
- E. 自我实现的需要

26. 真题 2011-S005 不属于压力源中心理社会因素的是()

- A. 考试
- B. 火灾
- C. 结婚
- D. 发热
- E. 搬迁

27. 真题 2011-S039 下列关于人与护理的描述, 不正确的是()

- A. 人是生理、心理、社会、精神、文化的统一整体
- B. 人是一个开放性系统
- C. 护理的主要功能是帮助个体的人维持机体各系统或各器官功能的协调平衡
- D. 护理中的人包括个人、家庭、社区和社会四个层面
- E. 护理的最终目标是提高整个人类社会的健康水平

28. 真题 2015-S047 患者, 男, 42 岁。肺炎住院。治疗后病情有所好转, 但这时他的妻子意外骨折, 他立即出院去照顾妻子和孩子。他的这种行为是()

- A. 角色行为冲突
- B. 角色行为缺如
- C. 角色行为强化
- D. 角色行为消退
- E. 角色行为改变

29. 真题 2014-S076 患儿, 5 岁。因患麻疹收入传染病医院, 经治疗后病情好转, 但仍因没有小朋友一起玩而闷闷不乐。根据艾瑞克森的心理社会发展学说, 此年龄段患儿主要解决的危机是()

- A. 信任对不信任
- B. 自主对羞愧
- C. 勤奋对自卑
- D. 主动对内疚
- E. 自我认同对角色紊乱

30. 真题 2014-S075 患儿, 5 岁。因患麻疹收入传染病医院, 经治疗后病情好转, 但仍因没有小朋友一起玩而闷闷不乐。此时患儿未满足的基本需要是()

- A. 生理的需要
- B. 安全的需要
- C. 爱与归属的需要
- D. 尊重的需要
- E. 自我实现的需要

31. 真题 2018-S027 护士与患者家属交流, 鼓励家属多到医院陪伴患者, 是为了满足患者的()

- A. 生理需要
- B. 安全需要
- C. 爱与归属的需要
- D. 自尊的需要
- E. 自我实现的需要

32. 真题 2018-S028 在胃镜检查前, 护士向患者讲解检查的过程及指导患者配合, 是为了满足患者的()

- A. 生理需要
- B. 安全需要
- C. 爱与归属的需要
- D. 自尊的需要
- E. 自我实现的需要

33. 真题 2013-J089 护理义务论分为行为义务论和()

- A. 理论义务论
- B. 实践义务论
- C. 职业义务论
- D. 规则义务论
- E. 执行义务论

34. 真题 2014-S004 马斯洛提出的人类基本需求层次理论不包括()

- A. 生理的需求
- B. 知识的需求
- C. 安全的需求
- D. 自尊的需求
- E. 自我实现的需求

35. 真题 2018-S029 护士为化疗后脱发的患者戴假发, 是为了满足患者的()

- A. 生理需要
- B. 安全需要
- C. 爱与归属的需要
- D. 自尊的需要
- E. 自我实现的需要

36. 真题 2014-S077 患儿, 5 岁。因患麻疹收入传染病医院, 经治疗后病情好转, 但仍因没有小朋友一起玩而闷闷不乐。如患儿危机解决不良, 可能出现的人格障碍是()

- A. 对他人不信任, 退缩
- B. 缺乏自信、消极、过于限制自己的活动
- C. 自私、纵容自己、缺乏责任心
- D. 角色紊乱、缺乏生活目标、甚至堕落
- E. 缺乏人际交往能力、逃避责任

37. 真题 2015-S002 在压力理论中, “不详的预感”属于()

- A. 生理性压力源
- B. 心理性压力源
- C. 社会性压力源
- D. 物理性压力源
- E. 文化性压力源

38. 真题 2014-S089 现在的患者角色与健康时承担的角色行为不协调, 属于()

- A. 患者角色行为缺如
- B. 患者角色行为冲突
- C. 患者角色行为强化

- D. 患者角色行为消退
- E. 患者角色行为适应

39. 真题 2015-S020 护士的思想道德素质不包括()

- A. 热爱护理事业
- B. 自爱、自尊、自信、自强
- C. 有较高的慎独修养
- D. 忠于职守, 救死扶伤
- E. 心理健康, 情绪稳定

40. 真题 2015-S042 患者出于安全的需要, 最希望的是()

- A. 由有知识、负责任的护士照顾
- B. 了解有关用药方面的知识
- C. 家属能够经常来院陪伴
- D. 尽量不要用药物治疗
- E. 获得一个安静的休养环境

41. 真题 2014-S088 患者没有进入患者角色, 不承认自己是患者, 属于()

- A. 患者角色行为缺如
- B. 患者角色行为冲突
- C. 患者角色行为强化
- D. 患者角色行为消退
- E. 患者角色行为适应

42. 真题 2014-S087 患者经过治疗后, 恢复了社会生活能力, 但表现出依赖性增强, 安于患者角色, 属于()

- A. 患者角色行为缺如
- B. 患者角色行为冲突
- C. 患者角色行为强化
- D. 患者角色行为消退
- E. 患者角色行为适应

43. 真题 2015-S018 根据人类基本需要层次, 对各层次间关系的理解, 不正确的是()

- A. 先满足低层次需要, 再考虑较高层次需要
- B. 不同层次需要不会重叠出现
- C. 各需要层次间可相互影响
- D. 个体的基本需要满足的程度和健康状况成正比
- E. 个体满足生理需要的方式类似

44. 真题 2013-S016 一般系统论的提出者是()

- A. 佩皮劳
- B. 奥瑞姆
- C. 纽曼
- D. 马斯洛
- E. 贝塔朗菲

45. 真题 2013-S033 患者出于安全的需要最希望的是()

- A. 由负责的护士照顾
- B. 了解有关用药方面的知识
- C. 家属能够经常来院陪护
- D. 尽量不要用药物治疗

E. 获得一个安静的休养环境

46. 真题 2013-S034 艾瑞克森认为个体解决自我认同与角色紊乱危机的主要时期是()

- A. 潜在期
- B. 青春期
- C. 成人早期
- D. 成人期
- E. 老年期

47. 真题 2013-S050 指导护士评估患者健康状况, 预测患者需要的理论是()

- A. 学习的理论
- B. 信息交流的理论
- C. 人的基本需要层次理论
- D. 人、环境、健康与护理的理论
- E. 疾病系统论

48. 真题 2013-S060 按皮亚杰的观点, 以自我为中心, 单方面考虑问题的儿童处于()

- A. 感觉运动期
- B. 前运思期
- C. 具体运思期
- D. 形式运思期
- E. 动思期

49. 真题 2011-S062 患者, 女, 44岁。因车祸胸部严重外伤入院。患者存在多方面的需要。按照人的基本需要层次论, 应首先满足的需要是()

- A. 安全的需要
- B. 自尊的需要
- C. 生理的需要
- D. 爱与归属的需要
- E. 自我实现的需要

50. 真题 2011-S053 患者, 女, 29岁。是位优秀的舞蹈演员, 一次车祸造成下肢骨折入院治疗。经诊治病情稳定, 但情绪低落, 很少与人交往。护士发现患者常望着自己的腿暗自流泪。她目前未满足的需要是()

- A. 生理的需要
- B. 安全的需要
- C. 自我实现的需要
- D. 爱与归属的需要
- E. 自尊的需要

51. 真题 2011-S047 压力反应警告期的临床表现是()

- A. 肌紧张度增加
- B. 心肌减慢
- C. 血压下降
- D. 呼吸减慢
- E. 血糖减轻

52. 真题 2010-S029 指导护士评估患者健康状况, 预见患者需要的理论是()

- A. 学习的理论

- B. 信息交流理论
- C. 人的基本需要层次理论
- D. 人、环境、健康与护理的理论
- E. 疾病系统论

53. 模拟题 患者，女，48岁。高级工程技术人员，A型行为特征，近期单位拟提升其职位，但其突发脑梗死，现表现焦虑不安。她的压力属于()

- A. 文化性压力源
- B. 生理性压力源
- C. 社会性压力源
- D. 心理性压力源
- E. 生物性压力源

54. 模拟题 患者，男，45岁。自感心前区不适自行步入门诊，被诊断为大面积急性心肌梗死。医师要求其立即平卧制动并紧急入院接受治疗。此时需要采取的护理系统是()

- A. 全补偿护理系统
- B. 半补偿护理系统
- C. 部分补偿护理系统
- D. 自我护理系统
- E. 支持-教育护理系统

55. 模拟题 由于病室气温高引发某患者“头痛、恶心的症状”，该压力源属于()

- A. 化学性压力源
- B. 心理性压力源
- C. 物理性压力源
- D. 生理性压力源
- E. 社会性压力源

56. 模拟题 塞利认为压力的生理反应过程分成的三个阶段是()

- A. 警告期、适应期、解决期
- B. 反应期、无效期和衰竭期
- C. 警告期、抵抗期和衰竭期
- D. 拒绝期、抵抗期和适应期
- E. 确认期、适应期和解决期

57. 模拟题 马斯洛将人的基本需要分为五个层次，由低到高依次为()

- A. 生理，爱与归属，安全，尊重，自我实现
- B. 安全，生理，爱与归属，尊重，自我实现
- C. 生理，安全，尊重，爱与归属，自我实现
- D. 生理，安全，爱与归属，尊重，自我实现
- E. 安全，生理，尊重，爱与归属，自我实现

58. 模拟题 患者，男，15岁。确诊为白血病，自从同室病友病故后便整日低头不语，暗自流泪，频繁地查看医学书籍。他的压力源于()

- A. 文化性压力源
- B. 生理性压力源
- C. 社会性压力源

- D. 心理性压力源
- E. 生物性压力源

59. 模拟题 属于生理需要的是()

- A. 对环境的陌生，对手术的恐惧
- B. 因疾病导致自卑感
- C. 担心住院会影响工作、学习等
- D. 生命体征、饮食、活动等
- E. 想念亲人、害怕孤单等

60. 模拟题 属于安全需要的是()

- A. 对环境的陌生，对手术的恐惧
- B. 因疾病导致自卑感
- C. 担心住院会影响工作、学习等
- D. 生命体征、饮食、活动等
- E. 想念亲人、害怕孤单等

61. 模拟题 属于爱与归属的需要的是()

- A. 对环境的陌生，对手术的恐惧
- B. 因疾病导致自卑感
- C. 担心住院会影响工作、学习等
- D. 生命体征、饮食、活动等
- E. 想念亲人、害怕孤单等

62. 模拟题 属于自尊与被尊重的是()

- A. 对环境的陌生，对手术的恐惧
- B. 因疾病导致自卑感
- C. 担心住院会影响工作、学习等
- D. 生命体征、饮食、活动等
- E. 想念亲人、害怕孤单等

63. 模拟题 属于实现自我的需要的是()

- A. 对环境的陌生，对手术的恐惧
- B. 因疾病导致自卑感
- C. 担心住院会影响工作、学习等
- D. 生命体征、饮食、活动等
- E. 想念亲人、害怕孤单等

64. 模拟题 马斯洛需要层次理论中爱与归属的需要包括的两个方面是()

- A. 爱与尊重
- B. 接纳与满足
- C. 给予与得到
- D. 宽容与理解
- E. 尊重与悦纳

65. 模拟题 患者，女，50岁。患乳腺癌，准备接受手术治疗。因女儿突然生病，该患者放弃治疗要求出院照顾女儿。该患者出现了哪种角色适应不良()

- A. 角色行为缺如
- B. 角色行为强化
- C. 角色行为消退
- D. 角色行为冲突
- E. 角色行为异常

66. 模拟题 患者,男,21岁。在人际交往中总是因为自以为是而遭受挫折,根据弗洛伊德的性心理发展理论,请判断他的问题可能是源自于()
- 口欲期
 - 肛门期
 - 性蕾期
 - 潜伏期
 - 生殖期
67. 模拟题 陈先生接管一家濒临倒闭的企业3个月,出现头痛、失眠、心跳加快、肌肉酸痛等症状,按照塞利的压力理论,他所处的压力生理反应期是()
- 衰竭期
 - 适应期
 - 警告期
 - 抵抗期
 - 反应期
68. 模拟题 患者,女,20岁。面部烧伤,恢复期,面部留有瘢痕。患者常有自卑感,不愿见人。护士应特别注意满足患者需要的层次是()
- 生理需要
 - 安全需要
 - 社交的需要
 - 尊重的需要
 - 自我实现的需要
69. 模拟题 在护患交谈中,护士移情是指护士()
- 同情患者
 - 怜悯患者
 - 鼓励患者
 - 表达自我感情
 - 理解患者感情
70. 真题 2017-S078 患者女,16岁。急性阑尾炎住院治疗,临近中考,因担心住院影响复习和考试,忧心忡忡,不能安心休养,不利于身体康复。此时该患者出现了角色适应中的()
- 角色行为缺如
 - 角色行为冲突
 - 角色行为退化
 - 角色行为减退
 - 角色行为紊乱
71. 真题 2017-S079 患者女,16岁。急性阑尾炎住院治疗,临近中考,因担心住院影响复习和考试,忧心忡忡,不能安心休养,不利于身体康复。目前影响该患者角色适应的主要因素是()
- 医院制度
 - 疾病的性质
 - 症状的可见性
 - 疾病的严重程度
 - 患者的社会特征
72. 真题 2017-S094 患者男,52岁,教师,因胃溃疡出血住院。在疾病恢复期,要求同事帮忙把自己的专业书带来,以便备课,此需要属于()
- 生理需要
 - 安全需要
 - 爱与归属的需要
 - 自尊的需要
 - 自我实现的需要
73. 真题 2017-S095 患者女,76岁。因发生尿潴留需要导尿,此需要属于()
- 生理需要
 - 安全需要
 - 爱与归属的需要
 - 自尊的需要
 - 自我实现的需要
74. 真题 2017-S096 新入院男患者,56岁,要求护士帮他介绍同室的病友,希望尽快与大家熟悉,被病友接纳,此需要属于()
- 生理需要
 - 安全需要
 - 爱与归属的需要
 - 自尊的需要
 - 自我实现的需要
75. 真题 2019-S040 患者,男,15岁。因车祸急诊入院,经抢救后患者生命体征较为稳定,但伤口疼痛难忍,因没有家属陪伴较为思念家人。此时应优先解决患者的()
- 生理需要
 - 安全需要
 - 爱与归属的需要
 - 尊重的需要
 - 自我实现的需要
76. 真题 2019-S058 患者,男,21岁。出国不适应,从出国第1天开始没有食欲。但进行胃镜检查正常,造成该患者出现身体症状的压力源属于()
- 生理性
 - 物理性
 - 心理性
 - 社会性
 - 文化性
77. 真题 2019-S024 弗洛伊德认为其心理活动是一切意识活动的基础的是()
- 意识
 - 前意识
 - 潜意识
 - 自我
 - 超我
78. 真题 2019-S020 患者,女,55岁。胆结石,拟于

次日在硬膜外麻醉下行胆囊切除手术。目前患者病情稳定，术前准备工作已做好，但仍焦虑不安，忧郁。这是因为未能满足患者的()

- A. 生理的需要
- B. 安全的需要
- C. 爱与归属的需要
- D. 尊重的需要
- E. 自我实现的需要

79. 真题 2019-S051 按皮亚杰的观点，以自我为中心，单方面考虑问题的儿童处于()

- A. 形式运思期
- B. 运思期
- C. 感觉运动期
- D. 具体运思期
- E. 前运思期

80. 真题 2019-S038 患者，女，65岁。患过敏性哮喘，经积极治疗后痊愈，但该患者仍然不肯出院，事事需要护师帮助，这种角色适应不良的情况属于()

- A. 角色行为冲突
- B. 角色行为强化
- C. 角色行为缺如
- D. 角色行为异常
- E. 角色行为消退

四. 护理理论

1. 真题 2010-S006 强调护患关系在护理中作用的理论是()

- A. 保健系统模式
- B. 自理模式
- C. 适应模式
- D. 人际关系模式
- E. 人类基本需要层次论

2. 真题 2015-J019 《大医精诚》云“见彼苦恼，若己有之；一心赴救，无作功夫形迹之心”体现了下列哪项临床基本道德原则()

- A. 生命至上原则
- B. 知情同意原则
- C. 最优化原则
- D. 医疗保密原则
- E. 双重效益原则

3. 真题 2014-S010 罗伊适应模式中对“人”的阐述不正确的是()

- A. 人是一个适应系统
- B. 包括个体、家庭、群体、社区人群
- C. 人不断调整自己去适应变化的环境
- D. 人体的生理调节器和认知调节器构成了适应的过程
- E. 人的适应性反应体现在生理功能和角色功能保持平衡状态

4. 真题 2016-J002 在突发公共卫生事件中，与护理伦理规范不符的是()

- A. 奉献精神
- B. 自身安全为重
- C. 协作精神
- D. 敬业精神
- E. 科学精神

5. 真题 2014-S011 符合纽曼对“初级预防”阐述的是()

- A. 采取早期诊断、治疗和护理措施
- B. 预防应激原侵犯或减少侵犯的可能，加强机体正常防御
- C. 帮助患者预防并发症
- D. 帮助患者进行康复锻炼
- E. 采取预防措施使其在受到侵犯后恢复平衡

6. 真题 2014-S012 有关罗伊适应模式的描述正确的是()

- A. 健康是一种完整的适应状态
- B. 人在适应环境变化时无需付出能量
- C. 人是一个适应系统，只具有生物属性
- D. 护理的目标是促进人在生理功能上的适应
- E. 人是通过生理调节维持身体平衡而达到适应

7. 真题 2013-S100 患者在直肠癌根治术后不接受造瘘口，经过护士的沟通鼓励后，患者积极主动参与到造瘘口的护理中，逐渐建立自我责任感，自信乐观。根据佩皮劳人际关系模式，患者现在这一阶段属于()

- A. 熟悉期
- B. 认识期
- C. 确认期
- D. 开拓期
- E. 解决期

8. 真题 2013-S099 患者，男，61岁。确诊直肠癌入院治疗。入院后护士热情接待患者，详细介绍病房的环境及注意事项等。根据佩皮劳人际关系模式，这一阶段属于()

- A. 熟悉期
- B. 认识期
- C. 确认期
- D. 开拓期
- E. 解决期

9. 真题 2014-S013 在奥瑞姆的自理模式中，对护理学基本概念的阐述，不正确的是()

- A. 护理是一种服务和助人的方式
- B. 护理是克服自理缺陷发展的活动
- C. 环境是人以外的所有因素，社会希望人能自我管理
- D. 人是有能力通过学习行为来达到自我照顾需要的
- E. 健康是指人的生理和心理两方面的完好状态

10. 真题 2014-S090 根据奥瑞姆自理模式的内容，属

于健康偏离时的自理需求的是()

- A. 摄入空气、水、食物
- B. 维持独处和社会交往的平衡
- C. 应对失去亲人的情况
- D. 患病后做出相应的生活方式改变
- E. 预防对健康有危害的因素

11. 真题 2018-S008 对奥瑞姆提出三种护理补偿系统的理解, 正确的是()

- A. 当病人自理能力完全丧失时, 应用支持教育系统
- B. 部分补偿系统应用于病人自理能力丧失时
- C. 三种补偿系统中只有支持教育系统需病人参与自理活动
- D. 全补偿系统要求病人参与自理活动
- E. 支持教育系统是病人有能力学习自理方法, 但必须在护士帮助下完成

12. 真题 2017-S009 不属于护理理论四个基本概念的是()

- A. 人
- B. 健康
- C. 保健
- D. 环境
- E. 护理

13. 真题 2014-S091 根据奥瑞姆自理模式的内容, 属于发展性的自理需求的是()

- A. 摄入空气、水、食物
- B. 维持独处和社会交往的平衡
- C. 应对失去亲人的情况
- D. 患病后做出相应的生活方式改变
- E. 预防对健康有危害的因素

14. 真题 2015-S031 患者可以根据需要和利益得到所有可能的服务属于佩皮劳人际关系模式的()

- A. 认知期
- B. 认识期
- C. 确认期
- D. 开拓期
- E. 解决期

15. 真题 2015-S088 根据自理模式理论, 对糖尿病患者进行护理时应采用()

- A. 全补偿系统
- B. 部分补偿系统
- C. 支持-教育系统
- D. 预防系统
- E. 帮助系统

16. 真题 2014-S007 对奥瑞姆提出的三种护理补偿系统的理解, 正确的是()

- A. 当患者自理能力完全丧失时, 应用支持-教育系统
- B. 部分补偿系统应用于患者自理能力丧失时
- C. 三种补偿系统中只有支持教育-系统需要患者参与自理活动

D. 全补偿系统要求患者参与自理活动

E. 支持-教育系统是患者有能力学习自理方法, 但必须在护士帮助下完成

17. 真题 2013-S087 根据自理模式理论, 对昏迷患者进行护理时应采用()

- A. 全补偿系统
- B. 部分补偿系统
- C. 支持教育系统
- D. 预防系统
- E. 帮助系统

18. 真题 2010-S036 代偿患者自护方面的不足属于奥伦护理系统结构的()

- A. 部分补偿系统中的护士活动
- B. 全补偿系统中的护士活动
- C. 部分补偿系统中的患者活动
- D. 支持教育系统中的患者活动
- E. 支持教育系统中的护士活动

19. 真题 2010-S037 佩皮劳护患关系形成过程不包括()

- A. 认识期
- B. 指导期
- C. 确认期
- D. 开拓期
- E. 解决期

20. 真题 2011-S003 人际关系模式的提出者是()

- A. 纽曼
- B. 罗伊
- C. 奥伦
- D. 马斯洛
- E. 佩皮劳

21. 真题 2011-S007 罗伊适应模式对四个护理学基本概念 的阐述, 正确的是()

- A. 健康是一种完整的适应状态
- B. 人在适应环境变化时无需付出能量
- C. 护理的目标是促进人在生理功能上的适应
- D. 人是一个适应系统, 具有生物、心理和社会属性
- E. 人是通过生理调节维持身体平衡而达到适应

22. 真题 2016-S072 患者男, 37 岁。胃大部切除手术后第 7 天, 有一定的自理能力。按照奥伦的护理理论, 护士可给予()

- A. 基本护理系统
- B. 全补偿护理系统
- C. 支持教育系统
- D. 部分补偿护理系统
- E. 健康教育系统

23. 真题 2016-S073 患者男, 37 岁。胃大部切除手术后第 7 天, 有一定的自理能力。护士在实施护理过程中, 对奥伦的护理理论观点体会, 不妥的是()

- A. 其基本精神是研究人的自理需要
- B. 自理是人本能的行为
- C. 护理是帮助病人克服影响实现自理能力的阻力
- D. 护理技术包括人际交往与对机体进行调整的技术
- E. 护理活动随着一个人的健康状况而适当改变

24. 真题 2016-S099 按纽曼健康系统模式, 当怀疑或发现压力源确实存在而压力反应尚未发生时, 应采取的预防措施是()

- A. 初级预防
- B. 一级预防
- C. 二级预防
- D. 三级预防
- E. 四级预防

25. 真题 2016-S100 按纽曼健康系统模式, 护士发现护理对象已出现疾病的症状和体征, 应采取的预防措施是()

- A. 初级预防
- B. 一级预防
- C. 二级预防
- D. 三级预防
- E. 四级预防

26. 真题 2011-S095 按纽曼的健康系统模式, 当怀疑或发现压力源确实存在而压力反应尚未发生时, 应采取的预防措施是()

- A. 初级预防
- B. 一级预防
- C. 二级预防
- D. 三级预防
- E. 四级预防

27. 真题 2016-S055 患者女, 52 岁。因饮食量增加但体重减轻, 多次检查空腹血糖均 $\geq 8.5\text{mmol/L}$, 按糖尿病进行治疗, 病情好转, 准备近日出院, 护士对其进行血糖仪使用方法的指导, 属于舆论自理理论的()

- A. 全补偿护理系统
- B. 全代偿护理系统
- C. 部分补偿护理系统
- D. 部分代偿护理系统
- E. 支持-教育系统

28. 真题 2015-S089 根据自理模式理论, 对昏迷患者进行护理时应采用()

- A. 全补偿系统
- B. 部分补偿系统
- C. 支持-教育系统
- D. 预防系统
- E. 帮助系统

29. 真题 2013-S086 根据自理模式理论, 对糖尿病患者进行护理时应采用()

- A. 全补偿系统
- B. 部分补偿系统

- C. 支持教育系统
- D. 预防系统
- E. 帮助系统

30. 真题 2013-S020 患者, 女, 25 岁。肌腱炎, 给予湿热敷。患者开始感觉敷布非常热, 敷布温度降低后被及时更换, 以同样的温度再接触到患部时, 患者又不觉得敷布很热。这是由于机体发生了()

- A. 心理适应
- B. 社会适应
- C. 技术适应
- D. 生理适应
- E. 病理适应

31. 真题 2017-S026 当怀疑或发现压力源存在而尚未发生压力反应时, 应采取的预防级别是()

- A. 一级预防
- B. 二级预防
- C. 三级预防
- D. 四级预防
- E. 五级预防

32. 真题 2011-S096 按纽曼健康系统模式, 护士发现护理对象已出现疾病的症状和体征, 应采取的预防措施是()

- A. 初级预防
- B. 一级预防
- C. 二级预防
- D. 三级预防
- E. 四级预防

33. 模拟题 患者, 男, 30 岁。因“急性胰腺炎”入院治疗。病情稳定后, 患者依赖性增强, 自己能做的事也要别人代劳, 该患者使用的心理防卫机制是()

- A. 否认
- B. 退化
- C. 投射
- D. 转移
- E. 补偿

34. 模拟题 患者, 女, 65 岁。脑血管意外, 意识不清, 长期卧床。根据奥瑞姆的自理模式, 护士提供的护理应属于()

- A. 全补偿系统
- B. 部分补偿系统
- C. 支持教育系统
- D. 健康教育系统
- E. 辅助系统

35. 模拟题 患者, 女, 75 岁。平素体健, 晨练时偶然跌倒造成右肘关节外伤, 部分活动受限, 入院后护士需采取的护理系统是()

- A. 全补偿护理系统
- B. 半补偿护理系统

- C. 部分补偿护理系统
- D. 自我护理系统
- E. 支持-教育护理系统

36. 模拟题 纽曼健康系统模式中以下哪项为基础的护理概念性框架()

- A. 全面性
- B. 闭合性
- C. 原则性
- D. 开放性
- E. 中心性

37. 模拟题 患者,女,38岁。在某医院接受甲状腺瘤切除术,在病区护士的悉心照顾与指导下,她充满信心,积极参与,主动对自我照顾发生兴趣,按照护理计划一天天地康复,按照佩皮劳人际关系模式理论,她与护士的关系进入了()

- A. 确认期
- B. 合作期
- C. 开拓期
- D. 认识期
- E. 解决期

38. 模拟题 佩皮劳人际关系模式的基本理论是()

- A. 互动
- B. 人际间关系
- C. 护患关系
- D. 护患双方的满足与成长
- E. 互相理解与尊重

39. 模拟题 结核性腹膜炎患者腹水呈()

- A. 渗出液
- B. 漏出液
- C. 介于渗出液与漏出液之间
- D. 血性腹水
- E. 乳糜腹水

40. 模拟题 属于三级预防的是()

- A. 使用激素类药物
- B. 婚前检查
- C. 使用含铅化妆品
- D. 对食管癌高发人群做疾病筛查
- E. 延长带瘤生存期

41. 模拟题 属于二级预防的是()

- A. 使用激素类药物
- B. 婚前检查
- C. 使用含铅化妆品
- D. 对食管癌高发人群做疾病筛查
- E. 延长带瘤生存期

42. 模拟题 属于一级预防的是()

- A. 使用激素类药物
- B. 婚前检查

- C. 使用含铅化妆品
- D. 对食管癌高发人群做疾病筛查
- E. 延长带瘤生存期

43. 模拟题 护士协助患者进行康复锻炼属于纽曼保健系统模式中的()

- A. 一级预防
- B. 二级预防
- C. 三级预防
- D. 四级预防
- E. 五级预防

44. 模拟题 提出自我照顾模式的是()

- A. 纽曼
- B. 汉斯
- C. 奥瑞姆
- D. 佩普劳
- E. 罗伊

45. 模拟题 《中华人民共和国护士管理办法》中规定()

- A. 护士注册的有效期为1年且需连续注册
- B. 中断注册者如再注册必须按有关规定参加临床实践6个月
- C. 中断注册3年以上者将不予再次注册
- D. 护生进行专业实习须在护士的指导下进行
- E. 护士严禁泄露就医者隐私

46. 模拟题 “低效性呼吸形态:发绀、呼吸急促,与胸部疼痛有关。”这一护理诊断的陈述方式是()

- A. PE公式
- B. ES公式
- C. PES公式
- D. PS公式
- E. P公式

47. 真题 2017-S048 佩皮劳护患关系形成过程不包括()

- A. 认识期
- B. 指导期
- C. 确认期
- D. 开拓期
- E. 解决期

48. 真题 2017-S055 纽曼的服务对象系统结构不包括()

- A. 核心部分
- B. 异常防线
- C. 弹性防线
- D. 正常防线
- E. 抵抗线

49. 真题 2017-S062 患者男,64岁,脑内囊出血1周,意识障碍,左侧偏瘫,尿便失禁,根据奥伦自理理论,

护士提供的护理应属于()

- A. 全补偿护理系统
- B. 部分补偿护理系统
- C. 辅助系统
- D. 支持系统
- E. 教育系统

50. 真题 2017-S072 患者男, 39 岁, 吸烟 15 年, 有哮喘家族史, 某日与邻居争吵后急性哮喘发作, 呼吸困难, 根据罗伊的适应模式, 该患者面临的主要刺激是()

- A. 情绪变化
- B. 气温变化
- C. 缺氧
- D. 吸烟史
- E. 家族遗传史

51. 真题 2019-S068 根据自理模式理论, 对昏迷患者进行护理时应采用()

- A. 全补偿系统
- B. 部分补偿系统
- C. 支持教育系统
- D. 预防系统
- E. 帮助系统

52. 真题 2019-S015 患者, 女, 51 岁。脑血管意外, 经过治疗后病情稳定, 但仍遗留下肢运动障碍, 行走不便, 护士给予下肢功能康复锻炼。根据纽曼的健康系统模式, 此护理干预属于()

- A. 初级预防
- B. 一级预防
- C. 二级预防
- D. 三级预防
- E. 四级预防

53. 真题 2019-S029 罗伊适应模式对四个护理学基本概念 的阐述, 正确的是()

- A. 健康是一种完整的适应状态
- B. 人在适应环境变化时无需付出能量
- C. 人是一个适应系统, 具有生物、心理和社会属性
- D. 护理的目标是促进人在生理功能上的适应
- E. 人是通过生理调节维持身体平衡而达到适应

54. 真题 2019-S048 当怀疑或发现压力源存在而尚未发生压力反应时, 应采取的预防级别是()

- A. 一级预防
- B. 二级预防
- C. 三级预防
- D. 四级预防
- E. 五级预防

55. 真题 2019-S067 根据自理模式理论, 对糖尿病患者进行护理时应采用()

- A. 全补偿系统
- B. 部分补偿系统
- C. 支持教育系统

- D. 预防系统
- E. 帮助系统

五. 医疗服务体系

1. 真题 2010-S005 一级医院指的是()

- A. 农村乡、镇卫生院和城市街道医院
- B. 诊治专科疾病而设置的医院
- C. 全国、省、市直属的市级大医院
- D. 医学院的附属医院
- E. 一般市、县医院及省辖市的区级医院

2. 真题 2014-J069 某护士单独值班, 突然三间病房的床铃同时响起, 该护士应选择先去照护哪间病房的患者()

- A. 距离护士站最近的患者
- B. 平时护患关系融洽的患者
- C. 有重要社会地位的患者
- D. 与本院医生有关系的患者
- E. 最可能有紧急医疗需要的患者

3. 真题 2016-S016 关于医院的任务, 错误的是()

- A. 指导基层和计划生育的技术工作
- B. 保证教学和科研任务的完成
- C. 以医疗为中心
- D. 做好扩大预防
- E. 以科研为主

4. 真题 2014-J073 新生儿病房为提高护理质量, 设计了临床护理科研方案, 需将住院的新生儿分为两个护理组, 分别进行不同的护理措施, 其中实验组要采用不同于新生儿护理常规的护理方案。在方案开始执行前护士必须要做的是()

- A. 向护理部主任报告研究内容
- B. 向新生儿的父母说明情况
- C. 向新生儿的父母说明情况并征得同意
- D. 征得新生儿父母的同意并签知情同意书
- E. 因为新方法没有风险, 不需告知患儿亲属

5. 真题 2015-S065 某社区卫生服务站, 负责社区内居民的预防、保健、医疗、康复和健康教育及计划生育, 这属于社区护理的()

- A. 广泛性
- B. 综合性
- C. 连续性
- D. 实用性
- E. 整体性

6. 模拟题 当妊娠危及胎儿母亲的性命时, 可允许行人工流产或引产, 这符合()

- A. 行善原则
- B. 不伤害原则
- C. 公正原则
- D. 尊重原则
- E. 自主原则

7. 真题 2019-J039 患者女, 26 岁, 去某医院做彩超检查, 护士站里一位护士告诉该患者做彩超前需要饮用大量的水, 并且解释了饮水的量和原因, 在等待检查的过程中, 该患者有尿意难忍, 遂向护士反映, 护士查看了该患者的状态, 向医生反映, 同时与前面的患者沟通后, 将该患者的序号向前调动, 让其提前检查。检查结束之后, 护士主动告知该患者洗手间的位置。分析上述案例, 下列选项从医学伦理视角错误的是()

- A. 护士履行了维护病人的健康, 减轻病人痛苦的义务
- B. 护士履行了解释说明的义务, 向患者解释了做法和原因
- C. 护士的行为, 融洽了医患关系
- D. 护士违背自主公正原则, 侵犯了其他患者的合法权益
- E. 护士实施有效沟通, 对患者进行了人文关怀

8. 真题 2014-S015 下列属于一级医院的是()

- A. 全国、省、市直属的市级大医院
- B. 一般市、县医院及省辖市的区级医院
- C. 农村乡、镇卫生院和城市街道医院
- D. 诊治专科疾病而设置的医院
- E. 医学院的附属医院

9. 真题 2018-S005 一级医院指的是()

- A. 农村乡、镇卫生院和城市街道医院
- B. 诊治专科疾病而设置的医院
- C. 全国、省、市直属的市级大医院
- D. 医学院的附属医院
- E. 一般市、县医院及省辖市的区级医院

10. 真题 2014-S014 男性, 30 岁, 井下矿工。近日感胸闷、气急、呼吸困难, X 线检查怀疑矽肺。该患者诊治的最佳医院是()

- A. 专家医院
- B. 综合医院
- C. 一级医院
- D. 职业病医院
- E. 全民所有制医院

11. 真题 2013-S056 不属于社区卫生服务特点的是()

- A. 针对性
- B. 综合性
- C. 连续性
- D. 广泛性
- E. 实用性

12. 真题 2013-S047 属于一级医院的是()

- A. 医学院校的附属医院
- B. 农村乡镇卫生院
- C. 市级医院
- D. 省级医院
- E. 县医院

13. 真题 2011-S055 某社区卫生服务站, 负责社区内

居民的预防、保健、医疗、康复和健康教育及计划生育, 这属于社区护理的()

- A. 广泛性
- B. 综合性
- C. 连续性
- D. 实用性
- E. 整体性

14. 真题 2010-S012 初级卫生保健的承担者是()

- A. 基层医院
- B. 社区卫生工作者
- C. 卫生行政部门
- D. 综合性医院的医生
- E. 综合性医院的医生和护士

15. 模拟题 社区卫生服务的主要工作内容是()

- A. 对健康人群的体检与筛选
- B. 对社区居民生活方式的健康指导与教育
- C. 预防、保健和促进健康
- D. 安排有益健康的活动
- E. 饮食营养指导与计划生育宣传

16. 真题 2017-S012 按我国对医院的分级管理制度, 三级医院的最主要任务是()

- A. 教学
- B. 科研
- C. 预防
- D. 指导
- E. 医疗

17. 真题 2017-S022 提出推行初级卫生保健是实现“2000 年人人享有卫生保健”这一目标的基本策略和基本途径的是()

- A. 《阿拉木图宣言》
- B. 《日内瓦宣言》
- C. 《莫斯科宣言》
- D. 《里约热内卢宣言》
- E. 《汉堡宣言》

18. 真题 2017-J077 医院为提高医疗护理服务质量, 积极开展医院质量和风险防范的教育活动, 以下不符合此项活动目的是()

- A. 教育员工加强工作责任心
- B. 学习不良事件报告制度和流程
- C. 通过各种方式加强与患者的有效沟通
- D. 积极化解工作中出现的医患矛盾
- E. 为医务人员投保医疗保险

19. 真题 2019-S047 医院分级管理标准中, 医院分级的依据中不包括()

- A. 地理位置
- B. 设施条件
- C. 管理水平
- D. 任务和功能

E. 技术管理水平

20. 真题 2019-S032 按照我国对医院的分级制度, 三级医院的最主要任务是()

- A. 科研
- B. 教学
- C. 指导
- D. 医疗
- E. 预防

六.沟通

1. 真题 2014-S092 护士为患者进行静脉穿刺时应使用的距离是()

- A. 亲密距离
- B. 个人距离
- C. 工作距离
- D. 公众距离
- E. 社会距离

2. 模拟题 护士在进行查体、治疗时与患者之间的距离属于()

- A. 亲密距离
- B. 个人距离
- C. 社会距离
- D. 空间距离
- E. 公众距离

3. 真题 2013-S085 和患者非正式交谈的主要特点是()

- A. 谈话环境安静
- B. 谈话主题明确
- C. 交谈气氛轻松、自然
- D. 语句表达随意、开放
- E. 交流信息可靠、随机

4. 真题 2014-S016 男性, 45 岁。患 2 型糖尿病, 多食、多饮、多尿、消瘦。护士通过收集资料了解到该患者存在知识缺乏, 并为其制订护理计划, 此时护士与患者处于护患关系发展时期的()

- A. 熟悉期
- B. 工作期
- C. 开始期
- D. 解决期
- E. 结束期

5. 真题 2015-S040 属于沟通基本层次中的最高层次是()

- A. 一般性沟通
- B. 事务性沟通
- C. 分享性沟通
- D. 共鸣性沟通
- E. 情感性沟通

6. 真题 2014-S018 小陈是患者严某的责任护士, 但第一次交谈就失败, 请分析造成其失败的原因是()

- A. 表情沉着、从容
- B. 在患者吃晚饭前进行交谈
- C. 热情介绍自己
- D. 选择一个安静环境进行交谈
- E. 仪表大方、整洁

7. 真题 2014-S019 属于语言性交流的是()

- A. 手势
- B. 沉默
- C. 倾诉
- D. 面部表情
- E. 专业性皮肤接触

8. 真题 2014-S025 观察患者从何时开始()

- A. 来院挂号时
- B. 入院一天内
- C. 写护理病历时
- D. 作护理体检时
- E. 接触患者时

9. 真题 2013-S084 和患者正式交谈的主要特点是()

- A. 谈话环境安静
- B. 谈话主题明确
- C. 交谈气氛轻松、自然
- D. 语句表达随意、开放
- E. 交流信息可靠、随机

10. 真题 2013-S059 达到分享感觉的最高境界的沟通层次是()

- A. 一般性沟通
- B. 分享感觉
- C. 分享个人的想法
- D. 共鸣性的沟通
- E. 陈述事实的沟通

11. 真题 2013-S021 护士与昏迷患者间适用的关系模式是()

- A. 主动-被动型模式
- B. 指导-合作型模式
- C. 指导-被动型模式
- D. 共同参与型模式
- E. 被动参与型模式

12. 真题 2010-S030 通过交谈收集资料的方法, 错误的是()

- A. 让患者畅所欲言, 切忌打断话题
- B. 告知交谈的目的及所需的时间
- C. 注意倾听, 及时给患者反馈
- D. 依交谈提纲收集资料
- E. 选择适宜的交谈环境

13. 真题 2010-S039 达到分享感觉最高境界的沟通层次是()

- A. 一般性沟通
- B. 分享感觉

- C. 分享个人的想法
- D. 一致性的沟通
- E. 陈述事实的沟通

14. 真题 2010-S042 患者,女,22岁。未婚,宫内孕10周入院。护士在收集资料时可促进有效沟通的措施是()

- A. 在大病房内进行提问,不必回避任何人
- B. 告诉患者自己对婚前性行为的看法
- C. 当患者谈话离题时打断患者
- D. 选择在没有其他人员的房间内进行交流
- E. 用亲密距离进行交流

15. 真题 2010-S045 患者,女,80岁。肿瘤晚期,全身极度衰竭,意识有时模糊。为安慰患者,护士与其交流时应使用的距离是()

- A. 亲密距离
- B. 个人距离
- C. 社会距离
- D. 工作距离
- E. 公众距离

16. 真题 2011-S074 患者,男,66岁。因患糖尿病入院,不会讲普通话,护士与其交流时应特别注意使用的沟通技巧是()

- A. 参与
- B. 沉默
- C. 提问
- D. 倾听
- E. 核对

17. 真题 2011-S097 沟通基本层次中最高层次的沟通是()

- A. 分享感觉
- B. 一般性沟通
- C. 共鸣性沟通
- D. 事务性沟通
- E. 分享个人的想法

18. 真题 2011-S098 沟通基本层次中不掺杂个人意见的客观沟通属于()

- A. 分享感觉
- B. 一般性沟通
- C. 共鸣性沟通
- D. 事务性沟通
- E. 分享个人的想法

19. 真题 2013-J088 患者,男,30岁。因高热肺部感染入院,责任护士在评估患者时发现患者有吸毒史,患者要求护士保密不要告诉别人。护士正确的做法是()

- A. 保护患者隐私,不告诉任何人包括其他医务人员
- B. 保护患者隐私,不告诉患者的配偶和亲属
- C. 保护患者隐私,不告诉亲属而要告诉医师
- D. 保护患者隐私,告诉患者亲属不告诉医师
- E. 保护患者隐私,告诉患者的单位要求他们保密

20. 真题 2014-S017 人际沟通的两种形式是()

- A. 语言性沟通和非语言性沟通
- B. 口头沟通和书面沟通
- C. 书面沟通和非语言性沟通
- D. 口头沟通和非语言性沟通
- E. 语言性沟通和书面沟通

21. 真题 2011-S030 患者因患有乳腺癌感到悲伤,护士安慰患者时,所采取的合适距离为()

- A. 个人距离
- B. 亲密距离
- C. 社会距离
- D. 公众距离
- E. 社交距离

22. 真题 2018-S022 在建立护患关系初期,护患关系发展的主要任务是()

- A. 确立患者的健康问题
- B. 对患者收集资料
- C. 为患者解决健康问题
- D. 与患者建立信任关系
- E. 为患者制定护理计划

23. 真题 2010-S013 不属于非语言性的形式是()

- A. 面部表情
- B. 手势
- C. 交流的空间距离
- D. 反应时间
- E. 健康宣教资料

24. 真题 2014-S093 护士为患者进行操作前解释时应使用的距离是()

- A. 亲密距离
- B. 个人距离
- C. 工作距离
- D. 公众距离
- E. 社会距离

25. 真题 2015-S028 护理技术操作前解释的内容不包括()

- A. 操作的目的、方法
- B. 患者需做的准备
- C. 操作过程
- D. 给予心理上的安慰
- E. 感谢患者的合作

26. 真题 2017-J025 某医院对恢复中病情轻微的患者,为保证其睡眠质量,夜间查房采用窗口查看方式,A患者入院后因不适应病房环境而常失眠,由此发现有时夜间护士不查房,遂向护士长投诉护士偷懒。护士应该怎样回应()

- A. 认为该患者事多,不予理睬
- B. 直接让该患者服用安定片
- C. 夜里象征性地打开门看一眼

D. 及时与该患者沟通交流,解释在何种情况下为减少打扰患者夜间不入户查房,并针对患者的失眠问题提出解决方法

E. 再次夜间查房时,即使该患者睡着也将其叫醒,嘘寒问暖

27. 真题 2016-S031 患者因患有乳腺癌感到悲伤,护士安慰患者时,所采取的合适距离为()

- A. 个人距离
- B. 亲密距离
- C. 社会距离
- D. 公众距离
- E. 社交距离

28. 真题 2016-S026 在建立护患关系初期,护患关系发展的主要任务是()

- A. 对病人收集资料
- B. 确定病人的健康问题
- C. 为病人制定护理计划
- D. 与病人建立信任关系
- E. 为病人解决健康问题

29. 真题 2015-S064 患者,男,66岁。糖尿病,不会讲普通话。护士在与其交流时应特别注意使用的沟通技巧是()

- A. 参与
- B. 沉默
- C. 提问
- D. 倾听
- E. 核对

30. 模拟题 关于有效沟通的方法,不正确的是()

- A. 沟通应有明确的目的
- B. 用30%~60%的时间注视对方的面部
- C. 关注对方的语言和非语言行为
- D. 减少聆听时间,保持快速的判断
- E. 交谈中不打断、批评他人

31. 模拟题 书面语言沟通主要应用于()

- A. 进行健康宣教
- B. 安慰患者
- C. 了解患者睡眠情况
- D. 了解患者的排泄情况
- E. 了解患者的饮食情况

32. 模拟题 主动-被动型护患关系适用于()

- A. 高血压患者
- B. 剖宫术后产妇
- C. 股骨头坏死患者
- D. 上呼吸道感染患者
- E. 出血性休克患者

33. 模拟题 下列不属于非语言性沟通形式的是()

- A. 手势
- B. 面部表情

C. 身体运动

D. 人际距离

E. 健康宣教资料

34. 模拟题 护患沟通时正确的做法是()

- A. 避免与患者有目光的接触
- B. 及时纠正患者叙述的内容
- C. 适当点头或轻声说“是”
- D. 对患者谈话的内容及时做出是非判断
- E. 不断提问引导谈话的进行

35. 模拟题 患者,男,75岁。胃癌晚期,全身极度衰竭,意识有时模糊。为安慰患者,护士与其交流时应使用的距离是()

- A. 亲密距离
- B. 个人距离
- C. 社交距离
- D. 工作距离
- E. 演讲距离

36. 模拟题 患者,男,60岁,大学教授。因患高血压住院治疗。适用于该患者的最佳护理关系是()

- A. 主动-被动型
- B. 指导-合作型
- C. 共同参与型
- D. 指导型
- E. 被动型

37. 真题 2017-S034 患者男,70岁,因冠心病病情危重住院治疗,后由于经济原因,患者及家属执意要求出院,此时护士应()

- A. 报告上级行政部门
- B. 让患者去找值班医生
- C. 按患者及家属意愿同意患者出院
- D. 本着救死扶伤的原则,强制留患者住院治疗
- E. 让患者或其法定监护人在自动出院栏上签字,做好护理记录后让患者出院

38. 模拟题 一位护士在与一位患者交谈的过程中,当患者谈到住院以来的高额费用时异常激动、不满。为了缓解患者的情绪,护士此时可采用的交谈技巧是()

- A. 倾听
- B. 核实
- C. 提问
- D. 阐释
- E. 沉默

39. 模拟题 以下属于开放式问题的是()

- A. 您对药物有过敏现象吗?
- B. 您吃饭了吗?
- C. 您感觉有哪些不适?
- D. 您现在还腹痛吗?
- E. 您是否吸烟?

40. 模拟题 患者,女,58岁。咳嗽、咳痰、喘息10年。近日咳大量脓痰,呼吸困难,食欲下降,诊断为慢性阻塞性肺疾病。适用于该患者与护士间的关系模式是()

- A. 被动-主动型模式
- B. 合作-互动型模式
- C. 指导-被动型模式
- D. 共同参与型模式
- E. 协商讨论型模式

41. 模拟题 患者,男,76岁。心功能不全,听力下降明显,护士在与其交流时应特别注意应用哪种沟通技巧()

- A. 倾诉
- B. 沉默
- C. 核对
- D. 倾听
- E. 反馈

42. 真题 2017-S045 在倾听技巧中不可取的是()

- A. 全神贯注
- B. 集中精神
- C. 双方保持一定的距离
- D. 双方坐同一高度
- E. 保持目光持续性接触

43. 真题 2017-X052 问诊时避免使用的语言为()

- A. 里急后重
- B. 大便带血
- C. 咳嗽
- D. 头痛
- E. 心慌

44. 真题 2017-S092 和患者正式交谈的主要特点是()

- A. 谈话环境安静
- B. 谈话主题明确
- C. 交谈气氛轻松、自然
- D. 语气表达随意、开放
- E. 交流信息可靠、随机

45. 真题 2017-S093 和患者非正式交谈的主要特点是()

- A. 谈话环境安静
- B. 谈话主题明确
- C. 交谈气氛轻松、自然
- D. 语气表达随意、开放
- E. 交流信息可靠、随机

46. 真题 2017-S097 护士通知患者做好进餐准备时应采用()

- A. 亲密区
- B. 个人区
- C. 工作区
- D. 公众区
- E. 社会区

47. 真题 2017-S098 在护士办公室,护士和同事工作时应采用()

- A. 亲密区
- B. 个人区
- C. 工作区
- D. 公众区
- E. 社会区

48. 真题 2019-S087 患者,女,52岁。因上腹部疼痛,剧烈难忍,以“急性肾绞痛”急诊入院。责任护士向患者询问病史,准备书写病历。此时为不增加患者的痛苦()

- A. 尽量缩短交谈时间
- B. 提供宣泄情感的机会
- C. 运用非语言沟通技巧
- D. 使用幽默技巧
- E. 严格按既定的提纲进行谈话

49. 真题 2019-S085 患者,女,52岁。因上腹部疼痛,剧烈难忍,以“急性肾绞痛”急诊入院。责任护士向患者询问病史,准备书写病历。此时影响有效沟通的因素中,属于个人因素的是()

- A. 患者的疼痛
- B. 沟通距离
- C. 人际关系
- D. 同室患者
- E. 医生的诊断

50. 真题 2019-S086 患者,女,52岁。因上腹部疼痛,剧烈难忍,以“急性肾绞痛”急诊入院。责任护士向患者询问病史,准备书写病历。此时的护患沟通大多为()

- A. 一般性沟通
- B. 事务性沟通
- C. 分享型沟通
- D. 共鸣性沟通
- E. 情感性沟通

七. 护士工作与法律

1. 真题 2010-S053 患儿,男,5岁。低钙抽搐需用钙剂治疗,护士从固定位置取出10%葡萄糖酸钙,凭经验不会错而未查对药物,该患儿接受静脉推注中死亡,经查实推注的是10%氯化钾,此行为属于()

- A. 侵权行为
- B. 故意犯罪
- C. 过失犯罪
- D. 侵犯行为
- E. 渎职罪

2. 模拟题 实习护生小赵,在未经带教老师的允许和带领下单独为患者进行静脉穿刺,无意中将液体输错并造成患者损伤。对护生小赵来说,需要()

- A. 承担法律责任
- B. 给予警告

- C. 给予罚款处罚
- D. 暂停实习
- E. 给家属赔礼道歉

3. 模拟题 实习护生小赵,在未经带教老师的允许和带领下单独为患者进行静脉穿刺,无意中将液体输错并造成患者损伤。如果小赵在带教护士的带领下发生差错事故,负责任的应该是()

- A. 护生小赵
- B. 带教护士
- C. 不需要
- D. 小赵和带教护士
- E. 护士长

4. 模拟题 在体温符号外划红圈表示()

- A. 超高热
- B. 物理降温
- C. 患者拒测
- D. 体温与病情不符
- E. 体温与脉搏重叠

5. 真题 2019-J047 某医院内科病房,治疗护士误将甲床的青霉素注射给乙床病人,而将乙床的庆大霉素注射给甲床病人。当她发现后心里十分矛盾和紧张,想把此事隐瞒下去。此护士的行为违反了医疗机构从业人员护士行为规范的()

- A. 不断更新知识,提高专业技术能力和综合素质
- B. 正确执行临床护理实践和技术规范
- C. 工作严谨、慎独,对执业行为负责
- D. 严格执行医嘱,发现医嘱违反法律
- E. 按照要求及时准确、完整规范书写病历,认真管理

6. 模拟题 责任制护理的特点不包括()

- A. 对患者实行 8 小时在岗,24 小时负责
- B. 护士责任明确
- C. 需要较少的护理人员
- D. 较全面地了解患者情况
- E. 文字记录书写任务较多

7. 模拟题 下列执行口头医嘱的做法,错误的是()

- A. 一般情况下不执行
- B. 在急诊抢救等特殊情况下须执行
- C. 执行时,护士应向医生复诵一遍
- D. 双方确认无误后方可执行
- E. 执行完后,医生不必补写书面医嘱

8. 模拟题 下列情形不属于医疗事故的是()

- A. 器械消毒不合格导致患者感染
- B. 输入血型错误导致患者发生溶血反应
- C. 药物查对错误导致患者死亡
- D. 因患者家属拒绝签字导致患者死亡
- E. 快速大量输血导致急性肺水肿

9. 模拟题 患者,女,45 岁。入院第 2 天清晨主诉昨夜难入睡,易惊醒。下午医生加开医嘱:地西洋,5mg,

PO, sos, 但当晚患者睡眠良好,该医嘱未予执行。次日上午,护士应在医嘱栏内()

- A. 用红笔写上“失效”
- B. 用蓝笔写上“未用”
- C. 用红笔写上“未用”
- D. 用蓝笔写上“作废”
- E. 用蓝笔写上“失效”

10. 模拟题 患者,男,37 岁。尿路感染入院,患者住院期间,病案中排列在最前面的是()

- A. 医嘱单
- B. 体温单
- C. 病程记录
- D. 病史和体格检查单
- E. 住院病案首页

11. 模拟题 执行医嘱时,错误的行为是()

- A. 紧急抢救时,执行口头医嘱
- B. 常规情况下,不执行电话医嘱
- C. 发现医嘱有错误时,应对其进行修改
- D. 发现医嘱有错误时,拒绝执行,并向医生提出质疑
- E. 患者对医嘱提出质疑时,应对医嘱的准确性进行核实

12. 模拟题 关于医嘱种类的解释,下列哪项不对()

- A. 长期医嘱有效时间在 24 小时以上
- B. 临时医嘱一般只执行一次
- C. 临时备用医嘱有效时间在 24 小时以内
- D. 长期医嘱医生注明停止时间后失效
- E. 长期备用医嘱须由医生注明停止时间后方为失效

13. 模拟题 以工作为导向,按工作内容分配护理工作的护理工作方式是()

- A. 个体护理
- B. 功能制护理
- C. 小组制护理
- D. 责任制护理
- E. 综合护理

14. 模拟题 不属于医嘱内容的是()

- A. 给药途径
- B. 测生命体征的方法
- C. 护理级别
- D. 隔离种类
- E. 药物剂量

15. 模拟题 哌替啶 50mg, IM, q6h, prn 是()

- A. 长期医嘱
- B. 临时医嘱
- C. 长期备用医嘱
- D. 临时备用医嘱
- E. 限时医嘱

16. 模拟题 因抢救患者未能及时书写病例时,在抢救结束后及时补记并注明时间,补记时间是抢救结束后()

- A. 6 小时
- B. 1 天
- C. 半小时
- D. 3 天
- E. 1 周

17. 模拟题 患者，女，28 岁。怀孕 38 周，胎膜早破，由救护车转入医院，经过检查后进入产房等待分娩，胎儿娩出后产妇出现羊水栓塞现象，立即给予相应治疗，经积极抢救后患者最终死亡。产妇家属非常愤怒，认为属于严重的医疗事故，要求医院给予说法，院方在经过耐心详细的解释后家属仍不能理解，家属提出做医疗事故鉴定，在鉴定过程中产妇的家属应当()

- A. 陪伴在鉴定工作人员身边搜集证据
- B. 参加到医疗事故鉴定的工作中
- C. 通过各种渠道收集医院事故的证据
- D. 享有参加鉴定的权利
- E. 采取回避的原则

18. 模拟题 患者，女，28 岁。怀孕 38 周，胎膜早破，由救护车转入医院，经过检查后进入产房等待分娩，胎儿娩出后产妇出现羊水栓塞现象，立即给予相应治疗，经积极抢救后患者最终死亡。医疗事故鉴定组最终得出的结论是产妇的死亡不属于医疗事故，家属在情绪上难以接受，于是组织亲戚朋友围攻医院，寻衅闹事，殴打医护人员，此时医院应()

- A. 尽量避免与其正面接触
- B. 耐心与其沟通
- C. 使用保安以武力镇压
- D. 及时报告公安机关，依法处理
- E. 为图省事与其家属私下解决

19. 模拟题 造成患者重度残疾属于()

- A. 一级医疗事故
- B. 二级医疗事故
- C. 三级医疗事故
- D. 四级医疗事故
- E. 医疗过失

20. 模拟题 实习护生小赵，在未经带教老师的允许和带领下单独为患者进行静脉穿刺，无意中将液体输错并造成患者损伤。此时应由谁负主要责任()

- A. 护生小赵
- B. 带教护士
- C. 不需要
- D. 小赵和带教护士
- E. 护士长

21. 模拟题 属于临时医嘱的是()

- A. 病危
- B. 转科
- C. 一级护理
- D. 流质饮食
- E. 氧气吸入

22. 真题 2016-S024 护士在执行医嘱的过程中，做法错误的是()

- A. 不可修改医嘱
- B. 一般不执行口头医嘱
- C. 患者对医嘱提出疑问时，护士应核实医嘱
- D. 发现医嘱有明显错误时，护士有权不执行医嘱
- E. 护士向医生指出医嘱中的错误后，医生仍执意要求护士执行时，护士应遵医嘱执行

23. 真题 2011-S031 护士因自信药物不会出错，没有进行查对，导致错误的药物注入患者体内，造成患者死亡。护士的行为属于()

- A. 渎职罪
- B. 过失犯罪
- C. 侵权行为
- D. 疏忽大意
- E. 无过失行为

24. 真题 2011-S045 医疗文件具有法律效应，因抢救患者未能及时书写的，应在抢救结束后据实补记，记录的时间限制是()

- A. 2 小时内
- B. 4 小时内
- C. 6 小时内
- D. 8 小时内
- E. 10 小时内

25. 真题 2018-S024 护士因自信药物不会出错，没有进行查对，导致错误的药物注入患者体内，造成患者死亡。护士的行为属于()

- A. 渎职罪
- B. 疏忽大罪
- C. 过失犯罪
- D. 侵权行为
- E. 无过失行为

26. 真题 2011-S067 护士未与患者及家属沟通，为患者施行了导尿管。该护士的行为被认为是()

- A. 合法行为
- B. 疏忽大意
- C. 渎职行为
- D. 犯罪行为
- E. 侵权行为

27. 真题 2013-J086 护士以下行为中违反了法律法规的职业要求的是()

- A. 抢救时独立执行医嘱
- B. 遵医嘱给患者服药
- C. 替医师书写口头医嘱
- D. 患者病情紧急时先行处置
- E. 对突发大出血患者先建立静脉通路

28. 真题 2013-S031 对护理工作中护士法律责任的叙述，错误的是()

- A. 护士要慎重对待口头医嘱

- B. 护士要慎重对待“必要时”等形式的医嘱
- C. 患者对医嘱有质疑时，护士应该核实
- D. 护士如发现医嘱有错误，应马上修改
- E. 护士应认真、准确地做好临床护理记录

29. 真题 2014-J011 急诊护士安排严重颅脑外伤昏迷患者优先就诊检查，所遵循的原则是()

- A. 自主原则
- B. 知情同意原则
- C. 双重效成原则
- D. 公正原则
- E. 效用原则

30. 真题 2014-J028 护理人员在未取得执业证书期间可以做的临床护理工作()

- A. 与患者沟通观察病情
- B. 静脉穿刺
- C. 肌内注射
- D. 过敏试验
- E. 给患者服药

31. 真题 2014-S020 下列执行医嘱的行为属违法行为的是()

- A. 紧急抢救时，执行口头医嘱
- B. 常规情况下，不执行电话医嘱
- C. 发现医嘱有错误时，对其进行修改
- D. 发现医嘱有错误时，拒绝执行，并向医生提出质疑
- E. 患者对医嘱提出质疑时，对医嘱的准确性进行核实

32. 真题 2014-S021 执行医嘱时正确的是()

- A. 一般情况下可执行口头医嘱
- B. 医嘱须经医生签字方为有效
- C. 医嘱须隔日仔细核对一次
- D. 需下一班执行的医嘱书面注明即可
- E. 各种通知单次日早晨集中送有关科室

33. 真题 2015-J031 护理人员能够在医疗机构执业的基本条件是()

- A. 持有护理院校毕业证书
- B. 通过护士执业资格考试
- C. 经过卫生行政部门注册
- D. 通过医疗机构考核面试
- E. 经过医疗机构系统培训

34. 真题 2015-J058 某护士在执行医嘱时，发现主治医生的处方有问题，该护士正确的做法是()

- A. 继续执行医嘱
- B. 立刻告诉护士长
- C. 立刻告诉主治医生
- D. 立刻告诉患者
- E. 立刻告诉患者家属

35. 真题 2015-S037 医疗卫生法的基本原则不包括()

- A. 公平原则
- B. 保护弱者原则

- C. 预防为主原则
- D. 卫生保护原则
- E. 患者自主原则

36. 真题 2015-S070 护士给孩子使用热水袋时发生烫伤。根据我国法律，这属于()

- A. 侵权
- B. 失职
- C. 过失犯罪
- D. 直接故意犯罪
- E. 间接故意犯罪

37. 真题 2016-J005 护理人员在未取得执业证书期间可以独立做的临床护理工作是()

- A. 与患者沟通观察病情
- B. 静脉穿刺
- C. 肌内注射
- D. 过敏试验
- E. 给患者服药

38. 真题 2016-J037 护士执业注册后才能独立从事护理工作，每次注册的有效期限为()

- A. 注册后 2 年内有效
- B. 注册后 3 年内有效
- C. 注册后 4 年内有效
- D. 注册后 5 年内有效
- E. 注册后 6 年内有效

39. 真题 2016-S007 医疗文件具有法律效应，因抢救病人未能及时书写的，应在抢救结束后据实补记，补记的时限是()

- A. 2 小时内
- B. 4 小时内
- C. 6 小时内
- D. 8 小时内
- E. 10 小时内

40. 模拟题 造成患者明显损害的其他后果的属于()

- A. 一级医疗事故
- B. 二级医疗事故
- C. 三级医疗事故
- D. 四级医疗事故
- E. 医疗过失

41. 模拟题 患儿，男，1 岁。住院期间因输液时查对不严，输错了药物，造成重度残疾，此类事故属于()

- A. 五级医疗事故
- B. 四级医疗事故
- C. 三级医疗事故
- D. 二级医疗事故
- E. 一级医疗事故

42. 真题 2017-J046 患者女 78 岁，脑卒中偏瘫，双眼白内障视物不清，意识清楚，智力正常，护士在为患者治疗前，职业行为恰当得做法是()

- A. 查对床号信息正确后, 解释治疗目的, 开始治疗
- B. 查对床头卡信息正确后, 无须解释治疗目的, 开始治疗
- C. 向亲属确认患者正确后, 无须解释治疗目的, 开始治疗
- D. 问患者姓名确认无误后, 解释治疗目的, 开始治疗
- E. 向亲属确认患者无误后, 解释治疗目的, 开始治疗

43. 真题 2017-S052 护士未与患者及家属沟通, 为患者施行了导尿术, 该护士的行为被认为是()

- A. 合法行为
- B. 疏忽大意
- C. 渎职行为
- D. 犯罪行为
- E. 侵权行为

44. 真题 2018-J071 护士在医疗过程中发现不良事件, 正确的做法是()

- A. 若当事人不是自己, 可报可不报
- B. 报告同事不良事件, 是“小人”的做法
- C. 若无不良后果, 可报可不报
- D. 如果别人不知道, 尽量化解
- E. 报告不良事件

45. 真题 2018-J075 下列护理人员的做法符合护理道德原则的是()

- A. 按照法律要求, 给患者提供适度的信息供其选择
- B. 发扬尊老爱幼道德风尚, 优先护理年老及儿童患者
- C. 护理患者时从实际出发, 重点考虑医疗效率及经济效益
- D. 向患者及家属隐瞒病情以保证工作不受干扰
- E. 满足患者需求, 对其言听计从, 以保证患者利益

46. 真题 2019-S056 护士为病人行导尿术时未用屏风遮挡, 导致病人不满而投诉。护士的行为应视为()

- A. 侵权
- B. 过失犯罪
- C. 故意犯罪
- D. 亵渎罪
- E. 疏忽大意

八. 护理程序

1. 模拟题 李女士, 59岁。卧床3周, 近日骶尾部皮肤破溃, 护士仔细观察后认为是压疮浅度溃疡期。支持判断的是()

- A. 局部皮肤发红, 水肿
- B. 皮肤上有大小水疱, 水疱破溃湿润
- C. 患者主诉骶尾部疼痛、麻木感
- D. 创面湿润有脓性分泌物
- E. 骶尾部皮肤呈紫红色, 皮下有硬结

2. 模拟题 健康资料的直接来源是()

- A. 亲属
- B. 患者本人

- C. 心理医生
- D. 同事
- E. 保姆

3. 模拟题 多采用 PE 形式描述的护理诊断是()

- A. 现存的护理诊断
- B. “有……危险”的护理诊断
- C. 健康的护理诊断
- D. 合作性问题
- E. 潜在并发症

4. 模拟题 多采用 P 形式描述的护理诊断是()

- A. 现存的护理诊断
- B. “有……危险”的护理诊断
- C. 健康的护理诊断
- D. 合作性问题
- E. 潜在并发症

5. 模拟题 多采用 PES 形式描述的护理诊断是()

- A. 现存的护理诊断
- B. “有……危险”的护理诊断
- C. 健康的护理诊断
- D. 合作性问题
- E. 潜在并发症

6. 模拟题 患者, 男, 75岁。以“COPD”收住院, 护士在收集资料时认为目前存在以下问题, 其中属于首优问题的是()

- A. 知识缺乏
- B. 疼痛
- C. 恐惧
- D. 清理呼吸道无效
- E. 营养不良

7. 模拟题 患者, 男, 23岁。觉得大街上人们都在注意他的行动, 对他有敌意, 房子里有人安装了摄像头, 监视他的行动, 有时自言自语、傻笑, 不吃家人做的饭, 害怕饭里有毒, 要自己亲自做饭, 对家人和朋友漠不关心, 父亲病重住院, 患者无动于衷。该患者主要护理问题为()

- A. 社交障碍
- B. 预感性悲哀
- C. 思维过程改变
- D. 穿着或修饰自理缺陷
- E. 生活自理能力降低

8. 真题 2017-S007 护理程序的最后一个步骤是()

- A. 评估
- B. 计划
- C. 诊断
- D. 评价
- E. 实施

9. 模拟题 下列属于主观方面的健康资料是()

- A. 血压 122/80mmHg
- B. 头昏脑涨
- C. 低尾部皮肤破损 1x2cm
- D. 膝关节红肿、压痛
- E. 肌张力三级

10. 真题 2016-S075 患者男, 65 岁。因直肠癌入院。患者步入病房, 精神和睡眠较差。3 天后在全麻下行直肠癌根治术。有腹部人工肛门。经治疗和护理于手术后第十天出院。患者术后一周主要的护理问题是()

- A. 有误吸的危险
- B. 有受伤的危险
- C. 排便失禁
- D. 自理缺陷
- E. 尿潴留

11. 真题 2016-S015 护理程序的步骤排列顺序, 正确的是()

- A. 评估-诊断-计划-实施-评价
- B. 评价-诊断-计划-实施-评估
- C. 评估-实施-计划-诊断-评价
- D. 评估-计划-诊断-实施-评价
- E. 评估-诊断-计划-评价-实施

12. 真题 2016-S005 护理计划主要是依据下列哪项制定的()

- A. 检验报告
- B. 既往病史
- C. 医疗诊断
- D. 护理查体
- E. 护理诊断

13. 真题 2015-S053 患者, 女, 30 岁。因上呼吸道感染就医。在下列采集的资料中, 属于客观资料的是()

- A. 感到头痛, 乏力 2 天
- B. 咽部充血, 体温 38.1℃
- C. 感到恶心
- D. 不易入睡
- E. 自觉咽痛

14. 模拟题 患者, 男, 35 岁。慢性扁桃体炎患者, 择期手术入院。护士应遵照医嘱给予该患者()

- A. 特级护理
- B. 一级护理
- C. 二级护理
- D. 三级护理
- E. 四级护理

15. 模拟题 患者, 男, 41 岁。急诊入院, 目前处于昏迷状态, 患者呼吸时有痰鸣音并有轻度发绀现象。属于社会状况评估的是()

- A. 已婚, 无过敏史
- B. 患者入院前性格内向
- C. 姓名: 王某, 性别: 男, 年龄: 41 岁
- D. 经济状况差, 家庭关系良好

E. 民族: 汉, 职业: 工人

16. 模拟题 患者, 男, 41 岁。急诊入院, 目前处于昏迷状态, 患者呼吸时有痰鸣音并有轻度发绀现象。评估患者存在以下问题, 你认为优先解决的问题是()

- A. 便秘
- B. 语言沟通障碍
- C. 清理呼吸道无效
- D. 皮肤完整性受损
- E. 营养失调, 低于机体需要量

17. 模拟题 患者, 29 岁。因车祸导致腰椎骨折, 搬运患者的正确方法应选择()

- A. 一人法
- B. 二人法
- C. 三人法
- D. 四人法
- E. 挪动法

18. 模拟题 患者, 男, 34 岁。因严重脑外伤收住入院。评估阶段, 护士收集的资料确认其存在诸多健康问题, 其中优先解决的护理问题是()

- A. 皮肤的完整性受损
- B. 活动无耐力
- C. 呼吸道阻塞
- D. 体液不足
- E. 疼痛

19. 模拟题 护士对前来门诊的患者, 首先应进行的工作是()

- A. 健康教育
- B. 卫生指导
- C. 预检分诊
- D. 查阅病案
- E. 心理安慰

20. 模拟题 多用于现存的护理诊断的陈述法是()

- A. P 公式
- B. ES 公式
- C. PS 公式
- D. PE 公式
- E. PSE 公式

21. 模拟题 在搜集资料过程中, 不属于客观资料的选项是()

- A. 患者体温 37.5℃
- B. 血红蛋白 70g/L
- C. 二尖瓣杂音
- D. 头痛剧烈
- E. 体重 58kg

22. 模拟题 隔日一次的外文缩写是()

- A. qod
- B. tid
- C. bid

- D. qd
E. qn
23. 模拟题 患者,男,62岁。患肺源性心脏病3年,近5日因受凉出现痰多、黏稠、不易咳出,诉全身乏力,已卧床2日未解大便。该患者的首要问题是()
A. 便秘
B. 活动无耐力
C. 语言沟通障碍
D. 清理呼吸道无效
E. 皮肤完整性受损
24. 模拟题 患者,男,50岁。司机,车祸后造成严重颅脑损伤,需随时观察、抢救,应给予的护理等级是()
A. 特级护理
B. 四级护理
C. 三级护理
D. 二级护理
E. 一级护理
25. 真题 2015-S048 患者,男,25岁。因发热、咳嗽、呼吸困难而住院,患者神志清楚。在收集资料的过程中属于主要来源的是()
A. 文献资料
B. 心理医生
C. 患者家属
D. 患者本人
E. 主治医生
26. 真题 2015-S041 属于护理程序中计划阶段的内容是()
A. 分析资料
B. 确定护理诊断
C. 确定护理目标
D. 实施护理措施
E. 评价患者反映
27. 真题 2018-S026 下列属于患者客观资料内容的是()
A. 疲乏无力、心悸
B. 头晕、头胀痛、恶心
C. 四肢麻木、呼吸急促
D. 皮肤黄疸、感觉瘙痒
E. 体温 38.5℃、咽喉部充血
28. 真题 2011-S063 患者,男,57岁。因心肌梗死入院,主管护士评估后确定他有以下健康问题。应优先解决的问题是()
A. 舒适改变:心前区疼痛
B. 营养失调:低于机体需要量
C. 活动无耐力
D. 气体交换受损
E. 知识缺乏
29. 真题 2011-S044 在收集患者资料时,关于客观资料的记录正确的是()
A. 每天排尿4-5次,量中等
B. 咳嗽剧烈,咳出大量泡沫痰
C. 每天饮开水5次,每次200ml
D. 每餐主食一碗米饭,一日三餐
E. 发热已经两天,午后发热明显
30. 真题 2011-S001 危险的护理诊断常用的陈述方式是()
A. P公式
B. PS公式
C. SE公式
D. PE公式
E. PSE公式
31. 真题 2010-Z071 患者,女,26岁。患系统性红斑狼疮3年,未婚,面部有较严重的蝶形红斑,怕见人,且有不规则发热。患者首要的护理诊断是()
A. 体温过高
B. 绝望
C. 焦虑
D. 皮肤完整性受损
E. 思维过程改变
32. 真题 2010-Z053 患者,男,28岁。酒后上腹部剧烈疼痛6小时,伴恶心、呕吐。查体:T38℃,辗转不安,巩膜轻度黄染,血淀粉酶256U/L,尿淀粉酶512U/L。首要的护理措施是()
A. 物理降温
B. 防止坠床
C. 胃肠减压
D. 协助患者翻身
E. 建立静脉通路
33. 真题 2010-S093 对患者进行人际关系、经济状况、生活方式的评估属于()
A. 心理评估
B. 病理评估
C. 认知评估
D. 感知评估
E. 社会评估
34. 模拟题 患者,男,55岁。因肺源性心脏病急诊入院,急诊室给予静脉输注抗生素、吸氧,现准备用平车送入病区,护送途中下列哪项错误()
A. 注意保暖
B. 注意安全
C. 暂停输液,吸氧
D. 安置合适卧位
E. 注意病情观察
35. 真题 2010-S092 对患者进行思想、情感、动机、精神状态、人格类型、应激水平的评估属于()
A. 心理评估

- B. 病理评估
- C. 认知评估
- D. 感知评估
- E. 社会评估

36. 真题 2010-S091 医疗诊断阐述的是()

- A. 有关个人对生活环境反应的判断
- B. 有关个人对医疗技术反应的判断
- C. 个人、家庭、社区对健康问题反应的判断
- D. 个人身体病理生理变化的判断
- E. 有关个人对生命照顾反应的判断

37. 真题 2010-S090 护理诊断阐述的是()

- A. 有关个人对生活环境反应的判断
- B. 有关个人对医疗技术反应的判断
- C. 有关个人、家庭、社区对健康问题反应的判断
- D. 有关个人身体病理生理变化的判断
- E. 有关个人对生命照顾反应的判断

38. 真题 2011-S076 患者,男,50岁。主诉头痛、发热、乏力、全身酸痛、恶心,面色潮红、皮肤干燥、发烫。呼吸音粗糙,体温 38.5℃。属于客观资料的信息是()

- A. 头痛
- B. 体温 38.5℃
- C. 乏力
- D. 全身酸痛
- E. 恶心

39. 真题 2011-S077 患者,男,50岁。主诉头痛、发热、乏力、全身酸痛、恶心,面色潮红、皮肤干燥、发烫。呼吸音粗糙,体温 38.5℃。此病的护理问诊重点是()

- A. 患者的文化程度和职业
- B. 患者的既往病史和家庭史
- C. 此次发病的诱因和症状
- D. 患者的生活状况和自理程度
- E. 心理和社会状况

40. 真题 2015-S033 关于护理诊断排列顺序的叙述,正确的是()

- A. 一个患者首优的护理诊断只能有一个
- B. 护士可参照马斯洛的需要层次论对护理诊断进行排序
- C. 首优的护理诊断解决之后再解决中优问题
- D. 现存的护理诊断应排在“有……危险”的护理诊断之前
- E. 对于某个患者来说,护理诊断的先后次序常常是固定不变的

41. 真题 2014-S095 医疗诊断阐述时对象是()

- A. 有关个人对生活环境反应的判断
- B. 有关个人对医疗技术反应的判断
- C. 个人、家庭、社会对健康问题反应的判断
- D. 对个人身体病理生理变化的判断

E. 有关个人对生命照顾反应的判断

42. 模拟题 书写病室报告时,应先书写的患者是()

- A. 出院患者
- B. 危重患者
- C. 新入院患者
- D. 当日手术患者
- E. 行特殊治疗的患者

43. 真题 2014-S094 护理诊断阐述的对象是()

- A. 有关个人对生活环境反应的判断
- B. 有关个人对医疗技术反应的判断
- C. 个人、家庭、社会对健康问题反应的判断
- D. 对个人身体病理生理变化的判断
- E. 有关个人对生命照顾反应的判断

44. 真题 2014-S024 女婴,2岁。肺炎,T39.0℃、P98次/分、R30次/分,咳嗽,痰不易咳出,颜面潮红。其中一项护理诊断为体温过高,请选出主要的诊断依据是()

- A. 皮肤发红、触之有热感
- B. 体温高于正常范围
- C. 呼吸、心跳均加快
- D. 痰液不能排出
- E. 不能出汗

45. 真题 2014-S023 对一位成年患者,可忽略的健康资料是()

- A. 既往患病史
- B. 免疫接种史
- C. 过敏史
- D. 家族病史
- E. 婚育史

46. 真题 2014-S022 进行护理评估时,资料的来源不包括()

- A. 患者
- B. 病历
- C. 患者家属
- D. 其他医务人员
- E. 护士的主观判断

47. 真题 2013-S035 收集资料进行记录时应注意的是()

- A. 记录应清晰、简洁、生动
- B. 记录应准确、全面、简洁
- C. 记录必须反映护士的主观判断
- D. 主观资料的记录应使用专业术语
- E. 记录客观资料应尽量用患者的原话

48. 真题 2011-Z058 患者,女,24岁,未婚,面部有较严重蝶形红斑,且长期不规则低热,其首要护理诊断是()

- A. 体温过高
- B. 皮肤完整性受损

- C. 有感染的危险
- D. 相关知识缺乏
- E. 思维过程改变

49. 真题 2011-S078 患者, 男, 50 岁。主诉头痛、发热、乏力、全身酸痛、恶心, 面色潮红、皮肤干燥、发烫。呼吸音粗糙, 体温 38.5℃。在收集健康资料时, 未用到的方法是()

- A. 视觉观察
- B. 触觉观察
- C. 听觉观察
- D. 嗅觉观察
- E. 交谈

50. 真题 2010-S011 对于患者主观资料的记录, 正确的是()

- A. 患者希望得到良好的关心和照顾
- B. 家属希望能为患者提供良好的治疗药物
- C. 家属说只要有利于康复, 所有治疗建议我们都考虑
- D. 患者说: “记忆力差, 阅读书籍常常读了后 5 行, 忘了前 5 行”
- E. 查体后感到: 患者精神好, 疼痛消失

51. 真题 2016-S064 患者女, 60 岁。腹胀、腹痛、暖气近日下蹲或腹部用力时, 出现不由自主的排尿。对新出现症状正确的护理诊断是()

- A. 功能性尿失禁: 与膀胱过度充盈有关
- B. 功能性尿失禁: 与腹压升高有关
- C. 有反射性尿失禁: 与膀胱收缩有关
- D. 完全性尿失禁: 与神经传导功能减退有关
- E. 压迫性尿失禁: 与膀胱括约肌功能减退有关

52. 模拟题 帮助患者坐轮椅, 下列哪项是错误的()

- A. 检查轮椅性能是否完好
- B. 将椅背与床尾平齐, 翻起脚踏板
- C. 拉起车闸固定车轮
- D. 患者坐稳后翻下脚踏板
- E. 尽量使患者身体靠前坐

53. 真题 2017-S064 患者男, 70 岁, 昏迷, 3 天未排便, 喉部有痰鸣音, 下列问题中应优先解决的是()

- A. 躯体活动障碍
- B. 语音沟通障碍
- C. 清理呼吸道无效
- D. 有皮肤完整性受损的危险
- E. 便秘

54. 真题 2019-S070 医疗诊断阐述的对象是()

- A. 有关个人对生活环境反应的判断
- B. 有关个人对医疗技术反应的判断
- C. 有关个人、家庭、社会对健康问题反应的判断
- D. 有关个人身体病理生理变化的判断
- E. 有关个人对生命的照顾反应的判断

55. 真题 2019-S069 护理诊断阐述的是()

- A. 有关个人对生活环境反应的判断
- B. 有关个人对医疗技术反应的判断
- C. 有关个人、家庭、社会对健康问题反应的判断
- D. 有关个人身体病理生理变化的判断
- E. 有关个人对生命的照顾反应的判断

56. 真题 2019-S054 女婴, 2 岁, 肺炎, T39.1℃、P98 次/分, R30 次/分。咳嗽, 痰不易咳出, 颜面潮红, 其中一项护理诊断为体温过高, 请选出主要依据是()

- A. 皮肤发热, 触之有热感
- B. 体温高于正常范围
- C. 痰液不能排出
- D. 呼吸、心跳均加快
- E. 不能出汗

57. 真题 2019-S053 属于社会状况评估的是()

- A. 青霉素过敏史
- B. 姓名、性别、年龄
- C. 民族、职业、入院方式
- D. 入院前性格外向, 善于交流
- E. 经济状况良好, 家庭关系和谐

九. 舒适、休息、睡眠与活动

1. 真题 2016-S086 脾切除术后 1 天应采取的体位是()

- A. 头高足低位
- B. 去枕仰卧位
- C. 半坐卧位
- D. 侧卧位
- E. 头低足高位

2. 模拟题 患者腰椎穿刺术后 4~6 小时内应采取的体位是()

- A. 仰卧位
- B. 中凹卧位
- C. 去枕仰卧位
- D. 屈膝仰卧位
- E. 高枕仰卧位

3. 模拟题 患者王某, 夜间睡眠时出现梦境, 则可证明其睡眠进入()

- A. 第 I 期
- B. 第 II 期
- C. 第 III 期
- D. 第 IV 期
- E. REM 期

4. 模拟题 平卧位适于()

- A. 肝门静脉分流术后 48 小时内患者
- B. 甲亢术后患者
- C. 乳腺癌术后患者
- D. 急性阑尾炎术后患者
- E. 重症急性胰腺炎患者

5. 模拟题 侧卧位压疮好发部位不包括()

- A. 耳廓
- B. 肩峰
- C. 髌部
- D. 膝前部
- E. 内外踝

6. 模拟题 白天病区理想的声音强度为()

- A. 50~55dB
- B. 60~70dB
- C. 75~80dB
- D. 85~90dB
- E. 35~40dB

7. 模拟题 易导致压疮发生的护理措施是()

- A. 身体空隙处垫软枕、气垫褥
- B. 身体下铺橡胶单, 以保护床单
- C. 更换弄湿的床单
- D. 使用石膏固定患者, 观察肢端皮肤颜色
- E. 翻身时应抬起患者, 避免拖、拽动作

8. 模拟题 患者, 女, 58岁。颅内肿瘤行左幕上开颅, 手术切除后24小时, 生命体征平稳, 此时应为患者安置的体位是()

- A. 平卧位
- B. 半卧位
- C. 床头抬高 15° ~ 30° 左侧卧位
- D. 床头抬高 15° ~ 30° 右侧卧位
- E. 下肢抬高 15° ~ 20° 的斜坡卧位

9. 模拟题 患者因心肌缺血、心绞痛发作卧床4周。为其床上洗发时, 患者突感胸痛、心悸、面色苍白、出冷汗, 护士应立即采取的措施是()

- A. 请家属协助洗发
- B. 加快速度, 迅速完成洗发操作
- C. 注意保暖, 为患者添加衣服后继续洗发
- D. 短暂休息, 鼓励患者坚持片刻
- E. 停止操作, 使患者平卧, 吸氧, 立即与医师联系

10. 模拟题 护士张某接班时未到床旁交接一名重症患者, 导致该患者病情加重无人发现以致险些错过最佳抢救时机, 此行为属于()

- A. 违反值班制度
- B. 不严格执行查对制度
- C. 医疗差错
- D. 违反交接班制度
- E. 违反操作规程

11. 模拟题 患者, 女, 30岁。入睡后, 全身肌肉松弛, 呼吸均匀, 脉搏减慢, 易被外界的响声惊醒。此时患者进入睡眠周期中的()

- A. 第I时相
- B. 第II时相
- C. 第III时相
- D. 第IV时相
- E. 快波睡眠

12. 模拟题 关于睡眠障碍的描述不正确的是()

- A. 失眠是最常见的睡眠障碍
- B. 梦游出现于正相睡眠的第四期
- C. 遗尿多出现于负相睡眠的第四期
- D. 继发性失眠是由身心不适引起的短暂失眠
- E. 发作性睡眠病是睡眠过多的一种

13. 真题 2016-S087 脑外伤开颅术后1天应采取的体位是()

- A. 头高足低位
- B. 去枕仰卧位
- C. 半坐卧位
- D. 侧卧位
- E. 头低足高位

14. 模拟题 下列不属于腹部手术后采取半卧位目的是()

- A. 促使腹腔内渗出液积聚于盆腔, 以减少吸收
- B. 使膈肌下移, 有利于呼吸
- C. 使腹肌松弛, 减轻腹胀
- D. 有利于引流
- E. 促使肠蠕动, 防止肠粘连

15. 模拟题 患者, 男, 72岁。长期卧床, 为预防下肢静脉血栓形成, 主要的措施是()

- A. 多饮水
- B. 被动肢体运动
- C. 高纤维素饮食
- D. 绝对卧床休息
- E. 关节活动

16. 真题 2014-Z057 患者, 女, 45岁。急性腹膜炎入院已休克, 具体的卧姿是头、躯干(上身)和下肢分别抬高()

- A. 上身 5° ~ 10° 、下肢 10° ~ 20°
- B. 上身 5° ~ 10° 、下肢 20° ~ 30°
- C. 上身 10° ~ 20° 、下肢 20° ~ 30°
- D. 上身 20° ~ 30° 、下肢 15° ~ 20°
- E. 上身 20° ~ 25° 、下肢 20° ~ 25°

17. 模拟题 一种宁静、安详、无焦虑及无拘无束状态的描述是指()

- A. 休息
- B. 舒适
- C. 睡眠
- D. 活动
- E. 放松

18. 模拟题 昏迷患者采用去枕仰卧位的目的是()

- A. 防止压疮
- B. 防止颅内压降低引起的头痛

- C. 使患者保持舒适
- D. 防止呕吐物流入气管引起窒息
- E. 腹肌放松, 利于检查

19. 模拟题 护理意识障碍患者时, 正确的护理措施是 ()

- A. 采用约束带防止坠床
- B. 伴有抽搐表现时, 应大声与其交谈, 以稳定情绪
- C. 牙关紧闭时, 用压舌板放于上下门齿间, 以防舌咬伤
- D. 眼睑不能闭合时, 眼部可用盐水纱布覆盖, 以保护角膜
- E. 对肢体采取被动运动, 促进血液循环, 预防静脉血栓

20. 模拟题 室温过高时人体会 ()

- A. 加快机体散热
- B. 神经系统受到抑制
- C. 肌肉紧张, 产生不安
- D. 促进体力恢复
- E. 尿量增加

21. 模拟题 湿度过高时人体会 ()

- A. 尿液排出量增加
- B. 口干舌燥、咽痛
- C. 肌肉紧张
- D. 精神系统受到抑制
- E. 出汗增多

22. 模拟题 保护骨隆突出处, 预防压疮不宜使用 ()

- A. 海绵垫
- B. 气垫
- C. 软枕
- D. 水褥
- E. 橡胶气圈

23. 模拟题 用约束带时应重点观察 ()

- A. 体位是否舒适
- B. 局部皮肤颜色及温度
- C. 约束带是否结实
- D. 神志是否清楚
- E. 衬垫是否垫好

24. 模拟题 患者, 男, 34岁。现经口气管插管, 口腔 pH 值中性, 护士选用 0.02% 的呋喃西林溶液为患者进行口腔护理, 其作用是 ()

- A. 遇有机物放出氧分子杀菌
- B. 改变细菌生长的酸碱环境
- C. 清洁口腔, 广谱抗菌
- D. 防腐生新, 促进愈合
- E. 使蛋白质凝固变性

25. 模拟题 患者, 男。患有胃溃疡出血, 经治疗后出血停止, 病情缓解, 大便隐血试验阴性。患者呕血时应采取的体位是 ()

- A. 平卧位, 头偏向一侧
- B. 截石位
- C. 头低足高位
- D. 头高足低位
- E. 半坐位

26. 模拟题 患者, 女, 58岁。因慢性胆囊炎急性发作入院治疗, 给予抗感染、补液、对症治疗, 日输液量 1000ml。今晨输液过程中, 突然出现胸闷、胸骨后疼痛, 继之呼吸困难、严重发绀, 主诉有濒死感觉, 听诊心前区可闻及一个响亮、持续的“水泡声”。此时患者应采取的体位是 ()

- A. 端坐位, 双腿下垂
- B. 左侧头低足高卧位
- C. 左侧头高足低卧位
- D. 右侧头低足高卧位
- E. 右侧头高足低卧位

27. 模拟题 会阴冲洗患者应取的卧位是 ()

- A. 端坐位
- B. 截石位
- C. 侧卧位
- D. 仰卧屈膝位
- E. 去枕平卧位

28. 模拟题 全麻手术后患者应取的卧位是 ()

- A. 端坐位
- B. 截石位
- C. 侧卧位
- D. 仰卧屈膝位
- E. 去枕平卧位

29. 模拟题 下列哪项描述的是一种宁静、安详、无焦虑及无拘无束的状态 ()

- A. 舒适
- B. 休息
- C. 睡眠
- D. 活动
- E. 放松

30. 模拟题 给一位左上肢骨折患者床上擦浴时方法正确的是 ()

- A. 由外眦向内眦擦拭眼部
- B. 擦洗后酌情在骨骼隆突部位用 50% 乙醇按摩
- C. 穿上衣时先穿右肢
- D. 脱上衣时先脱左肢
- E. 擦洗动作要轻慢

31. 模拟题 入睡最浅、最容易唤醒的睡眠时间是 ()

- A. 慢波睡眠的第 I 时相
- B. 慢波睡眠的第 II 时相
- C. 慢波睡眠的第 III 时相
- D. 慢波睡眠的第 IV 时相
- E. 快波睡眠

32. 模拟题 患者，男。生诉右上腹疼痛来院，医生查体不配合，患者疼痛严重，辗转反侧，坐卧不宁，该患者的体位属于()

- A. 主动体位
- B. 被动体位
- C. 被迫体位
- D. 俯卧体位
- E. 仰体位

33. 模拟题 患者，女，60岁。肝硬化10年，伴大量腹腔积液，现昏迷，急诊平车入院。该患者应安置的体位是()

- A. 中凹卧位，头偏向一侧
- B. 半卧位，头下加枕
- C. 俯卧位，膝下垫枕
- D. 左侧卧位，头下加枕
- E. 仰卧位，头偏向一侧

34. 模拟题 患者，男。外伤昏迷，急诊入院，患者体位呈不舒适状态，该患者所处的体位是()

- A. 自主体位
- B. 被动体位
- C. 强迫体位
- D. 头低脚高位
- E. 头高脚低位

35. 模拟题 李女士，59岁。卧床3周，近日骶尾部皮肤破溃，护士仔细观察后认为是压疮溃疡期。对李女士局部压疮的处理方法不妥的是()

- A. 用高压氧治疗
- B. 大水疱剪去表皮，涂消毒溶液
- C. 清除坏死组织，生理盐水冲洗
- D. 伤口湿敷
- E. 局部按外科换药处理

36. 模拟题 李女士，59岁。卧床3周，近日骶尾部皮肤破溃，护士仔细观察后认为是压疮溃疡期。李女士发生压疮最主要的原因是()

- A. 局部组织受压过久
- B. 病原菌侵入皮肤组织
- C. 皮肤受潮湿摩擦刺激
- D. 机体营养不良
- E. 皮肤破损

37. 模拟题 可增加肌肉的张力而不改变肌肉的长度的运动是()

- A. 被动运动
- B. 协助主动运动
- C. 主动运动
- D. 阻力运动
- E. 等长运动

38. 真题 2018-S037 乙状结肠镜检查和治疗时采取()

- A. 截石位
- B. 膝胸卧位

- C. 屈膝仰卧位
- D. 头高脚低位
- E. 头低脚高位

39. 模拟题 用外力阻碍患者主动运动，以锻炼其肌肉最大能力的运动是()

- A. 被动运动
- B. 协助主动运动
- C. 主动运动
- D. 阻力运动
- E. 等长运动

40. 真题 2018-S038 膀胱镜检查时采取()

- A. 截石位
- B. 膝胸卧位
- C. 屈膝仰卧位
- D. 头高脚低位
- E. 头低脚高位

41. 模拟题 当患者无自主活动能力，关节运动时应采取()

- A. 被动运动
- B. 协助主动运动
- C. 主动运动
- D. 阻力运动
- E. 等长运动

42. 真题 2018-S039 影响舒适的心理方面因素是()

- A. 角色行为冲突
- B. 面对各种压力
- C. 陌生病房环境
- D. 严重噪音干扰
- E. 身体活动受限

43. 模拟题 肺段切除手术后患者的正确卧位是()

- A. 平卧位
- B. 头低足高仰卧位
- C. 健侧卧位
- D. 1/4侧卧位
- E. 患侧卧位

44. 真题 2018-S040 影响舒适的社会方面因素是()

- A. 角色行为冲突
- B. 面对各种压力
- C. 陌生病房环境
- D. 严重噪音干扰
- E. 身体活动受限

45. 模拟题 患者，男，49岁。因突发左侧肢体活动不利伴恶心、呕吐及头痛来诊，以“脑栓塞”收入院。今晨护士进行肌力评估时其左侧肢体可轻微收缩，但不能产生动作。按6级肌力记录法，该患者的肌力为()

- A. 0级
- B. 1级

- C. 2级
- D. 4级
- E. 5级

46. 模拟题 大量腹腔积液的患者采取()

- A. 仰卧位
- B. 侧卧位
- C. 坐位
- D. 半坐卧位
- E. 头高足低位

47. 模拟题 预防褥疮时,为缓解对局部的压迫不宜使用()

- A. 海绵垫
- B. 气垫褥
- C. 橡皮气圈
- D. 水褥
- E. 海绵褥

48. 模拟题 阿米巴痢疾患者行保留灌肠时应采用的卧位是()

- A. 右侧卧位
- B. 左侧卧位
- C. 俯卧位
- D. 仰卧位
- E. 膝胸卧位

49. 真题 2017-S044 属于危险性最大的睡眠失调是()

- A. 睡眠性呼吸暂停
- B. 发作性睡眠
- C. 睡眠过度
- D. 梦游
- E. 遗尿

50. 模拟题 病区值班护士接到住院处通知收一位危重患者入院时,其床单位的准备是()

- A. 在普通病房准备备用床
- B. 在普通病房将备用床改为暂空床.
- C. 在急救室准备备用床
- D. 在急救室将备用床改为暂空床
- E. 在隔离室将备用床改为暂空床

51. 模拟题 协助患者移向床头时,两位护士站在床的两侧,抬起患者的手法应该是()

- A. 并列托住患者的颈肩和大腿
- B. 并列托住患者的背部和大腿
- C. 交叉托住患者的颈肩和臀部
- D. 并列托住患者的腰部和膝部
- E. 交叉托住患者的腰部和臀部

52. 模拟题 患者,男,30岁。车祸入院后发生休克,急诊入院后予中凹卧位,护士需将其头、躯干(上身)和下肢分别抬高()

- A. 上身 $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$ 、下肢 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$
- B. 上身 $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$ 、下肢 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$

- C. 上身 $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$ 、下肢 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- D. 上身 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$ 、下肢 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$
- E. 上身 $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$ 、下肢 $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$

53. 模拟题 孕妇,28岁。妊娠20周,采用膝胸卧位纠正胎位不正,不正确的是()

- A. 双膝稍分开(与肩同宽)
- B. 大腿与床面呈 45°
- C. 胸贴床面,臀部抬起
- D. 头偏向一侧
- E. 每天做2-3次,每次5-10分钟

54. 真题 2016-S078 患者男,70岁。因患有吉兰巴雷综合征引起呼吸肌麻痹行气管切开。病室内噪音的控制应低于()

- A. 120分贝
- B. 90分贝
- C. 65分贝
- D. 50分贝
- E. 45分贝

55. 真题 2013-S011 引起患者不舒适的最高表现形式是()

- A. 烦躁不安
- B. 睡眠不佳
- C. 萎靡不振
- D. 疼痛
- E. 疲乏

56. 真题 2013-S026 关于ROM练习的叙述,正确的是()

- A. 尽早、频繁地进行ROM练习
- B. 每天坚持练习5-10次
- C. 患者疼痛时加快操作速度
- D. 每个关节每次做20-30下
- E. 活动时比较两侧关节活动情况

57. 真题 2013-S072 患者,男,70岁。因经常夜间睡眠时离床到院子里活动,醒后对所发生的事情不能回忆,诊断为梦游症。该患者夜晚出来活动可能发生于()

- A. NREM第I时相
- B. NREM第II时相
- C. NREM第III时相
- D. NREM第IV时相
- E. 异相睡眠

58. 真题 2013-S073 患者,男,70岁。因经常夜间睡眠时离床到院子里活动,醒后对所发生的事情不能回忆,诊断为梦游症。该患者梦游所处睡眠分期的特点是()

- A. 睡眠最浅
- B. 易被唤醒
- C. 难以唤醒
- D. 很难唤醒
- E. 极难唤醒

59. 真题 2013-S077 患者,男,60岁。心绞痛史5年,

未规律用药。2小时前劳累时出现心前区压榨性疼痛，伴濒死感，舌下含化硝酸甘油，疼痛未缓解，诊断为急性心肌梗死。给予吸氧，重症监护，绝对卧床休息等措施，3小时后病情稳定。此时首要的护理诊断是()

- A. 疼痛
- B. 恐惧
- C. 知识缺乏
- D. 自理缺陷
- E. 活动无耐力

60. 真题 2013-S083 患者，男，28岁。暴饮暴食后出现上腹正中刀割样剧痛，不能忍受，并伴有恶心、呕吐，急送至医院，诊断为急性胰腺炎。给予禁食、胃肠减压，肠外营养支持治疗。2周后病情稳定，改为要素饮食，鼻饲提供营养。根据世界卫生组织(WHO)对疼痛程度的分级，该患者发病时的疼痛属于()

- A. 0级
- B. 1级
- C. 2级
- D. 3级
- E. 4级

61. 真题 2013-Z067 肺炎患儿宜采取的体位是()

- A. 平卧位
- B. 去枕仰卧位
- C. 头部抬高20-30cm，下肢抬高10-20cm
- D. 半卧位
- E. 左侧卧位

62. 真题 2013-S088 面及颈部手术后患者可取的卧位是()

- A. 中凹卧位
- B. 半坐卧位
- C. 端坐位
- D. 头低脚高位
- E. 头高脚低位

63. 真题 2013-S089 十二指肠引流时患者可取的卧位是()

- A. 中凹卧位
- B. 半坐卧位
- C. 端坐位
- D. 头低脚高位
- E. 头高脚低位

64. 真题 2011-Z054 患者，女，45岁。急性腹膜炎入院已休克，具体的卧姿是头、躯干(上身)和下肢分别抬高()

- A. 上身 5° - 10° 下肢 10° - 20°
- B. 上身 5° - 10° 、下肢 20° - 30°
- C. 上身 10° - 20° 、下肢 20° - 30°
- D. 上身 20° - 30° 、下肢 15° - 20°
- E. 上身 20° - 25° 、下肢 20° - 25°

65. 真题 2017-S060 需要考虑舒适和安全两个主要因

素的环境是()

- A. 人文环境
- B. 社会环境
- C. 外环境
- D. 治疗性环境
- E. 医院物理环境

66. 真题 2011-Z045 躯体性疼痛的特点是()

- A. 痛觉迟钝，痛感弥散
- B. 定位正确，感觉敏锐
- C. 过程缓慢而持久
- D. 伴有焦虑不安
- E. 对张力、压力性刺激敏感

67. 真题 2011-S083 患者，男，28岁。暴饮暴食后出现上腹正中刀割样剧痛，不能忍受，并伴有恶心、呕吐。急送至医院，诊断为急性胰腺炎，医嘱禁食、胃肠减压，肠外营养支持。2周后病情稳定，改为要素饮食，鼻饲提供营养。根据世界卫生组织(WHO)对疼痛程度的分级。该患者的疼痛属于()

- A. 0级
- B. 1级
- C. 2级
- D. 3级
- E. 4级

68. 真题 2010-S052 患者，男，72岁。1周前早晨起床发现半身肢体瘫痪，现病情稳定准备进行康复功能训练，训练前对患者进行患肢肌力程度检测为1级，该肌力程度的表现是()

- A. 完全瘫痪，肌力完全丧失
- B. 可见肌肉轻微收缩，但无肢体运动
- C. 肢体可移动位置，但不能抬起
- D. 肢体能抬离床面，但不能对抗阻力
- E. 肢体能做对抗阻力运动，但肌力减弱

69. 真题 2010-S072 患者，男，64岁。突然出现胸骨后压迫性疼痛并放射到左肩和左侧小指，不能忍受，面色苍白、出冷汗、心率快，心电图可见ST段压低、T波倒置，使用消心痛5分钟后疼痛缓解。引起患者疼痛的原因是()

- A. 温度刺激
- B. 物理损伤
- C. 化学损伤
- D. 病理改变
- E. 心理因素

70. 真题 2010-S073 患者，男，64岁。突然出现胸骨后压迫性疼痛并放射到左肩和左侧小指，不能忍受，面色苍白、出冷汗、心率快，心电图可见ST段压低、T波倒置，使用消心痛5分钟后疼痛缓解。患者的疼痛属于世界卫生组织(WHO)对疼痛程度分级的()

- A. 0级
- B. 1级
- C. 2级

- D. 3 级
- E. 4 级

71. 真题 2011-S013 通过分散患者注意力的方法达到消除紧张情绪,减轻疼痛,缓解和促进睡眠的目的,称为()

- A. 心理治疗
- B. 无痛治疗
- C. 运动治疗
- D. 松弛术
- E. 控制术

72. 真题 2011-S021 引起患者不舒适的最高表现形式是()

- A. 烦躁不安
- B. 睡眠不佳
- C. 萎靡不振
- D. 疼痛
- E. 疲乏

73. 真题 2011-S027 关于关节活动范围练习(ROM练习)的描述,正确的是()

- A. 尽早、频繁 ROM 练习
- B. 每天坚持练习 3-10 次
- C. 患者疼痛时加快操作速度
- D. 每个关节每次做 20-30 次
- E. 活动时观察两侧关节活动情况

74. 真题 2011-S071 患者,女,28 岁。左下肢膝关节因车祸进行手术治疗,术后 3 个月其左下肢的关节活动需要他人的帮助,也需要用器械进行。此时左下肢的关节活动能力是()

- A. 0 度
- B. 1 度
- C. 2 度
- D. 3 度
- E. 4 度

75. 真题 2011-S079 患者,男,30 岁。急性阑尾炎合并穿孔,在硬膜外麻醉下行阑尾切除术,术后手术室护士送患者回病室。次日患者体温 39℃,主诉切口疼痛难忍,患者应取的体位是()

- A. 仰卧屈膝位
- B. 右侧卧位
- C. 端坐卧位
- D. 半坐卧位
- E. 头高脚低位

76. 真题 2011-S080 患者,男,30 岁。急性阑尾炎合并穿孔,在硬膜外麻醉下行阑尾切除术,术后手术室护士送患者回病室。向患者解释取此种体位的理由是()

- A. 可减少局部出血,有利于伤口愈合
- B. 可防止炎症扩散和毒素吸收,可减轻疼痛
- C. 可减少回心血量,促进局部血液循环
- D. 减轻肺部淤血,减少并发症

E. 减轻腹部切口缝合处的张力,减轻疼痛

77. 真题 2013-S092 为阿米巴痢疾患者进行保留灌肠时患者的体位是()

- A. 左侧卧位
- B. 右侧卧位
- C. 半坐位
- D. 头低足高位
- E. 膝胸卧位

78. 真题 2013-S093 为慢性细菌性痢疾患者行保留灌肠时患者的体位是()

- A. 左侧卧位
- B. 右侧卧位
- C. 半坐位
- D. 头低足高位
- E. 膝胸卧位

79. 真题 2013-Z027 某下肢瘫痪患者,经查肢体可在床面移动,但不能自行抬起,此肌力应判为()

- A. 0 级
- B. 1 级
- C. 2 级
- D. 3 级
- E. 4 级

80. 真题 2015-S061 患者,男,42 岁。近 2 个月持续入睡困难,夜间多梦、易醒,醒后仍觉疲倦,急躁易怒。正确的做法是()

- A. 饮酒以促进睡眠
- B. 睡前大量剧烈活动
- C. 尽早休息,迫使自己入睡
- D. 夜间睡眠不够,白天补觉
- E. 进行短时间阅读或听柔和音乐放松

81. 真题 2015-Z053 患者,男,27 岁。近两年来经常出现低热,近来感气促,间断咳脓痰。胸部 X 片示纵隔移向右侧,行脓腔造影,咳出蓝色痰液。为改善呼吸功能应建议此患者采取()

- A. 左侧卧位
- B. 平卧位
- C. 右侧卧位
- D. 半坐卧位
- E. 头低足高位

82. 真题 2017-S076 患者男,56 岁。胃癌术后三个月。患者出现背部疼痛。活动时加重,不能忍受,要求用镇痛剂。该患者疼痛级别属于()

- A. 0 级
- B. 1 级
- C. 2 级
- D. 3 级
- E. 4 级

83. 真题 2016-S006 医院内工作人员做到“四轻”，是为了给病人()

- A. 创造良好的社会环境
- B. 创造安静的环境
- C. 建立良好的护患关系
- D. 创造安全的环境
- E. 树立良好的职业形象

84. 真题 2017-S077 患者男，56岁。胃癌术后三个月。患者出现背部疼痛。活动时加重，不能忍受，要求用镇痛剂。该患者护理措施错误的是()

- A. 松弛术
- B. 心理护理
- C. 针灸治疗
- D. 适度活动
- E. 给予麻醉性止痛药物

85. 真题 2016-S045 肌肉等长练习的正确描述是()

- A. 因肌肉长度改变而肢体运动
- B. 伴有明显的关节运动
- C. 增加肌肉的张力而不改变肌肉的长度
- D. 增加肌肉的张力且改变肌肉的长度
- E. 等长运动又称动力运动

86. 真题 2016-S054 患者女，35岁。因车祸丈夫突然去世后患者出现一过性活动受限，生活不能自理等。其主要原因是()

- A. 神经系统功能受损
- B. 心理因素
- C. 全身乏力
- D. 生理因素
- E. 严重疾病

87. 真题 2016-S059 患者男，72岁。1周前早晨起床发现半身肢体瘫痪，现病情稳定准备进行康复功能训练。训练前对患者进行患肢肌力程度监测为1级，该肌力程度的表现是()

- A. 完全瘫痪，肌力完全丧失
- B. 可见肌肉轻微收缩，但无肢体运动
- C. 肢体可移动位置，但不能抬起
- D. 肢体能抬离床面，但不能对抗阻力
- E. 肢体能作对抗阻力运动，但肌力减弱

88. 真题 2016-S062 患者女，61岁。因头昏摔倒致腰椎L₂右侧横突骨折而急诊入院，经积极治疗，现病情已稳定。护士协助患者改变体位的方法正确的是()

- A. 一人协助患者取半坐卧位法
- B. 两人协助患者取半坐卧位法
- C. 一人协助患者取端坐位法
- D. 一人协助患者轴线翻身法
- E. 两人协助患者轴线翻身法

89. 真题 2016-S066 患者男，57岁。因心肌梗死入院。主管护士评估后确定其有以下健康问题。应优先解决的问题是()

- A. 舒适改变：心前区疼痛
- B. 营养失调：低于机体需要量
- C. 活动无耐力
- D. 气体交换受损
- E. 知识缺乏

90. 真题 2016-S076 患者男，70岁。因患有吉兰巴雷综合征引起呼吸肌麻痹行气管切开。在护理该患者时，病室温度应保持在()

- A. 12℃-14℃
- B. 15℃-17℃
- C. 18℃-20℃
- D. 22℃-24℃
- E. 25℃-27℃

91. 真题 2015-S055 患者，女，32岁。过马路时不慎被汽车撞成右下肢开放性骨折，因失血过多发生休克。入院后应采取的体位是()

- A. 头高足低位
- B. 头低足高位
- C. 中凹卧位
- D. 去枕仰卧位
- E. 俯卧位

92. 真题 2015-S035 关于舒适和不舒适的叙述，不正确的是()

- A. 舒适是自我满足的主观感受
- B. 最高水平的舒适是一种健康状态
- C. 影响舒适的因素包括身体、心理和社会三方面
- D. 疼痛会给患者带来严重的不舒适
- E. 舒适和不舒适没有严格的分界线

93. 真题 2015-S013 患者自己无能力变换体位，卧于他人安置的体位是()

- A. 主动卧位
- B. 被动卧位
- C. 被迫卧位
- D. 稳定卧位
- E. 自动卧位

94. 真题 2014-S026 影响舒适的身体方面的因素不包括()

- A. 焦虑
- B. 体位不当
- C. 活动受限
- D. 身体不洁
- E. 机体不适

95. 真题 2014-S027 患者的疼痛可能会导致多方面的反应，下列不是由疼痛所引起的反应是()

- A. 皱眉、哭泣、呻吟、尖叫
- B. 退缩、抑郁、愤怒、依赖
- C. 胃肠道紊乱、骨骼肌紧张、内分泌改变
- D. 血压升高、心率加快、手掌出汗、面色苍白
- E. 血钙升高、血糖升高、血钠降低、血氯降低

96. 真题 2014-S030 进行胰胆管造影时应采取的体位是()

- A. 俯卧位
- B. 头低脚高位
- C. 头高脚低位
- D. 侧卧位
- E. 仰卧屈膝位

97. 真题 2014-S031 下列不是舒适的正常表现的一项是()

- A. 没有疼痛
- B. 没有焦虑
- C. 没有忧愁
- D. 轻松自在
- E. 十分欣快

98. 真题 2014-S078 张女士, 60 岁。左脚拇趾外翻矫正术后半年。体检: 拇趾关节强直, 不能背跖屈, 跛行。造成患者运动障碍的主要原因是()

- A. 疼痛
- B. 心理因素
- C. 关节骨骼损伤
- D. 治疗措施不当
- E. 运动神经功能受损

99. 真题 2014-S079 张女士, 60 岁。左脚拇外翻矫正术后半年。体检: 拇趾关节强直, 不能背跖屈, 跛行。对患者脚趾关节首先进行的运动形式是()

- A. 被动运动
- B. 主动运动
- C. 阻力运动
- D. 弹性运动
- E. 协助性主动运动

100. 真题 2014-S096 遗尿常发生于睡眠周期的()

- A. 正相睡眠第 I 期
- B. 正相睡眠第 II 期
- C. 正相睡眠第 III、IV 期
- D. 正相睡眠第 IV 期
- E. 异相睡眠期

101. 真题 2014-S097 有利于个体精力恢复的睡眠周期是()

- A. 正相睡眠第 I 期
- B. 正相睡眠第 II 期
- C. 正相睡眠第 III、IV 期
- D. 正相睡眠第 IV 期
- E. 异相睡眠期

102. 真题 2015-S003 患者疼痛时的行为反应是()

- A. 面色苍白或潮红
- B. 呼吸频率增加
- C. 手心出汗
- D. 胃肠功能紊乱

E. 皱眉、咬嘴唇

103. 真题 2015-S076 患者, 男, 64 岁。突然出现胸骨后压榨性疼痛并放射到左肩和左侧小指, 不能忍受, 面色苍白、出冷汗、心率快, 心电图可见 ST 段压低、T 波倒置, 使用消心痛 5 分钟后疼痛缓解。患者的疼痛属于世界卫生组织 (WHO) 对疼痛程度分级的()

- A. 0 级
- B. 1 级
- C. 2 级
- D. 3 级
- E. 4 级

104. 真题 2016-S077 患者男, 70 岁。因患有吉兰巴雷综合征引起呼吸肌麻痹行气管切开。病室湿度应保持在()

- A. 10%-20%
- B. 25%-30%
- C. 35%-40%
- D. 50%-60%
- E. 65%-70%

105. 模拟题 患者, 男, 56 岁。对患者进行肌力检查时, 四肢体自主抬离床面, 但医生用手轻压即落, 该患者肌力属于()

- A. 1 级
- B. 2 级
- C. 3 级
- D. 4 级
- E. 5 级

106. 真题 2019-S007 腹腔有炎症的患者采取的体位是()

- A. 端坐位
- B. 俯卧位
- C. 侧卧位
- D. 中凹卧位
- E. 半坐卧位

107. 真题 2019-S008 昏迷患者的体位是()

- A. 强迫体位
- B. 自主体位
- C. 被动体位
- D. 被迫体位
- E. 自由体位

108. 真题 2019-S010 对疼痛病人通过分散注意力达到解除疼痛和焦虑, 增加病人自我控制的能力, 其止痛方法属于()

- A. 松弛术
- B. 催眠术
- C. 按摩术
- D. 体位疗法
- E. 心理咨询

109. 真题 2019-S013 自我满足的主观感觉是()

- A. 休息
- B. 安详
- C. 睡眠
- D. 放松
- E. 舒适

110. 真题 2019-S017 关于 ROM 练习的叙述, 正确的是()

- A. 尽早, 频繁地进行 ROM 练习
- B. 每天坚持练习 5~10 次
- C. 患者疼痛时加快操作速度
- D. 每个关节每次做 20~30 下
- E. 活动时比较两侧关节活动情况

111. 真题 2019-S031 患者, 男, 50 岁。有吸烟史, 咳嗽 2 个月, 咯血或痰中带血 2 周。X 线胸片: 左肺上叶有 1.5cm×2.0cm 病灶。患者入院后入睡困难, 易醒。引起该患者睡眠不佳的主要原因是()

- A. 环境改变
- B. 焦虑情绪
- C. 内分泌变化
- D. 睡眠周期节律破坏
- E. 病房不能吸烟

112. 真题 2019-S052 对 3 岁以上的儿童评估疼痛的程度时, 选择的最佳工具是()

- A. 数学式评估工具
- B. 描述式疼痛评估工具
- C. 面部表情疼痛测量图
- D. 道坎阈式评估工具
- E. 文字式评估工具

十. 营养与饮食

1. 模拟题 不适用鼻饲法的患者是()

- A. 昏迷患者
- B. 早产儿
- C. 口腔术后患者
- D. 病情危重者
- E. 食管静脉曲张患者

2. 模拟题 下列不是必需氨基酸的是()

- A. 亮氨酸
- B. 色氨酸
- C. 赖氨酸
- D. 缬氨酸
- E. 门冬氨酸

3. 模拟题 持续胃肠减压时间较长时, 应加强的护理项目是()

- A. 口腔卫生
- B. 预防压疮发生
- C. 需要服药时, 由减压管注入

D. 记录吸出液的量和质

E. 及时更换收集瓶

4. 模拟题 鼻饲时插入胃管的长度相当于患者的()

- A. 眉心至胸骨柄的长度
- B. 发际至胸骨柄的长度
- C. 发际至剑突的长度
- D. 眉心至剑突的长度
- E. 鼻尖至剑突的长度

5. 模拟题 使用普通胃管长期鼻饲者, 定期更换胃管的时间是()

- A. 1 天
- B. 3 天
- C. 7 天
- D. 10 天
- E. 14 天

6. 模拟题 患者, 男, 68 岁。脑出血昏迷 6 个月。提供鼻饲营养时, 护理操作不妥的是()

- A. 两次鼻饲间隔时间应在 2 小时以上
- B. 鼻饲饮食易滋生细菌, 应注意保鲜
- C. 注入流食或药物前要确认胃管在胃内
- D. 鼻饲饮食需加温至 38~40℃ 方可使用
- E. 胃管每日更换, 晚上拔出, 次晨由另一鼻孔插入

7. 模拟题 患者, 女, 40 岁。诊断为伤寒, 住院 2 周。患者口唇干裂, 口温 40℃, 脉搏 120 次/分。患者体温降至正常后, 宜给予()

- A. 低糖饮食
- B. 少渣饮食
- C. 高膳食纤维饮食
- D. 高蛋白饮食
- E. 要素饮食

8. 模拟题 甲状腺功能检查要求禁食海带、紫菜等含碘高的食物的试验周期是()

- A. 1 天
- B. 3 天
- C. 7 天
- D. 1 个月
- E. 14 天

9. 真题 2016-S070 患者男, 59 岁。心肌梗死, 经抢救病情稳定, 平时饮食精细, 时常便秘, 为其讲解预防便秘的知识, 该患者复述的内容应予纠正的是()

- A. 每日定时排便一次
- B. 适当翻身或下床活动
- C. 多食蔬菜, 水果和粗粮
- D. 摄入足够的水分
- E. 每晚睡前使用开塞露

10. 真题 2016-S068 患者男, 36 岁。右上腹腹痛, 腹胀, 嗝气, 准备做胆囊造影, 检查前 1 天午餐应进食()

- A. 低蛋白饮食

- B. 无脂肪饮食
- C. 高蛋白饮食
- D. 高脂肪饮食
- E. 低脂肪饮食

11. 真题 2016-S067 患者女, 24 岁。长期口角糜烂, 最可能缺乏的营养素是()

- A. 维生素 B1
- B. 维生素 B2
- C. 维生素 B6
- D. 维生素 B12
- E. 维生素 PP

12. 真题 2016-S033 能降低毛细血管和细胞膜通透性的物质是()

- A. 铁
- B. 钙
- C. 磷
- D. 硫
- E. 锌

13. 真题 2016-S030 为昏迷病人插胃管, 为了提高成功率, 当胃管插至 15cm 时将病人头部托起, 使下颌靠近胸骨柄, 其目的是增大()

- A. 食管通过膈肌弧度
- B. 环状软骨水平弧度
- C. 平气管交叉处弧度
- D. 贲门口水平处弧度
- E. 咽喉部通道的弧度

14. 真题 2016-S014 不符合要素饮食的特点是()

- A. 含有人体所必需的各种营养素
- B. 无需消化也能被吸收
- C. 有利于纠正负氮平衡
- D. 适用于肠胃道瘘、严重烧伤病人
- E. 含一定纤维素, 可促进肠蠕动

15. 真题 2016-S013 给患者实施青霉素皮试前, 最重要的准备工作是()

- A. 环境要清洁、宽敞
- B. 准备好注射用物
- C. 抽药剂量要准确
- D. 选择注射部位要合适
- E. 询问病人有无过敏史

16. 真题 2016-S012 构成甲状腺素的主要成分是()

- A. 磷
- B. 碘
- C. 锌
- D. 铁
- E. 钙

17. 模拟题 患者, 男。患有胃溃疡出血, 经治疗后出血停止, 病情缓解, 大便隐血试验阴性。患者出血期间大便颜色是()

- A. 果酱色
- B. 暗红色
- C. 鲜红色
- D. 黄褐色
- E. 柏油色

18. 模拟题 患者, 男。患有胃溃疡出血, 经治疗后出血停止, 病情缓解, 大便隐血试验阴性。大便隐血试验前 3 天嘱患者禁食()

- A. 大白菜
- B. 土豆
- C. 菠菜和动物血
- D. 菜花
- E. 豆腐

19. 模拟题 高热患者宜给予()

- A. 半流质饮食
- B. 软质饮食
- C. 低蛋白饮食
- D. 普食饮食
- E. 流质饮食

20. 模拟题 患者, 男, 38 岁。患肝硬化门静脉高压征, 行门-腔静脉分流术后 3 天, 一般情况良好, 肛门已排气, 大便未解。对其饮食护理正确的是()

- A. 低脂、高蛋白、高热量普食
- B. 高脂、高蛋白、高热量普食
- C. 高脂、低蛋白、高热量流质饮食
- D. 低脂、低蛋白、高热量流质饮食
- E. 低脂、高蛋白、高热量流质饮食

21. 真题 2017-S021 患者女, 40 岁。诊断为伤寒, 已住院 2 周。病情处于恢复期, 应给予的饮食是()

- A. 低脂饮食
- B. 少渣饮食
- C. 高膳食纤维饮食
- D. 低蛋白饮食
- E. 要素饮食

22. 模拟题 患者, 女。高血压病经住院治疗血压已控制, 健康宣教时护士应指导患者饮食, 下列不正确的是()

- A. 低盐、低脂、低胆固醇
- B. 适量蛋白质
- C. 多吃新鲜蔬菜、水果
- D. 低盐、高钾、高蛋白
- E. 高盐、低脂、低胆固醇

23. 模拟题 患者, 女, 60 岁。拟择期行食管癌切除术。现患者能进食粥之类的食物, 护士建议的饮食为()

- A. 高热量、低蛋白、低脂肪流食
- B. 高热量、低蛋白、低脂肪半流食
- C. 高热量、高蛋白、高维生素半流食
- D. 高热量、低蛋白、高维生素半流食
- E. 高热量、高蛋白、高脂肪普食

24. 模拟题 甲亢患者宜进饮食为()

- A. 普通饮食
- B. 低脂肪
- C. 低胆固醇
- D. 高蛋白
- E. 高热量

25. 模拟题 低盐饮食, 限制成人食盐量为()

- A. $<2\text{g/d}$
- B. $\leq 2\text{g/d}$
- C. $\geq 2\text{g/d}$
- D. $<0.8\text{g/d}$
- E. $>0.8\text{g/d}$

26. 模拟题 患者, 男, 62岁。胃大部切除术后行空肠造瘘。该患者饮食应采取()

- A. 低脂肪饮食
- B. 半流质饮食
- C. 流质饮食
- D. 少渣饮食
- E. 要素饮食

27. 模拟题 液化饮食是()

- A. 有渣自然饮食制成的匀浆
- B. 无渣自然饮食制成的匀浆
- C. 无渣饮食可全部被吸收
- D. 全部肠道外给入
- E. 仅适用于既无消化又无吸收功能的患者

28. 模拟题 要素饮食是()

- A. 有渣自然饮食制成的匀浆
- B. 无渣自然饮食制成的匀浆
- C. 无渣饮食可全部被吸收
- D. 全部肠道外给入
- E. 仅适用于既无消化又无吸收功能的患者

29. 真题 2015-S097 调节心脏和神经传导及肌肉收缩的物质是()

- A. 钙
- B. 磷
- C. 碘
- D. 锌
- E. 铁

30. 真题 2015-S096 参与合成血红蛋白, 肌红蛋白与细胞色素 A 的物质是()

- A. 钙
- B. 磷
- C. 碘
- D. 锌
- E. 铁

31. 真题 2015-S067 患儿, 男, 7岁。近2个月来出现异食癖, 喜食煤渣, 患儿缺乏的营养素是()

- A. 钙
- B. 铁
- C. 镁
- D. 钾
- E. 锌

32. 真题 2011-S094 急性消化道疾病患者宜采用的饮食是()

- A. 普通饮食
- B. 软质饮食
- C. 流质饮食
- D. 半流质饮食
- E. 禁食

33. 真题 2011-S093 疾病恢复期患者宜采用的饮食是()

- A. 普通饮食
- B. 软质饮食
- C. 流质饮食
- D. 半流质饮食
- E. 禁食

34. 真题 2011-S082 患者, 男, 28岁。暴饮暴食后出现上腹正中刀割样剧痛, 不能忍受, 并伴有恶心、呕吐。急送至医院, 诊断为急性胰腺炎, 医嘱: 禁食、胃肠减压, 肠外营养支持。2周后病情稳定, 改为要素饮食, 鼻饲提供营养。该患者要素饮食的特点不包括()

- A. 营养价值高
- B. 营养成分全面
- C. 含大量纤维素
- D. 不需经过消化
- E. 肠道直接吸收

35. 真题 2011-S081 患者, 男, 28岁。暴饮暴食后出现上腹正中刀割样剧痛, 不能忍受, 并伴有恶心、呕吐。急送至医院, 诊断为急性胰腺炎, 医嘱: 禁食、胃肠减压, 肠外营养支持。2周后病情稳定, 改为要素饮食, 鼻饲提供营养。给该患者要素饮食过程中做法正确的是()

- A. 从高浓度、大剂量开始
- B. 溶液温度应保持在 35°C
- C. 鼻饲过程出现恶心应立即停用
- D. 若停用应逐渐减量
- E. 长期使用时无需补充维生素

36. 真题 2018-S035 低蛋白饮食适用于()

- A. 伤寒患者
- B. 冠心病患者
- C. 脑出血患者
- D. 尿毒症患者
- E. 肺结核患者

37. 真题 2011-S034 属于脂溶性维生素的是()

- A. 维生素 K
- B. 维生素 C

- C. 维生素 B1
- D. 维生素 PP
- E. 维生素 B6

38. 真题 2018-S036 少渣饮食适用于()

- A. 伤寒患者
- B. 冠心病患者
- C. 脑出血患者
- D. 尿毒症患者
- E. 肺结核患者

39. 真题 2011-S023 为昏迷患者插胃管, 为了提高成功率, 当胃管插至 15cm 时将患者头部托起, 使下颌靠近胸骨柄。其目的是增大()

- A. 食管通过膈肌弧度
- B. 环状软骨水平弧度
- C. 平气管交界处弧度
- D. 贲门口水平处弧度
- E. 咽喉部通道的弧度

40. 真题 2011-S022 协助患者进餐时, 不妥的是()

- A. 将食物餐具放在方便取放的位置
- B. 鼓励卧床的患者自行进食
- C. 对视力障碍者事先告知食物的内容
- D. 喂食的量及速度适中, 温度适宜
- E. 要先喂液体食物, 后喂固体食物

41. 真题 2011-S019 长期行鼻饲饮食的患者应定期更换胃管, 硅胶胃管更换的时限是()

- A. 每天 1 次
- B. 每周 1 次
- C. 每月 1 次
- D. 每两个月 1 次
- E. 每半年 1 次

42. 真题 2010-S071 患者, 男, 64 岁。突然出现胸骨后压迫性疼痛并放射到左肩和左侧小指, 不能忍受, 面色苍白、出冷汗、心率快, 心电图可见 ST 段压低、T 波倒置, 使用消心痛 5 分钟后疼痛缓解。对患者进行健康指导, 错误的是()

- A. 宜摄入低脂肪低胆固醇食物
- B. 不宜饮浓茶, 避免刺激性食物
- C. 病情缓解期可适当参加活动
- D. 食物中宜高糖, 适量纤维素
- E. 宜平时携带保健盒以备急用

43. 真题 2010-S070 患者, 男, 40 岁。因车祸导致脑外伤, 出现昏迷, 为保证营养供给, 需要长期鼻饲, 取去枕平卧位, 准备接受插胃管。为其插胃管至 15cm 时, 应采取的护理措施是()

- A. 使患者头后仰便于胃管插入
- B. 让患者取右侧卧位使插管顺利
- C. 让患者头托起, 使下颌骨靠近胸骨柄
- D. 将病床床头摇起, 使患者呈半坐卧位
- E. 使患者头偏向护士一侧方便胃管插入

44. 真题 2016-X037 下列不属于营养疗法适应证的是()

- A. 近期体重下降超过正常体重的 10%
- B. 血清白蛋白 < 40g/L
- C. 连续 7 日以上不能正常进食者
- D. 已确诊为营养不良者
- E. 可能发生高分解代谢的应激状态病人

45. 真题 2018-S043 患者男, 18 岁。尿蛋白定性检查 +++, 尿蛋白定量 3.5g/24h, 镜下血尿, 眼睑及双下肢轻度水肿。以肾炎收治。护士应指导患者摄入()

- A. 低脂肪饮食
- B. 低热量饮食
- C. 低优质蛋白饮食
- D. 低胆固醇饮食
- E. 高磷饮食

46. 真题 2010-S069 患者, 男, 40 岁。因车祸导致脑外伤, 出现昏迷, 为保证营养供给, 需要长期鼻饲, 取去枕平卧位, 准备接受插胃管。胃管更换的时间是()

- A. 乳胶胃管每天更换 1 次, 硅胶胃管每周更换 1 次
- B. 乳胶胃管每周更换 1 次, 硅胶胃管每月更换 1 次
- C. 乳胶胃管每周更换 1 次, 硅胶胃管每月更换 2 次
- D. 乳胶胃管每周更换 2 次, 硅胶胃管每月更换 1 次
- E. 乳胶胃管每天更换 1 次, 硅胶胃管每月更换 2 次

47. 真题 2017-S089 调节心脏和神经传导及肌肉收缩的物质是()

- A. 钙
- B. 磷
- C. 碘
- D. 锌
- E. 铁

48. 真题 2018-S044 患者男, 18 岁。尿蛋白定性检查 +++, 尿蛋白定量 3.5g/24h, 镜下血尿, 眼睑及双下肢轻度水肿。以肾炎收治。为协助检查、测定肾小球滤过功能应摄入()

- A. 低盐饮食
- B. 肌酐试验饮食
- C. 普通饮食
- D. 高脂饮食
- E. 无盐低钠饮食

49. 真题 2010-S051 患者, 女, 24 岁。长期口角糜烂, 最可能缺乏的营养素是()

- A. 维生素 B1
- B. 维生素 B2
- C. 维生素 B6
- D. 维生素 B12
- E. 维生素 PP

50. 真题 2018-S045 患者男, 18 岁。尿蛋白定性检查

+++，尿蛋白定量 3.5g/24h，镜下血尿，眼睑及双下肢轻度水肿。以肾炎收治。为协助检查、测定肾小球滤过功能选择试验饮食，其试验期为()

- A. 1 周
- B. 2 天
- C. 2 周
- D. 1 天
- E. 3 天

51. 真题 2010-S014 能降低毛细血管和细胞膜通透性的物质是()

- A. 铁
- B. 钙
- C. 磷
- D. 碘
- E. 锌

52. 真题 2010-X035 人类维生素 D 的主要来源为()

- A. 蛋黄中的维生素 D
- B. 牛奶中的维生素 D
- C. 动物肝脏中的维生素 D
- D. 植物食品中的维生素 D
- E. 皮肤中的 7-脱氢胆固醇

53. 真题 2018-S046 患者男，18 岁。尿蛋白定性检查+++，尿蛋白定量 3.5g/24h，镜下血尿，眼睑及双下肢轻度水肿。以肾炎收治。为协助检查、测定肾小球滤过功能选择试验饮食，其试验期间内应注意的问题包括()

- A. 控制全天饮食中的水分
- B. 限制蔬菜、水果及植物油的摄入
- C. 检查当日早晨禁食
- D. 禁食肉类、鱼类、禽类
- E. 避免进食过甜、过咸的食物

54. 真题 2013-J006 高血压、动脉粥样硬化的老年患者，无需限制的饮食是()

- A. 高胆固醇食物
- B. 高动物脂肪食物
- C. 高糖食物
- D. 高钠食物
- E. 高钙食物

55. 真题 2013-J037 脂溶性维生素包括维生素()

- A. A、D、E、K
- B. A、E、C、D
- C. A、K、C、D
- D. E、B、K、D
- E. A、B、C、D

56. 真题 2013-J076 除水外，人体构成的主要成分是()

- A. 糖类
- B. 脂肪
- C. 蛋白质
- D. 电解质
- E. 维生素

57. 真题 2015-S058 患者，男，64 岁。脑血栓昏迷，需插胃管进行鼻饲饮食。插管至 15cm 时，应注意()

- A. 使患者头偏向一侧
- B. 使患者头后仰
- C. 帮助患者张嘴
- D. 使患者下颌靠近胸骨柄
- E. 刺激患者做吞咽动作

58. 真题 2015-S057 患者，男，15 岁。诊断为急性肾炎。为配合治疗，适宜的饮食为()

- A. 高蛋白、低脂肪饮食
- B. 高蛋白、低盐饮食
- C. 低蛋白、低脂肪饮食
- D. 低蛋白、低盐饮食
- E. 低蛋白、低胆固醇饮食

59. 真题 2015-S046 中枢神经系统活动能量的来源是()

- A. 脂肪
- B. 蛋白质
- C. 碳水化合物
- D. 脂肪和碳水化合物
- E. 碳水化合物和蛋白质

60. 真题 2015-S038 对要素饮食的叙述，不正确的是()

- A. 是一种化学精制食物
- B. 由无渣小分子物质组成
- C. 容易消化
- D. 营养价值高
- E. 营养全面

61. 真题 2015-S027 为鼻饲患者灌注食物时，鼻饲液的适宜温度是()

- A. 34-36℃
- B. 36-38℃
- C. 38-40℃
- D. 40-42℃
- E. 42-44℃

62. 真题 2014-S035 属于脂溶性的维生素是()

- A. 维生素 K
- B. 维生素 C
- C. 维生素 B₁
- D. 维生素 PP
- E. 维生素 B₆

63. 真题 2017-S056 患者男，70 岁，头痛后意识不清，呼吸有鼾音，需要鼻饲供给营养，为提高鼻饲插管成功率，操作方法正确的是()

- A. 插管前将患者的头部前倾
- B. 患者头和颈部保持水平线
- C. 插管 15cm 时托起患者头部
- D. 插管困难时可做吞咽动作
- E. 插管有呛咳时顺势进行插入

64. 真题 2014-S034 孙某, 男, 26 岁。慢性肾衰竭, 饮食中每日蛋白含量不应超过()

- A. 20g
- B. 30g
- C. 40g
- D. 50g
- E. 60g

65. 真题 2014-S033 忌碘饮食要求在检查治疗前禁食海带、紫菜等含碘高的食物的具体时间是()

- A. 3 天
- B. 7 天
- C. 14 天
- D. 1 个月
- E. 2 个月

66. 真题 2014-S032 不属于治疗膳食的是()

- A. 忌碘膳食
- B. 低盐膳食
- C. 无盐膳食
- D. 低脂膳食
- E. 低蛋白质膳食

67. 真题 2013-S082 患者, 男, 28 岁。暴饮暴食后出现上腹正中刀割样剧痛, 不能忍受, 并伴有恶心、呕吐, 急送至医院, 诊断为急性胰腺炎。给予禁食、胃肠减压, 肠外营养支持治疗。2 周后病情稳定, 改为要素饮食, 鼻饲提供营养。该患者要素饮食的特点不包括()

- A. 营养价值高
- B. 营养成分全面
- C. 含少量纤维素
- D. 不需经过消化
- E. 肠道直接吸收

68. 真题 2013-S081 患者, 男, 28 岁。暴饮暴食后出现上腹正中刀割样剧痛, 不能忍受, 并伴有恶心、呕吐, 急送至医院, 诊断为急性胰腺炎。给予禁食、胃肠减压, 肠外营养支持治疗。2 周后病情稳定, 改为要素饮食, 鼻饲提供营养。给该患者要素饮食过程中的正确做法是()

- A. 从高浓度、大剂量开始
- B. 溶液温度应保持在 35℃
- C. 鼻饲过程中出现恶心立即停用
- D. 若停用应逐渐减量
- E. 长期使用时无需补充维生素

69. 真题 2017-X061 重度肥胖是指体重超过同性别、同身高参照人群均值的()

- A. 0.1
- B. 0.2
- C. 0.3
- D. 0.4
- E. 0.5

70. 真题 2013-S069 患者, 男, 40 岁。因车祸导致脑外伤, 出现昏迷。为保证营养的供给, 需要长期鼻饲, 取去枕平卧位, 准备接受插胃管。为其插胃管至 15cm 时, 应采取的护理措施是()

- A. 使患者头后仰便于胃管插入
- B. 让患者取右侧卧位使插管顺利
- C. 将患者头托起, 使下颌骨靠近胸骨柄
- D. 将病床床头摇起, 使患者呈半坐卧位
- E. 使患者头偏向护士一侧方便胃管插入

71. 真题 2013-S068 患者, 男, 40 岁。因车祸导致脑外伤, 出现昏迷。为保证营养的供给, 需要长期鼻饲, 取去枕平卧位, 准备接受插胃管。胃管更换的时间是()

- A. 乳胶胃管每天更换 1 次, 硅胶胃管每周更换 1 次
- B. 乳胶胃管每周更换 1 次, 硅胶胃管每月更换 1 次
- C. 乳胶胃管每周更换 1 次, 硅胶胃管每月更换 2 次
- D. 乳胶胃管每周更换 2 次, 硅胶胃管每月更换 1 次
- E. 乳胶胃管每天更换 1 次, 硅胶胃管每月更换 2 次

72. 真题 2013-S008 含有优质蛋白质的食物是()

- A. 馒头
- B. 豆腐
- C. 土豆
- D. 苹果
- E. 南瓜

73. 真题 2013-X011 肝性脑病患者经治疗神志恢复后可逐渐给予蛋白质饮食, 最适宜的选择是()

- A. 动物蛋白质
- B. 蔬菜、水果
- C. 碳水化合物
- D. 植物蛋白质
- E. 每天蛋白质在 40g 以上

74. 真题 2010-J011 除水以外人体构成的主要成分是()

- A. 糖类
- B. 脂肪
- C. 蛋白质
- D. 电解质
- E. 维生素

75. 真题 2019-Z026 下列饮食中含铁量最少的食物是()

- A. 奶类
- B. 海带
- C. 木耳
- D. 香菇
- E. 瘦肉

76. 真题 2019-S002 构成甲状腺激素的主要成分是()

- A. 磷
- B. 碘
- C. 锌

- D. 铁
E. 钙
77. 真题 2019-S003 甲状腺吸收 ^{131}I 测定前, 应禁食的食物是()
A. 瘦肉
B. 鳝鱼
C. 牛肉
D. 紫菜
E. 猪肝
78. 真题 2019-S006 缺乏时会导致佝偻病的矿物是()
A. 钠
B. 钾
C. 钙
D. 碘
E. 铁
79. 真题 2019-S012 为昏迷病人插胃管, 为了提高成功率, 当胃管插至 15cm 时将病人头部托起, 使下颌靠近胸骨柄, 其目的是增大()
A. 环状软骨水平弧度
B. 贲门口水平处弧度
C. 咽喉部通道的弧度
D. 食管通过膈肌弧度
E. 平气管交叉处弧度
80. 真题 2019-S041 患者, 男, 60 岁。急性胰腺炎, 给予要素饮食, 护士在操作中不妥的是()
A. 必须新鲜配制
B. 可从造瘘处滴入
C. 可口服或鼻饲
D. 滴注前后需要温开水冲净管腔
E. 鼻饲前, 温度应保持在 32~36℃
81. 真题 2019-S059 患者, 男, 28 岁。身高 175cm, 体重 76kg, 其体重范围属于()
A. 正常范围
B. 过重
C. 肥胖
D. 消瘦
E. 明显消瘦
82. 真题 2019-Z043 在营养疗法中, 要素饮食的要点错误的是()
A. 无菌操作
B. 滴注肠内的营养温度应保持在 20~22℃
C. 管内导管要保持通畅
D. 保持口腔、鼻腔的清洁
E. 评记 24 小时出入量
- 痛, 正确的护理是()
A. 嘱患者翻身, 变换体位后再灌入
B. 退管少许, 再稍转动缓慢插入
C. 适当放低灌肠筒以减慢流速
D. 嘱患者张口呼吸以减轻腹压
E. 应立即停止灌肠, 及时处理
2. 模拟题 患者, 女, 73 岁。充血性心力衰竭伴水、钠潴留, 严重便秘, 需灌肠, 禁用的灌肠溶液是()
A. 生理盐水
B. “1、2、3”溶液
C. 肥皂水溶液
D. 甘油和温开水
E. 油剂
3. 模拟题 护士行导尿术时, 操作不妥的是()
A. 戴口罩、帽子并清洗双手
B. 导尿过程中及时观察患者有何不适
C. 详细解释导尿目的, 缓解患者担忧心理
D. 用无菌持物钳夹取棉球消毒外阴
E. 检查导尿包的名称及灭菌日期
4. 真题 2010-S020 留 24 小时尿标本时加入甲醛的作用是()
A. 固定尿中有机成分
B. 防止尿液中的激素被氧化
C. 防止尿液被污染变质
D. 维持尿液中的化学成分不变
E. 防止尿液改变颜色
5. 真题 2018-S004 大量不保留灌肠的禁忌证是()
A. 中暑
B. 伤寒
C. 急腹症
D. 习惯性便秘
E. 结肠检查前
6. 真题 2010-S023 肠套叠患儿的大便呈()
A. 果酱样
B. 柏油样
C. 白陶土样
D. 淡黄色
E. 黄褐色
7. 真题 2010-S031 护士为患者行导尿术时未用屏风遮挡, 导致患者不满投诉, 护士的行为应视为()
A. 侵权
B. 过失犯罪
C. 故意犯罪
D. 渎职罪
E. 疏忽大意
8. 真题 2010-S040 肛管排气操作中, 不恰当的一项是()
A. 肛管插入深度为 15-18Cm

十一.排泄

1. 真题 2010-S008 在大量不保留灌肠过程中, 患者突然出现面色苍白、脉速、心慌、气促、出冷汗、剧烈腹

- B. 与肛管连接的橡胶管插入盛水瓶中
C. 在患者腹部沿顺时针方向作环形按摩
D. 帮助患者更换体位
E. 肛管保留 1 小时以上
9. 真题 2010-S054 患者, 男, 28 岁。阿米巴痢疾, 护士为患者进行保留灌肠, 采取右侧卧位的目的是()
A. 减轻药物毒副作用
B. 有利于药物保留
C. 可提高治疗效果
D. 减少对患者的局部刺激
E. 使患者舒适安全
10. 真题 2016-S041 为糖尿病患者留尿作尿糖定量检查, 采集尿标本的方法是()
A. 留清晨第 1 次尿约 100ml
B. 随时留尿 100ml
C. 饭前留尿 100ml
D. 留 24h 尿
E. 留中段尿 5ml
11. 真题 2017-S008 解除非尿路梗阻所致的尿潴留, 不适合首先采用()
A. 下腹部热敷
B. 按摩下腹部
C. 听流水声
D. 温水洗外阴
E. 导尿术
12. 真题 2010-S080 患者, 男, 59 岁。患者在家时排便正常, 但入院 4 天没有排便, 饮食正常。遵医嘱给予开塞露治疗, 不正确的是()
A. 为保护患者隐私, 用屏风遮挡, 拉好窗帘
B. 剪去封口后, 先挤出少许液体润滑开口处
C. 患者取左侧卧位
D. 轻插入肛门后将药液全部挤入直肠
E. 嘱患者无需保留, 可立即排便
13. 真题 2018-S009 “1、2、3”灌肠溶液的正确配置方法是()
A. 50%硫酸镁 20ml, 甘油 80ml, 温开水 100ml
B. 50%硫酸镁 25ml, 甘油 50ml, 温开水 75ml
C. 50%硫酸镁 30ml, 甘油 60ml, 温开水 90ml
D. 50%硫酸镁 40ml, 甘油 40ml, 温开水 90ml
E. 50%硫酸镁 50ml, 甘油 100ml, 温开水 150ml
14. 真题 2010-S081 患者, 男, 59 岁。患者在家时排便正常, 但入院 4 天没有排便, 饮食正常。开塞露的作用机制是()
A. 在肠道内吸水膨胀后, 增加肠内容物的容积
B. 在肠腔维持高渗透压, 阻止肠内盐和水分吸收
C. 润滑软化粪便, 减少肠内水分被吸收
D. 使黏膜通透性增加, 使电解质和水向肠腔渗透
E. 刺激十二指肠分泌缩胆囊肽, 促进肠分泌肠液和蠕

动

15. 真题 2011-S010 阿米巴痢疾患者留取粪便标本的容器是()
A. 硬纸盒
B. 玻璃瓶
C. 蜡纸盒
D. 无菌容器
E. 加温容器
16. 真题 2011-S011 关于尿液颜色的描述正确的是()
A. 胆红素尿呈棕红色
B. 乳糜尿呈乳白色
C. 肾病尿液呈黄褐色
D. 脓尿呈酱油色
E. 溶血反应的尿液呈红色
17. 真题 2011-S014 肠套叠患者的粪便呈()
A. 陶土色便
B. 柏油样便
C. 暗红色便
D. 果酱样便
E. 鲜红色便
18. 真题 2011-S015 可出现尿频、尿急、尿痛的患者是()
A. 膀胱造瘘
B. 妊娠压迫
C. 膀胱炎症
D. 膀胱结核
E. 急性肾炎
19. 真题 2011-S017 灌肠前后分别排便一次在体温单上的记录方法是()
A. 2
B. 2/E
C. 2/2E
D. 1 (2/E)
E. 1 (1/E)
20. 真题 2017-S015 阿米巴痢疾病人留取粪便标本的容器是()
A. 硬纸盒
B. 玻璃瓶
C. 蜡纸盒
D. 无菌容器
E. 加温容器
21. 真题 2011-S057 孕妇, 因尿潴留, 护士准备为该孕妇行导尿术。下列叙述欠妥的是()
A. 戴口罩、帽子并清洗双手
B. 关闭门窗、保护患者隐私
C. 将无菌与非无菌物品分别放置
D. 检查导尿包的名称及灭菌日期
E. 用无菌持物镊夹取棉球消毒外阴

22. 真题 2011-S066 患者, 女, 45 岁。因尿路感染, 医嘱尿培养及药物敏感试验, 患者神志清醒, 一般情况下, 护士留取尿标本的方法是()

- A. 导尿术
- B. 留取中段尿
- C. 嘱患者留晨起第 1 次尿
- D. 收集 24 小时尿
- E. 随机留尿 100ml

23. 真题 2011-S058 患者, 女, 47 岁。腰椎损伤 2 个月, 长期留置导尿管, 今晨护士发现患者尿液浑浊有很多沉淀。护士应该采取的护理措施是()

- A. 用 0.1% 苯扎溴铵消毒尿道口
- B. 为患者翻身更换卧位
- C. 热水袋热敷下腹部
- D. 鼓励患者多饮水促进排尿
- E. 膀胱内滴药消除炎症

24. 真题 2011-S072 患者, 男, 37 岁。出现向心性肥胖、痤疮、高血压, 疑为皮质醇增多症, 准备进行尿 17-羟皮质类固醇监测, 24 小时尿中加入浓盐酸的剂量是()

- A. 1-2ml
- B. 3-4ml
- C. 5-10ml
- D. 15-20ml
- E. 25-30ml

25. 真题 2017-X019 少尿是指 24 小时尿量少于()

- A. 100ml
- B. 200ml
- C. 300ml
- D. 400ml
- E. 500ml

26. 真题 2011-S099 取粪培养标本时无菌长棉签插入肛门的长度是()

- A. 4~5cm
- B. 7~10cm
- C. 10~15cm
- D. 15~20cm
- E. 20~25cm

27. 真题 2017-S020 阿米巴痢疾病人行保留灌肠时应采用的卧位是()

- A. 右侧卧位
- B. 左侧卧位
- C. 半坐位
- D. 头低足高位
- E. 膝胸卧位

28. 真题 2011-S100 用 10% 水合氯醛灌肠时肛管插入肛门至直肠的长度是()

- A. 6-7cm
- B. 7-10cm

- C. 10-15cm
- D. 15-20cm
- E. 20-25cm

29. 真题 2015-S024 留 24 小时尿标本用浓盐酸进行防腐, 其作用是()

- A. 延缓尿中化学成分分解
- B. 防止尿中激素被氧化
- C. 固定尿液中有机成分
- D. 防止尿液被细菌污染
- E. 防止尿液颜色改变

30. 真题 2013-S004 隐血试验前 3 天禁忌的饮食是()

- A. 豆制品
- B. 马铃薯
- C. 大白菜
- D. 白萝卜
- E. 绿叶菜

31. 真题 2017-S023 灌肠前后分别排便一次在体温单上的记录方法是()

- A. 2
- B. 2/E
- C. 2/2E
- D. 1 (1/2E)
- E. 1 (1/E)

32. 真题 2013-S005 长期留置导尿管的患者, 出现尿液浑浊、沉淀或结晶时应()

- A. 经常清尿道口
- B. 膀胱内用药
- C. 热敷下腹部
- D. 进行膀胱冲洗
- E. 经常更换卧位

33. 真题 2013-S032 使用时需要观察尿量的药物是()

- A. 硫酸镁注射液
- B. 西地兰
- C. 20%甘露醇
- D. 50%葡萄糖
- E. 5%碳酸氢钠

34. 真题 2013-S038 为伤寒患者灌肠时, 液体量和高度分别是()

- A. 300ml, 小于 30cm
- B. 400ml, 小于 30cm
- C. 500ml, 小于 30cm
- D. 600ml, 小于 20cm
- E. 700ml, 小于 20cm

35. 真题 2013-S058 密闭式膀胱冲洗术冲洗液滴入膀胱的速度为()

- A. 20-40 滴/分
- B. 30-50 滴/分
- C. 40-60 滴/分

- D. 60-80 滴/分
- E. 80-100 滴/分

36. 真题 2013-S062 为糖尿病患者留尿作尿糖定量检查, 采集尿标本的方法是()

- A. 留清晨第 1 次尿约 100ml
- B. 随时留尿 100ml
- C. 饭前留尿 100ml
- D. 留 24 小时尿
- E. 留中段尿 5ml

37. 真题 2013-S090 胆道完全阻塞时, 粪便呈()

- A. 暗绿色
- B. 暗红色
- C. 无光样黑色
- D. 柏油色
- E. 陶土色

38. 真题 2013-S091 下消化道出血时, 粪便呈()

- A. 暗绿色
- B. 暗红色
- C. 无光样黑色
- D. 柏油色
- E. 陶土色

39. 真题 2018-J030 以下原因引起的急性尿潴留中, 属于非机械性梗阻引起的是()

- A. 前列腺增生
- B. 膀胱结石
- C. 不习惯卧床排尿
- D. 尿道结石
- E. 尿道狭窄

40. 真题 2014-J094 人体尿成分中的主要物质是()

- A. 水
- B. 肌酐
- C. 尿素
- D. 蛋白质
- E. 钾离子

41. 真题 2014-S006 膀胱刺激征的表现是()

- A. 尿急、腰痛、尿频
- B. 尿频、尿急、尿多
- C. 尿频、尿多、尿痛
- D. 尿急、尿痛、尿频
- E. 尿多、尿急、尿痛

42. 真题 2014-S036 下列不属于大量不保留灌肠适应证的是()

- A. 为便秘者软化、清除粪便
- B. 为急腹症患者做肠道准备
- C. 腹腔手术前的准备
- D. 为分娩者做肠道准备
- E. 为高热患者降温

43. 真题 2018-S033 膀胱内有尿则会不自主地流出, 使膀胱处于空虚状态, 属于()

- A. 真性尿失禁
- B. 假性尿失禁
- C. 压力性尿失禁
- D. 反射性尿失禁
- E. 急迫性尿失禁

44. 真题 2014-S065 石先生, 男, 56 岁。患尿毒症, 精神萎靡。下腹无胀满, 24 小时尿量为 60ml。请问患者的排尿状况属于()

- A. 正常
- B. 尿闭
- C. 少尿
- D. 尿潴留
- E. 尿量偏少

45. 真题 2018-S034 膀胱内有大量尿液, 当充盈达到一定压力时, 即可不自主溢出少量尿液, 膀胱内压力降低时, 排尿立即终止, 但膀胱内仍呈胀满状态, 尿液不能排空, 属于()

- A. 真性尿失禁
- B. 假性尿失禁
- C. 压力性尿失禁
- D. 反射性尿失禁
- E. 急迫性尿失禁

46. 模拟题 灌肠后排一次大便的记录方法为()

- A. 1
- B. 1/E
- C. 1 1/E
- D. 0/E
- E. E/0

47. 真题 2015-X047 米泔水样便常见于()

- A. 霍乱
- B. 伤寒
- C. 肠炎
- D. 阿米巴痢疾
- E. 肝炎

48. 真题 2015-S008 极度衰弱、膀胱高度膨胀的患者, 导尿时排空膀胱会引起()

- A. 尿失禁
- B. 腹部剧痛
- C. 血尿、虚脱
- D. 膀胱炎症
- E. 尿潴留加重

49. 真题 2015-S017 伤寒患者灌肠的液量及液面距肛门的距离应是()

- A. 1000ml、不超过 30cm
- B. 1000ml、不超过 60cm
- C. 不超过 500ml、不超过 30cm

- D. 不超过 500ml、不超过 40cm
- E. 500ml、60cm

50. 真题 2015-S034 关于小量不保留灌肠的叙述, 正确的是()

- A. 右侧卧位, 双膝屈曲
- B. 小儿插管深度 4-7cm
- C. 灌入 50%硫酸镁 60ml
- D. 后注入温开水 20-30ml
- E. E 保留溶液 30 分钟后排便

51. 真题 2015-S051 患者, 女, 55 岁。因外伤入院。患者不能控制排便, 多次将大便排在床上。对该患者的护理重点是()

- A. 定时开窗通风, 消除不良气味
- B. 保护肛周皮肤, 防止压疮
- C. 尊重患者, 消除心理压力
- D. 观察粪便性质、颜色与量
- E. 保证每天摄入足量的液体

52. 真题 2017-S040 为伤寒患者灌肠时, 液体量和高度分别是()

- A. 300ml, 小于 30cm
- B. 400ml, 小于 30cm
- C. 500ml, 小于 30cm
- D. 600ml, 小于 20cm
- E. 700ml, 小于 20cm

53. 真题 2015-S077 患者, 男, 肠腔高度胀气, 遵医嘱行肛管排气。下列护理措施中, 不正确的是()

- A. 取左侧卧位
- B. 橡胶管留出足够长度并妥善固定
- C. 保留肛管不超过 30 分钟
- D. 排气不畅时, 帮助患者变换体位或按摩腹部
- E. 需要时, 2-3 小时后再行肛管排气

54. 真题 2018-S041 含有胆红素的尿液颜色是()

- A. 红棕色
- B. 鲜红色
- C. 黄褐色
- D. 暗红色
- E. 酱油色

55. 真题 2015-S078 患者, 男, 肠腔高度胀气, 遵医嘱行肛管排气。护士分析患者平日饮食习惯, 给予健康指导, 不妥的是()

- A. 多饮水
- B. 少食豆类食物
- C. 少食高糖类食物
- D. 选用清淡、易消化食物
- E. 少食水果、蔬菜等富含粗纤维素的饮食

56. 真题 2018-S042 含有血红蛋白的尿液颜色是()

- A. 红棕色
- B. 鲜红色

- C. 黄褐色
- D. 暗红色
- E. 酱油色

57. 真题 2015-S090 大量不保留灌肠肛管插入深度为()

- A. 4-6cm
- B. 7-10cm
- C. 12-14cm
- D. 15-20cm
- E. 22-24cm

58. 真题 2015-S091 保留灌肠肛管插入深度为()

- A. 4-6cm
- B. 7-10cm
- C. 12-14cm
- D. 15-20cm
- E. 22-24cm

59. 真题 2015-S092 胆道完全阻塞时, 粪便呈()

- A. 暗绿色
- B. 暗红色
- C. 无光样黑色
- D. 柏油色
- E. 陶土色

60. 真题 2015-S093 下消化道出血时, 粪便呈()

- A. 暗绿色
- B. 暗红色
- C. 无光样黑色
- D. 柏油色
- E. 陶土色

61. 真题 2016-S001 长期留置导尿管的患者, 出现尿液混浊、沉淀或结晶时应()

- A. 经常清洁尿道口
- B. 膀胱内用药
- C. 热敷下腹部
- D. 进行膀胱冲洗
- E. 经常更换卧位

62. 真题 2016-S029 使用时需要观察尿量的药物是()

- A. 硫酸镁注射液
- B. 西地兰
- C. 20%甘露醇
- D. 50%葡萄糖
- E. 5%碳酸氢钠

63. 真题 2016-S037 充血性心力衰竭患者禁忌的灌肠溶液是()

- A. 生理盐水
- B. 甘油溶液
- C. 1、2、3 溶液
- D. 肥皂水
- E. 石蜡油

64. 真题 2016-S043 可以防止细菌污染, 延缓尿液中化学成分分解的防腐剂是()

- A. 95%乙醇
- B. 浓盐酸
- C. 甲醛
- D. 乙酸
- E. 甲苯

65. 真题 2017-S050 尿的颜色与疾病相符的一项是()

- A. 急性肾小球肾炎患者的尿呈浓茶色
- B. 恶性疟疾患者的尿呈白色浑浊
- C. 阻塞性黄疸患者的尿呈黄褐色
- D. 丝虫病患者的尿呈洗肉水色
- E. 尿道化脓性炎症患者的尿呈乳白色

66. 真题 2016-S052 患者男, 52岁。有胃溃疡病史, 近日来上腹部疼痛加剧, 医嘱做粪便隐血试验, 检查前3天能给患者食用的菜谱是()

- A. 卷心菜, 五香牛肉
- B. 菠菜, 红烧青鱼
- C. 茭白, 炒鸡蛋
- D. 油豆腐, 鸡血汤
- E. 青菜, 炒鸡肝

67. 真题 2016-S056 患者女, 52岁。需肠道抗感染治疗, 护士遵医嘱给其行保留灌肠, 下列正确的是()

- A. 晚上睡觉前灌肠为宜
- B. 阿米巴痢疾取左侧卧位
- C. 臀部抬高 20cm 防药液溢出
- D. 肛管插入直肠长度 20~25cm
- E. 液面距离肛门高度 40~60cm

68. 真题 2016-S060 患者男, 58岁, 长期卧床。护士为预防其发生便秘而制定如下护理计划, 其中不妥的措施是()

- A. 每天液体摄入量不少于 2000ml
- B. 排便时可抬高床头
- C. 禁用油脂类食物
- D. 排便时可配合做腹部按摩
- E. 如需泻药应选择作用缓和的药物

69. 真题 2016-S061 患者男, 46岁。便秘, 护士遵医嘱直肠插入甘油栓剂, 软化粪便。操作错误的是()

- A. 患者取侧卧位, 膝部弯曲, 暴露肛门
- B. 护士戴上手套或指套, 以避免污染手指
- C. 插入肛门, 并用示指将栓剂沿直肠壁朝脐部方向进入 6-7cm
- D. 操作后患者如有便意, 即可上厕所
- E. 若栓剂滑脱出肛门外, 应予重新插入

70. 真题 2016-S063 患者女, 25岁。妊娠 39周, 于 2:30pm 正常分娩。6:40pm 患者主诉腹胀、腹痛。视诊: 下腹膀胱区隆起。叩诊 耻骨联合上浊音。该患者存在

的健康问题是()

- A. 分娩后疼痛
- B. 体液过多
- C. 便秘
- D. 尿潴留
- E. 有子宫内膜感染的可能

71. 模拟题 下列哪种疾病可出现酱油色尿()

- A. 阻塞性黄疸
- B. 丝虫病
- C. 肝细胞性黄疸
- D. 膀胱癌
- E. 输入异型血

72. 模拟题 膀胱内充满尿液, 其压力增高, 迫使少量尿液自尿道口溢出, 称为()

- A. 真性尿失禁
- B. 尿潴留
- C. 尿瘘
- D. 充盈性尿失禁
- E. 尿频

73. 模拟题 患者, 男, 72岁。1个月来大便带血, 消瘦, 拟行直肠镜检查, 应采用的卧位是()

- A. 膝胸卧位
- B. 左侧卧位
- C. 截石位
- D. 蹲位
- E. 平卧位

74. 模拟题 下列对尿失禁患者的护理哪项是错误的()

- A. 指导患者行盆底肌肉锻炼
- B. 可采用接尿器或尿壶接尿
- C. 对长期尿失禁患者可给予留置导尿管
- D. 注意皮肤护理
- E. 嘱患者少饮水, 以减少尿量

75. 模拟题 下列属于大量不保留灌肠禁忌证的是()

- A. 中暑
- B. 伤寒
- C. 急腹症
- D. 习惯性便秘
- E. 结肠检查前

76. 模拟题 大量不保留灌肠时, 灌肠液的温度常为()

- A. 30~32℃
- B. 33~35℃
- C. 36~38℃
- D. 39~41℃
- E. 42~45℃

77. 模拟题 做尿糖定量检查应加入的防腐剂是()

- A. 稀盐酸
B. 95%乙醇
C. 甲苯
D. 浓盐酸
E. 甲醛
78. 模拟题 患者,男,77岁。自诉便秘多日,护士拟采用人工取便的方法,谨慎选用该方法的患者是()
A. 慢性肠炎
B. 脑卒中
C. 巨结肠症
D. 心脏病
E. 骨盆骨折
79. 真题 2017-S063 排便失禁患者护理重点是()
A. 保护臀部,防止发生皮肤破损
B. 给予患者高蛋白软食
C. 认真观察患者排便时的心理反应
D. 鼓励患者多饮水
E. 观察记录粪便性质、颜色和量
80. 模拟题 患者,男,58岁。肠胀气,遵医嘱行肛管排气,不正确的操作是()
A. 肛管插入直肠15~18cm
B. 与肛管相连的橡胶管插入水瓶中
C. 在患者腹部按摩
D. 患者取左侧卧位
E. 保留肛管1小时以上
81. 模拟题 患者,女,68岁。截瘫引起尿失禁。此尿失禁属于()
A. 真性尿失禁
B. 假性尿失禁
C. 充溢性尿失禁
D. 压力性尿失禁
E. 膀胱括约肌无力性尿失禁
82. 真题 2017-S065 给女性患者导尿,行第二次消毒时消毒小阴唇,尿道口的顺序是()
A. 自上而下,由外→内
B. 自上而下,内→外→内
C. 自下而上,内→外→内
D. 自上而下,外→内→外
E. 自下而上,外→内→外
83. 模拟题 下列哪项不是大量不保留灌肠的适应证()
A. 为便秘者软化、清除粪便
B. 为急腹症患者肠道准备
C. 腹腔手术前的准备
D. 为分娩者肠道准备
E. 为高热患者降温
84. 模拟题 下列关于灌肠的注意事项错误的是()
A. 伤寒患者灌肠液量不得超过500ml
B. 急腹症患者禁忌灌肠
C. 肝性脑病患者宜用肥皂水灌肠
D. 中暑患者可用4℃生理盐水进行大量不保留灌肠
E. 对顽固性失眠者可予保留灌肠进行镇静
85. 模拟题 尿潴留患者腹部叩诊呈()
A. 实音
B. 鼓音
C. 清音
D. 过清音
E. 浊音
86. 模拟题 患者,男,30岁。内痔切除术后3天未排大便,腹胀明显,处理方法错误的是()
A. 每晚服液状石蜡
B. 低压灌肠
C. 肛管排气
D. 给予流质饮食
E. 嘱患者多饮水
87. 模拟题 保留灌肠时,药液量应()
A. <100ml
B. <200ml
C. <300ml
D. <400ml
E. <500ml
88. 模拟题 大量不保留灌肠时,伤寒患者每次药液量为()
A. <100ml
B. <200ml
C. <300ml
D. <400ml
E. <500ml
89. 模拟题 患者,男,36岁。患慢性痢疾,其病变部位在乙状结肠,对其进行保留灌肠宜采取()
A. 头低脚高位
B. 头骨脚低位
C. 左侧卧位
D. 右侧卧位
E. 屈膝位
90. 模拟题 有关呕血与黑便的描述,不正确的是()
A. 呕血一般都有黑便
B. 出血量5ml,大便隐血试验阳性
C. 出血量60ml,出现黑便
D. 出血量超过300ml,出现黑便
E. 黑便必有呕血
91. 模拟题 服用铁剂后出现黑便的原因是()
A. 引起肠黏膜破溃出血
B. 引起上消化道出血
C. 腐蚀肠壁血管引起出血
D. 在肠道细菌作用下生成硫化铁所致
E. 腐蚀胃血管引起出血

92. 模拟题 为尿潴留患者第一次放尿, 放尿量不应超过()

- A. 400ml
- B. 500ml
- C. 800ml
- D. 1000ml
- E. 1500ml

93. 真题 2017-S075 患者女, 68岁, 长期卧床。5天未排便。医嘱予甘油栓通便, 下列操作错误的是()

- A. 患者取侧卧位, 膝部弯曲
- B. 嘱患者屏气, 尽量放松
- C. 置入后保持侧卧位 15分钟
- D. 将栓剂沿直肠壁朝脐部方向送入 6~7cm
- E. 若栓剂滑脱出肛门外, 应予重新插入

94. 模拟题 预防便秘的措施错误的是()

- A. 建立规律的排便习惯
- B. 多食高纤维素的食物
- C. 定时使用简易通便法
- D. 适当运动
- E. 多食水果

95. 模拟题 休克患者留置导尿的主要目的是()

- A. 预防压疮
- B. 促进有毒物质的排泄
- C. 收集尿标本, 做细菌培养
- D. 测尿量及比重, 了解肾血流灌注情况
- E. 预防尿潴留

96. 模拟题 患者, 男, 56岁。前列腺严重肥大, 体质虚弱, 膀胱高度膨胀, 帮助其排尿的最佳方法是()

- A. 热敷下腹部
- B. 按摩下腹部
- C. 针灸
- D. 导尿
- E. 听流水声

97. 模拟题 患者, 女, 50岁。严重失眠, 遵医嘱给予 10%水合氯醛 20ml, 9pm 保留灌肠。下列操作中哪项不妥()

- A. 灌肠前嘱患者先排便
- B. 灌肠时协助患者取左侧卧位
- C. 将臀部垫高 10cm
- D. 液面与肛门距离 30~40cm
- E. 肛管插入直肠 15~20cm

98. 模拟题 清洁灌肠的主要目的是()

- A. 解除腹部手术后的胀气
- B. 术前肠道准备
- C. 为保胎孕妇解除便秘
- D. 治疗肠道感染
- E. 为高热患者降温

99. 真题 2018-J080 老年男性尿失禁最常见的原因是()

- A. 膀胱结石
- B. 尿道狭窄
- C. 膀胱结核
- D. 膀胱肿瘤
- E. 前列腺增生

100. 模拟题 为女患者导尿的操作, 正确的是()

- A. 两次外阴部的消毒均是由外而内, 自上而下
- B. 先戴好无菌手套, 再打开导尿包
- C. 导尿管误入阴道后, 应拔出更换无菌导尿管后再插入尿道
- D. 手套污染后, 用碘伏消毒后再用
- E. 对膀胱高度膨胀, 身体极度衰弱者, 应一次把尿放完, 解除患者痛苦

101. 模拟题 肛管排气时, 适宜的插管深度和置管时间是()

- A. 7~10cm, 30分钟左右
- B. 10~15cm, 20分钟左右
- C. 10~15cm, 1小时左右
- D. 15~18cm, 20分钟左右
- E. 15~18cm, 1小时左右

102. 模拟题 为男性患者导尿, 提起阴茎与腹壁呈 60度角, 可使()

- A. 耻骨下弯消失
- B. 耻骨前弯消失
- C. 耻骨下弯和耻骨前弯均消失
- D. 尿道膜部扩张
- E. 尿道三个狭窄都消失

103. 模拟题 膀胱冲洗时为预防泌尿系统感染, 每天饮水量为()

- A. 1000ml
- B. 1500ml
- C. 2000ml
- D. 2500ml
- E. 3000ml

104. 模拟题 直肠栓剂插入后应嘱患者保持侧卧位()

- A. 3分钟
- B. 5分钟
- C. 10分钟
- D. 15分钟
- E. 30分钟

105. 模拟题 肛管排气法, 肛管插入直肠的深度是()

- A. 7~10cm
- B. 11~12cm
- C. 13~15cm
- D. 15~18cm
- E. 18~20cm

106. 模拟题 患者,男,56岁。患尿毒症,精神萎靡,下腹无胀满,24小时尿量为60ml。患者的排尿状况是()

- A. 正常
- B. 无尿
- C. 少尿
- D. 尿量较少
- E. 尿失禁

107. 模拟题 患者,女,43岁。中暑,体温41.5℃,按医嘱灌肠为患者降温,正确的是()

- A. 灌肠液用0.1%~0.2%肥皂水
- B. 灌肠液温度为4℃
- C. 灌肠液量每次<500ml
- D. 灌肠时患者取右侧卧位
- E. 灌肠后患者保留1小时排便

108. 模拟题 患儿,男,8岁。因发热而入院治疗,体温39.5℃,需给予物理降温。为患儿降温,宜使用的灌肠法是()

- A. 大量不保留灌肠
- B. 小量不保留灌肠
- C. 保留灌肠
- D. 结肠灌洗
- E. 口服高渗溶液清洁灌肠

109. 模拟题 患儿,男,8岁。因发热而入院治疗,体温39.5℃,需给予物理降温。为患儿灌肠时,灌肠液的温度为()

- A. 28℃~32℃
- B. 32℃~38℃
- C. 34℃~36℃
- D. 39℃~41℃
- E. 4℃

110. 模拟题 患儿,男,8岁。因发热而入院治疗,体温39.5℃,需给予物理降温。为患儿灌肠时,灌肠液的液量为()

- A. 少于200ml
- B. 200~500ml
- C. 500~1000ml
- D. 800~1200ml
- E. 1000~1500ml

111. 模拟题 患儿,男,8岁。因发热而入院治疗,体温39.5℃,需给予物理降温。为患儿大量不保留灌肠时,肛管应插入的长度为()

- A. 3~6cm
- B. 4~7cm
- C. 7~10cm
- D. 12~15cm
- E. 15~18cm

112. 模拟题 患儿,男,8岁。因发热而入院治疗,体温39.5℃,需给予物理降温。为患儿灌肠时,宜使用的灌肠液是()

- A. 0.1%肥皂水
- B. 低渗盐水
- C. 10%水合氯醛
- D. 白醋
- E. 1、2、3溶液

113. 模拟题 大量不保留灌肠时,灌肠筒内液面距肛门的距离是()

- A. 10~20cm
- B. 20~30cm
- C. 30~40cm
- D. 40~60cm
- E. 60~80cm

114. 真题 2019-S016 患者,男,40岁。肝硬化伴肝功能不全,为该患者灌肠时,不宜选用肥皂水的原因是()

- A. 防止发生腹胀
- B. 防止发生酸中毒
- C. 减少氨的产生及吸收
- D. 以免引起顽固性腹泻
- E. 减少对肠黏膜的刺激

115. 真题 2019-S039 为女患者行导尿术,第二次消毒尿道口及小阴唇的顺序为()

- A. 自下而上,外→内→外
- B. 自上而下,内→外→内
- C. 自下而上,外→内→外
- D. 自下而上,内→外→内
- E. 尿道口外螺旋式消毒2次

116. 真题 2019-S044 休克病人留置导尿最主要的目的是()

- A. 引流尿液,促进有毒物质的排泄
- B. 测尿量及比重,了解肾血流灌注情况
- C. 保持床单位清洁干燥,使患者舒适
- D. 收集尿液标本,做细菌培养
- E. 避免尿液潴留在膀胱内

117. 真题 2019-S061 患者,男,37岁。出现向心性肥胖、痤疮、高血压,疑为皮质醇增多症,准备进行尿17-羟皮质类固醇监测,24小时尿中加入浓盐酸的剂量是()

- A. 1~2ml
- B. 3~4ml
- C. 5~10ml
- D. 15~20ml
- E. 25~30ml

118. 真题 2019-S075 患者睡前或清晨起床前,将透明胶带贴于肛门周围处是检查()

- A. 蛲虫
- B. 阿米巴原虫
- C. 细菌性痢疾

- D. 弓形虫
- E. 疟疾

119. 真题 2019-S076 需要将便器加温至接近人体的体温, 排便后标本连同便盆立即送检的是检查()

- A. 蛲虫
- B. 阿米巴原虫
- C. 细菌性痢疾
- D. 弓形虫
- E. 疟疾

120. 真题 2019-S095 患者, 男, 52 岁。高血压合并脑出血, 现突然进入深度昏迷, 出现高热、小便失禁等, 准备给予留置尿管。患者尿失禁可能属于()

- A. 真性尿失禁
- B. 假性尿失禁
- C. 压力性尿失禁
- D. 急迫性尿失禁
- E. 功能性尿失禁

121. 真题 2019-S096 患者, 男, 52 岁。高血压合并脑出血, 现突然进入深度昏迷, 出现高热、小便失禁等, 准备给予留置尿管。导尿操作中为固定导管, 应向导管气囊注入()

- A. 空气
- B. 蒸馏水
- C. 注射用水
- D. 生理盐水
- E. 无菌生理盐水

122. 真题 2019-Z071 采集清洁中段尿培养标本, 正确的方法是()

- A. 可以使用抗菌药物前或停用抗菌药物 3 天后收集尿标本
- B. 留取尿标本是要严格无菌操作, 清洁外阴, 消毒尿道口
- C. 标本留好后最好在 2 小时内做细菌培养
- D. 不能立即送检的尿标本可以放在阴凉处
- E. 做尿细菌定量培养时, 可随时采集尿标本

十二. 医院内感染的预防和控制

1. 模拟题 穿脱隔离衣时应避免污染的部位是()

- A. 腰带以下部位
- B. 袖子的后面
- C. 腰带以上部位
- D. 胸前、背后
- E. 衣领

2. 真题 2018-S001 使用无菌容器, 操作正确的是()

- A. 盖的内面朝下, 以便放置稳妥
- B. 物品取出后, 未污染的物品可放回
- C. 手握容器边缘, 以便持物牢靠
- D. 开盖 30 分钟内盖好, 以防污染
- E. 手指不可触及容器内面及边缘

3. 真题 2015-S009 属于清洁区的是()

- A. 医护值班室
- B. 分诊处
- C. 检验室
- D. 走廊
- E. 消毒间

4. 真题 2016-S058 孕妇, 尿潴留, 护士准备为其行导尿术。下列操作欠妥的是()

- A. 戴口罩, 帽子并清洗双手
- B. 关闭门窗, 保护患者隐私
- C. 将无菌与非无菌物品分别放置
- D. 检查导尿包的名称及灭菌日期
- E. 用无菌持物镊夹取棉球消毒外阴

5. 真题 2016-S079 患者男, 6 岁。突起高热入院, 查体: 精神萎靡, 面色青灰, 四肢厥冷, 反复抽搐。T40℃, P152 次/分, R32 次/分, 肛门拭子镜检可见大量脓细胞和红细胞。患儿应采取的隔离种类为()

- A. 分泌物隔离
- B. 消化道隔离
- C. 接触隔离
- D. 昆虫隔离
- E. 呼吸道隔离

6. 真题 2017-Z004 下列化学消毒注意事项中, 错误的是()

- A. 器械必须洗净擦干后浸泡
- B. 器械必须与药液充分接触
- C. 浸泡后的器械, 使用前用无菌生理盐水冲洗
- D. 消毒药液长期有效
- E. 对金属有腐蚀作用的药液, 不可用来浸泡器械

7. 真题 2016-S080 患者男, 6 岁。突起高热入院, 查体: 精神萎靡, 面色青灰, 四肢厥冷, 反复抽搐。T40℃, P152 次/分, R32 次/分, 肛门拭子镜检可见大量脓细胞和红细胞。关于穿脱隔离衣的注意事项, 不正确的是()

- A. 双手应保持在腰平面以上
- B. 穿好隔离衣后不得进入清洁区
- C. 无潮湿或污染时不更换隔离衣
- D. 隔离衣需遮盖工作服
- E. 保持隔离衣衣领清洁

8. 真题 2017-Z005 手术人员穿好手术衣, 戴好无菌手套后, 双手应放在()

- A. 胸前
- B. 身体两侧
- C. 交叉于腋下
- D. 高举头前
- E. 背后

9. 真题 2016-S090 属于高度危险物品的是()

- A. 衣服

- B. 压舌板
- C. 口罩
- D. 穿刺针
- E. 被褥

10. 真题 2017-S006 用燃烧法消毒搪瓷类容器时，常需倒入少量的乙醇，其浓度为()

- A. 0.35
- B. 0.45
- C. 0.65
- D. 0.85
- E. 0.95

11. 真题 2016-S091 属于中度危险物品的是()

- A. A. 衣服
- B. B. 压舌板
- C. C. 口罩
- D. D. 穿刺针
- E. E. 被褥

12. 真题 2016-S095 需现配现用的消毒剂是()

- A. 乙醇
- B. 甲醛
- C. 戊二醛
- D. 氯己定
- E. 过氧乙酸

13. 真题 2016-S096 不能与肥皂、洗衣粉混用的消毒剂是()

- A. 乙醇
- B. 甲醛
- C. 戊二醛
- D. 氯己定
- E. 过氧乙酸

14. 模拟题 下列各项除哪项外，白色假丝酵母菌均对其有抵抗力()

- A. 干燥
- B. 紫外线
- C. 化学制剂
- D. 热
- E. 日光

15. 模拟题 可安置在一个病室进行床边隔离的疾病是()

- A. 流脑与菌痢
- B. 肺结核与肠炎
- C. 伤寒与肺结核
- D. 菌痢与伤寒
- E. 麻疹与白喉

16. 模拟题 传染病区内属于半污染区的是()

- A. 医生值班室
- B. 病室及厕所
- C. 病区内走廊

- D. 浴室
- E. 治疗室

17. 真题 2016-S050 无菌持物钳的湿式保存法，消毒液应浸泡达到的深度为()

- A. 持物钳轴关节
- B. 持物钳轴下 2-3cm
- C. 持物钳轴上 2-3cm
- D. 持物钳的 1/2
- E. 没过整钳

18. 真题 2017-S013 在传染病区内属于半污染区的是()

- A. 库房
- B. 病区内走廊
- C. 值班室
- D. 病室
- E. 更衣室

19. 真题 2016-S019 对非典型肺炎患者采取的隔离属于()

- A. 昆虫隔离
- B. 肠道隔离
- C. 严密隔离
- D. 血液隔离
- E. 接触隔离

20. 真题 2015-S010 控制医院感染最简单有效的方法是()

- A. 洗手
- B. 戴手套
- C. 环境消毒
- D. 隔离传染患者
- E. 合理应用抗生素

21. 真题 2018-S015 护理严密隔离的传染病患者时，口罩更换的时间是()

- A. 8 小时
- B. 24 小时
- C. 12 小时
- D. 每次接触后更换
- E. 4 小时

22. 真题 2015-S014 使用无菌溶液时应先核对()

- A. 瓶盖有无松动
- B. 瓶体有无裂痕
- C. 瓶签各项内容
- D. 溶液有无变色
- E. 溶液有无絮状物

23. 真题 2015-S019 在传染病区内护士穿隔离衣的方法，正确的是()

- A. 穿戴工作衣帽，取下手表，卷袖于肘下，洗手
- B. 穿隔离衣，其污染面应朝内对着操作者
- C. 穿衣袖时双手可触及隔离衣的外面

- D. 两手在背后捏住隔离衣内外边缘对齐折叠系带
- E. 穿隔离衣后双臂保持在腰以下视线范围内

24. 真题 2015-S054 患者,男,甲型肝炎住院 20 天治愈出院,护士为其进行终末期消毒处理,不妥的做法是()

- A. 患者洗澡、换清洁衣裤
- B. 个人用物经消毒后带出病区
- C. 被服及时送洗衣房清洗
- D. 室内空气可用喷雾消毒
- E. 病床、桌椅用消毒液擦拭

25. 真题 2015-S068 患者,男,26 岁。腿部外伤后发展为气性坏疽,为其换药用的剪刀最佳消毒方法是()

- A. 75%酒精浸泡
- B. 燃烧
- C. 微波消毒灭菌
- D. 高压蒸汽灭菌
- E. 煮沸

26. 真题 2015-S086 护士洗手时揉搓的时间不少于()

- A. 15 秒
- B. 30 秒
- C. 1 分钟
- D. 2 分钟
- E. 3 分钟

27. 真题 2015-S087 护士涂擦消毒手时涂擦的时间不少于()

- A. 15 秒
- B. 30 秒
- C. 1 分钟
- D. 2 分钟
- E. 3 分钟

28. 真题 2016-S004 使用无菌溶液的方法,不正确的是()

- A. 使用前应核对溶液的名称、浓度、有效日期及溶液质量
- B. 开启瓶塞时手不可触及瓶口
- C. 冲洗瓶口时标签始终朝向掌心
- D. 倒液后环绕消毒瓶塞时,最先消毒手接触的部位
- E. 已开启的无菌溶液瓶内的溶液,可保存 24 小时

29. 真题 2016-S009 不属于医院感染的是()

- A. 新生儿经胎盘获得的感染
- B. 护理“非典”患者时护士获得的感染
- C. 新生儿脐带发炎
- D. 患者住院第 10 天后出现上呼吸道感染
- E. 住院患者导尿后发生泌尿系感染

30. 模拟题 无菌包被无菌等渗盐水浸湿应()

- A. 立即使用完
- B. 4 小时内用完
- C. 24 小时内用完

- D. 烘干后使用
- E. 重新灭菌

31. 模拟题 不属于出院患者床单位处理要求的是()

- A. 整理病历,交病案室管理
- B. 撤下病床上床单、被套、枕套,送洗衣房洗涤
- C. 床垫、褥、被及枕芯用紫外线照射消毒或日光暴晒 6 小时
- D. 用消毒液擦拭病床、桌、椅
- E. 病室开窗通风

32. 真题 2018-S025 对艾滋病患者应执行的隔离种类为()

- A. 血液-体液隔离
- B. 接触隔离
- C. 性病隔离
- D. 严密隔离
- E. 引流物-分泌物隔离

33. 模拟题 紫外线杀菌的最佳波长是()

- A. 254nm
- B. 245nm
- C. 250nm
- D. 452nm
- E. 425nm

34. 模拟题 A 区是普通外科,每个病室收治 3 个患者。小王是刚进临床的护校实习学生,小张是她的带教老师,在见习病房清洁、消毒工作时,小张发现小王错误的做法是()

- A. 扫床套“一人一套”
- B. 便器用后消毒
- C. 餐具用后消毒
- D. 小桌擦布“一室一布”
- E. 氧气瓶用消毒液浸泡

35. 模拟题 接触隔离的标志是()

- A. 黄色标志
- B. 橙色标志
- C. 蓝色标志
- D. 棕色标志
- E. 红色标志

36. 模拟题 护士在患者进行妇科检查中正确的配合是()

- A. 应导尿排空膀胱
- B. 取自由体位
- C. 所有患者均做阴道检查准备
- D. 患者所用用具应消毒
- E. 臀垫如无污染,可继续使用

37. 模拟题 隔离衣使用的要求,正确的是()

- A. 每周更换一次
- B. 要保持袖口内外面清洁
- C. 必须完全盖住工作服

- D. 隔离衣潮湿, 晾干后再使用
- E. 隔离衣挂在走廊内应外面向外

38. 模拟题 用戊二酸浸泡金属类用物时, 为了防锈可加入的物质是()

- A. 5%亚硝酸钠
- B. 0.5%亚硝酸钠
- C. 5%碳酸氢钠
- D. 2%碳酸氢钠
- E. 0.5%碳酸氢钠

39. 模拟题 关于化学消毒剂的使用方法, 下列说法不正确的是()

- A. 过氧乙酸可用于浸泡消毒金属器械
- B. 皮肤过敏者不能用碘酊消毒
- C. 新洁尔灭不能与肥皂合用
- D. 碘伏可用于皮肤黏膜的消毒
- E. 戊二醛常用于精密器械的消毒

40. 模拟题 纤维内镜的消毒灭菌宜用()

- A. 酒精浸泡法
- B. 高压蒸汽灭菌法
- C. 戊二醛浸泡法
- D. 煮沸法
- E. 焚烧法

41. 真题 2017-S033 2016年7月23日, 护士铺无菌盘时, 不正确的是()

- A. 所用无菌包的灭菌日期是2016年7月14日
- B. 打开无菌包后, 用无菌持物钳夹取治疗巾
- C. 打开治疗巾时, 手不可触及治疗巾内面
- D. 铺无菌盘时, 不能背对无菌区, 更不能有事离开
- E. 铺好的无菌盘4小时内有效

42. 模拟题 关于手术铺无菌单操作, 以下不正确的是()

- A. 手不能与有菌物品接触
- B. 无菌单铺好后可按需要移动
- C. 手术区周围应铺4~6层
- D. 手术区外周至少铺2层
- E. 无菌单不可与手术衣腰以下的部分接触

43. 模拟题 患者, 男, 48岁。右下肢外伤后未得到正确处理而导致破伤风。为其伤口换药后污染敷料处理方法是()

- A. 过氧乙酸浸泡后清洗
- B. 高压灭菌后再清洗
- C. 丢入污物桶再集中处理
- D. 日光下暴晒再清洗
- E. 送焚烧炉焚烧

44. 模拟题 患者, 女, 40岁。诊断为伤寒, 住院2周。患者口唇干裂, 口温40℃, 脉搏120次/分。患者口腔有异味, 去除口臭宜选用的含漱液是()

- A. 生理盐水

- B. 朵贝尔溶液
- C. 醋酸
- D. 碳酸氢钠溶液
- E. 硼酸溶液

45. 模拟题 患者, 男, 38岁。发热、咳嗽2周, 伴胸痛、气短、极度乏力, 拟诊为艾滋病。体格检查: 体温38度, 双侧颊黏膜散在溃疡、并有白色分泌物; 两肺听诊可闻及湿罗音。血白细胞 $4.0 \times 10^9/L$, $CD4^+/CD8^+$ 比值 <1 , X线提示双肺间质性肺炎。不恰当的护理是()

- A. 严格执行消毒隔离措施
- B. 多与患者沟通, 鼓励患者树立战胜疾病的信心
- C. 给予高热量、高蛋白、高维生素的清淡、易消化饮食
- D. 提供患者与家属、亲友沟通的机会, 获得更多心理支持
- E. 安置患者于隔离病室内, 病室外挂黄色标志进行严密隔离

46. 模拟题 紫外线灯消毒开始计时的时间为从亮灯后()

- A. 4~6分钟
- B. 5~7分钟
- C. 3~5分钟
- D. 2~4分钟
- E. 6~8分钟

47. 模拟题 对芽胞无效的消毒剂是()

- A. 2%戊二醛
- B. 70%酒精
- C. 0.5%过氧乙酸
- D. 37%甲醛溶液
- E. 环氧乙烷

48. 模拟题 患者, 男, 28岁。腹泻来诊, 粪便初为黄水样, 后呈米泔水样便, 并伴烦躁不安、眼窝下陷、精神呆滞。宜采用的隔离措施是()

- A. 严密隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 保护性隔离
- D. 血液隔离
- E. 昆虫隔离

49. 模拟题 患者, 男, 27岁。因车祸导致臀部深部组织感染, 需用苯扎溴铵(新洁尔灭)溶液冲洗伤口。护士发现处置室仅有5%苯扎溴铵10ml, 欲配制伤口冲洗液, 该护士应加蒸馏水至()

- A. 1200ml
- B. 1000ml
- C. 750ml
- D. 650ml
- E. 500ml

50. 模拟题 已打开的无菌包包内剩余物品有效期是()

- A. 4小时

- B. 24 小时
- C. 3 天
- D. 7 天
- E. 14 天

51. 模拟题 对出院患者病床单位的处理下列哪项不妥 ()

- A. 撤下被服送洗
- B. 床垫, 棉被置于日光下曝晒 6 小时
- C. 室内物品用消毒液擦拭
- D. 痰杯, 便盆浸泡于消毒液中
- E. 立即铺好暂空床

52. 真题 2010-S009 菌尘传播其途径是属于 ()

- A. 空气传播
- B. 饮食传播
- C. 生物媒介传播
- D. 直接接触传播
- E. 间接接触传播

53. 真题 2011-S024 护士在执行 PICC 过程中发现手套破损, 此时应 ()

- A. 用无菌纱布覆盖破损处
- B. 用消毒液消毒破损处
- C. 用胶布粘贴破损处
- D. 加戴一副手套
- E. 立即更换手套

54. 真题 2011-S041 绿脓杆菌感染的患者用过的剪刀, 其消毒灭菌的步骤是 ()

- A. 灭菌、清洁, 再灭菌
- B. 清洁后用高压蒸气灭菌
- C. 彻底清洗后, 用化学消毒剂浸泡消毒
- D. 直接采取燃烧法达到灭菌
- E. 与其浸泡消毒后, 再分别清洁灭菌

55. 模拟题 微波消毒灭菌法不适用的物品是 ()

- A. 食品
- B. 金属物品
- C. 玻璃水杯
- D. 化验单据
- E. 医疗药品

56. 真题 2011-S043 可用于黏膜冲洗的溶液是 ()

- A. 0.02% 过氧乙酸
- B. 2% 戊二醛
- C. 0.1% 氯胺
- D. 70% 酒精
- E. 0.5% 碘酊

57. 真题 2011-S046 控制医院感染的关键措施不包括 ()

- A. 隔离传染源
- B. 切断传播途径
- C. 保护易感人群

- D. 加强预防性用药
- E. 定期进行消毒灭菌效果监测

58. 真题 2011-S059 患者, 男, 甲型肝炎住院 20 天治愈出院。护士为其进行终末消毒处理不妥的做法是 ()

- A. 患者洗澡、换清洁衣裤
- B. 个人用物经消毒后带出病区
- C. 被服及时送洗衣房清洗
- D. 室内空气可用喷雾消毒
- E. 病床、桌椅用消毒液擦拭

59. 真题 2011-S086 患儿, 男, 3 岁。因手足口病入院, 某日出现肺水肿, 护士协助医生及时接上呼吸机。医院用品的危险性是指物品污染后对人体造成危害的程度。呼吸机管道属于 ()

- A. 极度危险物品
- B. 高度危险物品
- C. 中度危险物品
- D. 低度危险物品
- E. 无危险物品

60. 真题 2017-S051 取用无菌溶液时, 下列叙述正确的是 ()

- A. 打开瓶盖后, 立即倒入无菌容器中
- B. 可直接在溶液瓶中蘸取
- C. 可用敷料堵住瓶口, 使溶液缓慢流出
- D. 剩余溶液应在开启后 24h 内使用
- E. 溶液倒出后未使用, 应及时倒回瓶中

61. 真题 2011-S087 患儿, 男, 3 岁。因手足口病入院, 某日出现肺水肿, 护士协助医生及时接上呼吸机。呼吸机管道可采取的消毒方法是 ()

- A. 干烤
- B. 日光曝晒
- C. 紫外线灯管照射
- D. 含氯消毒剂溶液浸泡
- E. 洗必泰溶液浸泡

62. 真题 2013-S003 为气性坏疽患者换药后的敷料选择的消毒灭菌法是 ()

- A. 煮沸法
- B. 燃烧法
- C. 干烤法
- D. 紫外线
- E. 压力蒸气

63. 真题 2013-S009 内源性感染是指 ()

- A. 饮食不当引起的感染
- B. 通过医疗器械引起的感染
- C. 患者与患者之间的感染
- D. 患者与医护人员之间的感染
- E. 自身携带病原体引起的感染

64. 真题 2013-S015 飞沫传播属于 ()

- A. 共同媒介传播

- B. 空气传播
- C. 接触传播
- D. 生物媒介传播
- E. 体液传播

65. 真题 2011-S020 关于使用紫外线灯管消毒法, 描述不正确的是()

- A. 用于室内空气消毒时, 距离小于 2m, 时间不少于 30 分钟
- B. 可用乙醇棉球擦拭, 以保持灯管清洁
- C. 照射时患者须戴防护镜、穿防护衣
- D. 消毒时间从紫外线灯亮可开始计时
- E. 定时监测灭菌效果

66. 真题 2010-S100 属于 II 类环境的是()

- A. 层流洁净手术室
- B. 急诊室
- C. 产房
- D. 传染病房
- E. 化验室

67. 真题 2017-S057 一般无菌手套的操作方法正确的是()

- A. 打开无菌手套袋后检查号码及灭菌日期
- B. 手套袋的系带缠好后放在手套袋的内面
- C. 用戴好手套的手捏住另一只手套的内面
- D. 戴好手套的手保持在腰以上水平视线范围
- E. 脱手套时双手分别捏住手套外面翻转

68. 真题 2010-S016 在传染病区内属于半污染区的是()

- A. 值班室
- B. 配餐室
- C. 处置室
- D. 食堂
- E. 医护办公室

69. 真题 2017-S058 属于高效化学消毒剂的是()

- A. 酒精
- B. 过氧乙酸
- C. 碘伏
- D. 氯乙定
- E. 季胺盐类

70. 真题 2010-S017 紫外线杀菌作用最强的波段是()

- A. 250-270Cm
- B. 200-275mm
- C. 250-280mm
- D. 200-275nm
- E. 250-270nm

71. 真题 2010-S022 戴、脱无菌手套的操作方法正确的是()

- A. 打开无菌手套袋后检查号码及灭菌日期
- B. 手套袋的系带缠好后放在手套袋的内面

- C. 用戴好手套的手捏住另一只手套的内面
- D. 戴好手套的手保持在腰以上水平视线范围
- E. 脱手套时双手分别捏住手套外面翻转脱下

72. 真题 2010-S038 使用无菌包的方法, 错误的是()

- A. 将无菌包放在清洁、干燥、平坦处
- B. 依次打开包的外角和左右角, 最后打开内角
- C. 使用无菌持物钳夹取包内无菌物品, 放在准备好的无菌区域内
- D. 如包内物品一次未用完, 可将其按原样折包好, 24 小时内可继续使用
- E. 如无菌包潮湿, 应先烘干再使用

73. 真题 2010-S060 患者, 男, 28 岁。因食用了苍蝇叮咬过的食物, 1 周后出现全身不适、体温 39.0-40℃, 呈稽留热、脉搏 60-70 次/分、表情淡漠。病程第 2 周出现玫瑰疹, 对患者采取的隔离种类是()

- A. 严密隔离
- B. 接触隔离
- C. 昆虫隔离
- D. 肠道隔离
- E. 保护性隔离

74. 真题 2010-S062 患者, 女, 30 岁。因乙型肝炎入传染科住院隔离治疗, 限制其活动, 该患者活动受限是属于()

- A. 焦虑造成活动无力
- B. 运动系统功能受损
- C. 社会因素的需要
- D. 治疗措施需要
- E. 疾病影响机体活动

75. 真题 2010-S096 I 类区域空气卫生学标准为()

- A. 细菌总数 $\leq 10\text{Cfu}/\text{m}^3$
- B. 细菌总数 $\leq 100\text{Cfu}/\text{m}^3$
- C. 细菌总数 $\leq 200\text{Cfu}/\text{m}^3$
- D. 细菌总数 $\leq 400\text{Cfu}/\text{m}^3$
- E. 细菌总数 $\leq 500\text{Cfu}/\text{m}^3$

76. 真题 2010-S097 II 类区域空气卫生学标准为()

- A. 细菌总数 $\leq 10\text{Cfu}/\text{m}^3$
- B. 细菌总数 $\leq 100\text{Cfu}/\text{m}^3$
- C. 细菌总数 $\leq 200\text{Cfu}/\text{m}^3$
- D. 细菌总数 $\leq 400\text{Cfu}/\text{m}^3$
- E. 细菌总数 $\leq 500\text{Cfu}/\text{m}^3$

77. 真题 2010-S098 III 类区域空气卫生学标准为()

- A. 细菌总数 $\leq 10\text{Cfu}/\text{m}^3$
- B. 细菌总数 $\leq 100\text{Cfu}/\text{m}^3$
- C. 细菌总数 $\leq 200\text{Cfu}/\text{m}^3$
- D. 细菌总数 $\leq 400\text{Cfu}/\text{m}^3$
- E. 细菌总数 $\leq 500\text{Cfu}/\text{m}^3$

78. 真题 2010-S099 属于 IV 类环境的是()

- A. 层流洁净手术室

- B. 急诊室
- C. 产房
- D. 传染病房
- E. 化验室

79. 真题 2013-S017 属于高效化学消毒剂的是()

- A. 酒精
- B. 过氧乙酸
- C. 碘伏
- D. 氯己定
- E. 季胺盐类

80. 真题 2017-S068 医院感染的主要对象是()

- A. 住院患者
- B. 医生
- C. 护士
- D. 探视者
- E. 陪伴者

81. 真题 2013-S018 在传染病区内属于清洁区的是()

- A. 值班室
- B. 化验室
- C. 浴室
- D. 病房
- E. 病区走廊

82. 真题 2014-S042 使用无菌容器正确的操作是()

- A. 盖的内面朝下, 以便放置稳妥
- B. 物品取出后, 未污染的物品可放回
- C. 手握容器边缘, 以便持物牢靠
- D. 开盖 30 分钟内盖好, 以防污染
- E. 手指不可触及容器内面及边缘

83. 真题 2014-S043 不宜用燃烧法消毒灭菌的物品是()

- A. 污染的敷料
- B. 治疗碗
- C. 镊子
- D. 拆线剪
- E. 坐浴盆

84. 真题 2014-S044 为防止交叉感染, 具有针对性的措施是()

- A. 一份无菌物品只供一位患者使用
- B. 无菌物品应放在清洁、干燥、固定处
- C. 无菌物品与非无菌物品分开存放
- D. 无菌物品应定期检查有效使用期
- E. 用无菌钳子夹取无菌物品

85. 真题 2014-S045 用 40% 甲醛进行气化消毒时, 需加入的氧化剂是()

- A. 乳酸钾
- B. 乳酸钠
- C. 氯化钾

- D. 氢氧化钾
- E. 高锰酸钾

86. 真题 2014-S080 李女士, 30 岁。5 天前脚趾被玻璃划伤, 近两天发热、厌食、说话受限、咀嚼困难、呈苦笑面容, 急诊入院。接诊护士对患者应施行的隔离方式是()

- A. 严密隔离
- B. 消化道隔离
- C. 呼吸道隔离
- D. 接触性隔离
- E. 保护性隔离

87. 真题 2014-S081 李女士, 30 岁。5 天前脚趾被玻璃划伤, 近两天发热、厌食、说话受限、咀嚼困难、呈苦笑面容, 急诊入院。患者使用过的被服, 正确的处置是()

- A. 先消毒, 后清洗
- B. 先清洗, 后消毒
- C. 先灭菌, 再清洗
- D. 先清洗, 再放日光下暴晒
- E. 先放日光下暴晒, 然后清洗

88. 真题 2014-S098 铺好的无菌盘的有效期是()

- A. 4 小时
- B. 24 小时
- C. 3 天
- D. 7 天
- E. 20 天

89. 真题 2014-S099 无菌溶液打开未用完, 消毒瓶口、瓶塞后盖好, 其有效保存期是()

- A. 4 小时
- B. 24 小时
- C. 3 天
- D. 7 天
- E. 20 天

90. 真题 2014-S100 压力蒸汽灭菌后的无菌物品, 其有效保存期是()

- A. 4 小时
- B. 24 小时
- C. 3 天
- D. 7 天
- E. 20 天

91. 真题 2015-S005 用紫外线灯消毒物品时有效距离和消毒时间分别是()

- A. 25-60cm、20-30 分钟
- B. 25-60cm、10-20 分钟
- C. 15-60mm、20-30 分钟
- D. 25-60mm、10-20 分钟
- E. 25-60mm、5-10 分钟

92. 真题 2014-S041 属于 III 类环境病区的是()

- A. 普通保护性隔离室
- B. 供应室无菌区
- C. 重症监护病房
- D. 注射室
- E. 婴儿室

93. 真题 2014-S040 门诊发现传染病患者时, 应立即采取的措施是()

- A. 转急诊室处理
- B. 消毒候诊环境
- C. 将患者隔离诊治
- D. 安排患者提前就诊
- E. 进行卫生宣教与候诊教育

94. 真题 2013-S023 铺无菌盘的操作方法正确的是()

- A. 用手取出无菌巾后将剩余无菌巾包好, 注明开包日期时间
- B. 操作者的双手不可触及无菌治疗巾的内面
- C. 折叠治疗巾上层呈扇形, 开口边缘向内放入无菌物品
- D. 双手捏住治疗巾上层两角内外面下拉, 覆盖无菌物品
- E. 铺好的无菌盘 12 小时内有效并注明铺盘日期时间

95. 真题 2013-S027 关于医院清洁、消毒、灭菌措施的叙述, 错误的是()

- A. 清洁是用清水等清除物品表面的污垢、尘埃
- B. 清洁常常是物品消毒、灭菌的前期步骤
- C. 清洁可达到杀灭少量病原微生物的效果
- D. 消毒是指用物理或化学方法杀灭除芽胞以外的所有病原微生物
- E. 灭菌是指用物理或化学方法杀灭一切微生物包括芽胞

96. 真题 2013-S028 经启用后不能维持 24 小时内有效的物品是()

- A. 开启过的无菌包
- B. 铺好的无菌盘
- C. 打开过的无菌溶液瓶
- D. 持续进行静脉输液的输液器
- E. 持续使用的留置导尿引流装置

97. 真题 2013-S042 把长 25cm 的持物镊浸泡在消毒液中, 镊子前部浸泡于液面下的部分长度应为()

- A. 5cm
- B. 7.5cm
- C. 10cm
- D. 12.5cm
- E. 15cm

98. 真题 2013-S043 关于无菌技术操作的叙述, 错误的是()

- A. 无菌物品取出来后未被污染, 可再放回无菌容器中备用
- B. 取用无菌物品应使用无菌持物钳

- C. 无菌操作前半小时应停止清扫
- D. 无菌物品与非无菌物品应分开放置
- E. 无菌物品应有明显标志

99. 真题 2013-S049 关于隔离衣使用的叙述, 错误的是()

- A. 隔离衣需全部遮盖工作服
- B. 衣领的内面为清洁面
- C. 隔离衣挂在病房里时应内面向外
- D. 隔离衣应每日更换一次
- E. 隔离衣潮湿后应立即更换

100. 真题 2013-S063 能产生新生态氧, 将菌体蛋白质氧化, 使菌体死亡的化学消毒灭菌剂是()

- A. 戊二醛
- B. 甲醛
- C. 环氧乙烷
- D. 过氧乙酸
- E. 碘伏

101. 真题 2014-S002 关于手的消毒, 错误的是()

- A. 接触被病原微生物污染的物品后只需要进行卫生洗手
- B. 实施侵入性操作前应进行手的消毒
- C. 护理免疫力低下的新生儿前应进行手的消毒
- D. 接触血液、体液和分泌物后应进行手的消毒
- E. 接触传染患者后应进行手的消毒

102. 模拟题 患者, 女, 24 岁。因乏力、厌食、恶心、肝大、血清 GPT 升高就医, 诊断为乙型肝炎, 住院治疗。护士为患者抽取血标本后, 刷洗双手的正确顺序是()

- A. 前臂、腕部、手背、手掌、手指、指缝、指甲
- B. 手指、指缝、手背、手掌、腕部、前臂
- C. 手背、指甲、手掌、手指、腕部、前臂
- D. 前臂、腕部、手背、手指、手掌、指缝、指甲
- E. 手掌、手背、手指、前臂、指甲、腕部

103. 真题 2014-S008 用物理或化学方法消除或杀灭除芽胞以外所有病原微生物使之达到无菌化的过程是指()

- A. 清洁
- B. 除菌
- C. 消毒
- D. 杀菌
- E. 灭菌

104. 真题 2014-S029 女性, 30 岁。因乙型肝炎入传染科住院隔离治疗, 限制其活动。该患者活动受限是属于()

- A. 焦虑造成活动无力
- B. 运动系统功能受损
- C. 社会因素的需要
- D. 治疗措施需要
- E. 疾病影响机体活动

105. 真题 2015-S007 关于煮沸消毒法的叙述, 不正确的是()

- A. 煮沸消毒前先将物品刷洗干净
- B. 物品不宜放置过多, 要保证各部分与水相接触
- C. 从物品放入开始计时消毒时间
- D. 水的沸点受气压影响, 海拔高的地区气压低, 水的沸点也低
- E. 将 1%-2% 的碳酸氢钠加入水中, 除增强杀菌效果外, 还有去污渍的作用

106. 真题 2017-S099 医院内属于高度危险性物品的是()

- A. 衣服
- B. 口罩
- C. 体温表
- D. 枕头条
- E. 输液器

107. 真题 2017-S100 医院内属于中度危险性物品的是()

- A. 衣服
- B. 口罩
- C. 体温表
- D. 枕头条
- E. 输液器

108. 真题 2019-S005 不需要进行保护隔离的是()

- A. 早产儿
- B. 大面积烧伤
- C. 肾脏移植术后患者
- D. 白血病大剂量化疗者
- E. 慢性乙型肝炎患者

109. 真题 2019-S011 已打开过而未被污染的无菌包, 其有效使用时间为()

- A. 4h
- B. 8h
- C. 12h
- D. 16h
- E. 24h

110. 真题 2019-S030 使用燃烧法对无菌持物钳进行消毒灭菌需要的时间是()

- A. 5s
- B. 10s
- C. 15s
- D. 20s
- E. 60s

111. 真题 2019-S033 流行性出血热患者宜采取的隔离种类为()

- A. 接触隔离
- B. 昆虫隔离
- C. 严密隔离
- D. 肠道隔离

E. 呼吸道隔离

112. 真题 2019-S035 不属于医院感染的是()

- A. 住院患者导尿后发生泌尿系感染
- B. 新生儿脐带发炎
- C. 新生儿经胎盘获得的感染
- D. 护理“非典”患者时护士获得的感染
- E. 患者住院第 10 天后出现上呼吸道感染

113. 真题 2019-S046 关于使用紫外线灯管消毒法, 不正确的叙述是()

- A. 用于室内空气消毒时, 距离小于 2 米, 时间 30~60 分钟
- B. 可用乙醇棉球擦拭, 以保持灯管清洁
- C. 照射时患者须戴防护镜, 穿防护衣
- D. 消毒时间从紫外线灯亮时开始计时
- E. 定时监测灭菌效果

114. 真题 2019-S071 油剂灭菌适宜的方法是()

- A. 干烤法
- B. 燃烧法
- C. 日光曝晒法
- D. 臭氧灭菌法
- E. 微波消毒灭菌法

115. 真题 2019-S072 病理标本处理适宜的方法是()

- A. 干烤法
- B. 燃烧法
- C. 日光曝晒法
- D. 臭氧灭菌法
- E. 微波消毒灭菌法

116. 真题 2019-S081 患儿, 男, 3 岁。因手足口病入院, 某日出现肺水肿, 护士应协助医生及时接上呼吸机。医院用品的危险性是指物品污染后对人体造成危害的程度。呼吸机管道属于()

- A. 极度危险物品
- B. 高度危险物品
- C. 中度危险物品
- D. 低度危险物品
- E. 无危险物品

117. 真题 2019-S082 患儿, 男, 3 岁。因手足口病入院, 某日出现肺水肿, 护士应协助医生及时接上呼吸机。呼吸机管道可采取的消毒方法是()

- A. 干烤
- B. 日光曝晒
- C. 紫外线灯管照射
- D. 含氯消毒剂溶液浸泡
- E. 洗必泰溶液浸泡

十三. 给药

1. 真题 2010-S010 需要时(长期)医嘱的外文缩写是

- ()
- A. hs
B. qn
C. prn
D. sos
E. st
2. 真题 2017-S001 每小时一次的外文缩写是()
- A. DC
B. pc
C. qh
D. ac
E. st
3. 真题 2010-S015 冠心病患者舌下给药时,最佳的体位是()
- A. 仰卧位
B. 侧卧位
C. 俯卧位
D. 半卧位
E. 端坐位
4. 真题 2017-S002 肌内注射选用连线法划分部位时,其注射区应选择髂前上棘与尾骨连线的()
- A. 外上 1/3 处
B. 外上 1/2 处
C. 中 1/3 处
D. 后 1/3 处
E. 后 1/2 处
5. 真题 2010-S024 服磺胺类药需多饮水的目的是()
- A. 减轻服药引起的消化道症状
B. 避免结晶析出堵塞肾小管
C. 避免头晕头痛等中枢神经系统反应
D. 增强药物疗效
E. 避免影响造血功能
6. 真题 2010-S025 给患者静脉注射时,液体滴入尚通畅,抽之有回血,局部肿胀不明显,但患者有痛感,可能是()
- A. 针头部分阻塞
B. 针头滑出血管外
C. 针头斜面小部分穿透下面血管壁
D. 静脉痉挛
E. 针头斜面紧贴血管壁
7. 真题 2010-S028 护士履行给药职责的前提是()
- A. 严格遵守安全给药的原则
B. 熟练掌握给药技术和方法
C. 高度责任感和严谨的工作作风
D. 促进疗效减轻药物不良反应
E. 指导患者合理用药
8. 真题 2010-S046 患儿,男,2岁。因肺部感染,需

- 肌内注射青霉素治疗,最佳的注射部位是()
- A. 臀大肌
B. 臀中肌
C. 上臂三角肌
D. 股外侧肌
E. 腹部肌肉
9. 真题 2010-S047 患者,女,35岁。体温 39.2℃,注射青霉素后发生过敏性休克。最佳的处理方法是()
- A. 停药、平卧、注射盐酸肾上腺素,保暖、吸氧
B. 停药、平卧、吸氧、注射抗组胺药物、保暖
C. 停药、平卧、测血压、注射呼吸兴奋剂、保暖
D. 停药、吸氧、保暖、注射阿拉明、平卧
E. 停药、吸氧、保暖、注射地塞米松、平卧
10. 真题 2010-S048 患者,男,39岁。因腿部被铁钉刺伤,急诊入院,医嘱破伤风抗毒素注射,破伤风抗毒素皮试药液浓度为()
- A. 15U/ml
B. 50U/ml
C. 100U/ml
D. 150U/ml
E. 500U/ml
11. 真题 2010-S050 患者,男,24岁。行左上臂脂肪瘤切除术,护士为手术医生取用麻醉剂时,应该首先查对()
- A. 瓶签
B. 瓶身有无裂缝
C. 瓶盖有无松动
D. 溶液澄清度
E. 有效期
12. 真题 2010-S056 患者,女,35岁。支气管哮喘,需用手压式雾化器雾化吸入,操作中不妥的是()
- A. 使用前充分摇匀药液
B. 雾化器接口放于双唇间,闭嘴
C. 深吸气时喷药
D. 每次 1-2 喷
E. 间隔时间 1-2 小时
13. 真题 2010-S058 患者,女,62岁。慢性支气管炎,肺气肿,痰液黏稠,不易咳出,用超声雾化吸入,操作中不妥的是()
- A. 稀释痰液药物应用 α -糜蛋白酶
B. 稀释药液至 50ml,放入雾化罐内
C. 水槽内放热水 250ml
D. 使用时先开电源开关,再开雾化开关
E. 治疗时间 15-20 分钟
14. 真题 2017-S011 接种卡介苗的注射部位为()
- A. 三角肌
B. 股外侧
C. 三角肌下缘

- D. 前臂掌侧下段
- E. 前臂内侧

15. 真题 2010-S061 患者, 男, 34 岁。急性肺炎, 在使用青霉素后发生过敏反应, 出现面色苍白、出冷汗、发绀、血压下降等循环衰竭症状的原因是()

- A. 胃肠道平滑肌痉挛
- B. 呼吸道分泌物增多
- C. 中枢系统缺氧
- D. 皮肤血管收缩
- E. 周围血管扩张

16. 真题 2010-S087 皮内注射法的进针角度为()

- A. 5°
- B. 15° -30°
- C. 30° -40°
- D. 50° -60°
- E. 90°

17. 真题 2010-S088 皮下注射法的进针角度为()

- A. 5°
- B. 15° -30°
- C. 30° -40°
- D. 50° -60°
- E. 90°

18. 真题 2011-S002 严禁用于静脉注射的药物是()

- A. 50%葡萄糖
- B. 10%葡萄糖酸钙
- C. 10%氯化钙
- D. 10%氯化钾
- E. 5%碳酸氢钠

19. 真题 2011-S009 股动脉注射拔针后局部加压时间是()

- A. 1-2 分钟
- B. 3-5 分钟
- C. 5-10 分钟
- D. 10-12 分钟
- E. 12-15 分钟

20. 真题 2017-S016 自安瓿吸取药液操作不妥的是()

- A. 严格执行查对制度
- B. 将安瓿尖端药液弹至体部
- C. 用砂轮在颈部划一锯痕, 折断安瓿
- D. 将针头斜面向下放入安瓿内的液面下吸药
- E. 吸药时不能用手握住活塞

21. 真题 2011-S016 容易潮解的口服药物是()

- A. 酵母片
- B. 胃蛋白酶
- C. 安定
- D. 阿司匹林
- E. 硝酸甘油

22. 真题 2011-S018 发生青霉素过敏性休克时, 临床常最早出现的症状是()

- A. 烦躁不安, 血压下降
- B. 四肢麻木, 头晕眼花
- C. 腹痛、腹泻
- D. 发绀、面色苍白
- E. 皮肤瘙痒、呼吸道症状

23. 真题 2011-S028 氧气雾化吸入时, 正确的是()

- A. 患者呼气时用手指堵住出气管
- B. 药液应稀释在 10ml 以内
- C. 湿化瓶内加冷开水 1/2 瓶
- D. 氧流量调节至 6-8L/min
- E. 嘱患者吸气时松开出气口

24. 真题 2011-S035 患者阴道摄入栓剂后至少平卧 15 分钟的主要目的是()

- A. 保持舒适
- B. 利于观察
- C. 避免药物渗出阴道污染内裤
- D. 利于药物扩散至整个阴道组织
- E. 利于患者进行放松运动

25. 真题 2011-S048 患者臀部肌内注射进针后抽吸有回血的措施是()

- A. 将针头插得深一点后推注药物
- B. 将针头向外拔出一点后推注药物
- C. 拔出针头后更换注射器针头重新进针
- D. 将药物丢弃
- E. 无需处理

26. 真题 2011-S056 患者, 女, 29 岁。呼吸道感染, 咳嗽、咳痰。护士为其进行雾化吸入, 可选择的祛痰药是()

- A. 地塞米松
- B. 庆大霉素
- C. α -糜蛋白酶
- D. 氨茶碱
- E. 舒喘灵

27. 真题 2011-S060 患者, 男, 25 岁。患化脓性扁桃体炎, 在注射青霉素数秒钟后出现胸闷、气促、面色苍白、出冷汗及濒死感, 血压 75/45mmHg, 护士首先采取的急救措施是()

- A. 给予氧气吸入
- B. 针刺人中、内关等穴位
- C. 皮下注射 0.1% 盐酸肾上腺素 1ml
- D. 给予静脉输液
- E. 报告医师

28. 真题 2013-S002 需混合注射几种药物时, 首先应注意的是()

- A. 药物的配伍禁忌
- B. 药物的有效期

- C. 各种药物的剂量
- D. 药物的刺激性
- E. 各种药物浓度

29. 真题 2013-S012 现有 95%乙醇 500ml, 要配制 70%乙醇, 需加入灭菌蒸馏水的量是()

- A. 132ml
- B. 179ml
- C. 185ml
- D. 279ml
- E. 385ml

30. 真题 2013-S036 应放入有色瓶或避光纸盒内、置于阴凉处保存的药物是()

- A. 氨茶碱
- B. 胎盘球蛋白
- C. 胃复安
- D. 糖衣片
- E. 乙醇

31. 真题 2017-S071 做血液气体分析的血标本采集后应密封放置于()

- A. 清洁试管中
- B. 草酸钾抗凝试管中
- C. 无菌试管中
- D. 枸橼酸钠试管中
- E. 肝素抗凝注射器试管中

32. 真题 2013-S040 做血液气体分析的血标本采集后应密封放置于()

- A. 清洁试管中
- B. 草酸钾抗凝试管中
- C. 无菌试管中
- D. 枸橼酸钠试管中
- E. 肝素抗凝注射器中

33. 真题 2013-S041 关于舌下给药的叙述, 错误的是()

- A. 具有药物吸收迅速, 生物利用度高的特点
- B. 将药片置于舌下, 任其自然溶解
- C. 不可将药片吞服
- D. 可以将药片嚼碎吞下
- E. 冠心病患者舌下给药时宜取半坐卧位

34. 真题 2013-S045 不属于“三查七对”的内容是()

- A. 床号、姓名
- B. 药名、浓度
- C. 剂量、方法、时间
- D. 用药后反应
- E. 操作前查、操作中查

35. 真题 2013-S046 临睡前给药的外文缩写是()

- A. st
- B. qd
- C. qh
- D. qn

E. hs

36. 真题 2018-S030 外用溶液具有()

- A. 清洁、消炎作用
- B. 润肤、软化痂皮、保护作用
- C. 保护、收敛作用
- D. 保护、消炎、润肤、止痒作用
- E. 消炎、止痒、杀菌作用

37. 真题 2013-S070 患儿, 女, 9岁。急性扁桃体炎, 医嘱给予青霉素治疗, 用药数天后出现发热、皮肤瘙痒、关节肿痛、淋巴结肿大、腹痛等症状。考虑该患儿出现的情况可能是()

- A. 淋巴结炎
- B. 风湿性关节炎
- C. 皮肤过敏反应
- D. 血清病型反应
- E. 消化道过敏反应

38. 真题 2018-S031 软膏制剂具有()

- A. 清洁、消炎作用
- B. 润肤、软化痂皮、保护作用
- C. 保护、收敛作用
- D. 保护、消炎、润肤、止痒作用
- E. 消炎、止痒、杀菌作用

39. 真题 2013-S071 患儿, 女, 9岁。急性扁桃体炎, 医嘱给予青霉素治疗, 用药数天后出现发热、皮肤瘙痒、关节肿痛、淋巴结肿大、腹痛等症状。该患儿发生的情况常出现在使用青霉素后()

- A. 1-4天
- B. 4-7天
- C. 7-12天
- D. 12-14天
- E. 14-17天

40. 真题 2018-S032 搽剂具有()

- A. 清洁、消炎作用
- B. 润肤、软化痂皮、保护作用
- C. 保护、收敛作用
- D. 保护、消炎、润肤、止痒作用
- E. 消炎、止痒、杀菌作用

41. 真题 2013-S074 患者, 女, 68岁。患糖尿病两年, 住院治疗。医嘱: 胰岛素 8单位三餐前 15分钟皮下注射。实习护士准备执行注射胰岛素医嘱, 需带教教师纠正的操作是()

- A. 常规消毒注射处皮肤
- B. 选用 2ml 注射器
- C. 进行三查七对
- D. 注射部位选择上臂三角肌下缘
- E. 针头与皮肤呈 40°角进针

42. 真题 2013-S066 患儿, 男, 6个月。因支气管炎住院治疗。护士帮助患儿服用止咳药, 正确的做法是()

- A. 先服止咳糖浆，后服维生素
 B. 服止咳糖浆后，喂少量温水
 C. 止咳糖浆与牛奶混匀后一起喂服
 D. 最后喂服止咳糖浆，之后不宜立即喂水
 E. 喂服止咳糖浆后立即喂奶
43. 真题 2013-S075 患者，女，68 岁。患糖尿病两年，住院治疗。医嘱：胰岛素 8 单位三餐前 15 分钟皮下注射。符合无痛技术的一项是()
 A. 加强核对
 B. 做到“两快一慢”
 C. 经常更换注射部位
 D. 严格执行无菌技术
 E. 进针后，注射前无须抽动活塞
44. 真题 2013-S076 患者，女，68 岁。患糖尿病两年，住院治疗。医嘱：胰岛素 8 单位三餐前 15 分钟皮下注射。实习护士为该患者进行胰岛素皮下注射时，针头刺入的深度应是针梗的()
 A. 1/3
 B. 2/3
 C. 3/4
 D. 全部刺入
 E. 针尖斜面
45. 真题 2014-S001 在青霉素治疗过程中，需重做皮试的情况是()
 A. 肌内注射改静脉滴注
 B. 肌内注射每天 2 次改成每天 4 次
 C. 患者本次注射药物因故拖延 2 小时
 D. 复换不同批号的青霉素
 E. 患者病情加重畏冷寒战
46. 真题 2014-S038 超声雾化吸入特点是()
 A. 雾量恒定，方便使用
 B. 雾滴细小，但不均匀
 C. 气雾滴随呼吸最终可以到达段支气管
 D. 气雾通过导管随患者吸气达到肺泡
 E. 产生气雾温度低，治疗后不易着凉
47. 真题 2017-S038 链霉素过敏试验液 0.1ml 含链霉素()
 A. 25 单位
 B. 150 单位
 C. 250 单位
 D. 500 单位
 E. 2500 单位
48. 真题 2014-S047 封某，糖尿病，医嘱皮下注射胰岛素 8Uac30 分，ac 的执行时间是()
 A. 早上 8:00
 B. 晚上 8:00
 C. 临睡前
 D. 饭前
- E. 必要时
49. 真题 2014-S048 为患者稀释痰做雾化吸入，药物首选()
 A. 卡那霉素
 B. 地塞米松
 C. α -糜蛋白酶
 D. 氨茶碱
 E. 沙丁胺醇
50. 真题 2014-S050 女性，39 岁。因上呼吸道感染使用青霉素治疗，在用药后 10 天，出现发热、皮肤瘙痒、关节肿胀、淋巴结肿大、腹痛等现象，根据症状患者最可能出现的是()
 A. 皮肤过敏反应
 B. 呼吸道过敏反应
 C. 消化道过敏反应
 D. 速发型过敏反应
 E. 血清病型反应
51. 真题 2017-S041 患者男，34 岁，急性肺炎，在使用青霉素后发生过敏反应，出现面色苍白，出冷汗，发绀，血压下降等循环衰竭症状的原因是()
 A. 胃肠道平滑肌痉挛
 B. 呼吸道分泌物增多
 C. 中枢系统缺氧
 D. 皮肤血管收缩
 E. 周围血管扩张
52. 真题 2014-S051 患者李某，患肠内阿米巴痢疾，医嘱为口服硫酸巴龙霉素 40-60 万 U，qid，连服 5 天，其中“qid”译成中文的正确含义是()
 A. 每 4 小时 1 次
 B. 每 6 小时 1 次
 C. 每天 2 次
 D. 每天 3 次
 E. 每天 4 次
53. 真题 2014-S052 下列不符合无痛注射原则的一项是()
 A. 患者侧卧位时上腿伸直，下腿弯曲
 B. 进针后、注射前，应抽动活塞
 C. 推注药物的速度宜慢
 D. 注射刺激性强的药物时，进针要深
 E. 多种药物同时注射时，先注射刺激性强的药物，再注射无刺激性的药物
54. 真题 2014-S053 静脉注射过程中，如发现患者局部疼痛、肿胀明显，试抽无回血。可能的原因是()
 A. 静脉痉挛
 B. 针刺入过深，穿破对侧血管壁
 C. 针头斜面一半在血管外
 D. 针头斜面紧贴血管内壁
 E. 针头刺入皮下

55. 真题 2014-S054 静脉注射推药时, 不正确的做法是()

- A. 固定针栓
- B. 快速推注药液
- C. 使患者保持舒适位置
- D. 随时观察患者有无不适
- E. 再次核对所用药物

56. 真题 2014-S055 有关无痛注射正确的叙述是()

- A. 患者注意力要集中
- B. 刺激性强的药物先注射
- C. 取侧卧位, 上腿弯曲
- D. 推注药物的速度要匀而快
- E. 刺激性强的药物做深部注射

57. 真题 2014-S056 下列哪类药物服用后需多饮水()

- A. 铁剂
- B. 止咳糖浆
- C. 助消化药
- D. 健胃药
- E. 磺胺类药

58. 真题 2015-X026 关于采集血液标本的注意事项, 不妥的叙述是()

- A. 避开输液侧肢体
- B. 采血器具应清洁干燥
- C. 不能从输液针头处采血
- D. 尽量缩短止血带压迫血管的时间
- E. 采血后针头贴试管壁缓缓注入试管内

59. 真题 2015-S015 容易潮解的口服药物是()

- A. 酵母片
- B. 胃蛋白酶
- C. 安定
- D. 阿司匹林
- E. 硝酸甘油

60. 真题 2015-S022 易风化潮解的药物应放在()

- A. 阴凉干燥处
- B. 避光纸盒内
- C. 有色瓶中
- D. 密封瓶中
- E. 冰箱冷藏

61. 真题 2015-S049 患者, 女, 35 岁。因糖尿病住院治疗, 医嘱皮下注射普通胰岛素 8 个单位 ac, 执行时间是()

- A. 上午
- B. 饭后
- C. 临睡前
- D. 饭前
- E. 必要时

62. 真题 2015-S050 患者, 男, 32 岁。脚底被铁锈钉刺伤。遵医嘱注射破伤风抗毒素。皮试结果: 红肿大于

1.5cm, 周围红晕达 6cm。采用脱敏注射。正确的注射方法是()

- A. 分 4 等分, 分次注射
- B. 分 5 等分, 分次注射
- C. 分 4 次注射, 剂量渐减
- D. 分 5 次注射, 剂量渐增
- E. 分 4 次注射, 剂量渐增

63. 真题 2015-S056 患者, 男, 66 岁。慢性心功能不全。医嘱地高辛 0.25mgqd, 护士发药前应首先()

- A. 了解心理反应
- B. 测脉率(心率)及脉律(心律)
- C. 观察意识状态
- D. 测量血压
- E. 检查瞳孔

64. 真题 2013-S039 进行氧气雾化吸入时的正确方法是()

- A. 湿化瓶内放水
- B. 药液稀释到 10ml
- C. 吸气时松开出气口
- D. 呼气时按住出气口
- E. 治疗时间 10-15 分钟

65. 真题 2017-S054 护士在整理病室内的常用药物, 对于氨茶碱的保管, 正确的方法是()

- A. 加锁保管
- B. 单独存放
- C. 存放与冰箱中
- D. 装在有色的密闭瓶中, 置于阴凉处
- E. 置于阴凉处, 并远离明火

66. 真题 2015-S063 患者, 女, 65 岁。老年性白内障术后第 3 天, 为预防感染, 需要滴眼药。护士在操作时, 眼药的滴入部位应该是()

- A. 眼上部结膜囊
- B. 眼下部结膜囊
- C. 眼角膜
- D. 上眼睑
- E. 下眼睑

67. 真题 2015-S069 患者, 女, 50 岁。因急性支气管炎遵医嘱用青霉素治疗。用于第 9 天出现发热、关节痛、全身淋巴结肿大、腹痛, 应考虑为()

- A. 消化系统过敏反应
- B. 皮肤过敏反应
- C. 血清病型反应
- D. 合并流行性感冒
- E. 注射部位感染致全身反应

68. 真题 2015-S071 患者, 男, 65 岁。肺心病入院, 护士为其进行静脉穿刺, 进针时有回血, 推药时患者疼痛明显。此时可能出现的问题是()

- A. 针头未刺入血管内
- B. 针头未完全刺入血管内

- C. 针头刺破对侧血管壁
- D. 针头穿透对侧血管壁
- E. 针头滑出血管外

69. 真题 2015-S080 患者, 男, 18 岁。因“急性肺炎”入院。患者神志清楚, 咳嗽、咳痰, 体温 39.5℃。医嘱乙醇拭浴。因患者咳嗽加剧, 痰液黏稠, 遵医嘱超声雾化吸入, 首选药物是()

- A. 庆大霉素
- B. α -糜蛋白酶
- C. 氨茶碱
- D. 沙丁胺醇
- E. 地塞米松

70. 真题 2015-S081 患者, 女, 26 岁。因停经 6 周, 阴道少量出血就诊, 诊断为先兆流产, 需肌内注射黄体酮。吸取药液操作不妥的是()

- A. 认真核对无误
- B. 将安瓿用两手对搓
- C. 消毒安瓿颈部, 折断安瓿
- D. 选择细长针头
- E. 针头斜面向下置入安瓿内面下吸

71. 真题 2015-S082 患者, 女, 26 岁。因停经 6 周, 阴道少量出血就诊, 诊断为先兆流产, 需肌内注射黄体酮。注射时, 患者的正确姿势是()

- A. 上腿伸直, 下腿弯曲
- B. 上腿弯曲, 下腿伸直
- C. 两腿均伸直
- D. 两腿均弯曲
- E. 足尖分开, 足跟相对

72. 真题 2015-S083 患者, 女, 26 岁。因停经 6 周, 阴道少量出血就诊, 诊断为先兆流产, 需肌内注射黄体酮。正确的注射部位是()

- A. 从臀裂顶点向左或向右划一水平线, 从髂前上棘作一垂直线, 取外上 1/4 处避开内角
- B. 髂前上棘和臀裂联线的外上 1/3 处
- C. 示指尖和中指尖分别置髂前上棘和髂嵴下缘, 在髂嵴、示指、中指构成的三角形内角内
- D. 髂前上棘内侧三横指处, 以患者自己手指宽度为标准
- E. 大腿中段外侧, 膝关节以上

73. 真题 2017-S061 护士在发口服药时, 不妥的做法是()

- A. 告诉患者稀盐酸用吸管吸
- B. 告诉患者健胃药应饭前服
- C. 告诉患者止咳糖浆服后应多饮水
- D. 服洋地黄前应测脉率及心律
- E. 患者不在, 将药带回并交班

74. 真题 2016-S018 股动脉注射拔针后局部加压时间是()

- A. 1-2min

- B. 3-5min
- C. 5-10min
- D. 10-12min
- E. 12-15min

75. 真题 2010-S089 肥胖患者进行静脉注射时的进针角度为()

- A. 5°
- B. 15° -30°
- C. 30° -40°
- D. 50° -60°
- E. 90°

76. 真题 2016-S020 超声雾化吸入的目的不包括()

- A. 稀化痰液
- B. 增加吸入氧浓度
- C. 解除支气管痉挛
- D. 减轻呼吸道的炎症
- E. 间歇吸入抗癌药物治疗肺癌

77. 真题 2016-S023 给药方式吸收最快的是()

- A. 口服
- B. 吸入
- C. 皮下注射
- D. 肌内注射
- E. 直肠给药

78. 真题 2016-S028 不符合药物管理原则的是()

- A. 按内服、外用、注射、剧毒等分类保管
- B. 定期检查, 如有异样, 应立即停止使用
- C. 按易挥发、易氧化、易燃易爆等分类保存
- D. 药柜置于光线明亮、阳光直射处, 保持整洁
- E. 病人个人用药单独存放, 并证明床号、姓名

79. 真题 2016-S039 应放入有色瓶或避光纸盒内, 置于阴凉处保存的药物是()

- A. 氨茶碱
- B. 胎盘球蛋白
- C. 胃复安
- D. 糖衣片
- E. 乙醇

80. 真题 2016-S057 患者女, 29 岁。呼吸道感染, 咳嗽, 咳痰。护士为其进行雾化吸入, 可选择的化痰药是()

- A. 地塞米松
- B. 庆大霉素
- C. α -糜蛋白酶
- D. 氨茶碱
- E. 舒喘灵

81. 真题 2015-S032 现有 95%乙醇 500ml, 要配制 70%乙醇, 需加入灭菌蒸馏水的量是()

- A. 132ml
- B. 179ml

- C. 185ml
- D. 279ml
- E. 385ml

82. 真题 2016-S071 患者女, 45 岁。左脚被钉子刺破, 遵医嘱肌肉注射破伤风毒素, 护士配制的 1mlTAT 过敏试验溶液里, 含 TAT 的剂量是()

- A. 15U
- B. 150U
- C. 1500U
- D. 250U
- E. 2500U

83. 真题 2016-S081 患者男, 30 岁。患“化脓性扁桃体炎”, 医嘱青霉素皮试, 护士在做青霉素皮试后约五分钟, 患者突感胸闷, 面色苍白, 出冷汗, 脉细速, 血压下降, 呼之不应。此时患者最可能发生的是()

- A. 心绞痛
- B. 低血容量性休克
- C. 心源性休克
- D. 过敏性休克
- E. 感染性休克

84. 真题 2016-S082 患者男, 30 岁。患“化脓性扁桃体炎”, 医嘱青霉素皮试, 护士在做青霉素皮试后约五分钟, 患者突感胸闷, 面色苍白, 出冷汗, 脉细速, 血压下降, 呼之不应。抢救时首选的药物为()

- A. 异丙肾上腺素
- B. 肾上腺素
- C. 地塞米松
- D. 多巴胺
- E. 去甲肾上腺素

85. 真题 2016-S088 一般患者静脉注射时进针角度是()

- A. $5^{\circ} - 15^{\circ}$
- B. $15^{\circ} - 30^{\circ}$
- C. $30^{\circ} - 40^{\circ}$
- D. $40^{\circ} - 50^{\circ}$
- E. $50^{\circ} - 60^{\circ}$

86. 真题 2016-S089 肥胖患者静脉注射时进针角度是()

- A. $5^{\circ} - 15^{\circ}$
- B. $15^{\circ} - 30^{\circ}$
- C. $30^{\circ} - 40^{\circ}$
- D. $40^{\circ} - 50^{\circ}$
- E. $50^{\circ} - 60^{\circ}$

87. 模拟题 破伤风抗毒素脱敏注射时出现轻微反应的处理是()

- A. 立即停止脱敏注射
- B. 立即皮下注射盐酸肾上腺素
- C. 待反应消退后减量增次注射

- D. 待反应消退后按原量注射
- E. 待反应消退后 1 次注射

88. 模拟题 应放在有色密闭盖瓶内的药物是()

- A. 易氧化的药物
- B. 易潮解的药物
- C. 易燃烧的药物
- D. 易风化的药物
- E. 易挥发的药物

89. 模拟题 为 2 岁以下的婴幼儿做肌内注射时, 不恰当的做法是()

- A. 注射时固定肢体
- B. 选择臀大肌注射
- C. 勿将针梗全部刺入
- D. 注射部位交替使用
- E. 注射时固定针头

90. 模拟题 使用前需要做药物过敏试验的是()

- A. 罗红霉素
- B. 阿奇霉素
- C. 利多卡因
- D. 泛影葡胺
- E. 丁胺卡那

91. 模拟题 股静脉穿刺的部位在()

- A. 股神经外侧
- B. 股动脉内侧
- C. 股动脉外侧
- D. 腹股沟韧带外侧 0.5cm
- E. 腹股沟韧带内侧 0.5cm

92. 模拟题 硫酸铝正确的服用方法是()

- A. 在餐前 1 小时服用
- B. 在餐中服用
- C. 在餐后即刻服用
- D. 在餐后 1 小时口服
- E. 宜睡前服用

93. 模拟题 青霉素注射液要求现用现配, 主要是防止()

- A. 污染
- B. 产生沉淀
- C. 产生青霉烯酸
- D. 产生致热物质
- E. 产生结晶

94. 模拟题 患者, 女, 51 岁。因糖尿病需用胰岛素药物治疗, 控制血糖, 医嘱胰岛素 4U, H, 餐前 30 分钟。“H”中文的正确含义是()

- A. 皮内注射
- B. 皮下注射
- C. 肌内注射
- D. 静脉注射
- E. 静脉滴注

95. 模拟题 挤压近针头端的输液管, 有阻力、无回血应()

- A. 更换针头重新穿刺
- B. 适当提高输液瓶位置
- C. 调整针头位置
- D. 热敷注射部位上端血管
- E. 适当降低患者肢体位置

96. 模拟题 青霉素皮内试验阳性时硬结的直径应大于()

- A. 0.5cm
- B. 1.0cm
- C. 1.5cm
- D. 2.0cm
- E. 2.5cm

97. 模拟题 破伤风皮内试验阳性时硬结的直径应大于()

- A. 0.5cm
- B. 1.0cm
- C. 1.5cm
- D. 2.0cm
- E. 2.5cm

98. 模拟题 患者, 女, 27岁。患慢性咽喉炎。最近上呼吸道感染后咳嗽加剧, 痰黏稠, 医嘱给予超声雾化吸入治疗。为患者治疗的首选药物是()

- A. 拟肾上腺素类药
- B. 沙丁胺醇
- C. 地西洋
- D. α -糜蛋白酶
- E. 氨茶碱

99. 模拟题 患者, 女, 27岁。患慢性咽喉炎。最近上呼吸道感染后咳嗽加剧, 痰黏稠, 医嘱给予超声雾化吸入治疗。护士指导患者做超声雾化吸入时, 操作不妥的是()

- A. 先指导患者有效雾化法
- B. 水槽内加冷蒸馏水水温不可超过 50℃
- C. 嘱患者张嘴深吸气
- D. 吸入时间不超过 20 分钟
- E. 完毕先关雾化开关, 再关电源开关

100. 模拟题 属于中枢兴奋药的是()

- A. 洛贝林
- B. 多巴胺
- C. 氨茶碱
- D. 洋地黄
- E. 利血平

101. 模拟题 下列属于易氧化和遇光变质的药物是()

- A. 硫酸亚铁、葡萄糖酸钙
- B. 维生素 C、氨茶碱
- C. 过氧乙酸、酵母片

D. 疫苗、抗毒血清

E. 乙醚、环氧乙酸

102. 模拟题 为了防止交叉感染应安排下列哪一位患者首先换药()

- A. 压疮创面
- B. 下肢慢性溃疡
- C. 脓肿切开引流
- D. 清创缝合后拆线
- E. 下肢开放性损伤

103. 模拟题 药物保管中, 剧毒药瓶上的标签颜色应是()

- A. 蓝色
- B. 红色
- C. 黑色
- D. 绿色
- E. 黄色

104. 模拟题 肌内注射应选择髂前上棘与尾骨两点连线的()

- A. 外上 1/4 处
- B. 外上 1/3 处
- C. 外上 1/2 处
- D. 中点处
- E. 下 1/2 处

105. 模拟题 成人肌内注射多次注射者最佳部位是()

- A. 股外侧肌
- B. 臀大肌
- C. 臀中肌、臀小肌
- D. 上臂三角肌
- E. 后背

106. 模拟题 宜装瓶盖紧的药物是()

- A. 糖衣片
- B. 维生素
- C. 氨茶碱
- D. 疫苗
- E. 盐酸肾上腺素

107. 模拟题 实施无痛肌内注射的措施, 不妥的是()

- A. 患者侧卧位时上腿弯曲
- B. 患者俯卧位时足尖相对, 足跟分开
- C. 推注药液速度缓慢
- D. 同时注射两种药液时, 应后注射刺激性强的药液
- E. 不在有硬结的部位进针

108. 模拟题 破伤风抗毒素的脱敏注射法是()

- A. 分四次注射, 剂量逐渐递减
- B. 分四次注射, 剂量逐渐递增
- C. 分五次注射, 剂量逐渐递减
- D. 分五次注射, 剂量逐渐递增
- E. 分四等份, 分次注射

109. 模拟题 患者,女,27岁。诊断为缺铁性贫血,护士为其讲述服用铁剂的方法,患者如果复述如出下列哪项说明该护士还需要再详细解服用方法()

- A. 饭后服用
- B. 可以饮浓茶
- C. 与维生素同服
- D. 不能同时喝牛奶
- E. 用吸管吸服铁剂

110. 模拟题 患者拟行结肠镜检查,护士介绍口服硫酸镁清洁肠道的方法,患者询问其与口服甘露醇的不同之处,该护士合适的回答是()

- A. 检查前3天每晚服用
- B. 检查前观察并记录排便次数及性质
- C. 检查前3天半流饮食
- D. 检查前1天流质饮食
- E. 检查前1天下午服用

111. 模拟题 患者,男,25岁。中耳炎,医嘱青霉素过敏试验。过敏试验液的注入皮内剂量为()

- A. 10U
- B. 50U
- C. 100U
- D. 500U
- E. 2500U

112. 模拟题 患者,男,25岁。中耳炎,医嘱青霉素过敏试验。若发生过敏性休克,最早出现的呼吸道症状是()

- A. 胸闷
- B. 打喷嚏
- C. 呼气困难
- D. 吸气困难
- E. 哮喘发作

113. 模拟题 患者,男,25岁。中耳炎,医嘱青霉素过敏试验。该患者皮内注射青霉素1分钟后,局部皮肤发红,面色苍白,考虑不可能出现的情况是()

- A. 晕针
- B. 血清病型反应
- C. 呼吸道过敏反应
- D. 皮肤过敏反应
- E. 过敏性休克

114. 模拟题 患者,男,25岁。中耳炎,医嘱青霉素过敏试验。用药过程中患者出现面色苍白,出冷汗、发绀,脉搏细弱,血压下降,呼吸困难,伴濒死感。遇到上述情况,首先采取的处理措施是()

- A. 立刻平卧,皮下注射0.1%盐酸肾上腺素
- B. 立刻平卧,给予升压药多巴胺
- C. 立即平卧,静脉注射地塞米松
- D. 立即平卧,给予呼吸兴奋药物洛贝林
- E. 立即平卧,静脉注射葡萄糖酸钙

115. 模拟题 患者,女,27岁。上呼吸道感染3天。患者咳嗽、咳黏痰。医嘱:超声雾化吸入,tid。超声雾化吸入治疗的目的不包括()

- A. 治疗呼吸道感染
- B. 减轻咳嗽
- C. 解除支气管痉挛
- D. 湿化呼吸道
- E. 促进食欲

116. 模拟题 患者,女,27岁。上呼吸道感染3天。患者咳嗽、咳黏痰。医嘱:超声雾化吸入,tid。为患者祛痰首选的药物是()

- A. 拟肾上腺素类药
- B. 沙丁胺醇
- C. 舒喘宁
- D. α 糜蛋白酶
- E. 氨茶碱

117. 模拟题 患者,女,27岁。上呼吸道感染3天。患者咳嗽、咳黏痰。医嘱:超声雾化吸入,tid。护士指导患者做超声雾化吸入时,操作不妥的是()

- A. 吸入罐内放药液稀释至30~50ml
- B. 水槽内加冷蒸馏水
- C. 嘱患者张嘴深吸气
- D. 吸入时间不超过20分钟
- E. 完毕,先关雾化开关,再关电源开关

118. 模拟题 下列皮试液1ml含量错误的是()

- A. 青霉素:500U
- B. 链霉素:2500U
- C. 破伤风抗毒素:150U
- D. 细胞色素C:7.5mg
- E. 普鲁卡因:2.5mg

119. 模拟题 密封瓶内抽吸药液的方法,错误的是()

- A. 针头与瓶塞应垂直
- B. 药瓶内应先注入与所需药液等量空气后再抽吸药液
- C. 排气时须以示指扶住针栓
- D. 开启瓶盖后直接抽吸药液
- E. 吸药时针头斜面应向下,空筒容量刻度朝上

120. 模拟题 药物过敏试验是采用()

- A. 皮内注射
- B. 皮下注射
- C. 肌肉注射
- D. 静脉注射
- E. 皮肤用药

121. 模拟题 0.1ml破伤风抗毒素过敏试验液含破伤风抗毒素()

- A. 10U
- B. 15U
- C. 150U
- D. 500U
- E. 1500U

122. 模拟题 服后不宜饮水的药物是()

- A. 健胃消食片
- B. 抗菌优
- C. 止咳糖浆
- D. 扑热息痛(对乙酰氨基酚)
- E. 硫酸亚铁

123. 模拟题 创面肉芽组织鲜红, 硬实, 分泌物不多, 触之易出血, 换药时应用()

- A. 5%氯化钠溶液湿敷
- B. 0.1%雷佛奴尔液湿敷
- C. 凡士林油纱布覆盖
- D. 红外线局部照射
- E. 2%硝酸银烧灼

124. 模拟题 超声雾化吸入的作用不包括()

- A. 防止感染
- B. 解除痉挛
- C. 稀释痰液
- D. 消除炎症
- E. 纠正缺氧

125. 模拟题 应用胰岛素的护理, 不妥的是()

- A. 未开封的胰岛素可保存在4~8℃的冰箱保鲜层中
- B. 使用时应注意剂量换算
- C. 抽药时避免震荡
- D. 两种胰岛素混用时, 应先抽鱼精蛋白锌胰岛素, 再抽正规胰岛素
- E. 胰岛素常采用皮下注射法

126. 真题 2019-S001 肌肉注射选用连线法划分部位时, 其注射区应选择髂前上棘与尾骨两点连线的()

- A. 外上1/3处
- B. 外上1/2处
- C. 中1/2处
- D. 后1/3处
- E. 后1/2处

127. 真题 2019-S009 医嘱苯丙酸诺龙 25mg im biw, 其中biw的中文译意是()

- A. 一天三次
- B. 一天两次
- C. 每周一次
- D. 每周两次
- E. 四小时一次

128. 真题 2019-S014 股动脉注射拔针后局部加压时间是()

- A. 1~2分钟
- B. 3~5分钟
- C. 5~10分钟
- D. 10~12分钟
- E. 12~15分钟

129. 真题 2019-S021 应存放在有色瓶中保存的药物是()

- A. 易氧化的药物
- B. 易潮解的药物
- C. 易挥发的药物
- D. 易燃烧的药物
- E. 易风化的药物

130. 真题 2019-S022 患者, 男, 67岁。慢性支气管炎急性发作, 咳嗽, 咳痰, 痰液黏稠, 伴呼吸困难。护士遵医嘱给予超声波雾化吸入疗法。护士在巡视病房时, 发现雾化器水槽内温度过高, 立即关闭机器并更换冷蒸馏水。说明此时超声雾化吸入器水槽内的温度已经超过了()

- A. 20℃
- B. 30℃
- C. 40℃
- D. 50℃
- E. 60℃

131. 真题 2019-S026 患者, 男, 23岁, 不慎致皮肤外伤10天, 自己处理不当导致皮损部位感染, 局部有大量渗液, 该患者局部用药宜选择的药物制剂为()

- A. 溶液
- B. 软膏
- C. 粉剂
- D. 糊剂
- E. 搽剂

132. 真题 2019-S027 做血液气体分析的血标本采集后应密封放置于()

- A. 清洁试管中
- B. 草酸钾抗凝试管
- C. 无菌试管中
- D. 枸橼酸钠试管中
- E. 肝素抗凝注射器试管中

133. 真题 2019-S037 关于超声雾化吸入的目的, 正确叙述的是()

- A. 抑制细胞活性改善通气
- B. 减少局部血液改善通气
- C. 降低神经细胞兴奋性改善通气
- D. 刺激神经末梢改善通气
- E. 解除呼吸道痉挛改善通气

134. 真题 2019-S045 新生儿接种卡介苗, 正确的做法是()

- A. 用碘伏消毒皮肤
- B. 注射部位在上臂三角肌下缘
- C. 针尖与皮肤呈30~40°角
- D. 刺入深度2/3
- E. 拔针时用干棉签按压快速拔针

135. 真题 2019-S049 护士在药房工作, 进行配药的过

程中不妥的是()

- A. 根据服药本摆药
- B. 先配固体药, 再配水剂
- C. 数种药液可放在同一药杯内
- D. 配完后需重新查对一遍
- E. 查对无误后, 还需另一护士查对无误后方可发药

136. 真题 2019-S063 青霉素过敏性休克, 呼吸道阻塞的临床表现不包括()

- A. 喉头水肿
- B. 支气管痉挛
- C. 胸闷、气促
- D. 呼吸困难
- E. 血压下降

137. 真题 2019-S077 青霉素皮试液每毫升含()

- A. 200U
- B. 150U
- C. 2000U
- D. 2500U
- E. 5000U

138. 真题 2019-S078 破伤风抗毒素皮试液每毫升含()

- A. 200U
- B. 150U
- C. 2000U
- D. 2500U
- E. 5000U

十四. 静脉输液与输血

1. 真题 2016-S065 患者男, 44岁。因食入烙饼, 食管静脉破裂出血约 1000ml。输入大量库存血后, 出现心率缓慢, 手足搐搦, 血压下降、伤口渗血, 出现以上症状的有关因素是()

- A. 血钾升高
- B. 血钾降低
- C. 血钙升高
- D. 血钙降低
- E. 血钠降低

2. 模拟题 静脉痉挛的处理措施为()

- A. 更换针头重新穿刺
- B. 适当提高输液瓶位置
- C. 调整针头位置
- D. 热敷注射部位上端血管
- E. 适当降低患者肢体位置

3. 模拟题 针头斜面紧贴血管壁导致溶液滴注不畅应()

- A. 更换针头重新穿刺
- B. 适当提高输液瓶位置
- C. 调整针头位置
- D. 热敷注射部位上端血管
- E. 适当降低患者肢体位置

4. 真题 2017-S003 输血注意事项错误的是()

- A. 须两人核对无误后方可输入
- B. 输血时可根据需要加入药品
- C. 如用库存血, 必须认真检查库存血质量
- D. 如发生严重反应时, 应立即停止输血
- E. 根据医嘱采集血标本, 要求每次只为一位患者采集

5. 模拟题 护士为患者输血前的准备工作错误的是()

- A. 做血型鉴定及交叉配血试验
- B. 血制品不能加温, 需自然复温
- C. 与血库人员共同做好“三查八对”
- D. 先输入复方氯化钠溶液
- E. 血液从血库取出后勿剧烈振荡

6. 模拟题 输液引起肺水肿的典型症状是()

- A. 发绀、胸闷
- B. 心悸、烦躁不安
- C. 胸痛、咳嗽
- D. 呼吸困难、咯粉红色泡沫样血痰
- E. 面色苍白、血压下降

7. 模拟题 有关输血注意事项下列说法不正确的是()

- A. 每次只能采集一位患者的血标本
- B. 库血取出后室温下放置 15~20 分钟后再输入
- C. 为防止过敏反应, 血液内可少量加入钙剂
- D. 发生严重反应, 应立停止输血
- E. 加压输血需专人守护

8. 模拟题 直接交叉配血试验为()

- A. 受血者血清和供血者红细胞进行配合试验
- B. 受血者红细胞和供血者血清进行配合试验
- C. 受血者血浆和供血者红细胞进行配合试验
- D. 受血者红细胞和供血者血浆进行配合试验
- E. 受血者红细胞和供血者红细胞进行配合试验

9. 模拟题 护士小张为一急性上呼吸道感染患者进行静脉输液治疗, 下列观察项目中不妥当的是()

- A. 患者主诉
- B. 针头是否堵塞
- C. 针头和输液器连接是否紧密
- D. 输液瓶内溶液量
- E. 血压变化

10. 模拟题 患者, 女, 25岁。休克, 护士测得中心静脉压 2cmH₂O, 血压 75/55mmHg, 心率 120 次/分, 尿量每小时 10ml。为增加循环血量可选用的溶液是()

- A. 低分子右旋糖酐
- B. 林格液
- C. 5%碳酸氢钠
- D. 高渗盐水
- E. 中分子右旋糖酐

11. 模拟题 患者, 男, 60岁。肺炎球菌肺炎。护士巡视病房时, 发现其输液不滴, 穿刺部位肿胀, 无回血,

主诉疼痛。应采取的措施为()

- A. 挤压输液管, 使液体通畅
- B. 拔出针头, 另选血管重行穿刺
- C. 升高输液架, 抬高输液瓶
- D. 变换肢体位置
- E. 热敷注射部位上端血管

12. 真题 2017-S010 一般儿童病人输液速度为每分钟()

- A. 10~15 滴
- B. 20~40 滴
- C. 40~60 滴
- D. 70~80 滴
- E. 85~90 滴

13. 模拟题 患者, 男, 60 岁。肺炎球菌肺炎。护士巡视病房时, 发现其输液不滴, 穿刺部位肿胀, 无回血, 主诉疼痛。此患者目前出现的情况最可能为()

- A. 针头阻塞
- B. 压力过低
- C. 静脉痉挛
- D. 针头脱出血管外
- E. 针头斜面紧贴血管壁

14. 真题 2018-S011 一氧化碳中毒的患者需输注的血液制品是()

- A. 浓缩红细胞
- B. 纤维蛋白原
- C. 白细胞浓缩悬液
- D. 血小板浓缩悬液
- E. 洗涤红细胞

15. 模拟题 患者, 男, 60 岁。肺炎球菌肺炎。护士巡视病房时, 发现其输液不滴, 穿刺部位肿胀, 无回血, 主诉疼痛。患者需长时间输液, 应首先选择()

- A. 头静脉
- B. 贵要静脉
- C. 肘正中静脉
- D. 手背静脉
- E. 大隐静脉

16. 模拟题 肖先生, 72 岁。胃癌晚期, 不能进食, 给予脂肪乳、氨基酸等输入, 一周后注射部位沿静脉走向出现条索状红线, 局部组织肿胀、发红, 患者主诉有疼痛感。为该患者输液的目的是()

- A. 纠正水和电解质失调
- B. 补充营养, 供给热能
- C. 输入药物
- D. 增加血容量
- E. 利尿

17. 模拟题 肖先生, 72 岁。胃癌晚期, 不能进食, 给予脂肪乳、氨基酸等输入, 一周后注射部位沿静脉走向出现条索状红线, 局部组织肿胀、发红, 患者主诉有疼痛感。此患者发生静脉炎与下列哪些因素有关()

- A. 输液速度过快
- B. 输液量过大
- C. 溶液含有致热物质
- D. 长期输入高浓度溶液
- E. 输液速度过慢

18. 真题 2017-S014 下列属于胶体液的是()

- A. 0.9%氯化钠溶液
- B. 5%葡萄糖溶液
- C. 10%葡萄糖溶液
- D. 20%白蛋白注射液
- E. 20%甘露醇

19. 真题 2018-S014 患者计划输液 2880ml, 24 小时匀速输入, 所用输液器滴系数为 15, 每分钟滴速为()

- A. 50 滴/分钟
- B. 40 滴/分钟
- C. 20 滴/分钟
- D. 30 滴/分钟
- E. 10 滴/分钟

20. 模拟题 肖先生, 72 岁。胃癌晚期, 不能进食, 给予脂肪乳、氨基酸等输入, 一周后注射部位沿静脉走向出现条索状红线, 局部组织肿胀、发红, 患者主诉有疼痛感。关于静脉炎的防治方法, 下列哪项不妥()

- A. 抬高患肢
- B. 超短波理疗
- C. 95%乙醇局部热敷
- D. 更换注射部位
- E. 患肢活动增加

21. 模拟题 护士巡视病房, 发现患者静脉输液的溶液不滴, 挤压时感觉输液管有阻力, 松手时无回血, 此种情况是()

- A. 输液压力过低
- B. 针头滑出血管外
- C. 静脉痉挛
- D. 针头斜面紧贴血管壁
- E. 针头阻塞

22. 模拟题 输液过程中导致静脉痉挛的原因是()

- A. 输液速度过快
- B. 液体注入皮下组织
- C. 针头阻塞
- D. 患者肢体抬举过高
- E. 输入的药液温度过低

23. 模拟题 溶血反应时尿液量为酱油色, 是因为尿液中含有()

- A. 红细胞
- B. 白细胞
- C. 血红蛋白

- D. 胆红素
- E. 淋巴结

24. 真题 2013-Z032 李女士, 50 岁。胆囊切除术后右下肢多次输液, 发生了血栓性静脉炎, 下列护理方法不对的是()

- A. 右下肢抬高
- B. 局部热敷
- C. 局部按摩
- D. 理疗
- E. 局部制动

25. 模拟题 患者, 男, 35 岁。2 小时前因空洞型肺结核致大咯血急诊入院, 给予静脉输血治疗, 期间出现皮肤潮红、头痛、恶心、呕吐, 测体温 39.8℃ 该患者可能发生()

- A. 过敏反应
- B. 发热反应
- C. 溶血反应
- D. 枸橼酸钠中毒反应
- E. 细菌污染反应

26. 模拟题 患者, 男, 36 岁。因车祸致内脏破裂大出血, 欲行急诊手术治疗。去手术室前, 护士遵医嘱为患者建立静脉通道并行输血治疗。因时间紧, 护士从血库取血后将血袋放入热水中提温, 5 分钟后给患者输入。当输血 10 分钟后, 患者感到头部胀痛, 出现恶心、呕吐、腰背部剧痛。患者最可能出现的反应是()

- A. 高钾血症
- B. 过敏反应
- C. 溶血反应
- D. 酸中毒
- E. 低血钙

27. 模拟题 患者, 男, 36 岁。因车祸致内脏破裂大出血, 欲行急诊手术治疗。去手术室前, 护士遵医嘱为患者建立静脉通道并行输血治疗。因时间紧, 护士从血库取血后将血袋放入热水中提温, 5 分钟后给患者输入。当输血 10 分钟后, 患者感到头部胀痛, 出现恶心、呕吐、腰背部剧痛。此反应产生的最大的可能原因是()

- A. 输入了致敏物质
- B. 输入了库存血
- C. 输入了异型血液
- D. 枸橼酸浓度过高
- E. 血液加温破坏了红细胞

28. 模拟题 患者输血后出现皮肤瘙痒, 荨麻疹, 眼睑口唇水肿应考虑为()

- A. 高钾血症
- B. 过敏反应
- C. 枸橼酸钠中毒反应
- D. 溶血反应
- E. 酸中毒

29. 模拟题 某患者在输血过程中出现畏寒、寒战, 体

温 40℃, 伴头痛、恶心、呕吐, 首先应考虑患者出现了()

- A. 发热反应
- B. 溶血反应
- C. 急性肺水肿
- D. 细菌污染反应
- E. 枸橼酸钠中毒反应

30. 模拟题 患者, 男, 68 岁。因上呼吸道感染诱发慢性阻塞性肺疾病急性发作, 入院后给予抗感染、平喘、祛痰治疗, 输液总量为 800ml, 计划 5 小时输完, 所用输液器滴系数为 15, 则每分钟滴数为()

- A. 30 滴
- B. 35 滴
- C. 40 滴
- D. 45 滴
- E. 50 滴

31. 模拟题 为减轻输血对心血管系统的负荷, 对重症贫血患者尽可能输注()

- A. 浓缩红细胞
- B. 洗涤红细胞
- C. 红细胞悬液
- D. 血浆
- E. 全血

32. 模拟题 某护士为一患淋巴瘤的患者静脉注射氮芥, 患者感局部明显疼痛, 肿胀, 回抽无回血, 立即拔除针头, 但局部仍痛, 下列处理哪项正确()

- A. 局部按摩
- B. 患肢下垂
- C. 麻醉镇痛
- D. 以 50% 硫酸镁湿热敷
- E. 局部冷敷, 以稀硫代硫酸钠局部封闭

33. 真题 2017-S027 低分子右旋糖酐的主要作用是()

- A. 降低血液黏稠度, 改善微循环
- B. 提高血浆胶体渗透压
- C. 补充蛋白质, 改善循环
- D. 补充营养和水分, 减轻水肿
- E. 供给热能, 保持酸碱平衡

34. 模拟题 一般成人静脉输液时滴速宜调至()

- A. 20~40 滴/分
- B. 30~50 滴/分
- C. 40~60 滴/分
- D. 50~70 滴/分
- E. 60~80 滴/分

35. 模拟题 “O” 型患者红细胞膜上存在的抗原是()

- A. “A” 抗原
- B. “B” 抗原
- C. “A、B” 抗原
- D. 无
- E. “D” 抗原

36. 模拟题 为改善患者的微循环, 应选用的溶液是 ()

- A. 5%葡萄糖溶液
- B. 0.9%氯化钠溶液
- C. 10%葡萄糖溶液
- D. 低分子右旋糖酐
- E. 5%碳酸氢钠

37. 模拟题 护士小张为患者进行输血治疗, 其执行过程中不正确的是 ()

- A. 同时采集同病房另一患者的血标本
- B. 库血取出后, 室温放置 15~20 分钟后再输入
- C. 输血前再次与他人核对
- D. 血液中不得随意加入药品
- E. 发生严重反应, 立即停止

38. 模拟题 患者, 女。消化道溃疡久治不愈, 今日输血 10 分钟后患者主诉头痛、发热、四肢麻木, 腰背部剧烈疼痛伴胸闷、气促, 患者可能发生了 ()

- A. 发热反应
- B. 过敏反应
- C. 溶血反应
- D. 空气栓塞
- E. 急性肺水肿

39. 模拟题 枸橼酸钠中毒反应可出现 ()

- A. 少尿、无尿
- B. 喉头水肿
- C. 体温升高达 40℃
- D. 手足抽搐
- E. 穿刺部位大块淤血

40. 模拟题 患者, 男, 36 岁。因车祸致内脏破裂大出血, 欲行急诊手术治疗。去手术室前, 护士遵医嘱为患者建立静脉通道并行输血治疗。因时间紧, 护士从血库取血后将血袋放入热水中提温, 5 分钟后给患者输入。当输血 10 分钟后, 患者感到头部胀痛, 出现恶心、呕吐、腰背部剧痛。此患者将出现的特征性表现是 ()

- A. 四肢麻木
- B. 血压下降
- C. 面部潮红
- D. 心前区压迫感
- E. 黄疸、血红蛋白尿

41. 模拟题 患者, 男, 36 岁。因车祸致内脏破裂大出血, 欲行急诊手术治疗。去手术室前, 护士遵医嘱为患者建立静脉通道并行输血治疗。因时间紧, 护士从血库取血后将血袋放入热水中提温, 5 分钟后给患者输入。当输血 10 分钟后, 患者感到头部胀痛, 出现恶心、呕吐、腰背部剧痛。发生此反应, 护士首要的护理措施是 ()

- A. 吸氧
- B. 观察血压
- C. 立即停止输血
- D. 遵医嘱静脉注射碳酸氢钠

E. 送检剩余血, 重做交叉配血试验

42. 模拟题 患者, 男, 36 岁。因车祸致内脏破裂大出血, 欲行急诊手术治疗。去手术室前, 护士遵医嘱为患者建立静脉通道并行输血治疗。因时间紧, 护士从血库取血后将血袋放入热水中提温, 5 分钟后给患者输入。当输血 10 分钟后, 患者感到头部胀痛, 出现恶心、呕吐、腰背部剧痛。如果患者死亡, 其常见原因是 ()

- A. 心力衰竭
- B. 呼吸衰竭
- C. 过敏性休克
- D. 急性肾衰竭
- E. 感染性休克

43. 模拟题 患者, 男, 70 岁。脑血栓, 医嘱静脉注射 10%葡萄糖酸钙 10ml, st。注射前最重要的工作是 ()

- A. 检查药瓶的标签
- B. 选择合适的注射器
- C. 准备其他物品
- D. 选择合适的血管
- E. 认真核对医嘱

44. 模拟题 患者, 男, 70 岁。脑血栓, 医嘱静脉注射 10%葡萄糖酸钙 10ml, st。静脉注射后, 操作错误的是 ()

- A. 注射后再次核对药物
- B. 注射后快速拔出针头
- C. 拔针后横向按压皮肤进针点
- D. 拔针后纵向按压血管进针点
- E. 注射后再次询问患者有无不适

45. 模拟题 患者, 女, 58 岁。因慢性胆囊炎急性发作入院治疗, 给予抗感染、补液、对症治疗, 日输液量 1000ml。今晨输液过程中, 突然出现胸闷、胸骨后疼痛, 继之呼吸困难、严重发绀, 主诉有濒死感觉, 听诊心前区可闻及一个响亮、持续的“水泡声”。该患者可能发生 ()

- A. 空气栓塞
- B. 急性肺水肿
- C. 过敏反应
- D. 心绞痛
- E. 心肌梗死

46. 模拟题 患者, 女, 58 岁。因慢性胆囊炎急性发作入院治疗, 给予抗感染、补液、对症治疗, 日输液量 1000ml。今晨输液过程中, 突然出现胸闷、胸骨后疼痛, 继之呼吸困难、严重发绀, 主诉有濒死感觉, 听诊心前区可闻及一个响亮、持续的“水泡声”。若发生空气栓塞, 则栓子阻塞部位为 ()

- A. 主动脉口
- B. 左冠状动脉口
- C. 右冠状动脉口
- D. 肺动脉口
- E. 右房室口

47. 模拟题 患者,女,58岁。因慢性胆囊炎急性发作入院治疗,给予抗感染、补液、对症治疗,日输血量1000ml。今晨输液过程中,突然出现胸闷、胸骨后疼痛,继之呼吸困难、严重发绀,主诉有濒死感觉,听诊心前区可闻及一个响亮、持续的“水泡声”。下列处理措施正确的是()

- A. 减慢滴速,密切观察
- B. 加压输液,无须专人守护
- C. 高流量吸氧
- D. 20%~30%乙醇湿化吸氧
- E. 立即停止输液,通知医生配合抢救

48. 模拟题 患者,男,32岁。确诊为再生障碍性贫血,欲行静脉输血治疗,已知其为“O”型血,则其血清中的抗体应为()

- A. 抗B
- B. 抗A
- C. 无
- D. 抗A、抗B
- E. 抗D

49. 模拟题 输血过敏反应可表现为()

- A. 少尿、无尿
- B. 喉头水肿
- C. 体温升高达40℃
- D. 手足抽搐
- E. 穿刺部位大块淤血

50. 模拟题 “Rh”血型阳性者红细胞膜上存在的抗原是()

- A. “A”抗原
- B. “B”抗原
- C. “A、B”抗原
- D. 无
- E. “D”抗原

51. 真题 2011-Z085 患者,女,45岁。因粘连性肠梗阻3天入院。诉口渴、无力、尿少。检查:呼吸26次/分。脉搏100次/分,血压90/60mmHg。皮肤弹性差,眼窝内陷。测血钾3.5mmol/L,CO₂CP13.3mmol/L(正常23-31mmol/L)。若在输液中患者出现呼吸急促,咳粉红色泡沫痰,应立即采取的措施是()

- A. 快速输液
- B. 大量输液
- C. 减慢或停止输液
- D. 正常输液加用强心剂
- E. 正常输液加用糖皮质激素

52. 真题 2016-S047 直接输新鲜血100ml需加入3.8%枸橼酸钠溶液的量是()

- A. 5ml
- B. 10ml
- C. 15ml
- D. 20ml
- E. 25ml

53. 真题 2013-X072 女性,66岁,因肺炎住院。既往有慢性肺源性心脏病病史,输液过程中突然出现呼吸困难、气促、咳嗽、咳出粉红色泡沫样痰。患者发生的情况是()

- A. 急性肺水肿
- B. 右心衰竭
- C. 肺气肿
- D. 支气管哮喘
- E. 肺不张

54. 真题 2013-X073 女性,66岁,因肺炎住院。既往有慢性肺源性心脏病病史,输液过程中突然出现呼吸困难、气促、咳嗽、咳出粉红色泡沫样痰。下列急救措施正确的是()

- A. 继续输液
- B. 给予呼吸兴奋剂
- C. 给予血管收缩药
- D. 给予利尿剂
- E. 采取左侧卧位和头低足高位

55. 真题 2013-S001 患者,男,35岁。因严重贫血需输血治疗,不利于防范医疗事故的操作是()

- A. 对供血者血液按规定进行严格抗原抗体检测
- B. 输血前查血型并进行交叉配血实验
- C. 输血前与患者签订输血协议
- D. 输血时严格查对制度
- E. 输血后马上整理用物,输血袋与输血器按医疗垃圾处理

56. 真题 2013-S029 发生溶血反应时,患者出现黄疸和血红蛋白尿的机制是()

- A. 红细胞凝集成团,阻塞部分小血管
- B. 血红蛋白进入肾小管
- C. 凝集的红细胞溶解,大量血红蛋白散布到血浆中
- D. 血红蛋白遇酸性物质变成结晶体,阻塞肾小管
- E. 肾小管内皮细胞坏死脱落,阻塞肾小管

57. 真题 2013-S044 关于预防输血过敏反应的叙述,错误的是()

- A. 勿选用有过敏史的献血员
- B. 献血员献血前宜食用清淡饮食
- C. 有过敏史的患者输血前给予抗过敏药物
- D. 献血员献血前宜少量食用糖水
- E. 献血前8小时不宜进高蛋白质和高脂肪食物

58. 真题 2013-S052 大量输注库存血时要防止发生()

- A. 碱中毒和低血钾
- B. 碱中毒和高血钾
- C. 低血钾和低血钠
- D. 酸中毒和低血钾
- E. 酸中毒和高血钾

59. 真题 2010-X052 治疗急性肺水肿不恰当的是()

- A. 取坐位,两腿下垂

- B. 口服地高辛
- C. 高流量吸氧
- D. 静脉滴注氨茶碱
- E. 皮下注射吗啡

60. 真题 2017-S053 大量输注库存血时要防止发生()

- A. 碱中毒和低血钾
- B. 碱中毒和高血钾
- C. 低血钾和低血钠
- D. 酸中毒和低血钾
- E. 酸中毒和高血钾

61. 真题 2013-S055 直接输新鲜血 100ml 需加入 3.8% 枸橼酸钠溶液的量是()

- A. 5ml
- B. 10ml
- C. 15ml
- D. 20ml
- E. 25ml

62. 真题 2013-S079 患者, 男, 32 岁。白血病, 血红蛋白 50g/L, 胸痛全身软弱无力, 皮肤、黏膜、指甲苍白。该患者输血的主要原因是()

- A. 大出血
- B. 贫血
- C. 严重感染
- D. 低蛋白血症
- E. 凝血功能异常

63. 真题 2013-S080 患者, 男, 32 岁。白血病, 血红蛋白 50g/L, 胸痛全身软弱无力, 皮肤、黏膜、指甲苍白。护士为患者输血时, 错误的操作是()

- A. 严格执行“三查八对”
- B. 护士操作时戴上手套
- C. 输血前先输入少量生理盐水
- D. 为达到治疗效果, 开始时速度宜快
- E. 两袋血之间输入少量生理盐水

64. 真题 2011-S085 患者, 男, 32 岁。在输液过程中突然出现呼吸困难, 气促。咳粉红色泡沫样痰, 两肺可闻及湿啰音。给予的护理措施中不正确的是()

- A. 立即为患者安置左侧卧位
- B. 安慰患者, 减轻紧张、恐惧心理
- C. 高流量吸氧
- D. 遵医嘱给予镇静药物
- E. 必要时四肢轮流结扎

65. 真题 2011-S084 患者, 男, 32 岁。在输液过程中突然出现呼吸困难, 气促。咳粉红色泡沫样痰, 两肺可闻及湿啰音。可能出现的输液反应是()

- A. 肺栓塞
- B. 肺气肿
- C. 肺水肿
- D. 肺不张
- E. 支气管哮喘

66. 真题 2011-S073 患者, 男, 44 岁。因食入烙饼, 食管静脉破裂出血约 1000ml, 输入大量库存血后, 出现心率缓慢、手足搐搦, 血压下降、伤口渗血, 出现以上症状的有关因素是()

- A. 血钾升高
- B. 血钾降低
- C. 血钙升高
- D. 血钙降低
- E. 血钠降低

67. 真题 2010-S004 静脉输液发生空气栓塞时, 造成患者死亡的原因是空气阻塞了()

- A. 肺动脉入口
- B. 肺静脉入口
- C. 主动脉入口
- D. 上腔静脉入口
- E. 下腔静脉入口

68. 真题 2010-S033 库存血在 4℃ 的环境内可保存()

- A. 24 小时
- B. 48 小时
- C. 72 小时
- D. 1 周
- E. 2-3 周

69. 真题 2010-S074 患者, 男, 27 岁。急性细菌性肠炎 1 天未进食, 医嘱静脉输液: 5%GS 1000ml、0.9%NaCl 500ml、抗生素、VitB₆、VitC、KCl。该患者静脉输液的最主要目的是()

- A. 治疗与补充血容量
- B. 治疗与纠正酸中毒
- C. 治疗与补充水分、电解质
- D. 补充血容量与纠正渗透压
- E. 供给热量

70. 真题 2010-S075 患者, 男, 27 岁。急性细菌性肠炎 1 天未进食, 医嘱静脉输液: 5%GS 1000ml、0.9%NaCl 500ml、抗生素、VitB₆、VitC、KCl。输液的注意事项中, 不正确的是()

- A. 茂菲管液面过高, 拔出瓶内针头降低液面
- B. 茂菲管内液面保持 1/2-2/3 满
- C. KCl 输入出现疼痛时减慢滴速
- D. 更换液体时严格无菌操作
- E. 按照先盐后糖的顺序

71. 真题 2010-S094 免疫性溶血性贫血患者适宜输入的成分血是()

- A. 浓缩红细胞
- B. 洗涤红细胞
- C. 红细胞悬液
- D. 白细胞浓缩悬液
- E. 血小板浓缩悬液

72. 真题 2010-S095 适用于战地急救的成分血是()

- A. 浓缩红细胞
- B. 洗涤红细胞
- C. 红细胞悬液
- D. 白细胞浓缩悬液
- E. 血小板浓缩悬液

73. 真题 2011-S050 一氧化碳中毒患者需输注的血液制品是()

- A. 浓缩红细胞
- B. 洗涤红细胞
- C. 白细胞浓缩悬液
- D. 血小板浓缩悬液
- E. 纤维蛋白原

74. 真题 2011-S061 患者, 男, 65 岁, 肺心病入院。护士为其进行静脉穿刺, 进针时有回血, 推药时患者疼痛明显。此时可能出现的问题是()

- A. 针头未刺入血管内
- B. 针头未完全刺入血管内
- C. 针头刺破对侧血管壁
- D. 针头穿透对侧血管壁
- E. 针头滑出血管外

75. 真题 2014-S046 男性, 44 岁。因食入烙饼, 食管静脉破裂出血约 1000ml, 输入大量库存血后, 出现心率缓慢、手足抽搐、血压下降、伤口渗血。出现以上症状的有关因素是()

- A. 血钾升高
- B. 血钾降低
- C. 血钙升高
- D. 血钙降低
- E. 血钠降低

76. 模拟题 采用颈外静脉穿刺法输液, 其穿刺部位为下颌角与锁骨上缘中点连线之()

- A. 上 1/3 处
- B. 中 1/3 处
- C. 下 1/3 处
- D. 上 2/5 处
- E. 下 2/5 处

77. 真题 2014-S049 颈外静脉穿刺时其正确的进针角度是持穿刺针与皮肤呈()

- A. 45° 进针, 入皮后呈 25° 穿刺
- B. 25° 进针, 入皮后呈 45° 穿刺
- C. 60° 进针, 入皮后呈 15° 进针
- D. 15° 进针, 入皮后呈 60° 进针
- E. 30° 进针, 入皮后呈 36° 进针

78. 真题 2015-S025 用于改善微循环的胶体溶液是()

- A. 中分子右旋糖酐
- B. 代血浆
- C. 5%葡萄糖盐水
- D. 低分子右旋糖酐
- E. 浓缩清蛋白注射液

79. 真题 2015-S030 患者, 男, 23 岁。脾外伤破裂引起出血约 1000ml, 输大量库存血后心率缓慢, 手足抽搐、血压下降、伤口渗血。其原因是()

- A. 血钾升高
- B. 血钙降低
- C. 血钙升高
- D. 血钾降低
- E. 血钠降低

80. 真题 2017-S073 库存血在 4℃ 的环境内可保存()

- A. 24h
- B. 48h
- C. 72h
- D. 1 周
- E. 2~3 周

81. 真题 2015-S059 患者, 男, 72 岁。因胃癌晚期, 不能进食, 需经静脉供给高营养以维持生命, 采用颈外静脉穿刺法输液, 其穿刺部位为下颌角与锁骨上缘中点连线的()

- A. 上 1/3 处
- B. 中 1/3 处
- C. 下 1/3 处
- D. 上 2/5 处
- E. 下 2/5 处

82. 真题 2015-S094 在输血前后, 为防止不良反应发生, 应静脉输入的溶液是()

- A. 复方氯化钠溶液
- B. 5%碳酸氢钠溶液
- C. 0.9%氯化钠溶液
- D. 11.2%乳酸钠溶液
- E. 10%葡萄糖酸钙溶液

83. 真题 2015-S095 为预防枸橼酸钠中毒反应发生, 每输入 1000ml 库存血, 应按医嘱静脉注射的液体是()

- A. 复方氯化钠溶液
- B. 5%碳酸氢钠溶液
- C. 0.9%氯化钠溶液
- D. 11.2%乳酸钠溶液
- E. 10%葡萄糖酸钙溶液

84. 真题 2016-X052 静脉点滴 10%葡萄糖液 200ml, 其中加入 10%氯化钾的最大量为()

- A. 2ml
- B. 3ml
- C. 4ml
- D. 5ml
- E. 6ml

85. 真题 2016-S003 静脉输液发生肺水肿, 应立即停止输液, 其后给予的最简便措施是()

- A. 呼吸机加压给氧
- B. 及时与医生联系

- C. 四肢轮流用止血带结扎
- D. 使病人取端坐位两腿下垂
- E. 静脉缓慢推注强心剂

86. 真题 2016-S025 下列不属于输液反应的是()

- A. 静脉炎
- B. 循环负荷过重反应
- C. 溶血反应
- D. 发热反应
- E. 空气栓塞

87. 真题 2015-X001 治疗急性肺水肿不恰当的是()

- A. 取坐位, 两腿下垂
- B. 口服地高辛
- C. 高流量吸氧
- D. 静脉滴注氨茶碱
- E. 皮下注射吗啡

88. 真题 2014-S086 患者, 吴某, 输血过程中出现头痛、四肢麻木、腰背部剧痛、呼吸急促、血压下降、黄疸等症状。护士可给患者应用热水袋, 放置于()

- A. 足底
- B. 腹部
- C. 腰部
- D. 背部
- E. 腋窝处

89. 真题 2014-S085 患者, 吴某, 输血过程中出现头痛、四肢麻木、腰背部剧痛、呼吸急促、血压下降、黄疸等症状。患者尿液中可含有()

- A. 红细胞
- B. 淋巴液
- C. 大量白细胞
- D. 胆红素
- E. 血红蛋白

90. 真题 2014-S057 大量输注库存血后要防止发生()

- A. 碱中毒和低血钾
- B. 碱中毒和高血钾
- C. 酸中毒和低血钾
- D. 酸中毒和高血钾
- E. 低血钾和低血钠

91. 真题 2014-S058 溶血反应发生时, 护士首先应()

- A. 通知医生
- B. 立即停止输血
- C. 测量血压及尿量
- D. 皮下注射肾上腺素
- E. 静脉滴注 4% 碳酸氢钠

92. 真题 2014-S059 输血引起枸橼酸钠中毒反应的表现是()

- A. 寒战、发热、恶心、呕吐
- B. 四肢麻木、腰背剧痛、胸闷
- C. 手足抽搐、心率缓慢、出血倾向

- D. 呼吸困难、咳粉红色泡沫样痰
- E. 血管神经性水肿伴呼吸困难

93. 真题 2014-S060 中分子右旋糖酐的主要作用是()

- A. 提高血浆胶体渗透压
- B. 补充蛋白质, 改善循环
- C. 供给热能, 保持酸碱平衡
- D. 补充营养和水分, 减轻水肿
- E. 降低血液黏稠度, 改善微循环

94. 真题 2014-S061 一氧化碳中毒患者需输注的血液制品是()

- A. 浓缩红细胞
- B. 洗涤红细胞
- C. 白细胞浓缩悬液
- D. 血小板浓缩悬液
- E. 血浆

95. 真题 2014-S062 叶先生, 26 岁。因患白血病住院治疗, 为增加其机体抵抗力, 可给予输入的血液制品是()

- A. 洗涤红细胞
- B. 白细胞浓缩悬液
- C. 血小板浓缩悬液
- D. 库存血
- E. 新鲜血

96. 真题 2014-S082 女性, 66 岁。因肺炎住院, 既往有慢性肺源性心脏病病史, 输液过程中突然出现呼吸困难、气促、咳嗽、咳出粉红色泡沫样痰。患者发生的情况是()

- A. 急性肺水肿
- B. 右心衰竭
- C. 肺气肿
- D. 支气管哮喘
- E. 肺不张

97. 真题 2014-S083 女性, 66 岁。因肺炎住院, 既往有慢性肺源性心脏病病史, 输液过程中突然出现呼吸困难、气促、咳嗽、咳出粉红色泡沫样痰。下列急救措施正确的是()

- A. 继续输液
- B. 给予强心剂
- C. 给予血管收缩药
- D. 10% 乙醇湿化吸氧
- E. 采取左侧卧位和头低足高位

98. 真题 2014-S084 患者, 吴某, 输血过程中出现头痛、四肢麻木、腰背部剧痛、呼吸急促、血压下降、黄疸等症状。该患者因输血发生了()

- A. 发热反应
- B. 过敏反应
- C. 溶血反应
- D. 急性肺水肿
- E. 枸橼酸钠中毒反应

99. 真题 2016-S035 小儿头皮静脉穿刺如果误入动脉, 局部可表现为()

- A. 无大变化
- B. 充血、发绀
- C. 条索状红线
- D. 苍白、水肿
- E. 呈树枝分布状苍白

100. 模拟题 输液速度的调节与下列哪项无关()

- A. 药液的浓度
- B. 药液的刺激性
- C. 输液量的多少
- D. 患者的年龄
- E. 治疗的要求

101. 真题 2019-S025 下列预防溶血反应的措施, 不正确的是()

- A. 认真做好血型鉴定和交叉配血试验
- B. 严格执行血液保存规定
- C. 输血前肌注异丙嗪
- D. 严格执行查对制度
- E. 血液不能加温、震荡

102. 真题 2019-S028 患者, 男, 34 岁。因呕血, 黑便来院就诊。查体: 神志清楚, 面色苍白; BP84/50mmHg。考虑血容量不足需补充液体, 应输入的溶液是()

- A. 5%碳酸氢钠
- B. 氨基酸
- C. 20%甘露醇
- D. 中分子右旋糖酐
- E. 浓缩白蛋白

103. 真题 2019-S043 患者, 男, 26 岁。因患白血病住院治疗, 为增加其机体抵抗力, 可给予输入的血液制品是()

- A. 洗涤红细胞
- B. 白细胞混浓缩混悬液
- C. 血小板浓缩悬液
- D. 库存血
- E. 新鲜血

104. 真题 2019-S055 在血管内溶血反应中, 出现黄疸、血红蛋白尿的原因()

- A. 血管痉挛
- B. 红细胞凝集
- C. 红细胞溶解
- D. 血小板释放
- E. 血红蛋白遇酸结晶

105. 真题 2019-S060 小儿头皮静脉穿刺如果误入动脉, 局部可表现为()

- A. 无大变化
- B. 苍白水肿
- C. 条索状红线

- D. 充血、发绀
- E. 呈树枝分布状苍白

十五. 冷热疗法

1. 模拟题 床上擦浴擦洗上肢和胸腹部时, 为肢体活动障碍的患者脱穿衣服的正确顺序是()

- A. 先脱近侧, 后脱远侧
- B. 先脱远侧, 后脱近侧
- C. 先穿健肢, 再穿患肢
- D. 先穿近侧, 再穿远侧
- E. 先脱健侧, 后脱患侧

2. 真题 2018-S002 面部危险三角区感染时禁用热疗的主要原因是()

- A. 热疗可促进血液循环, 加重皮下出血、肿胀和疼痛
- B. 热疗可导致细菌入血, 使炎症扩散, 造成颅内感染
- C. 受伤范围小, 热疗不方便、效果差
- D. 局部皮肤敏感性差, 容易烫伤
- E. 缓解疼痛后, 会掩盖病情贻误诊断和治疗

3. 模拟题 痔疮患者热水坐浴时, 水温应为()

- A. 40~45℃
- B. 50~55℃
- C. 50℃以内
- D. 60℃以内
- E. 70℃以内

4. 真题 2018-S003 关于热疗的应用目的, 正确的叙述是()

- A. 促进浅表炎症消退和局限
- B. 抑制炎症的扩散
- C. 减轻局部充血或出血
- D. 传导发散体内的热
- E. 提高痛觉神经的兴奋性

5. 模拟题 下列红外线烤灯的使用, 说法错误的是()

- A. 暴露治疗部位
- B. 皮肤出现红斑为剂量合适
- C. 灯距为 20~30cm
- D. 时间为 20~30 分钟
- E. 照射后应休息 15 分钟后再离开

6. 模拟题 患者, 女, 20 岁。踝关节扭伤 12 小时, 经检查局部肿胀、疼痛明显, 需进行冷敷, 其目的是()

- A. 减轻深部组织充血
- B. 促进炎症局限
- C. 减轻局部充血、疼痛
- D. 使局部血管扩张, 减轻充血
- E. 促进末梢循环

7. 模拟题 患者, 男, 25 岁。右前臂 II 度烧伤 5 天, 局部创面湿润、疼痛, 可在局部进行()

- A. 湿热敷
- B. 红外线灯照射

- C. 湿冷敷
- D. 放置热水袋
- E. 放置冰袋

8. 真题 2016-Z011 会阴热敷治疗时,热敷面积一般是病损范围的()

- A. 相等大小
- B. 1 倍大小
- C. 2 倍大小
- D. 3 倍大小
- E. 4 倍大小

9. 真题 2016-S069 患者女,19 岁。爬山时左踝部扭伤,导致局部肿胀、疼痛,立即来医院就诊,正确的处理措施是()

- A. 按摩患处
- B. 热湿敷
- C. 局部用冰块冷敷
- D. 局部用热水袋热敷
- E. 用红外线烤灯照射

10. 真题 2016-S034 使用冰帽物理降温,肛温不得低于()

- A. 37℃
- B. 36℃
- C. 35℃
- D. 33℃
- E. 30℃

11. 模拟题 采用热疗法促进炎症后期炎症局限的机制是()

- A. 解除肌肉痉挛
- B. 促进软组织松弛
- C. 降低细胞新陈代谢
- D. 溶解坏死组织
- E. 降低神经兴奋性

12. 模拟题 使用冰帽或冰槽的患者,应注意监测患者()

- A. 血压的变化,发现血压异常立即停止使用
- B. 注意患者瞳孔的变化,发现瞳孔异常说明出现并发症立即停止使用
- C. 监测肛温在 33℃左右,不低于 30℃,以防止心室纤颤等并发症出现
- D. 注意监测血氧分压和血氧饱和度的变化
- E. 注意监测呼吸的变化,发现异常呼吸立即停止使用

13. 模拟题 麻醉未清醒的患者使用热水袋保暖时,水温应为()

- A. 40-45℃
- B. 50-55℃
- C. 50℃以内
- D. 60℃以内
- E. 70℃以内

14. 真题 2018-S012 乙醇擦浴时所用乙醇的浓度为()

- A. 45%~55%
- B. 25%~35%
- C. 40%~45%
- D. 55%~65%
- E. 35%~40%

15. 模拟题 组织损伤破裂的患者局部禁用冷疗的原因是()

- A. 防止冻伤
- B. 以防引起反射性心率减慢、心房纤颤或心室纤颤及房室传导阻滞
- C. 以防引起腹泻
- D. 因冷疗可降低血液循环,增加组织损伤,且影响伤口愈合
- E. 以防反射性末梢血管收缩,影响散热或引起一过性冠状动脉收缩

16. 模拟题 对热疗的作用描述正确的是()

- A. 促进浅表炎症消退和局限
- B. 早期可防止炎症的扩散
- C. 减轻局部出血
- D. 传导散发体内的热
- E. 提高痛觉神经的兴奋性

17. 模拟题 脑外伤的患者头部用冰帽的目的是()

- A. 收缩毛细血管,减轻充血和出血
- B. 减少脑细胞耗氧,利于脑细胞功能恢复
- C. 降低神经的兴奋性,减轻疼痛
- D. 促使白细胞释放蛋白溶解酶,溶解坏死组织
- E. 降低毛细血管通透性,减轻组织压迫

18. 模拟题 在炎症后期用热疗的目的是()

- A. 收缩毛细血管,减轻充血和出血
- B. 减少脑细胞耗氧,利于脑细胞功能恢复
- C. 降低神经的兴奋性,减轻疼痛
- D. 促使白细胞释放蛋白溶解酶,溶解坏死组织
- E. 降低毛细血管通透性,减轻组织压迫

19. 模拟题 患者,男,22 岁。腰背部肌肉拉伤,给予冷疗,护士向患者介绍如需反复使用冷疗,中间要间隔()

- A. 20 分钟
- B. 30 分钟
- C. 50 分钟
- D. 1 小时
- E. 1.5 小时

20. 模拟题 患者,女,21 岁。眼部整形术后局部有少量出血及眼部肿胀,护士为配合止血可在眼部()

- A. 用手掌根部压迫上下眼睑
- B. 放置冰囊
- C. 局部涂凡士林保护皮肤,放置热水袋,注意避免烫伤
- D. 进行红外线照射

E. 用 50%硫酸镁进行湿热敷

21. 模拟题 乙醇擦浴时主要的散热方式为()

- A. 发热
- B. 对流
- C. 传导
- D. 蒸发
- E. 传递

22. 真题 2016-S022 婴幼儿使用热水袋的水温应低于()

- A. 45℃
- B. 50℃
- C. 55℃
- D. 60℃
- E. 65℃

23. 真题 2016-S010 关于冷疗影响因素的叙述, 不正确的是()

- A. 在相同温度下, 湿冷的效果优于干冷
- B. 用冷时间越长, 效果越好
- C. 用冷面积越大, 效果越强
- D. 皮肤较薄的区域对冷的敏感性强
- E. 老年人较年轻人对冷刺激反应迟钝

24. 模拟题 应用冷疗的目的是()

- A. 降低神经末梢敏感性
- B. 减轻深部组织的充血
- C. 增加毛细血管通透性
- D. 使毛细血管扩张
- E. 加速血液循环

25. 真题 2016-J063 不属于人体散热主要方式的是()

- A. 蒸发
- B. 辐射
- C. 对流
- D. 传导
- E. 呼吸

26. 真题 2013-S022 禁忌乙醇擦拭的部位是()

- A. 颈前颌下
- B. 腋窝
- C. 腹股沟
- D. 肘窝
- E. 足底

27. 真题 2013-S010 关于冷疗的叙述, 不正确的是()

- A. 在相同温度下, 湿冷的效果优于干冷
- B. 用冷时间越长, 效果越好
- C. 用冷面积越大, 效果越强
- D. 皮肤较薄的区域对冷的敏感性强
- E. 老年人较年轻人对冷刺激反应迟钝

28. 真题 2011-S038 高热患者体温达 39.8℃, 为其降温时最佳的措施是()

A. 头部置冰帽

B. 乙醇拭浴

C. 腋下及腹股沟置冰袋

D. 头部冷湿敷

E. 头部用冰帽

29. 真题 2011-S037 冷、热疗法如需反复使用, 为防止继发效应, 中间应间隔()

- A. 20 分钟
- B. 30 分钟
- C. 45 分钟
- D. 1 小时
- E. 3 小时

30. 真题 2011-S032 禁用热水坐浴的疾病是()

- A. 盆腔感染炎症
- B. 内痔手术后
- C. 会阴疾患
- D. 外阴部充血
- E. 肛裂感染

31. 真题 2017-S028 高热病人体温高达 39.8℃, 为其物理降温的最佳措施是()

- A. 头部置冰袋
- B. 乙醇擦浴
- C. 颈腋下及腹股沟置冰袋
- D. 头部冷湿敷
- E. 头部用冰帽

32. 真题 2011-S026 乙醇擦浴时所用乙醇的浓度为()

- A. 55%-65%
- B. 45%-55%
- C. 40%-45%
- D. 35%-40%
- E. 25%-35%

33. 真题 2014-S064 面部危险三角区感染时禁用热疗的主要原因是()

- A. 热疗可促进血液循环, 加重皮下出血、肿胀和疼痛
- B. 热疗可导致细菌入血, 使炎症扩散, 造成颅内感染
- C. 受伤范围小, 热疗不方便、效果差
- D. 局部皮肤敏感性差, 容易烫伤
- E. 缓解疼痛后, 会掩盖病情, 耽误诊断和治疗

34. 真题 2010-S086 患者, 男, 32 岁。因脑外伤入院, 神志不清。查体: 体温 39.8℃, 脉搏 65 次/分, 呼吸 16 次/分, 血压 160/90mmHg, 医嘱给予降温, 静脉滴注甘露醇。为患者降温时应注意肛温不得低于()

- A. 33℃
- B. 30℃
- C. 35℃
- D. 35.5℃
- E. 36℃

35. 真题 2017-S031 用冷或用热超过一定时间, 会产

生继发效应，冷热疗法适宜的时间为()

- A. 10~20min
- B. 20~30min
- C. 30~40min
- D. 40~50min
- E. 50~60min

36. 真题 2010-S085 患者，男，32 岁。因脑外伤入院，神志不清。查体：体温 39.8℃，脉搏 65 次/分，呼吸 16 次/分，血压 160/90mmHg，医嘱给予降温，静脉滴注甘露醇。此时降温的主要目的是()

- A. 减轻充血
- B. 减轻出血
- C. 减轻脑水肿
- D. 促进炎症局限
- E. 加速神经冲动传导

37. 真题 2013-S067 患者，女，78 岁。因腹泻待查收入院。患者四肢冰冷，护士用热水袋进行保暖。正确的操作措施是()

- A. 热水袋灌入水至 1/2-2/3 满
- B. 调节热水袋水温至 60-70℃
- C. 热水袋放置时，袋口朝向身体内侧
- D. 使用时将热水袋与患者皮肤直接接触
- E. 使用过程中发现皮肤潮红、疼痛，应暂停 10 分钟后使用

38. 真题 2013-Z028 对感觉障碍的患者，下列护理措施中哪项不妥()

- A. 缓解患者紧张不安的情绪
- B. 避免患处重压，防止压疮
- C. 对感觉障碍的患肢，使用暖水袋保暖
- D. 避免搔抓患处，以防损伤造成感染
- E. 衣服应柔软宽松，以减少对皮肤的刺激

39. 真题 2015-Z049 患者，女，26 岁。下楼梯时右脚踝关节不慎扭伤，24 小时之内的正确处理是()

- A. 热敷
- B. 冷敷
- C. 先热敷 30 分钟，再冷敷 30 分钟
- D. 先冷敷 12 小时，再热敷 12 小时
- E. 热敷和冷敷交替进行

40. 真题 2015-S079 患者，男，18 岁。因“急性肺炎”入院。患者神志清楚，咳嗽、咳痰，体温 39.5℃。医嘱乙醇拭浴。乙醇拭浴时，冰袋不宜放置在患者的()

- A. 头部
- B. 腋下
- C. 腹股沟
- D. 手心
- E. 足底

41. 真题 2015-S052 患者，女，23 岁。急性胃肠炎，腹痛，怕冷，所以在患者腹部()

- A. 放置热水袋

- B. 湿热敷
- C. 红外线照射
- D. 湿冷敷
- E. 乙醇按摩

42. 真题 2015-S012 属于冷疗禁忌证的是()

- A. 牙痛
- B. 鼻出血
- C. 全身微循环障碍
- D. 扁桃体摘除术后
- E. 软组织扭伤初期

43. 模拟题 下列患者使用热水袋时水温可以为 60~70℃ 的是()

- A. 昏迷患者
- B. 瘫痪患者
- C. 婴幼儿患者
- D. 腹泻患者
- E. 老年患者

44. 真题 2014-S063 乙醇拭浴时，禁忌擦拭的部位有()

- A. 头部、四肢
- B. 手掌、肘窝
- C. 腋窝、腹股沟
- D. 前胸、腹部
- E. 腰背部

45. 真题 2014-S039 女性，20 岁。踝关节扭伤 12 小时，经检查局部肿胀、疼痛明显，需进行冷敷，其目的是()

- A. 减轻深部组织充血
- B. 促进炎症局限
- C. 减轻局部出血、疼痛
- D. 使局部血管扩张
- E. 促进末梢循环

46. 真题 2015-S036 为防止脑水肿，用冰槽降温时患者的肛温维持在()

- A. 25℃
- B. 28℃
- C. 30℃
- D. 33℃
- E. 35℃

47. 真题 2014-S003 高热患者行乙醇拭浴时，其散热方式是()

- A. 辐射
- B. 对流
- C. 蒸发
- D. 传导
- E. 接触

48. 真题 2010-S084 患者，男，32 岁。因脑外伤入院，神志不清。查体：体温 39.8℃，脉搏 65 次/分，呼吸 16 次/分，血压 160/90mmHg，医嘱给予降温，静脉滴注甘

露醇。此时最主要的降温方式是()

- A. 乙醇拭浴
- B. 温水拭浴
- C. 腋窝置冰袋
- D. 头部戴冰帽
- E. 腹股沟置冰袋

49. 模拟题 忌用冷疗的疾病是()

- A. 急性关节扭伤
- B. 慢性炎症
- C. 牙痛
- D. 烫伤
- E. 脑外伤

50. 模拟题 对使用冰袋的患者应注意观察()

- A. 瞳孔的变化
- B. 尿液的性质
- C. 粪便的性质
- D. 用冷部位情况, 皮肤色泽, 防止冻伤
- E. 血压的变化

51. 真题 2017-S047 在炎症早期用冷疗的目的是()

- A. 增强新陈代谢和白细胞的吞噬功能
- B. 降低细胞新陈代谢和微生物的活力
- C. 促进炎性分泌物的吸收和消散
- D. 物理作用使体内的热通过传导散发
- E. 通过传导和蒸发的作用使体温降低

52. 真题 2017-S059 下列病人使用热水袋时, 水温可以为 60℃~70℃的是()

- A. 昏迷病人
- B. 瘫痪病人
- C. 婴幼儿病人
- D. 老年病人
- E. 腹泻病人

53. 真题 2019-S083 患者, 男, 33 岁。左踝部关节扭伤 3 天, 左脚擦伤, 行温水浸泡。该患者进行温水浸泡时, 不妥的是()

- A. 浸泡盆可反复使用
- B. 水温保持在 43℃~46℃
- C. 调节室温
- D. 暴露患处, 取坐姿
- E. 用无菌纱布清洁创面

54. 真题 2019-S080 使用冰帽物理降温, 肛温不得低于()

- A. 30℃
- B. 33℃
- C. 36℃
- D. 39℃
- E. 42℃

55. 真题 2013-J057 不属于人体散热主要方式的是()

- A. 蒸发

- B. 辐射
- C. 对流
- D. 传导
- E. 呼吸

56. 真题 2019-S079 取下头部冰袋的条件是全身用冷后 30min, 所测体温应低于()

- A. 30℃
- B. 33℃
- C. 36℃
- D. 39℃
- E. 42℃

57. 真题 2019-S074 热水坐浴的水温是()

- A. 30~40℃
- B. 40~45℃
- C. 45~50℃
- D. 50~60℃
- E. 60~70℃

58. 真题 2019-S073 热湿敷的水温是()

- A. 30~40℃
- B. 40~45℃
- C. 45~50℃
- D. 50~60℃
- E. 60~70℃

59. 真题 2019-S084 患者, 男, 33 岁。左踝部关节扭伤 3 天, 左脚擦伤, 行温水浸泡。患者浸泡部位有伤口, 护士在操作过程中, 应尤其注意的是()

- A. 伤口处敷以鱼石脂软膏
- B. 屏风遮挡患者
- C. 关闭门窗, 注意保暖
- D. 保持床单位清洁
- E. 运用无菌操作技术

十六. 病情观察

1. 模拟题 患者, 男, 46 岁。诊断为蛛网膜下隙出血, 遵医嘱给予 20%甘露醇 250ml, 快速静脉滴注, 护士应注意观察()

- A. 有无过敏反应
- B. 有无心慌、出冷汗、神志不清等低血糖反应
- C. 观察其尿量及有无电解质紊乱的现象
- D. 观察体温的变化, 有无虚脱或休克的发生
- E. 观察血压变动

2. 模拟题 患者面容枯槁, 面色灰白或发绀, 表情淡漠为()

- A. 肝病面容
- B. 肾病面容
- C. 病危面容
- D. 甲状腺功能亢进面容
- E. 二尖瓣面容

3. 模拟题 格拉斯哥评分量表, 总分范围为()

- A. 1~10 分
- B. 3~15 分
- C. 5~20 分
- D. 10~25 分
- E. 15~25 分

4. 模拟题 患者, 男, 37 岁。诊断为急性化脓性腹膜炎, 因未及时治疗导致败血症, 该患者发热时常见的热型是()

- A. 间歇热
- B. 波浪热
- C. 不规则热
- D. 回归热
- E. 弛张热

5. 真题 2018-X004 意识全部丧失, 所有反射均消失的状态称为()

- A. 嗜睡
- B. 昏睡
- C. 意识模糊
- D. 浅昏迷
- E. 深昏迷

6. 模拟题 患者, 男, 38 岁。因车祸受伤入院, 患者入院后神志不清, 各种反射消失, 单侧瞳孔扩大、固定, 手术回病房后, 发现患者呼吸道分泌物较多, 遵医嘱给予吸痰治疗。患者入院时意识障碍属于()

- A. 意识模糊
- B. 嗜睡
- C. 浅昏迷
- D. 深昏迷
- E. 谵妄

7. 模拟题 患者, 男, 59 岁。开放性骨折合并感染, 体温 39℃ 左右, 有时高低不一, 日差在 2℃; 左右, 连续 5 天不退, 脉搏 93 次/分, 呼吸 23 次/分, 查体:P 腔黏膜干燥, 左颊黏膜有一 0.2cm×0.2cm 溃疡面, 基底潮红。该患者测量体温、脉搏、呼吸的频率应为()

- A. 每 1 小时 1 次
- B. 每 4 小时 1 次
- C. 每 6 小时 1 次
- D. 每 8 小时 1 次
- E. 每 12 小时 1 次

8. 模拟题 患者, 男, 59 岁。开放性骨折合并感染, 体温 39℃ 左右, 有时高低不一, 日差在 2℃; 左右, 连续 5 天不退, 脉搏 93 次/分, 呼吸 23 次/分, 查体:P 腔黏膜干燥, 左颊黏膜有一 0.2cm×0.2cm 溃疡面, 基底潮红。该患者的体温热型是()

- A. 回归热
- B. 间歇热
- C. 弛张热
- D. 稽留热
- E. 不规则热

9. 模拟题 患者, 男, 46 岁。不慎坠楼, 急诊入院 3 天。患者呈熟睡状态, 在强烈刺激下可以唤醒, 很快又再入睡, 醒时答话含糊或答非所问, 请判断患者的意识状态是()

- A. 浅昏迷
- B. 深昏迷
- C. 嗜睡
- D. 昏睡
- E. 意识模糊

10. 真题 2017-X008 双侧瞳孔不等大见于()

- A. 视神经萎缩
- B. 吗啡中毒
- C. 阿托品中毒
- D. 颅内病变
- E. 农药中毒

11. 模拟题 刘先生, 入院 7 天, 体温均在 39.5~40℃, 其热型是()

- A. 间歇热
- B. 波浪热
- C. 稽留热
- D. 弛张热
- E. 不规则热

12. 模拟题 为了准确观察患者的血压, 测量时应尽量做到四定, 即()

- A. 定时间、定部位、定体位、定血压计
- B. 定时间、定部位、定血压计、定人员
- C. 定时间、定部位、定体位、定记录格式
- D. 定时间、定体位、定部位、定听诊器
- E. 定时间、定体位、定部位、定袖带

13. 真题 2016-S048 下列意识障碍中, 属最轻度的是()

- A. 烦躁
- B. 昏睡
- C. 嗜睡
- D. 浅昏迷
- E. 意识模糊

14. 模拟题 休克时反映生命器官血液灌注最简单可靠的指标是()

- A. 神志
- B. 肢体温度
- C. 血压
- D. 心率
- E. 尿量

15. 模拟题 患者, 女, 30 岁。血 FT3 8.3pmol/L, 面容惊愕, 眼裂增大眼球突出, 目光闪烁, 兴奋、烦躁, 该患者呈现的面容为()

- A. 贫血面容
- B. 慢性病容

- C. 甲亢面容
- D. 病危面容
- E. 满月面容

16. 模拟题 患者，女，67岁。癌症晚期，患者面容憔悴，面色晦暗，目光暗淡。该患者的面容是()

- A. 急性病容
- B. 慢性病容
- C. 病危病容
- D. 贫血病容
- E. 甲亢病容

17. 模拟题 速脉常见于()

- A. 心力衰竭患者
- B. 动脉硬化患者
- C. 颅内压增高患者
- D. 房室传导阻滞患者
- E. 甲状腺功能减退患者

18. 模拟题 基础体温测定正确的是()

- A. 基础体温是指人日常的平均体温
- B. 常用于测定雌激素的分泌情况
- C. 一般连续测1个月经周期以上
- D. 晚上临睡前测体温
- E. 经过6~8小时睡眠后，未进行任何活动测得的体温

19. 模拟题 青光眼瞳孔的变化是()

- A. 双侧瞳孔缩小
- B. 单侧瞳孔缩小
- C. 双侧瞳孔散大
- D. 瞳孔成椭圆形并伴散大
- E. 瞳孔对光反应消失

20. 模拟题 有机磷农药中毒瞳孔的变化是()

- A. 双侧瞳孔缩小
- B. 单侧瞳孔缩小
- C. 双侧瞳孔散大
- D. 瞳孔成椭圆形并伴散大
- E. 瞳孔对光反应消失

21. 真题 2017-S019 患者男，65岁。观察可见患者面肌消瘦、面色苍白、表情淡漠、双目无神，眼眶凹陷，其面容属于()

- A. 急性病容
- B. 希氏面容
- C. 慢性病容
- D. 病危面容
- E. 二尖瓣面容

22. 模拟题 危重或深昏迷患者瞳孔的变化是()

- A. 双侧瞳孔缩小
- B. 单侧瞳孔缩小
- C. 双侧瞳孔散大
- D. 瞳孔成椭圆形并伴散大
- E. 瞳孔对光反应消失

23. 模拟题 王女士，63岁。诊断为心房纤维颤动。护士为其测血压，动脉搏动微弱而不易辨清，需重复测量。下述做法错误的是()

- A. 测量值先读收缩压，后读舒张压
- B. 使汞柱降到“0”点
- C. 连续加压直到听清为止
- D. 稍等片刻后重测
- E. 将袖带内气体驱尽

24. 模拟题 患者，男，55岁。患肝病，有嗜睡现象，于今晨测体温时，呼之不应，但压迫眶上神经有痛苦表情，应判断为()

- A. 昏迷
- B. 嗜睡
- C. 浅昏迷
- D. 深昏迷
- E. 意识模糊

25. 真题 2016-S017 深昏迷患者不能将痰液咳出的主要原因是()

- A. 咳嗽反射迟钝
- B. 咳嗽反射消失
- C. 吞咽反射消失
- D. 痰液较稀薄
- E. 咳嗽较无力

26. 真题 2016-S008 护士对患者进行病情观察的最佳途径是()

- A. 进行交换班时
- B. 通过阅读病历
- C. 与患者日常接触中
- D. 加强医护间的联系
- E. 经常查看护理记录

27. 真题 2013-S061 用格拉斯哥昏迷评分量表测定意识障碍程度，浅昏迷评分是()

- A. <15分
- B. <12分
- C. <9分
- D. <7分
- E. <3分

28. 真题 2013-S051 伤寒常见的热型是()

- A. 间歇热
- B. 不规则热
- C. 体温过低
- D. 稽留热
- E. 弛张热

29. 真题 2013-S014 瞳孔散大的标准是瞳孔直径()

- A. <2mm
- B. 2-3mm
- C. 3-4mm
- D. 4-5mm

E. >5mm

30. 真题 2011-S075 患者, 男, 36 岁。因脑外伤急诊入院已 3 天, 患者呈熟睡状态, 可以唤醒但随即入睡, 答话含糊、答非所问, 患者的意识状态是()

- A. 浅昏迷
- B. 昏睡
- C. 嗜睡
- D. 意识障碍
- E. 谵妄

31. 真题 2011-S040 属于格拉斯哥昏迷评分表(GlasgowComaScale, GCS)的项目是()

- A. 呼吸强弱
- B. 语言反应
- C. 血压情况
- D. 体温情况
- E. 皮肤反应

32. 真题 2010-S077 患者, 女, 因脑挫裂伤入院 2 天, 呈持续睡眠状态, 可被唤醒, 能够简单回答问题, 但反应迟钝, 随后又很快入睡。对该患者重点观察的内容是()

- A. 体温
- B. 脉搏
- C. 呼吸
- D. 血压
- E. 神志

33. 真题 2010-S076 患者, 女, 因脑挫裂伤入院 2 天, 呈持续睡眠状态, 可被唤醒, 能够简单回答问题, 但反应迟钝, 随后又很快入睡。该患者的意识障碍程度应为()

- A. 嗜睡
- B. 意识模糊
- C. 昏睡
- D. 浅昏迷
- E. 深昏迷

34. 真题 2010-S068 患者, 男, 22 岁。近日来感觉身体极度不适, 伴发热, 遂入院治疗。入院当日体温最高时达 39.4℃, 最低时为 37.6℃。护理该患者时, 护士为其测量体温的间隔时间是()

- A. 2 小时
- B. 4 小时
- C. 6 小时
- D. 8 小时
- E. 12 小时

35. 真题 2010-S067 患者, 男, 22 岁。近日来感觉身体极度不适, 伴发热, 遂入院治疗。入院当日体温最高时达 39.4℃, 最低时为 37.6℃。该热型常见的疾病是()

- A. 肺炎球菌性肺炎
- B. 伤寒

- C. 癌症
- D. 疟疾
- E. 风湿热

36. 真题 2016-X002 意识全部丧失, 所有反射均消失的状态称为()

- A. 嗜睡
- B. 昏睡
- C. 意识模糊
- D. 浅昏迷
- E. 深昏迷

37. 真题 2015-S066 患者, 男, 36 岁。因脑外伤急诊入院已 3 天, 呈睡眠状态, 可以唤醒但随即入睡, 可以回答问题但有时不正确。该患者的意识状态是()

- A. 浅昏迷
- B. 昏睡
- C. 嗜睡
- D. 意识模糊
- E. 谵妄

38. 真题 2017-S035 瞳孔散大的标准是指瞳孔直径()

- A. <2mm
- B. 2~3mm
- C. 3~4mm
- D. 4~5mm
- E. >5mm

39. 真题 2015-S044 瞳孔呈椭圆形并伴散大, 常见于()

- A. 虹膜粘连
- B. 颅内压增高
- C. 阿托品中毒
- D. 青光眼
- E. 吗啡中毒

40. 真题 2015-S006 瞳孔散大的标准是瞳孔直径()

- A. >2mm
- B. 2-3mm
- C. 3-4mm
- D. 4-5mm
- E. >5mm

41. 真题 2014-S069 深昏迷患者不能将痰液咳出的主要原因是()

- A. 咳嗽反射迟钝
- B. 咳嗽反射消失
- C. 吞咽反射消失
- D. 痰液较稀薄
- E. 咳嗽较无力

42. 真题 2014-S068 男性, 36 岁。因脑震荡急诊入院已 3 天, 患者呈睡眠状态, 可以唤醒, 可以回答问题但有时不正确, 很快又入睡, 请判断患者的意识状态是()

- A. 浅昏迷

- B. 昏睡
- C. 嗜睡
- D. 意识模糊
- E. 谵妄

43. 真题 2010-S066 患者, 男, 22 岁。近日来感觉身体极度不适, 伴发热, 遂入院治疗。入院当日体温最高时达 39.4℃, 最低时为 37.6℃。此种发热的热型为()

- A. 稽留热
- B. 弛张热
- C. 间歇热
- D. 回归热
- E. 不规则热

44. 模拟题 口服第一片短效口服避孕药(单相片)的时间是()

- A. 月经来潮的第 3 天
- B. 月经来潮的第 5 天
- C. 月经来潮的第 10 天
- D. 月经来潮的第 14 天
- E. 月经来潮的第 21 天

45. 模拟题 患者, 女, 车祸致截瘫, 昏迷 24 小时, 呼吸微弱, 为其测量呼吸频率的方法是()

- A. 仔细听呼吸音响并计数
- B. 手置患者鼻孔前, 以感觉气流通过并计数
- C. 手按胸腹部, 根据胸腹部起伏次数计算呼吸频率
- D. 测得的脉率乘以 1/4, 以推测呼吸次数
- E. 置少许棉絮于患者鼻孔前计算其飘动次数

46. 真题 2017-S043 患者男, 36 岁, 因脑外伤急诊入院 3 天, 呈睡眠状态, 可以唤醒但随即入睡, 可以回答问题但有时不正确。该患者的意识状态是()

- A. 浅昏迷
- B. 昏睡
- C. 嗜睡
- D. 意识模糊
- E. 谵妄

47. 真题 2019-S088 患者, 男, 41 岁。自感心前区不适前来就诊, 就诊过程中突然倒地, 意识丧失。对该患者进行一般情况的观察, 内容不包括()

- A. 面容与表情
- B. 特殊检查和治疗
- C. 皮肤与黏膜
- D. 姿势与步态
- E. 饮食与营养

48. 真题 2019-S050 下列属于格拉斯哥昏迷评分表(Glasgow Coma Scale, GCS)的项目是()

- A. 呼吸强弱
- B. 语言反应
- C. 血压情况
- D. 体温情况

- E. 皮肤反应

十七.危重病人的抢救和护理

1. 模拟题 患者意识障碍加重, 双侧瞳孔不等大, 脉搏缓慢洪大, 血压升高, 最可能发生了()

- A. 呼吸麻痹
- B. 脑疝
- C. 意识障碍
- D. 疼痛
- E. 躯体移动障碍

2. 模拟题 安定中毒后使用硫酸钠导泻的机制是()

- A. 在肠道内形成高渗透压, 阻止肠道水分和残存药物的吸收
- B. 促进肠蠕动
- C. 在肠管内壁形成保护屏障, 减少吸收
- D. 与毒物发生化学反应, 降低毒性
- E. 与毒物发生竞争性抑制作用

3. 模拟题 对于痰液过多且昏迷的患者, 为防止窒息, 护士在为其翻身前首先应()

- A. 给患者吸氧
- B. 给患者吸痰
- C. 指导患者有效咳嗽
- D. 给患者雾化吸入
- E. 慢慢移动患者

4. 模拟题 下述用氧方法正确的是()

- A. 氧气筒应至少距火炉 1m、暖气 5m
- B. 氧气表及螺旋口上应涂油润滑
- C. 用氧时, 先插入鼻导管再调节氧流量
- D. 停用氧时, 先拔出鼻导管再关闭氧气开关
- E. 持续用氧者, 每周更换鼻导管两次

5. 模拟题 鼻导管给氧, 氧流量 4L/min 时, 氧浓度是()

- A. 25%
- B. 29%
- C. 33%
- D. 37%
- E. 39%

6. 模拟题 使用呼吸机的患者通气量不足的表现是()

- A. 两侧胸廓运动不对称
- B. 双肺无对称呼吸音
- C. 血压降低
- D. 颜面苍白
- E. 脉搏加速

7. 模拟题 新生儿心肺复苏过程与成人相似, 但其按压通气比为()

- A. 1:1
- B. 2:1
- C. 3:1
- D. 4:1

E. 5:1

8. 模拟题 急性安眠药中毒洗胃用()

- A. 2%碳酸氢钠
- B. 1: 5000 高锰酸钾
- C. 清水或生理盐水
- D. 鸡蛋清、牛奶
- E. 10%活性炭

9. 模拟题 1605 中毒洗胃忌用()

- A. 2%碳酸氢钠
- B. 1: 5000 高锰酸钾
- C. 清水或生理盐水
- D. 鸡蛋清、牛奶
- E. 10%活性炭

10. 真题 2018-X009 大咯血窒息的首要抢救措施是()

- A. 清除呼吸道内积血
- B. 立即切开支气管
- C. 加压湿化吸氧
- D. 用呼吸中枢兴奋剂
- E. 平卧头偏向一侧

11. 真题 2018-S010 使用氧气时, 氧气筒内压力不应低于()

- A. 3kg/cm²
- B. 5kg/cm²
- C. 8kg/cm²
- D. 10kg/cm²
- E. 15kg/cm²

12. 模拟题 患者, 男, 78 岁。败血症, 口腔有一较深溃疡, 内有酸臭绿色液体, 稍黏稠, 为其进行口腔护理时选用的含漱液是()

- A. 过氧化氢溶液
- B. 复方硼酸溶液
- C. 呋喃西林溶液
- D. 碳酸氢钠溶液
- E. 醋酸溶液

13. 模拟题 使用鼻导管给氧时操作正确的是()

- A. 给氧前用干棉签清洁患者鼻孔
- B. 导管插入长度为鼻尖到耳垂的 1/2
- C. 给氧时, 调节氧流量后插入鼻导管
- D. 停止给氧时, 应先关氧气开关
- E. 氧气筒放置距暖气至少 5m

14. 模拟题 应用人工呼吸机治疗时, 一般呼气末正压(PEEP)选择是()

- A. 3~5cmH₂O
- B. 4~6cmH₂O
- C. 7~9cmH₂O
- D. 6~8cmH₂O
- E. 5~10cmH₂O

15. 真题 2018-S013 患者经鼻导管需吸入的氧气浓度为 45%, 氧气流量应调节为每分钟()

- A. 5L
- B. 7L
- C. 8L
- D. 4L
- E. 6L

16. 模拟题 下列禁忌洗胃的患者是()

- A. 幽门梗阻者
- B. 肝硬化伴食管静脉曲张者
- C. 昏迷者
- D. 胆囊炎患者
- E. 胃炎

17. 模拟题 浸泡纤维胃镜宜用的消毒液是()

- A. 0.1%苯扎溴铵
- B. 0.2%过氧乙酸
- C. 70%乙醇
- D. 2%戊二醛
- E. 碘伏

18. 真题 2017-S017 挤压呼吸气囊, 每次可进入肺内的空气量是()

- A. 100~150ml
- B. 200~300ml
- C. 350~450ml
- D. 500~1000ml
- E. 1200~1500ml

19. 模拟题 清醒的口服毒物中毒者, 洗胃的首选方法是()

- A. 口服催吐法
- B. 漏斗胃管洗胃法
- C. 助洗器胃管洗胃法
- D. 自动洗胃机洗胃法
- E. 灌肠法

20. 模拟题 下列哪种药物中毒引起双侧瞳孔扩大()

- A. 敌敌畏
- B. 颠茄酊
- C. 氯丙嗪
- D. 吗啡
- E. 敌百虫

21. 模拟题 危重或深昏迷患者表现为()

- A. 双侧瞳孔缩小
- B. 小脑幕裂孔疝早期
- C. 双侧瞳孔散大
- D. 瞳孔呈椭圆形并伴散大
- E. 瞳孔对光反射消失

22. 模拟题 有机磷农药中毒患者表现为()

- A. 双侧瞳孔缩小
- B. 小脑幕裂孔疝早期

- C. 双侧瞳孔散大
- D. 瞳孔呈椭圆形并伴散大
- E. 瞳孔对光反射消失

23. 模拟题 患者，女，24岁。服毒自杀，入院急救，电动洗胃机洗胃过程中流出血性液体，护士应采取的措施是()

- A. 停止操作，通知医生
- B. 调整胃吸引压力
- C. 更换洗胃液为生理盐水
- D. 灌入止血药以止血
- E. 灌入蛋清水，保护胃粘膜

24. 模拟题 患儿，男，7岁。误服1605，急诊入院在洗胃过程中应密切观察患者的()

- A. 面色
- B. 脉搏、血压
- C. 呼吸
- D. 有无并发症的发生
- E. 以上都是

25. 真题 2018-S021 患者男，50岁，喉癌手术进行气管切开，患者痰液较多，为其吸痰时应避免的操作是()

- A. 从深部向上提拉，左右旋转
- B. 一次吸引不超过15秒
- C. 一根管吸净口腔痰液后再吸气管内痰液
- D. 插管时，关闭负压吸引
- E. 痰液未吸净需休息2min后再吸

26. 模拟题 患儿，男，7岁。误服1605，急诊入院这种农药中毒禁用的洗胃溶液是()

- A. 碳酸氢钠
- B. 高锰酸钾
- C. 油类泻药
- D. 蛋清水
- E. 过氧化钠

27. 模拟题 患儿，男，7岁。误服1605，急诊入院。医护人员需立即进行洗胃，应用的溶液是()

- A. 温开水
- B. 生理盐水
- C. 2%~4%的碳酸氢钠
- D. 1:15000~1:20000高锰酸钾
- E. 白醋

28. 模拟题 患者，男，30岁。因车祸导致心跳、呼吸骤停。护士进行单人心肺复苏时人工呼吸与心脏按压的比例是()

- A. 1:3
- B. 1:5
- C. 2:10
- D. 2:15
- E. 2:30

29. 真题 2013-J062 在碱性溶液中可使毒性增强的有

机磷农药是()

- A. 敌百虫
- B. 乐果
- C. 氧乐果
- D. 乙硫磷
- E. 敌敌畏

30. 模拟题 洗胃液的温度为()

- A. 20~22℃
- B. 25~38℃
- C. 30~33℃
- D. 35~37
- E. 28~40℃

31. 模拟题 鼻导管给氧时，导管插入的长度是()

- A. 鼻尖至耳垂
- B. 鼻尖至耳垂的1/2
- C. 鼻尖至耳垂的1/3
- D. 鼻尖至耳垂的2/3
- E. 鼻尖至耳垂的1/4

32. 模拟题 患儿，2岁。呼吸困难，给予氧疗，合适的方法是()

- A. 氧气枕法
- B. 头罩法
- C. 鼻塞法
- D. 鼻导管法
- E. 面罩法

33. 模拟题 患者，男，75岁。诊断为慢性呼吸衰竭，表现为呼吸困难，发绀明显，血气分析结果为 PaO₂ 45mmHg，PaCO₂ 72mmHg，该患者应()

- A. 高浓度、高流量持续吸氧
- B. 高浓度、高流量间歇吸氧
- C. 低浓度、低流量持续吸氧
- D. 低浓度、低流量间歇吸氧
- E. 酒精湿化吸氧

34. 模拟题 简易呼吸器挤压一次入肺的空气量约为()

- A. 100~500ml
- B. 500~1000ml
- C. 800~1200ml
- D. 1000~1200ml
- E. 1200~1500ml

35. 模拟题 抢救物品管理的“五定”不包括下列哪项()

- A. 定数量品种
- B. 定点放置
- C. 定期更换
- D. 定期检查维修
- E. 定人保管

36. 模拟题 对心跳呼吸骤停患者进行心肺复苏时，其基本生命支持的内容是()

- A. 人工呼吸, 人工循环, 药物治疗
- B. 病情估计, 人工呼吸, 人工循环
- C. 人工循环, 开放气道, 人工呼吸
- D. 人工呼吸, 人工循环, 脑复苏
- E. 开放气道, 人工呼吸, 心脏除颤

37. 模拟题 虹吸原理应用于()

- A. 漏斗胃管洗胃
- B. 电动吸引器洗胃
- C. 电动洗胃机洗胃
- D. 电动吸痰
- E. 肠胃减压

38. 模拟题 患者, 男, 25岁。劳动后口渴厉害, 随手将窗台上的“矿泉水”一饮而尽。饮后感口腔有刺鼻气味, 腹部烧灼样剧痛。发现将过氧乙酸误服, 来院急诊。护士为患者洗胃, 不宜选择的液体是()

- A. 生理盐水
- B. 蛋清
- C. 5%醋酸
- D. 米汤
- E. 牛奶

39. 真题 2016-S098 可用于病情较重, 氧分压明显下降者的吸氧方法是()

- A. A鼻导管法
- B. 鼻塞法
- C. 面罩法
- D. 头罩法
- E. 氧气枕法

40. 真题 2010-S021 中毒后忌用脂肪类食物的毒物种类是()

- A. 酸性物
- B. 碱性物
- C. 敌百虫
- D. 氰化物
- E. 灭鼠药

41. 真题 2016-S097 主要用于小儿的吸氧方法是()

- A. A鼻导管法
- B. 鼻塞法
- C. 面罩法
- D. 头罩法
- E. 氧气枕法

42. 真题 2017-S036 对急性中毒患者应迅速采用的洗胃方法是()

- A. 口服催吐法
- B. 漏斗胃管洗胃法
- C. 电动吸引器洗胃法
- D. 自动洗胃机洗胃法
- E. 手动洗胃机洗胃法

43. 真题 2016-S032 输液中发生肺水肿时吸氧需用

20%-30%的乙醇湿化, 其目的是()

- A. 使患者呼吸道湿化
- B. 消毒吸入的氧气
- C. 使痰液易咳出
- D. 降低肺泡表面张力
- E. 降低肺泡内泡沫表面张力

44. 真题 2010-X070 患者, 男, 50岁。在田间劳动时不慎敌百虫农药中毒, 立即被送急诊。抢救时禁用的措施是()

- A. 清水洗胃
- B. 2%碳酸氢钠洗胃
- C. 1:5000高锰酸钾洗胃
- D. 1%盐水洗胃
- E. 硫酸钠导泻

45. 真题 2013-S019 漏斗胃管洗胃法是利用()

- A. 空吸原理
- B. 虹吸原理
- C. 负压原理
- D. 液体静压原理
- E. 正压原理

46. 模拟题 为昏迷患者做口腔护理时哪种方法不正确()

- A. 操作前将患者的义齿取下浸于冷开水中
- B. 从门齿处放入开口器
- C. 禁止漱口
- D. 清点棉球个数
- E. 每次夹紧一个棉球并挤出多余水分

47. 真题 2013-S006 挤压呼吸气囊, 每次可进入肺内的空气量是()

- A. 100-150ml
- B. 200-300ml
- C. 350-450ml
- D. 500-1000ml
- E. 1200-1500ml

48. 真题 2011-S090 如果使用人工呼吸器为患儿进行人工呼吸, 挤压一次可进入肺内的空气是()

- A. 100ml
- B. 400ml
- C. 500ml
- D. 1000ml
- E. 300ml

49. 真题 2011-S069 患者, 男, 50岁。需进行氧气治疗, 氧气浓度65%, 持续48小时吸氧后, 出现烦躁, 呼吸、心率增快, 血压上升, 继而出现呼吸困难、发绀、昏迷。患者可能出现的问题是()

- A. 氧中毒
- B. 肺不张
- C. 呼吸抑制
- D. 呼吸道分泌物干燥

E. 晶状体后纤维组织增生

50. 真题 2011-S052 患者,男,65岁。脑出血昏迷,患者咳嗽反射迟钝,导致痰液沉积较深,需要给患者气管内吸痰,下列方法正确的是()

- A. 吸净口腔痰液后继续吸气管内痰液
- B. 插管时打开负压吸引
- C. 吸痰时从深部向上提拉,左右旋转
- D. 一次吸痰不超过 30 秒
- E. 吸痰后将管内痰液吸水冲净后再用

51. 真题 2011-S029 输液中发生肺水肿时吸氧需用 20%-30%的乙醇湿化,其目的是()

- A. 使患者呼吸道湿化
- B. 消毒吸入的氧气
- C. 使痰液易咳出
- D. 降低肺泡表面张力
- E. 降低肺泡内泡沫表面张力

52. 真题 2011-S004 禁忌洗胃的中毒毒物是()

- A. 有机磷
- B. 安眠药
- C. 浓硫酸
- D. 重金属
- E. 生物碱

53. 真题 2010-Z009 人工心肺机的作用不包括()

- A. 取代心脏进行循环
- B. 调节氧和二氧化碳的交换
- C. 调节血液温度
- D. 过滤血
- E. 防止血栓形成

54. 模拟题 患者,女,68岁。因脑出血入院。患者处于深昏迷状态,有痰鸣音,重度发绀,护士立即用电动吸引器为其吸痰,但痰黏稠不易吸出。电动吸引器吸痰时,调节的负压范围值为()

- A. 10.0~23.3kPa
- B. 20.0~33.3kPa
- C. 30.0~43.3kPa
- D. 40.0~53.3kPa
- E. 50.0~63.3kPa

55. 真题 2010-S079 患者,女,45岁。在为果树喷洒敌百虫农药时,出现头痛、无力、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等中毒症状,被急送入院,医护人员立即给予洗胃。应选择的洗胃溶液是()

- A. 蛋清水
- B. 4%碳酸氢钠
- C. 淡石灰水
- D. 1:15000-1:20000 高锰酸钾溶液
- E. 5%醋酸

56. 真题 2010-S078 患者,女,45岁。在为果树喷洒敌百虫农药时,出现头痛、无力、恶心、呕吐、腹痛、

腹泻等中毒症状,被急送入院,医护人员立即给予洗胃。洗胃过程中,护士发现有血性液体流出,同时患者腹痛加剧,此时正确的做法是()

- A. 观察的同时继续洗胃
- B. 继续缓慢洗胃
- C. 快速洗胃
- D. 立即停止洗胃
- E. 休息片刻,继续洗胃

57. 真题 2010-S055 患者,男,67岁。病情危重,为减轻感知觉改变对患者的影响,护士应采取的正确措施是()

- A. 环境要热闹一些,避免患者孤独
- B. 光线可以暗一点,避免刺眼
- C. 嘱咐家属不要窃窃私语,避免给患者心理压力
- D. 可以用湿纱布遮盖双眼,避免角膜溃疡
- E. 多与患者交谈,使其感受家人的温暖

58. 真题 2010-S049 患者,男,46岁。脑外伤昏迷,PaCO₂ 7.0kPa, 为保持患者呼吸道通畅,护士为其实施吸痰术,下列操作中不妥的是()

- A. 用张口器助其张口
- B. 先吸口腔内痰液,再吸气管内痰液
- C. 每次吸痰时间不超过 15 秒
- D. 吸痰导管必须每次更换
- E. 吸痰前可先加大吸氧流量再吸痰

59. 真题 2010-S044 患者,女,24岁。因服毒昏迷不醒,被送入医院急诊室抢救,其家属不能准确地说出毒物名称,此时护士的正确处理方法是()

- A. 请家属立即查清毒物名称后洗胃
- B. 抽胃内容物送检后用温开水洗胃
- C. 鼻饲牛奶或蛋清水,以保护胃黏膜
- D. 生理盐水清洁灌肠,减少毒物吸收
- E. 禁忌洗胃,待清醒后用催吐法排除毒物

60. 真题 2010-S041 使用人工呼吸机时,潮气量一般为()

- A. 1-5ml/kg
- B. 5-10ml/kg
- C. 10-15ml/kg
- D. 15-20ml/kg
- E. 20-25ml/kg

61. 真题 2013-S037 误服硫酸后需保护胃黏膜时可选用的溶液是()

- A. 镁乳
- B. 白醋
- C. 高锰酸钾
- D. 过氧化氢
- E. 碳酸氢钠

62. 真题 2013-S048 重度缺氧时 SaO₂可降低到小于()

- A. 80%
- B. 75%

- C. 70%
- D. 65%
- E. 60%

63. 真题 2016-X079 患者男, 50 岁。在田间劳动时不慎敌百虫农药中毒, 立即被送急诊。抢救时禁用的措施为()

- A. 清水洗胃
- B. 2%碳酸氢钠洗胃
- C. 1:5000 高锰酸钾洗胃
- D. 1%盐水洗胃
- E. 硫酸钠导泻

64. 真题 2015-S062 患者, 男, 肺气肿。吸氧后缺氧情况明显好转, 遵医嘱停用氧气时应首先()

- A. 关总开关
- B. 取下湿化瓶
- C. 取下鼻导管
- D. 关流量表开关
- E. 记录停氧时间

65. 真题 2015-S029 误服硫酸后, 需保护胃黏膜时可选用的溶液是()

- A. 镁乳
- B. 白醋
- C. 高锰酸钾
- D. 过氧化氢
- E. 碳酸氢钠

66. 真题 2015-S021 危重患者眼睑不能闭合时应()

- A. 滴氯霉素眼药水
- B. 滴生理盐水
- C. 戴有色眼镜
- D. 覆盖凡士林纱布
- E. 覆盖无菌生理盐水纱布

67. 真题 2015-S016 为传染病患者吸痰时, 错误的做法是()

- A. 痰液黏稠可叩拍背部
- B. 吸痰前穿隔离衣戴手套
- C. 一次吸痰时间不超过 15 秒
- D. 痰液滴落地面应立即清洁处理
- E. 一次性吸痰管放入高危品袋中焚烧

68. 真题 2015-S001 气管内吸痰时, 每次插管吸痰时间不宜超过()

- A. 5 秒
- B. 10 秒
- C. 15 秒
- D. 1.5 分钟
- E. 15 分钟

69. 真题 2014-Z038 敌百虫中毒忌用的洗胃液是()

- A. 牛奶
- B. 生理盐水

- C. 1:5000 高锰酸钾溶液
- D. 2%碳酸氢钠溶液
- E. 矿泉水

70. 真题 2014-S074 不属于抢救室必需的设备是()

- A. 除颤器
- B. 壁灯
- C. 抢救车
- D. 电源插座
- E. 木板一块

71. 真题 2014-S073 误服硫酸后须保护胃黏膜时可选用的溶液是()

- A. 镁乳
- B. 白醋
- C. 高锰酸钾
- D. 过氧化氢
- E. 碳酸氢钠

72. 真题 2014-S072 男性, 76 岁。因呼吸困难, 咳嗽、咳痰, 给予氧气吸入。因需进食停用氧气, 应采取的最佳措施是()

- A. 先关流量开关, 后拔管
- B. 先关总开关, 后拔管
- C. 分离氧气管道, 鼻导管保留
- D. 先拔出鼻导管再关流量开关
- E. 边进食边吸氧

73. 真题 2014-S071 痰液黏稠不易咳出者的促进排痰措施为()

- A. 指导有效咳嗽
- B. 拍背与胸壁震荡
- C. 湿化呼吸道
- D. 体位引流
- E. 机械吸痰

74. 真题 2014-S070 气管内吸痰一次吸引时间不宜超过 15 秒, 其主要原因是()

- A. 引起患者缺氧和发绀
- B. 吸痰器工作时间过长易损坏
- C. 吸痰管通过痰液过多易阻塞
- D. 引起患者刺激性呛咳造成不适
- E. 吸痰用托盘暴露时间过久造成细菌感染

75. 真题 2014-S028 要求氧浓度达到 45% 时, 应为患者调节氧流量为()

- A. 6L
- B. 10L
- C. 8L
- D. 2L
- E. 4L

76. 真题 2017-S069 误用硫酸后, 需保护胃黏膜可选用的溶液是()

- A. 镁乳

- B. 白醋
- C. 高酸钾
- D. 过氧化氢
- E. 碳酸氢钠

77. 真题 2013-S098 可服用 3%过氧化氢溶液后引吐的毒物是()

- A. 敌敌畏
- B. 灭鼠药
- C. 氰化物
- D. 敌百虫
- E. 巴比妥类

78. 真题 2013-S097 可用 2%-4%碳酸氢钠洗胃的毒物是()

- A. 敌敌畏
- B. 灭鼠药
- C. 氰化物
- D. 敌百虫
- E. 巴比妥类

79. 真题 2010-S007 对危重患者的护理, 下列措施正确的是()

- A. 保持平卧, 尽量少翻动患者
- B. 保持病房安静, 禁止家属探视
- C. 保持口腔清洁, 口腔护理每日 2 次
- D. 发现患者心脏骤停, 首先通知医生
- E. 为保护患者自尊, 意识丧失者不应使用保护具

80. 模拟题 患者, 女, 68 岁。因脑出血入院。患者处于深昏迷状态, 有痰鸣音, 重度发绀, 护士立即用电动吸引器为其吸痰, 但痰黏稠不易吸出。下列哪种方法有利于黏稠痰的吸出()

- A. 上下移动导管反复抽吸
- B. 加大负压固定一处抽吸
- C. 缓慢滴入生理盐水后抽吸
- D. 延长每次吸痰时间
- E. 每次用生理盐水冲洗吸痰导管

81. 真题 2017-J073 ICU 收治的对象不包括()

- A. 精神病患者
- B. 严重感染
- C. 持续性癫痫
- D. 糖尿病酮症酸中毒
- E. 急性呼吸道梗塞

82. 真题 2019-S089 患者, 男, 41 岁。自感心前区不适前来就诊, 就诊过程中突然倒地, 意识丧失。基本生命支持步骤是()

- A. 胸外心脏按压、开放气道、人工呼吸
- B. 病情估计、人工呼吸、胸外心脏按压
- C. 人工呼吸、胸外心脏按压、药物治疗
- D. 开放气道、人工呼吸、心脏除颤
- E. 人工呼吸、胸外心脏按压、心脏除颤

83. 真题 2019-S034 深度昏迷患者不能将痰液咳出的主要原因是()

- A. 吞咽反射消失
- B. 咳嗽反射迟钝
- C. 咳嗽较无力
- D. 咳嗽反射消失
- E. 痰液较稀薄

84. 真题 2019-S094 患者, 男, 40 岁。因摔伤头部致昏迷 1 小时急诊入院, 查体: 心率 86 次/分, 血压 138/80mmHg, 呼吸 20 次/分。诊断为脑挫裂伤, 左侧急性硬膜下血肿, 右侧硬膜外血肿、颅骨骨折。入院后在全麻下行颞枕开颅颅内血肿清除术。术后第 1 天患者呈深昏迷状态, 眼睑不能闭合, 气管插管内可见较多分泌物, 遵医嘱给予吸痰。该患者的护理措施, 不正确的是()

- A. 密切观察病情, 做好抢救准备
- B. 眼睑处用干无菌纱布覆盖
- C. 保持呼吸道通畅
- D. 每日口腔护理 2 次
- E. 每 2 小时为患者翻身一次

85. 真题 2019-S090 患者, 男, 41 岁。自感心前区不适前来就诊, 就诊过程中突然倒地, 意识丧失。单人行人工呼吸与胸外心脏按压的比例是()

- A. 1:5
- B. 5:1
- C. 2:30
- D. 15:2
- E. 1:15

86. 真题 2019-S091 患者, 男, 41 岁。自感心前区不适前来就诊, 就诊过程中突然倒地, 意识丧失。危重病人应首先观察的是()

- A. 有无腹水
- B. 生命体征变化
- C. 意识状态的变化
- D. 大小便情况
- E. 肢体活动情况

87. 真题 2019-S092 患者, 男, 40 岁。因摔伤头部致昏迷 1 小时急诊入院, 查体: 心率 86 次/分, 血压 138/80mmHg, 呼吸 20 次/分。诊断为脑挫裂伤, 左侧急性硬膜下血肿, 右侧硬膜外血肿、颅骨骨折。入院后在全麻下行颞枕开颅颅内血肿清除术。术后第 1 天患者呈深昏迷状态, 眼睑不能闭合, 气管插管内可见较多分泌物, 遵医嘱给予吸痰。吸痰操作中注意事项正确的是()

- A. 调节负压, 不可超过 40Kpa, 以免造成黏膜损伤
- B. 严格无菌操作
- C. 吸痰时间不少于 15s
- D. 吸痰前给予生理盐水 5ml 注入气管插管内
- E. 吸痰玻璃接管每次吸痰后进行更换

88. 真题 2019-S093 患者, 男, 40 岁。因摔伤头部致昏迷 1 小时急诊入院, 查体: 心率 86 次/分, 血压

138/80mmHg,呼吸 20 次/分。诊断为脑挫裂伤,左侧急性硬膜下血肿,右侧硬膜外血肿、颅骨骨折。入院后在全麻下行颞枕开颅颅内血肿清除术。术后第 1 天患者呈深昏迷状态,眼睑不能闭合,气管插管内可见较多分泌物,遵医嘱给予吸痰。该患者促进痰液排出的方法,不正确的是()

- A. 叩背
- B. 肺部物理治疗
- C. 体位引流
- D. 吸痰
- E. 雾化吸入

十八.临终护理

1. 真题 2010-S019 进行尸体护理的做法,错误的是()

- A. 撤去治疗用物
- B. 放低头部
- C. 装上义齿
- D. 洗脸闭合眼睑
- E. 用尸单包裹尸体

2. 真题 2015-S085 患者,女,53 岁。乳腺癌晚期,身体极度衰竭,卧床不起,情绪暴躁、常无端发脾气。护理该患者时,不恰当的护理措施是()

- A. 劝患者不要轻易表达不良情绪
- B. 允许患者表达不良情绪
- C. 防止患者的过激行为
- D. 给予精神支持
- E. 做好与家属的沟通

3. 真题 2016-S092 尸僵出现的时间是患者死亡后()

- A. 1-3 小时
- B. 2-4 小时
- C. 12-16 小时
- D. 20 小时
- E. 24 小时

4. 真题 2016-S093 尸斑出现的时间是患者死亡后()

- A. 1-3 小时
- B. 2-4 小时
- C. 12-16 小时
- D. 20 小时
- E. 24 小时

5. 真题 2016-S094 尸体腐败出现的时间是患者死亡后()

- A. 1-3 小时
- B. 2-4 小时
- C. 12-16 小时
- D. 20 小时
- E. 24 小时

6. 真题 2017-S005 临终患者最早出现的心理反应期一般是()

- A. 否认期

- B. 愤怒期
- C. 协议期
- D. 忧郁期
- E. 接受期

7. 模拟题 临终患者通常最早出现的心理反应期是()

- A. 协议期
- B. 愤怒期
- C. 否认期
- D. 接受期
- E. 忧郁期

8. 模拟题 出现尸斑的时间为()

- A. 死亡后 2~4 小时
- B. 死亡后 4~6 小时
- C. 死亡后 6~8 小时
- D. 死亡后 8~10 小时
- E. 死亡后 24 小时

9. 模拟题 现代死亡的标准是()

- A. 心跳停止
- B. 呼吸停止
- C. 心跳呼吸均停止
- D. 全脑死亡
- E. 无反射运动

10. 模拟题 脑死亡的判定标准不包括()

- A. 瞳孔散大
- B. 不可逆的深度昏迷
- C. 自主呼吸停止
- D. 脑干反射消失
- E. 脑电波消失

11. 模拟题 患者,男,36 岁。已确诊为“白血病”1 年,患者对自己的病情非常了解。患者喜欢独处,失眠时间增加,情感减退。其属于临终患者的阶段是()

- A. 否认期
- B. 愤怒期
- C. 协议期
- D. 忧郁期
- E. 接受期

12. 模拟题 下列哪项不是临床死亡期的特征()

- A. 呼吸停止
- B. 心跳停止
- C. 各种反射消失
- D. 延髓处于深度抑制状态
- E. 组织细胞新陈代谢停止

13. 模拟题 患者不慎咬破体温计,下列哪项处理是错误的()

- A. 立即清除玻璃碎屑
- B. 口服蛋清水
- C. 口服牛奶

- D. 病情允许可服用韭菜等粗纤维的食物
- E. 禁服粗纤维食物

14. 真题 2015-S084 患者,女,53岁。乳腺癌晚期,身体极度衰竭,卧床不起,情绪暴躁、常无端发脾气。此时患者的心理反应是()

- A. 否认期
- B. 愤怒期
- C. 协议期
- D. 忧郁期
- E. 接受期

15. 真题 2015-S060 患者,男,65岁。肝癌晚期,极度衰弱。此时医护人员应采取的主要措施是()

- A. 以对症照料为主
- B. 以治愈疾病为主
- C. 尽量延长患者的生存时间
- D. 实施安乐死
- E. 放弃一切治疗

16. 真题 2015-S023 对于丧亲者的护理,不妥的是()

- A. 认真进行尸体护理
- B. 鼓励家属宣泄感情
- C. 尽力提供经济支持
- D. 进行心理疏导
- E. 对丧亲者随访

17. 真题 2010-S027 濒死期患者最后消失的感觉常是()

- A. 视觉
- B. 听觉
- C. 味觉
- D. 嗅觉
- E. 触觉

18. 真题 2010-S032 患者,男,55岁。近来上腹部疼痛,消瘦,大便隐血阳性。作胃镜检查后得知患了胃癌,出现心理和行为异常。有利于患者应对的转机是()

- A. 出现迁怒行为不要将其个人化
- B. 不必纠正患者抑郁和退缩行为
- C. 出现愤怒时立即帮助分析结果
- D. 满足患者提出治疗的所有要求
- E. 告知患者全部病情真相

19. 真题 2010-S059 患者,男,58岁。胃癌晚期,近几日反复出现呕血及黑便现象,患者情绪低落、沉默寡言,经常哭泣。其心理反应处于()

- A. 接受期
- B. 抑郁期
- C. 协议期
- D. 愤怒期
- E. 否认期

20. 真题 2011-S033 进行尸体护理时,错误的是()

- A. 撤去治疗用物,去枕,头部放低

- B. 洗脸,闭合眼睑
- C. 有义齿代为装上
- D. 擦净躯体,必要时填堵孔道
- E. 穿上尸衣裤并用尸单包裹

21. 真题 2011-S036 死亡后尸体温度逐渐降低,尸温与环境温度相同大约需要的时间是()

- A. 6小时
- B. 12小时
- C. 24小时
- D. 36小时
- E. 48小时

22. 真题 2011-S070 患者,男,65岁。肝癌晚期,极度衰弱,此时医护人员应采取的主要措施是()

- A. 以对症照料为主
- B. 以治疗疾病为主
- C. 尽量延长患者的生存时间
- D. 实施安乐死
- E. 放弃一切治疗

23. 真题 2011-J087 有关临终关怀护理的内容,正确的是()

- A. 虽然患者的病情很重,但仍要以大剂量的针对性的积极治疗为主
- B. 可以通过暗示等办法告诉患者病情严重和所剩时日不多的事实
- C. 尽可能地减少临终患者的治疗费用
- D. 组织各种丰富的体育活动,以提高患者临终的生活质量
- E. 解决患者生理、心理上的需求

24. 真题 2013-S094 尸斑开始出现的时间是死亡后()

- A. 1小时
- B. 2-4小时
- C. 6-8小时
- D. 12-16小时
- E. 24小时

25. 真题 2013-S095 尸僵发展至高峰的时间是死亡后()

- A. 1小时
- B. 2-4小时
- C. 6-8小时
- D. 12-16小时
- E. 24小时

26. 真题 2013-S096 尸僵缓解发生在死亡后()

- A. 1小时
- B. 2-4小时
- C. 6-8小时
- D. 12-16小时
- E. 24小时

27. 真题 2015-J052 临床死亡期限一般认为是()

- A. 2-3 分钟
- B. 4-6 分钟
- C. 6-8 分钟
- D. 8-10 分钟
- E. 10-15 分钟

28. 真题 2015-S004 尸体护理时将尸体仰卧, 头下垫枕的主要目的是()

- A. 易于鉴别
- B. 保持良好姿势
- C. 便于尸体护理
- D. 延缓尸僵速度
- E. 防止面部淤血变色

29. 模拟题 尸体料理时, 头下垫枕的目的是()

- A. 防止面部变色
- B. 便于操作
- C. 防止下颌下垂
- D. 保持尸体位置
- E. 便于家属认领

30. 模拟题-S084 患者, 女, 28 岁。怀孕 38 周, 胎膜早破, 由救护车转入医院, 经过检查后进入产房等待分娩, 胎儿娩出后产妇出现羊水栓塞现象, 立即给予相应治疗, 经积极抢救后患者最终死亡。患者家属在接到医疗机构通知后应及时处理尸体, 尸体存放不得超过()

- A. 1 周
- B. 2 周
- C. 1 个月
- D. 2 个月
- E. 1 个季度

31. 模拟题 濒死期生命处于()

- A. 临床死亡阶段
- B. 不可挽救阶段
- C. 复苏期
- D. 可逆阶段
- E. 不可逆阶段

32. 模拟题 患者, 男, 66 岁。车祸撞伤头部, 出现深昏迷, 脑干反射消失, 脑电波消失, 无自主呼吸。患者的表现应属于()

- A. 濒死期
- B. 临床死亡期
- C. 生物学死亡期
- D. 疾病晚期
- E. 临终期

33. 真题 2017-S042 患者女, 28 岁, 其母因突发心肌梗死死亡, 几天后带着悲痛的情绪着手处理后事和准备丧礼。根据安格尔理论, 此患者的心理反应阶段处于()

- A. 觉察
- B. 释怀
- C. 恢复期

- D. 震惊
- E. 不相信

34. 真题 2018-Z043 肿瘤患者心理变化过程的第一期表现是()

- A. 抑郁
- B. 愤怒
- C. 接受
- D. 否认
- E. 协商

35. 真题 2017-S066 实施尸体护理的时间为()

- A. 患者心跳呼吸停止立即进行
- B. 患者脑死亡时立即进行
- C. 家属要求时进行
- D. 医生下达死亡诊断书时进行
- E. 患者安葬时进行

36. 真题 2017-S070 患者意识丧失, 各种反射逐渐丧失, 肌张力消失, 心跳减弱, 呼吸微弱, 根据这些征象, 医学上应诊断为()

- A. 临床死亡期
- B. 濒死期
- C. 否认期
- D. 生物学死亡期
- E. 接收期

37. 真题 2019-S066 尸体腐烂出现在死后几小时()

- A. 1~3 小时
- B. 2~4 小时
- C. 12~16 小时
- D. 20 小时
- E. 24 小时

38. 真题 2019-S065 尸僵出现在死亡后几小时()

- A. 1~3 小时
- B. 2~4 小时
- C. 12~16 小时
- D. 20 小时
- E. 24 小时

39. 真题 2019-S064 尸斑出现在死亡后几小时()

- A. 1~3 小时
- B. 2~4 小时
- C. 12~16 小时
- D. 20 小时
- E. 24 小时

40. 真题 2019-S018 患者, 男, 60 岁。因晚期胰头癌入院治疗, 入院后患者常常独自流泪, 其心理处于()

- A. 否认期
- B. 愤怒期
- C. 协议期
- D. 忧郁期

E. 接受期