

初级护师复习资料

- 1.交替脉：节律规则而强弱交替出现的脉搏，为左心室衰竭的重要体征。
- 2.水冲脉：脉搏骤起骤落，急促而有力，常见于主动脉瓣关闭不全。
- 3.脉搏短绌：常见于心房颤动，出现脉率不等于心率
- 4.奇脉：病人吸气时脉搏显著减弱或消失，常见于心包积液
- 5.缓脉：脉率少于 60 次/分，常见于：颅内压增高，房室传导阻滞。
- 6.有机磷农药中毒呼吸：大蒜味
- 7.尿毒症：氨味
- 8.糖尿病酮症酸中毒：烂苹果味
- 9.肝性脑病：肝腥（肝臭）味
- 10.支气管扩张或肺脓肿：恶臭味
- 11.腹膜刺激征：压痛，反跳痛，肌紧张
- 12.急性胃穿孔或脏器破裂所致：急性弥漫性腹膜炎
- 13.急性肠胃炎：肠鸣音活跃
- 14 肠麻痹：肠鸣音减弱或消失
- 15 瞳孔缩小：有机磷，巴比妥类，吗啡等药物中毒
- 16 瞳孔扩大：视神经萎缩，阿托品药物中毒及深昏迷病人
- 17.两侧瞳孔大小不一：颅内病变
- 18：X 线胸片双肺透亮度增加，提示肺气肿
- 19.肺结核最简便有效的处理痰的方法：焚烧

- 20 痰结核菌检查：是确定病人是否有传染性的主要方法
- 21 肺结核的主要传播途径是：飞沫传播
- 22：抗结核药正确使用原则：早期，联合，适量，规则和全程治疗。
- 23 异烟肼：周围神经炎
- 24 乙胺丁醇：球后视神经炎
- 25 利福平：肝功能损
- 26 急性肺水肿：氧疗给予高流量（6-8L/分）酒精湿化（30%-50%）吸氧
- 27 急性肺水肿酒精湿化可使肺泡泡沫的表面张力减低
- 28 感染：是 COPD 发生和加重的主要原因
- 29 通气功能障碍主要引起：Ⅱ型呼衰
- 30 急性心梗死时血清肌酶以及肌酸磷酸激酶出现在最早
- 31 急性心梗死具有诊断价值的是：心肌酶 CK-MB
- 32 室颤：非同步电除颤
- 33 房颤：同步电除颤
- 34 心绞痛：舌下含服硝酸甘油
- 35.DIC 高凝期及时应用：肝素
- 36， 中心静脉压：5-12cmH₂O
- 37 黄疸指数：肝功能监测指标
- 38 中心静脉压：心功能监测指标
- 39 血尿素氮：肾功能监测指标

- 40.实质性脏器损伤：腹腔内出血（腹腔穿刺抽出不凝血）
- 41 胃穿孔：X线检查膈下游离气体
- 42.肝癌禁止：肥皂水灌肠，以减少肠道胺的吸收，预防肝性脑病
- 43.急性化脓性梗阻性胆管炎：Charcot 三联征（腹痛 寒战高热 黄疸）
44. 急性化脓性梗阻性胆管炎治疗原则：紧急胆道减压手术
- 45.胆道引流管至少放置：2周以上
- 46.甲状腺术后出现手足抽搐，是由于术中损伤了甲状旁腺
- 47 急性乳腺炎主要病因是：乳汁淤积和细菌入侵
- 48.厌氧菌感染创面的溶液：过氧化氢和高锰酸钾
- 49.转运毒蛇咬伤患者，伤口与心脏部位持平，不宜抬高伤肢
- 50 最常见的肠梗阻：粘连性肠梗阻
- 51.最易发生绞窄的是：肠扭转
- 52.肠套叠早期可试：空气钡剂灌肠
- 53 早期诊断结肠癌的最有价值的方法是：纤维肠镜检查
- 54.密切观察血压者四定：定时间，定部位，定体位，定血压计
- 55.吸气性呼吸困难：明显三凹征（吸气时胸骨上窝，锁骨上窝，肋间隙出现凹陷）
56. 吸气性呼吸困难常见于：气管阻塞，气管异物
- 57 呼气性呼吸困难常见于：支气管哮喘，阻塞性肺气肿
- 58 混合性呼吸困难常见于：重症肺炎，肺不张，胸腔积液
- 59 大咯血首选药物：垂体后叶素

60 肺癌恶性程度最高的类型是：细胞未分化癌

61.肺癌手术切除最多的是：鳞癌

62 阻塞性肺气肿主要引起：Ⅱ型呼吸衰竭

64 肺癌对化疗最敏感的的类型是：小细胞未分化癌

65.慢性肺心病：低流量持续给氧（2-3L/分）

66 急性胰腺炎：禁食，胃肠减压

67.检测肾功能的指标：血肌酐，血尿素氮，内生肌酐清除率

68.慢性再障治疗首选：雄激素

69 甲状腺功能亢进：T₃ T₄ 分泌过多

70 甲状腺弥漫性肿大是甲状腺功能亢进的典型体征

71.黏液性水肿为甲状腺减退的典型表现

72. 甲状腺功能亢进症最敏感的指标是：TSH 血清促甲状腺激素

73 急性胰腺炎：血清淀粉酶升高

74 正常睡眠周期 90 分钟，遗尿多在 IV 期，梦境多在 REM 期出现

75 对于急性疼痛者，在未明确诊断前不得随意使用镇痛药，对慢性疼痛者，使用镇痛药应在疼痛前。

76 脂肪的生理功能是促进脂溶性维生素的吸收

77 缺乏钙易引起小儿佝偻病

78 缺乏维生素锌会导致发育停滞，性成熟受抑制

79 缺乏维生素 D 可导致骨质疏松

80 确认胃管在胃内的方法有：抽吸胃液 听过气水声 看气泡

尿指 24 小时小于等于 100ml

82. 留取 24 小时尿标本作 17-羟类固醇检查，应加防腐剂浓盐酸。

83 强酸强碱等腐蚀性物质中毒，禁止洗胃，可使用药物或者物理性对抗击，如：牛奶，蛋清

84 洗胃时，每次灌入量为 300-500ml，总量 10000-20000ml

85. 服毒后 6 小时内洗胃效果最佳

86 敌百虫与碱性药物可分解成毒性更强的敌敌畏

87 血氧分压低于 6.67kpa，是氧疗的指征

88. 吸痰时，时间不应超过 15 秒

89 死亡分为三期：濒死期 临床死亡期 生物学死亡期

90 嗜睡是最轻度的意识障碍

100 胃溃疡的疼痛在进食以后疼痛，十二指肠溃疡在饥饿的时候疼痛。

