

一、A1

1、外伤性截瘫病人，建立反射性膀胱的护理措施是

- A.留置导尿，定时开放引流
- B.每周更换导尿管
- C.每2小时更换体位
- D.抬高床头，多饮开水
- E.每日膀胱冲洗1次

【正确答案】：A

【答案解析】：早期留置尿管持续引流，2~3周后定时开放，每4~6小时开放1次，平时夹闭，以使膀胱充盈，防止膀胱萎缩及感染，并训练自律性膀胱。

2、观察休克患者时，下列哪项是反映组织灌流量最简单有效的指标

- A.血压
- B.脉搏
- C.神志
- D.尿量
- E.肢端温度

【正确答案】：D

【答案解析】：尿量：是观察休克变化简便而有效的指标，可以反映肾血流灌注量。在正常肾功能条件下，成人要求达30ml/h以上；小儿20ml/h以上。

3、肛管手术后，能促进炎症吸收，缓解肛门括约肌痉挛的护理措施是

- A.保持大便通畅
- B.早期适当活动
- C.温水肛门坐浴
- D.保持局部清洁
- E.避免仰卧位

【正确答案】：C

【答案解析】：肛门坐浴可清洁肛门，改善血液循环，促进炎症吸收，缓解括约肌痉挛、减轻疼痛。

4、乳房自查的时间最好在

- A.月经前1~2日
- B.月经期间
- C.月经后1~2日
- D.月经后2~6日
- E.月经后4~7日

【正确答案】：E

5、对于草酸结石患者的饮食建议是

- A.多饮浓茶
- B.多食富含纤维素的食物
- C.多食蔬菜，如菠菜、土豆
- D.多食坚果类食物
- E.多食豆制品、奶制品

【正确答案】：B

【答案解析】：草酸结石含钙高，应多食富含纤维素的食物，限制含钙和草酸的饮食，如菠菜、番茄、土豆、芦笋等。

6、直肠癌患者最近出现血尿及膀胱刺激症状，检查后认为是肿瘤转移，这种转移属于

- A.淋巴转移
- B.血行转移
- C.直接浸润
- D.种植性转移
- E.免疫转移

【正确答案】：C

7、针对输血并发症的治疗措施中，错误的是

- A.对较轻的发热反应可以先减慢输血速度
- B.过敏反应表现为呼吸困难、喘鸣、面红腹痛时，必须及时停止输血
- C.出现溶血反应的可疑症状时应适当减慢输血速度并进一步观察
- D.发生循环超负荷时应立即停止输血
- E.出现细菌污染反应必须立即终止输血

【正确答案】：C

【答案解析】：出现溶血反应的可疑症状时应立即停止输血，核对受血者与供血者姓名和血型，并抽取静脉血离心后观察血浆色泽，若为粉红色即证明有溶血。

8、对于已决定手术治疗的急腹症患者，可采取的护理措施有

- A.适当镇痛
- B.适量饮水
- C.灌肠
- D.输液输血
- E.平卧位

【正确答案】：A

【答案解析】：决定手术治疗患者即诊断基本明确的情况下急腹症患者可适当镇痛，故A正确;但必须禁食水、禁灌肠，故B、C不对;急腹症患者半卧位有利于呼吸、利于炎症吸收、缓解症状，不宜平卧，故E不对;而急腹症患者对于血色素 $>10g$ 者一般不需输血治疗，故D不确切。因此答案为A。

9、肾移植的患者术前饮食最好是

- A.高糖、高脂肪、低蛋白
- B.高糖、高蛋白、控制脂肪
- C.每天摄入食盐<9g
- D.低蛋白、高糖、高维生素、低盐
- E.蛋白质以每天每千克体重 1g 较为适宜

【正确答案】：D

10、颈椎病经颈前路手术的病人，护士术前需要指导病人

- A.进行俯卧训练
- B.做颈部前屈运动
- C.做颈部后伸运动
- D.推移气管和食管训练
- E.做颈部侧屈和侧转活动

【正确答案】：D

【答案解析】：主要为适应术中气管食管的牵拉。

11、检查胸腔引流管是否通畅最简易的方法是

- A.听患者呼吸音是否正常
- B.检查引流管有否扭曲
- C.看引流管内有无液体
- D.观察水封瓶中长玻璃管内水柱波动情况
- E.观察水封瓶内有无胸液

【正确答案】：D

【答案解析】：注意观察长玻璃管中的水柱波动。一般情况下水柱上下波动约4~6cm，若水柱波动过高，可能存在肺不张；若无波动，则示引流管不畅或肺已完全扩张。

12、疼痛病人的护理以下描述错误的是

- A.术后疼痛尽量做到疼痛发作后及时给药
- B.用药后评估和记录止痛效果
- C.使用前要了解止痛药物的作用
- D.术前焦虑与术后疼痛关系明显
- E.病人未明确诊断之前，勿随意使用止痛药

【正确答案】：A

【答案解析】：术后疼痛尽量做到疼痛发作前给药，开始给足剂量，以后改为维持量。必要时联合用药。

13、肾挫伤的护理措施错误的是

- A.绝对卧床休息

- B.按时使用抗生素
- C.多饮水，保持尿路通畅
- D.血尿消失后即可下床活动
- E.定时观察体温和血白细胞计数

【正确答案】：D

【答案解析】：绝对卧床休息2~4周，即使血尿消失，仍需继续卧床休息至预定时间。

14、冬眠低温疗法降温速度以每小时下降多少度为宜

- A.0.5℃
- B.1℃
- C.1.5℃
- D.2℃
- E.2.5℃

【正确答案】：B

【答案解析】：冬眠低温疗法：降温速度以每小时下降1℃为宜，体温降至肛温31~34℃较为理想，体温过低易诱发心律失常。

15、颅脑手术后关于应激性溃疡说法正确的是

- A.丘脑上部及脑干受损后可引起应激性胃黏膜糜烂、溃疡和出血
- B.患者呕吐大量黄绿色胃内容物
- C.术后使用地塞米松预防
- D.一旦发现胃出血，应立即放置胃管，抽净胃内容物后用少量温水洗胃
- E.发现胃出血，经胃管或全身应用止血药物

【正确答案】：E

【答案解析】：丘脑下部及脑干受损后可引起应激性胃黏膜糜烂、溃疡和出血，故A错误。患者呕吐大量血性或咖啡色胃内容物，故B错误。术后使用雷尼替丁预防，而不是地塞米松，故C错误。一旦发现胃出血，应立即留置胃管，抽净胃内容物后用少量冰水洗胃，而温水会加重出血，故D错误。发现胃出血，经胃管或全身应用止血药物，故E正确。

16、食管癌术后进流质的时间是

- A.第7天左右
- B.第5天左右
- C.第3天左右
- D.停止胃肠减压24小时后，无呼吸困难、吻合口瘘的症状
- E.停止胃肠减压2小时后，无胸内剧痛

【正确答案】：D

【答案解析】：食管癌术后：停止胃肠减压24小时后，若无呼吸困难、胸内剧痛、患侧呼吸音减弱及高热等吻合口瘘的症状时，可开始进食。

A.肺部并发感染

B.便秘

C.脑干损伤

D.蛛网膜下腔出血

E.颅内感染

【正确答案】：B

【答案解析】：因为肺部并发感染、颅内感染会引起体温升高脑干损伤影响体温中枢，会引起体温升高蛛网膜下腔出血会有吸收热，体温会升高，只有便秘不会引起体温升高，故选B。

18、在石膏固定患者的护理中最重要的评估内容是

A.心理社会反应

B.固定是否确切

C.肢体血运情况

D.生活自理能力

E.既往身体状况

【正确答案】：C

19、低钾血症时静脉输液补钾速度一般不超过

A.10 滴/min

B.20 滴/min

C.30 滴/min

D.40 滴/min

E.60 滴/min

【正确答案】：E

20、外科患者发生代谢性碱中毒最常见的原因是

A.大量输入库存血

B.长期服用碳酸氢钠等碱性药物

C.低钾血症

D.因严重呕吐、长期胃肠减压所致的胃液丧失过多

E.利用呋塞米等利尿药物

【正确答案】：D

【答案解析】：外科病人严重呕吐、长期胃肠减压等，可丧失大量的H<sup>+</sup>及Cl<sup>-</sup>，导致代谢性碱中毒。

21、手术用丝线是优质蚕丝制成，其优点为

A.抗拉力差，组织反应小

B.抗拉力强，组织反应小，在体内不能被吸收

C.在体内能被吸收，组织反应大

E.在体内不能被吸收，抗拉力差

【正确答案】：B

【答案解析】：丝线是异物，不能被人体吸收。我们应用丝线缝合伤口，就是利用丝线拉力强而反应小的特点。

22、结肠造口患者正确的护理措施为

- A.术后应立即保持造口开放状态
- B.取右侧卧位以防粪便流出
- C.以氧化锌软膏涂抹保护外翻肠黏膜
- D.观察造口肠段有无出血、坏死与回缩
- E.术后次日开始应行造口扩张以防造口狭窄

【正确答案】：D

【答案解析】：结肠造口护理：观察造口情况，开放造口前用凡士林或生理盐水纱布外敷结肠造口，敷料浸湿后应及时更换。观察造口肠段的血液循环和张力情况，若发现有出血、坏死和回缩等异常，应及时报告医师并协助处理。

23、开放性骨折现场止血宜首选

- A.上止血带
- B.局部压迫包扎
- C.指压出血血管
- D.结扎出血血管
- E.抬高伤肢

【正确答案】：A

【答案解析】：开放性骨折不能在现场采取局部压迫包扎、指压出血血管、结扎出血血管止血，抬高上肢会加重肢体缺血。

24、输入储存过久的库存血时，易引起

- A.低钙血症
- B.高钾血症
- C.低钾血症
- D.低钠血症
- E.高钠血症

【正确答案】：B

【答案解析】：血液贮存过久，红细胞破坏，细胞内钾离子游离出来。人体输入后会起高钾血症。

25、对于早期妊娠的急性阑尾炎患者行阑尾切除手术，围手术期应加用的治疗是

- A.缩宫素
- B.黄体酮

C.抗生素

D.肾上腺皮质激素

【正确答案】：B

26、T形管的护理下列哪项错误

- A.防止T形管脱落，造成胆汁性腹膜炎
- B.应保持无菌，以防逆行性的感染
- C.保持引流管通畅，防止扭曲、受压
- D.注意保护引流管引出处的皮肤
- E.引流管保持2周后可拔除

【正确答案】：E

【答案解析】：T形管引流2周后可以考虑拔管，但拔出之前先夹闭管道，无症状后造影，造影显示通畅，再引流2~3d后拔管。

27、前列腺摘除术后，前列腺窝出血的护理，哪项最重要

- A.静滴氨甲苯酸
- B.膀胱冲洗液内加凝血药
- C.气囊导尿管充水并固定在大腿内侧
- D.低温等渗盐水膀胱冲洗
- E.避免肛管排气，禁忌灌肠

【正确答案】：C

【答案解析】：前列腺窝出血常采用压迫止血方法。

28、颅脑术后的患者头部只能卧于健侧，是为了

- A.防止呕吐
- B.减轻疼痛
- C.便于观察伤口情况
- D.防止脑疝的形成
- E.减少伤口的压力

【正确答案】：D

29、胰腺癌预防手术后并发症的护理措施错误的是

- A.术前1周开始戒烟
- B.手术前30分钟静脉给一次足量广谱抗生素
- C.教会病人进行深呼吸式呼吸锻炼
- D.手术超过4小时再添加一个剂量的抗生素
- E.术前若无感染，不必过早应用抗生素

【正确答案】：A

【答案解析】：呼吸道准备：严格戒烟，最好在2周以上。

30、有关急性化脓性关节炎不正确的是

D.早期下地功能锻炼

C.物理降温

D.遵医嘱使用抗生素

E.保持引流通畅

【正确答案】：B

【答案解析】：为防止关节粘连，保留关节功能可做关节被动活动，3周后做主动活动，但不要急于下地。

31、急性骨髓炎 X 线检查骨质变化最早出现在

A.发病后 2~3 天

B.发病 1 周后

C.发病 2 周后

D.发病 3 周后

E.发病 4 周后

【正确答案】：C

【答案解析】：早期 X 线检查无改变，最少两周后才有所表现，病骨干骺区骨质破坏，之后骨密质破坏变薄，后期可见密度很高的死骨形成。

32、对于已确诊为腹腔脏器损伤行非手术治疗患者，以下选项中不是转行手术探查指征的为

A.腹部透视，发现胃泡明显扩大

B.腹痛和腹膜刺激征进行性加重

C.肠鸣音逐渐减弱、消失

D.全身情况恶化

E.血压有继续下降趋势

【正确答案】：A

【答案解析】：已确诊为腹腔内脏器破裂，或非手术治疗者在观察期间出现以下情况时，应终止观察，及时进行手术探查：

1.腹痛和腹膜刺激征有进行性加重或范围扩大者；

2.肠鸣音逐渐减弱、消失或出现腹胀明显者；

3.全身情况有恶化趋势，出现口渴、烦躁、脉率增快，或体温及白细胞计数上升者

4.红细胞计数进行性下降者；

5.血压由稳定转为不稳定甚至下降者；

6.胃肠道出血不易控制者；

7.经积极抗休克治疗，情况不见好转反而继续恶化者。

题干问不是转手术探查的指征，只有 A 不符合。

33、局麻药内加肾上腺素的主要目的是

A.延缓药物吸收，避免中毒



D.预防术中血压下降

E.预防术中脉搏减慢

【正确答案】：A

【答案解析】：局麻药内加肾上腺素可使局部血管收缩，延缓药物吸收，避免中毒。

34、典型外伤性硬脑膜外血肿的临床经过是

A.血肿侧瞳孔散大→意识障碍→血压升高

B.血肿对侧肢体瘫痪→对侧瞳孔散大→意识障碍

C.清醒后再次出现进行性意识障碍→血压升高、脉搏变慢→瞳孔两侧不等大

D.双侧瞳孔同时散大→血压下降

E.意识障碍→去脑强直→呼吸停止

【正确答案】：C

【答案解析】：典型外伤性幕上硬脑膜外血肿会出现中间清醒期，所以会再次出现意识障碍，进行性加重。血压升高、心率、脉搏减慢，患侧瞳孔先缩小，对光反射迟钝继而进行性扩大、对光反射消失。故选C。

35、对于腹膜炎患者采取半卧位的优点，不包括

A.减轻中毒症状

B.有利于呼吸

C.减轻腹胀

D.有利于渗液吸收

E.有利于渗液积聚至盆腔

【正确答案】：D

【答案解析】：体位半卧位可以促使腹内渗出液积聚于盆腔，以减少吸收、减轻中毒症状并利于引流，同时使膈肌下移，腹肌松弛，减轻腹胀对呼吸和循环的影响。

36、肠梗阻患者手术治疗后应注意观察预防的并发症为

A.急性胃扩张

B.急性呼吸窘迫综合征

C.休克

D.肠痿

E.泌尿系感染

【正确答案】：D

【答案解析】：肠梗阻手术治疗后需及时观察发现的并发症为腹腔感染、肠痿、肠粘连其他选项出现几率低。故选D。

37、胃、十二指肠溃疡手术后护理正确的措施为

A.禁食禁饮1周

- D.血压平稳后宜低半卧位
- E.术后 3 天给予少量米汤或饮水

【正确答案】：D

【答案解析】：胃、十二指肠溃疡手术后：

血压平稳后取低半卧位，禁食、胃肠减压、输液及应用抗生素。观察生命体征以及胃肠减压和引流管吸出液的量和性质。肠蠕动恢复后，拔出胃管后当日可少量饮水或米汤，第 2 日进半量流质饮食，鼓励病人术后早期活动。

- 38、泌尿系统梗阻最危险的是
- A.肾小球滤过率降低，尿量减少
  - B.肾血管受压，血流量减少
  - C.尿浓缩能力下降
  - D.尿的酸化能力受损害
  - E.细菌直接进入血循环

【正确答案】：E

- 39、关于小脑幕切迹疝说法正确的是
- A.又称枕骨大孔疝
  - B.小脑幕上方的颞叶沟回、海马回通过大脑幕切迹向幕下移位
  - C.疝入的组织压迫小脑的大脑脚
  - D.牵拉动眼神经引起锥体束征
  - E.牵拉滑车神经引起瞳孔变化

【正确答案】：D

【答案解析】：小脑幕切迹疝又称颞叶沟回疝，故 A 错误。小脑幕上方的颞叶沟回、海马回通过小脑幕切迹向幕下移位，故 B 错误。疝入的组织压迫中脑的大脑脚，故 C 错误。牵拉动眼神经引起锥体束征，故 D 正确。牵拉动眼神经引起瞳孔变化，故 E 错误。故正确答案选 D。

- 40、肿瘤患者化疗或放疗期间，最重要的观察项目是
- A.胃肠道反应
  - B.口腔黏膜反应
  - C.血白细胞和血小板计数

- D.皮肤反应
- E.脱发

【正确答案】：C

【答案解析】：肿瘤病人放疗和化疗期间，需观察的项目很多，最主要的是观察对造血系统的损伤。

## 二、A2

- 1、刘女士，30 岁，因盆腔脓肿需行手术，患者的麻醉方式应选择

A.连续硬膜外阻滞

C.低位硬膜外阻滞

D.骶管阻滞

E.神经阻滞麻醉

【正确答案】：C

【答案解析】：椎管内麻醉包括蛛网膜下腔阻滞、硬脊膜外阻滞。

硬脊膜外阻滞：

硬脊膜外阻滞也称硬膜外阻滞，是将局麻药注入硬膜外间隙，阻滞脊神经根。使其支配区域产生暂时性麻痹的麻醉方法。适用于除头部以外的任何手术。

分类

根据硬膜外阻滞部位不同，可分为：

1.高位硬膜外阻滞 于颈5~胸6之间进行穿刺，阻滞颈部及上胸段脊神经，适用于甲状腺、上肢或胸壁手术，目前已罕用。

2.中位硬膜外阻滞 穿刺部位在胸6~胸12之间，常用于腹部手术。

3.低位硬膜外阻滞 穿刺部位在腰部各棘突间隙，用于下肢及盆腔手术。

4.骶管阻滞 经骶裂孔进行穿刺，阻滞骶神经，适用于肛门、会阴部手术。

2、女性，28岁，原发性甲状腺功能亢进，术前行碘剂及硫氧嘧啶类治疗无效，改用普萘洛尔(心得安)奏效。术前行苯巴比妥钠及阿托品，术中发现心率增加到170/min，其原因是

A.休克早期

B.手术刺激

C.甲状腺危象早期

D.精神紧张

E.阿托品作用

【正确答案】：E

【答案解析】：阿托品提高窦房结兴奋性，提高心率。

3、男性，58岁，车祸伤3h后送来急诊，检查发现骨盆骨折，左股骨干骨折，左胫腓骨骨折，查体：面色苍白，血压75/45mmHg，在急诊室的首选治疗是

A.固定骨折处

B.建立静脉通道补液

C.找家属办手续

D.联系床位住院

E.通知化验室检查

【正确答案】：B

【答案解析】：休克病人应该立即补液治疗。

4、女性，40岁，发现左侧乳房肿块1周，穿刺确诊为乳癌，全麻下行乳腺癌根治术，清醒后应采取的体位是

- B.侧卧位
- C.半卧位
- D.端坐位
- E.头抬高 15°，足抬高 20°

【正确答案】：C

【答案解析】：体位:病人术后血压平稳后可取半卧位，有利于呼吸和引流。

5、患者，男性，21岁。4小时前饮酒后突然出现上腹剧痛。查体：板状腹，全腹压痛反跳痛，左上腹最为明显，肝浊音界消失，移动性浊音(+)，肠鸣音消失。对该患者最重要的诊断依据是

- A.肠鸣音消失
- B.突发腹部剧痛
- C.腹膜炎体征
- D.肝浊音界消失
- E.移动性浊音

【正确答案】：D

【答案解析】：患者饮酒后突发上腹剧痛，考虑急性胰腺炎或穿孔病变，而肝浊音界消失为气腹表现，对诊断穿孔排除胰腺炎有指导意义，而其他选项的体征可出现在任何急腹症。故选D。

6、男性，12岁，运动中发生前臂骨折，入院复位后给予对小夹板固定，下列哪项不妥

- A.抬高患肢
- B.注意观察机体的感觉，运动及血运
- C.可早期进行患肢功能锻炼
- D.告诉病人定期复诊
- E.缚夹板的带结以不能上下移动为宜

【正确答案】：E

【答案解析】：夹板外绑带松紧合适，以能容易上下移动1cm为宜。

7、患者，女性，35岁。左前臂石膏绷带包扎1小时后，出现手指剧痛，苍白发凉，桡动脉搏动减弱，应首先采取的措施是

- A.保暖
- B.抬高前臂
- C.给止痛药
- D.肢体远端注意保暖
- E.适当松解石膏绷带

【正确答案】：E

【答案解析】：题中所述症状是石膏包扎过紧所导致的血运障碍引起的，所以首选处理措施是E。

- A.鼻咽部黏膜损伤
- B.恶心、呕吐、腹胀、腹泻
- C.高血糖及电解质紊乱
- D.管道阻塞
- E.吸入性肺炎

【正确答案】：B

【答案解析】：肠内营养易引起消化道功能紊乱等一系列表现。

9、患者男性，15岁，检查后诊断为急性血源性化脓性骨髓炎。以下选项术后护理描述错误的是

- A.滴入瓶高于床面60~70cm
- B.引流瓶低于床面50cm
- C.引流速度维持50~60滴/分
- D.保持引流通畅，防止阻塞和扭曲
- E.制动肢体可进行肌肉等长收缩

【正确答案】：C

【答案解析】：术后切口观察及引流护理保持引流通畅，防止阻塞和扭曲。滴入瓶高于床面60~70cm，引流瓶低于床面50cm，引流速度术后第1天快速滴入，以后维持50~60滴/分，详细记录引流液性质及引流液量。伤口及时换药。

10、女性，62岁，肛门处流脓，排气9个月，2年前曾行肛管脓肿切排术，查：肛门左侧旁有一瘘口有粪性分泌物，该病人术后护理哪项不正确

- A.为减少排便时疼痛，多用温盐水灌肠
- B.便后坐浴20~30min
- C.坐浴常用0.02%高锰酸钾液
- D.伤口敷料保持干燥
- E.伤口引流保持通畅

【正确答案】：A

【答案解析】：肛肠疾病一般不灌肠，以免引起出血，或加重感染。

11、食管癌切除术后第8天的病人，开始进食少量流食，病人出现发热、轻度呼吸困难，护士高度怀疑病人可能出现

- A.肺部感染
- B.乳糜胸
- C.吻合口瘘
- D.肺不张
- E.肿瘤转移

【正确答案】：C

甚至脓毒血症。吻合口瘘多发生在术后 5~10 天。

12、一肺叶切除术后第 3 天的病人，出现气促，听诊双肺满布痰鸣音，护士采取下列措施帮助病人，但哪项除外

- A.教会病人深呼吸、有效地咳嗽
- B.吸氧
- C.每天进行雾化吸入 3 次
- D.叩背
- E.限制饮水

【正确答案】：E

【答案解析】：肺叶切除术后病人出现气促，听诊双肺满布痰鸣音，多与肺部感染有关，护士应该加强感染护理。

限制饮水只会使痰液更加难以咳出，无助于感染的控制。

13、女性，34 岁，全身化脓性感染，需抽血做血培养及抗生素敏感试验，最佳时间应是

- A.高热时
- B.间歇期
- C.寒战时
- D.静脉滴注抗生素时
- E.抗生素输入后

【正确答案】：C

【答案解析】：寒战时细菌量大，毒素强，血培养阳性率高。

14、女性，34 岁，下肢骨折后行石膏固定，5d 后发生了骨筋膜室综合征，对其正确的处理是

- A.抬高患肢
- B.立即切开复位，探查血管
- C.密切观察有无肾功能损害
- D.拆除外固定

E.彻底切开筋膜减压

【正确答案】：D

【答案解析】：发生骨筋膜室综合征，要立即去除过紧的固定，内部血肿切开减压。

15、女性，45 岁，胃肠道术后禁食患者，化验血清钾离子偏低，给予氯化钾静脉滴注，病人自行调快滴速，突然出现了呼吸困难，心律失常，护士须采取的紧急措施是

- A.10%葡萄糖注射液 50ml，静脉注射
- B.5%葡萄糖注射液 20ml，静脉注射
- C.0.9%氯化钠注射液 20ml，静脉滴注
- D.5%氯化钙加等量 5%葡萄糖溶液缓慢滴入
- E.10%氯化钙 50ml，静脉滴注

【正确答案】：D

16、患者男性，35岁。因车祸导致双下肢挤压伤，第2天统计24小时尿量为200ml，下列化验结果不符台肾衰竭的是

- A.血钾 5.6mmol/L
- B.尿素氮 14.2mmol/L
- C.血镁 1.4mmol/L
- D.血磷 0.89mmol/L，血钙 2.96mmol/L
- E.血浆肌酐 106mmol/L

【正确答案】：D

【答案解析】：挤压伤最主要的问题是肾衰竭，当24小时尿量小于400ml时即为少尿，因此根据患者第2天尿量可认为该患者已进入肾衰竭少尿期。该期患者由于少尿，会有代谢产物聚集，导致肌酐、尿素氮增高还会导致高血钾、高血镁、高血磷和低血钙，故D错误。

17、患者女性，10岁，被载重汽车砸伤左大腿，出血2小时。左下肢剧痛，不敢活动。检查神志清，表情淡漠，面色苍白，脉搏细弱，大腿中段皮肉裂开，骨端外露。应考虑合并有

- A.血管损伤
- B.神经损伤
- C.创伤性休克
- D.脂肪栓塞
- E.挤压综合征

【正确答案】：C

【答案解析】：分析题干信息患者有外伤史，左大腿损伤，出血2小时，出血造成表情淡漠，面色苍白，脉搏细弱等休克表现，选项A描述不全面，而选项B无依据，选项D患者主要表现为呼吸困难，故与题干不符，选项E患者以肾衰竭为诊断标准，故可排除，因此正确答案为C。

18、某先生，因十二指肠溃疡并发瘢痕性幽门梗阻，反复呕吐宿食，消瘦，皮肤干燥，弹性消失入院后经充分术前准备，在硬脊膜外麻醉下行胃大部切除术。该病人入院时的护理诊断是

- A.心输出量减少
- B.体液不足
- C.组织灌注量改变
- D.活动无耐力
- E.知识缺乏

【正确答案】：B

19、张先生，肝硬化致门静脉高压症，分流手术前的护理哪项正确

- A.鼓励体育锻炼
- B.高蛋白，高脂饮食
- C.注射维生素K

【正确答案】：C

20、孙先生，6h前负重物时，右侧斜疝被嵌顿，哪项临床表现，说明疝内容物已发生缺血坏死，应做好急诊手术前准备

- A.疝块增大，不能回纳
- B.局部有剧烈疼痛
- C.疝块紧张发硬，有触痛
- D.阵发性腹痛伴呕吐
- E.全腹有压痛，肌紧张

【正确答案】：E

21、阑尾脓肿患者，给予抗感染治疗1周后再次复诊时发现脓肿已消退，请问做阑尾切除术的最佳时间为

- A.立即手术切除
- B.1周后手术切除
- C.1个月手术切除
- D.2个月手术切除
- E.3个月后手术切除

【正确答案】：E

【答案解析】：根据病情，病人出现阑尾脓肿，一般保守治疗3个月后手术。

22、患者男性，54岁。黄疸、纳差2个月。体格检查：全身黄染明显，胆囊肿大可扪及。血总胆红素 $342\mu\text{mol/L}$ ，AKP300U。此时最可能原因为

- A.急性病毒性肝炎

B.胆道蛔虫症

C.胆总管囊肿

D.壶腹周围癌

E.溶血性黄疸

【正确答案】：D

【答案解析】：碱性磷酸酶(ALP,AKP)正常值：成人 $32\sim 92\text{U/L}$ ；儿童(小于10岁) $36\sim 213\text{U/L}$ 。

阻塞性黄疸、肝硬化、肝坏死，碱性磷酸酶明显升高(肝细胞性黄疸则升高不明显)。

壶腹周围癌，是指壶腹部、胆总管末段及十二指肠乳头附近的癌肿，主要包括壶腹癌、胆总管下端癌和十二指肠腺癌。常见临床症状为进行性、近乎无痛性黄疸、肝及胆囊肿大，纳差，消瘦等。化验检查：早期淀粉酶可升高，血清胆红素一般多在 $13.68\mu\text{mol/L}(8\text{mg})$ 以上，尿胆红素强阳性。SGPT、AKP增高。大便潜血试验约85~100%患者为阳性，镜检可见未消化的肌纤维和脂肪。

23、女性，40岁，因门脉高压，上消化道出血而行脾切除、脾肾静脉分流术，术后卧位是

- A.去枕平卧位



D.自由体位

E.制动平卧位

【正确答案】：E

【答案解析】：为减少术后出血，门静脉高压症分流术后病人平卧位48h，并且不让床上活动。

24、患者，男性，36岁。公司聚餐中饮白酒1斤，6小时后上腹剧痛来就诊。上腹部及左上腹仅有轻度深压痛。

此时对该患者最有价值的化验检查是

A.尿淀粉酶测定

B.血淀粉酶测定

C.血清钙测定

D.B超检查

E.谷丙转氨酶测定

【正确答案】：B

25、患者，女性，43岁。头外伤引起脑干损伤、高温，拟行冬眠低温疗法，物理降温需在用冬眠药后0.5小时施行，

这是为了防止

A.低血压

B.抽搐

C.寒战

D.不退热

E.呼吸困难

【正确答案】：C

【答案解析】：因为使用冬眠药后，要等自主神经被充分阻滞，患者御寒反应消失，进入昏睡状态后，方可加用物理降温措施。否则，患者一旦出现寒战，可使机体代谢率升高、耗氧量增加，无氧代谢加剧及体温升高。故选C。

26、患者男性，40岁。十二指肠溃疡，择期经上腹正中切口行胃大部切除术，并置乳胶片引流。一般拔除引流片时间为

A.术后1~2天

B.术后3~4天

C.术后5~6天

D.术后7~8天

E.术后9~10天

【正确答案】：A

【答案解析】：乳胶引流片一般于术后1~2天拔除，单腔或双腔橡皮引流管放置的时间主要依引流的目的而定，大多要1周内拔除。胃肠减压管一般在胃肠道功能恢复、肛门排气后，即可拔除。

27、44岁，急性腹膜炎术后怀疑并发盆腔脓肿，最简单的方法是

C.X线腹部透视

D.大便检查

E.腹腔穿刺

【正确答案】：B

【答案解析】：直肠指检可以触及直肠前壁饱满感、波动感。

28、一自发性气胸的年轻病人，有胸腔闭式引流，其想带管活动，活动时要注意，但下列哪项除外

A.活动前要固定好引流瓶

B.引流瓶要低于胸腔

C.维持引流瓶的直立状态

D.夹闭引流管

E.保持引流系统的密闭性

【正确答案】：D

【答案解析】：胸腔引流必须保持通畅，不能夹闭。

29、患者，男性，48岁。因顽固性十二指肠溃疡而于18个月前行胃大部切除术，3个月前再次出现中上腹痛，且比术前更剧烈，并偶有黑便，则该患者最可能的诊断是

A.残胃癌

B.吻合口溃疡

C.碱性反流性胃炎

D.残胃溃疡

E.残留十二指肠溃疡

【正确答案】：B

【答案解析】：选项A发生在良性疾病行胃大部切除术5年以上，故可排除;选项C主要表现为剑突下持续性烧灼痛，呕吐、体重减轻等，无黑便，故可排除胃大部切除术后不会并发选项D、E;而选项B吻合口溃疡多发生在术后2年内，主要症状为溃疡症状重现，患者的病史特点与此相符，故选B。

30、患者女性，70岁。因急腹症入院，急救过程中先后出现少尿、肺水肿、呼吸困难、嗜睡、意识障碍、消化道出血等症状，应诊断为

A.DIC

B.ARF

C.MODS

D.ARDS

E.SIRS

【正确答案】：C

三、A3/A4

1. 患者男性，60岁。因头痛、头晕、右半身麻木于2个月前门诊全不入院。1年前发现右臂痛，即行颈椎CT平扫

右侧肢体不全瘫，右侧病理反射阳性。胸片示右肺第2肋间可见阴影。

【正确答案】：

<1>、本例患者考虑有

- A.左大脑中动脉闭塞
- B.脑干缺血性病灶
- C.高血压脑出血
- D.颅内压增高
- E.脑萎缩

【正确答案】：D

【答案解析】：因为头痛、呕吐、视乳头水肿是颅内压增高的典型临床表现，选项A、B、C、E与题干信息不符，所以考虑患者有颅内压增高。

<2>、为明确诊断，首选的检查是

- A.脑血管造影
- B.头部CT或MRI
- C.脑超声波
- D.腰穿
- E.胸部CT

【正确答案】：B

【答案解析】：选项A脑血管造影主要用于疑有脑血管畸形或动脉瘤等疾病的病例。选项C、E对颅内占位性病变无诊断价值；颅内高压时禁止做腰穿，排除选项D。头部CT是诊断颅内占位性病变的首选辅助检查措施，不仅能对绝大多数占位性病变做出定位诊断，而且还有助于定性诊断。CT具有无创伤性的特点，易于被患者接受。在CT不能确诊的情况下，可进一步行MRI检查，以利于确诊，故选B。

<3>、检查发现有颅内占位性病变，病变周围水肿明显，且中线移位 $>0.5\text{cm}$ 。应首先考虑的诊断是

- A.慢性硬脑膜下血肿
- B.脑出血
- C.脑转移瘤
- D.脑脓肿
- E.原发性颅内肿瘤

【正确答案】：C

【答案解析】：选项A较少见，多出现在有头部外伤时；选项B常有血压突然升高而发病，头痛剧烈，病情加重；选项D常有发热。故排除A、B、D。因为颅内占位性病变，考虑颅内肿瘤；同时右肺第2肋间可见阴影，考虑是肺部肿瘤脑转移，所以考虑脑转移瘤，排除E，故选C。

<4>、此时最有效的处理措施是

- A.持续腰穿引流

C.开颅病灶切除

D.过度换气

E.去骨片减压术

【正确答案】：C

【答案解析】：因为颅内占位性病变(颅内肿瘤)是导致颅内压增高的原因，而手术是治疗颅内肿瘤最直接、最有效的方法，所以开颅病灶切除是解除颅内压增高的最有效措施。选项A是颅内高压处理的禁忌措施，选项B、D、E为保守治疗措施，不能去除病因，故选C。

2、患者，男性，34岁。急刹车致使方向盘挤压上腹部16小时，患者主诉上腹部、腰部及右肩疼痛，持续性，伴恶心、呕吐。查体：体温38.4℃，上腹部肌紧张明显，有压痛，反跳痛(±)，移动性浊音(-)，肠鸣音存在。血常规：白细胞 $18.4 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞89%，淋巴细胞11%，怀疑胰腺损伤。

【正确答案】：

<1>、如行剖腹探查术，则术中最可能发现的合并损伤的脏器是

A.十二指肠

B.胆总管

C.横结肠

D.右侧肾

E.脾

【正确答案】：A

【答案解析】：因十二指肠邻近胰腺组织，两者同时损伤相对其他选项可能性大若胆总管损伤患者应有胆汁性腹膜炎症状，肾脏损伤应有血尿等表现，脾脏损伤一般有出血性休克表现。故选A。

<2>、如果此患者处理不妥当，最可能的远期并发症是

A.胆总管狭窄

B.胰腺真性囊肿

C.脂肪泻

D.胰腺假性囊肿

E.横结肠梗阻

【正确答案】：D

【答案解析】：胰腺损伤最常见的并发症为胰腺假性囊肿。故选D。

<3>、如果患者拟行手术治疗，手术前正确的措施是

A.大量快速输血输液

B.少量流质饮食

C.注射吗啡止痛

D.抗感染治疗

E.腹部热敷

【答案解析】：胰腺损伤后应禁食、胃肠减压、输液，禁忌热敷、禁忌应用吗啡止痛以免引起Oddi括约肌收缩加重病情。而选项A会导致患者循环负荷过重，描述不确切，故选D。

<4>、患者手术后正确的护理措施为

- A.半卧位，早期活动
- B.绝对卧床制动
- C.术后次日恢复流质饮食
- D.禁忌使用止痛药物
- E.应用吗啡止痛

【正确答案】：A

【答案解析】：胰腺手术后宜半卧位以利于引流、减少炎症吸收，鼓励早期床上活动，故A正确而B错误;禁食胃肠减压直至患者肠蠕动恢复，故C不对;适当止痛以保证患者舒适。但禁忌应用吗啡止痛以免引起Oddi括约肌收缩加重病情，故D、E不正确。因此答案为A。

<5>、患者手术后发生胰瘘，正确的处理是

- A.一旦肠鸣音恢复即可行完全肠内营养
- B.应用减少胰腺分泌药物

- C.手术治疗缝合瘘口
- D.拔除引流管促使瘘口自愈
- E.无需肠外营养

【正确答案】：B

【答案解析】：对于胰瘘患者应禁食、胃肠减压并应用抑制胰腺分泌药物以减少胰液渗漏，故A错误而B正确;需肠外营养支持以促进瘘口愈合，故E错误;放置引流管有效引流。保证引流通畅，不作瘘口缝合，经有效引流和应用抑制胰腺外分泌药物、胃肠外营养支持等治疗后4~6周内自愈，故C、D不正确;因此答案为B。

<6>、对明确诊断帮助最大的检查是

- A.腹部B超
- B.上腹部CT检查
- C.诊断性腹腔穿刺抽出液的淀粉酶含量测定
- D.腹部X线平片
- E.测定血清淀粉酶

【正确答案】：C

【答案解析】：腹腔穿刺淀粉酶含量测定为胰腺损伤诊断的特异性指标。故选C。

3、患者，女性，15岁。胸背痛2年余，发病以来始终伴有低热，夜间盗汗，体重下降5kg，查体：脊椎轻度后凸畸形，胸部棘突压痛，X线片示胸椎溶骨性破坏，椎间盘受累，诊断为胸椎结核。

【正确答案】：

<1>、该患者准备接受手术治疗，术前应用抗结核药物的时间至少应为

B.2周

C.3周

D.4周

E.5周

【正确答案】：B

<2>、术前该患者被要求严格卧床，最主要的目的是

A.促进睡眠

B.减轻疼痛

C.预防截瘫

D.改善营养状况

E.控制结核症状

【正确答案】：C

【答案解析】：绝对卧硬板床休息，以减轻椎体压力，防止脊柱受压或截瘫加重，使病灶局限，减少机体消耗。

<3>、术后护理措施中正确的是

A.术后早期应轴线翻身

B.全身制动至骨组织完全愈合

C.继续服用抗结核药物1~2周

D.若发生气胸应持续低流量吸氧

E.若出现石膏综合征应立即完全拆除石膏

【正确答案】：A

4、某女生，22岁。长期减肥禁食，晕倒，急诊收入院。

【正确答案】：

<1>、该女性昏迷的原因最有可能为

A.高钾血症

B.等渗性脱水

C.高渗性脱水

D.低渗性脱水

E.低钙血症

【正确答案】：C

<2>、治疗该患者首选静脉滴注液体为

A.乳酸林格液

B.0.9%氯化钠液

C.5%葡萄糖液

D.10%葡萄糖液

【正确答案】：C

【答案解析】：对于高渗性脱水患者治疗原则是尽早去除病因，能饮水者尽量饮水，不能饮水者静脉滴注5%葡萄糖，脱水症状基本纠正、血清钠降低后再补充适量等渗盐水，故答案为C。

5、患者男性，20岁。左足被开水烫伤，疼痛剧烈，局部有水疱。

【正确答案】：

<1>、评估其烧伤面积及深度为

- A.3.5%，I度
- B.3.5%，浅II度
- C.4%，深II度
- D.7%，浅II度
- E.3%，I度

【正确答案】：B

<2>、应立即改为暴露疗法的情况是

- A.敷料湿透
- B.发热
- C.创面疼痛
- D.敷料渗液，呈绿色
- E.白细胞计数增高

【正确答案】：D

四、B

- 1、A.胆石症
- B.急性胰腺炎
- C.十二指肠溃疡
- D.输尿管结石
- E.脾破裂

【正确答案】：

<1>、脐周出现蓝色改变(Cullen征)多见于

【正确答案】：B

【答案解析】：急性胰腺炎时外漏的胰液(包含许多酶)沿组织间隙到达皮下，溶解皮下脂肪，使毛细血管破裂出血，同时坏死组织及腹腔内出血沿腹膜间隙与肌层渗入腹壁下，出现皮下斑点，出现Cullen征，其他选项无此特征。

<2>、最常致出血性休克的是

【正确答案】：E

【答案解析】：脾脏为实质性脏器，损伤破裂时，出血量较大，容易引起出血性休克，其他选项不易引起出血性休克。

【正确答案】：A

【答案解析】：胆石症时炎症可经刺激膈肌导致同侧肩背部放射痛。

2、A.急性单纯性胆囊炎

B.胆囊结石经常发作

C.胆总管结石伴有休克

D.肝内结石局限于左叶

E.胆总管扩张不明显，但并发慢性胰腺炎

【正确答案】：

<1>、胆总管探查及引流术适用于

【正确答案】：C

<2>、肝叶切除术适用于

【正确答案】：D

<3>、胆总管口括约肌切开成形术适用于

【正确答案】：E

<4>、非手术治疗适用于

【正确答案】：A

<5>、胆囊切除术适用于

【正确答案】：B

【答案解析】：胆总管结石伴有休克者，宜立即行胆总管探查引流减压肝内结石局限于左叶者，可行肝叶切除以治疗肝管阻塞；当胆总管扩张并发慢性胰腺炎时，宜通过胆总管口括约肌切开成形术缓解该处压力，以免有饮酒、劳累等因素时诱发急性胰腺炎。胆囊炎是细菌性感染或化学性刺激(胆汁成分改变)引起的胆囊炎性病变，急性单纯性胆囊炎可经内科消炎利胆等治疗；对于经常发作的胆囊结石，治疗原则是手术切除病变胆囊。

3、A.抑郁期

B.磋商期

C.愤怒期

D.接受期

E.震惊否认期

【正确答案】：

<1>、小刘得知患了肝癌晚期后不言不语，眼神呆滞。继之极力否认，不相信这个事实，此时处于

【正确答案】：E

<2>、当小刘不得不承认自己患癌后，表现出烦躁、不满的情绪，此时处于

【正确答案】：C

<3>、小刘经过一段时间的挣扎，很希望自己能够活下来，祈求在自己身边可出现奇迹，此时处于

【正确答案】：B



<5>、小刘经过激烈的内心挣扎，正确认识到生命终点的到来，心境变得平和，通常不愿多说话，此时处于

【正确答案】：D

