

# 《外科主治医师》试题及答案

## 《外科主治医师》试题及答案

### 一、单项选择题

1.关于生殖细胞瘤以下描述中不正确的是

- A 鞍上为多发部位
- B 恶性程度高
- C 放疗敏感
- D 化疗不敏感
- E 常通过脑脊液播散

正确答案：D

解题思路：生殖细胞瘤对化疗具有较高的敏感性，同时松果体区血脑屏障的解剖缺陷使药物易于分布于肿瘤细胞。

2.关于血管网织细胞瘤的描述不正确的是

- A 为良性肿瘤
- B 可多发
- C 瘤结节与囊大小无关
- D 病程囊性长，实性短
- E 实性肿瘤术前行血管栓塞

正确答案：D

解题思路：一般囊性肿瘤病程短，实性肿瘤生长缓慢，长达数年或更长。实性肿瘤供血非常丰富，术前行血管栓塞将降低手术风险及难度。

3.颅内肿瘤中最多见的是

- A 转移瘤
- B 脑膜瘤
- C 神经上皮性肿瘤
- D 垂体腺瘤
- E 胆脂瘤

正确答案：C

解题思路：颅内肿瘤中以神经上皮肿瘤发病率最高，有资料统计约占全部颅内肿瘤的40%。

4.蛛网膜下腔出血常见的原因是

- A 颅内动脉瘤
- B 脑动脉炎
- C 高血压
- D 颅脑外伤
- E 颅内肿瘤

正确答案: A

解题思路: 此题无解题思路

5. 关于脑干肿瘤的描述中, 不正确的是

- A 延髓巨大血管网状细胞瘤术后常出现消化道出血
- B 小且深在的无症状海绵状血管瘤可不手术
- C 室管膜瘤边界不清, 难以全切
- D 脑干肿瘤DSA多无异常
- E 星形细胞瘤多发生在儿童及青年

正确答案: C

解题思路: 室管膜瘤多有边界, 在显微镜下多可完全切除。

6. 以下哪项不符合颅内原发性淋巴瘤临床表现

- A 病程长
- B 头痛、呕吐
- C 轻偏瘫
- D 视盘水肿
- E 精神症状

正确答案: A

解题思路: 颅内原发性淋巴瘤为恶性肿瘤, 病程短, 多在半年内。

7. 对放射治疗最为敏感的神经上皮性肿瘤是

- A 星形细胞瘤
- B 室管膜细胞瘤
- C 髓母细胞瘤
- D 松果体细胞瘤
- E 少枝胶质细胞瘤

正确答案: C

解题思路: 不同类型的胶质瘤按对放疗的敏感性依次排列为髓母细胞瘤>少枝胶质细胞瘤>室管膜

8. 跨越视交叉后上方的颈内动脉分支是

- A 脉络膜前动脉
- B 脉络膜后动脉
- C 大脑前动脉
- D 大脑中动脉
- E 眼动脉

正确答案：C

解题思路：大脑前动脉自颈内动脉发出后走向中线，于视交叉后上方进入纵裂。

9. 颅内动脉瘤的好发部位是

- A 前交通动脉
- B 后交通动脉
- C 海绵窦
- D 椎-基底动脉系统
- E 颈内动脉系统的分叉部

正确答案：E

解题思路：此题无解题思路

10. 闭合性颅脑损伤早期治疗要点是

- A 防止休克
- B 防止癫痫
- C 气管切开
- D 控制水入量
- E 防止脑水肿和颅内血肿

正确答案：E

解题思路：此题无解题思路

11. 患者头部外伤后，双眼出现向左侧的同向凝视，可考虑有

- A 右侧额极损伤
- B 左侧额极损伤
- C 左侧额中回后部损伤
- D 左枕叶损伤
- E 右颞叶损伤

正确答案：C

引起向病侧的同向凝视。

12. 关于脊髓空洞症, 下述哪个是不正确的

- A 节段性分离性障碍
- B 常伴有Chiari畸形
- C 一侧或两侧鱼际肌、骨间肌萎缩
- D 可出现Charcot关节
- E 常呈急性发病

正确答案: E

解题思路: 脊髓空洞症慢性起病, 逐渐加重。

13. 动脉瘤破裂形成血肿的发生率, 以何者最高

- A 前交通动脉瘤
- B 后交通动脉瘤
- C 大脑后动脉动脉瘤
- D 大脑中动脉动脉瘤
- E 基底动脉动脉瘤

正确答案: D

解题思路: 大脑中动脉动脉瘤分布在主干上约占72%, 其余在周围支上, 其出血频度高, 发生血肿机会多。

14. 在动脉瘤手术中以下列哪种方法最好

- A 孤立术
- B 近端载瘤动脉夹闭术
- C 加固术
- D 瘤颈夹闭术
- E 凝固术

正确答案: D

解题思路: 动脉瘤的治疗方法很多, 但到目前为止动脉瘤颈夹闭仍是首选和最好方法, 另外, 现在施行血管内治疗动脉瘤栓塞的也日渐增多。

15. 动脉瘤破裂后再出血多发生在初次破裂后的哪段时间

- A 一周以内
- B 第一周末至第二周

C 第二周末至第三周

正确答案：B

解题思路：目前大量资料表明，动脉瘤破裂后的再出血多发生于初次破裂后的7~14天。

16. 下列哪项表述是错误的

A 颅裂纯属先天颅骨发育异常

B 单纯颅裂一般需手术治疗

C 裂孔处有组织外溢称囊性颅裂

D 颅裂大多位于中线，以枕部最为多见

E 眶内脑膜脑膨出应与眶内肿物鉴别

正确答案：B

解题思路：单纯颅裂一般无需手术治疗，当合并膨出者一般需手术治疗，手术治疗的目的是切除膨出囊，还纳膨出的脑组织等内容物，修补不同层次的裂孔。

17. 目前动脉瘤开颅手术中较理想的方法是

A 动脉瘤包裹术

B 动脉瘤孤立术

C 载瘤动脉夹闭术

D 动脉瘤颈夹闭术

E 动脉瘤颈夹闭术+动脉瘤切除术

正确答案：E

解题思路：此题无解题思路

18. 女性，10岁，头痛1年，加重伴呕吐，10天。查体，双侧视神经乳头水肿，性早熟，双眼不能上视，病变部位在

A 大脑半球

B 蝶鞍区

C 松果体区

D 小脑

E 脑干

正确答案：C

解题思路：此题无解题思路

19. 对脑动脉瘤的预后主要根据为

A 意识障碍程度

B 脑压上升程度

D 有无偏瘫

E 脑动脉瘤的多少

正确答案: A

解题思路: 此题无解题思路。此题出得有问题: 一是破裂动脉瘤还是未破裂动脉瘤的评价表转是各不相同的。

20. 脑脓肿的形成是一个连续的过程, 它可划分为几个阶段

A 2

B 3

C 4

D 5

E 6

正确答案: B

解题思路: 脑脓肿的病理过程一般可分为三个阶段, 即急性脑炎症阶段、化脓阶段、包膜形成阶段。

21. 颅内转移瘤来源最常见为

A 肺部

B 肝脏

C 泌尿系统

D 胃肠

E 皮肤及骨骼

正确答案: A

解题思路: 颅内转移瘤以肺癌最多见, 国内外统计来源最多均为肺癌。

22. 外展神经起自

A 延髓上缘

B 中脑下缘

C 脑桥上缘

D 脑桥下缘

E 中脑

正确答案: D 对的, 第六对颅神经是发自桥延沟, 但是作为高位颅神经不会发自延髓的。所以是发自桥脑的下缘。

解题思路: 此题无解题思路

A 持续的小发作

B 频发的癫痫大发作

C 长期服药不能控制的大发作

D 频发的大发作，间歇期仍意识不清

E 持续的精神运动性发作

正确答案：D

解题思路：癫痫持续状态的定义为频繁大发作，间歇期仍意识不清。

24. 当前对脑胶质瘤最常用且效果较好的化疗药物是

A 长春新碱

B 甲氨蝶呤

C 顺铂

D 亚硝基脲类(卡氮芥)

E 氟尿嘧啶

正确答案：D

解题思路：目前针对胶质瘤的化疗有许多方法及药物，但仍以亚硝基脲类(卡氮介)药物疗效肯定，副作用相对较小而多用。

25. 关于松果体区生殖细胞瘤临床表现叙述错误的是

A 脑积水

B 听力障碍

C 共济失调

D 性发育迟缓

E 视困难

正确答案：D

解题思路：正常松果体细胞分泌的褪黑激素可降低促性腺激素的含量和分泌，使性征同身体发育协调。肿瘤使褪黑激素减少，导致性早熟。起源于松果体细胞的肿瘤可表现为性发育迟缓。

26. 临床表现为同侧动眼神经麻痹，对侧偏瘫，称之为Weber综合征的常见于什么部位的损伤

A 四叠体上丘

B 四叠体下丘

C 中脑腹侧部

D 桥脑腹侧

E 桥脑背侧

正确答案：C

眼神经麻痹，对侧偏瘫，称之为Weber综合征。

27. 生殖细胞肿瘤不包括

- A 生殖细胞瘤
- B 畸胎瘤
- C 脂肪瘤
- D 绒毛膜上皮癌
- E 内胚窦肿瘤

正确答案：C

解题思路：根据WHO1990年分类，生殖细胞肿瘤包括生殖细胞瘤、畸胎瘤(含恶性畸胎瘤)、绒毛膜上皮癌、内胚窦肿瘤、胚胎癌和混合性生殖细胞瘤6大类。

28. 癫痫的临床发作表现分型，不包括

- A 大发作
- B 小发作
- C 癫痫持续状态
- D 局限性发作
- E 精神运动性发作

正确答案：C

解题思路：癫痫的临床发作表现分型：大发作、小发作、局限性发作及精神运动性发作。

29. 在神经上皮性肿瘤中最多见的是

- A 髓母细胞瘤
- B 室管膜瘤
- C 少枝胶质细胞瘤
- D 星形细胞瘤
- E 脉络丛乳头状瘤

正确答案：D

解题思路：在神经上皮性肿瘤中最多见的是星形细胞瘤，约占颅内肿瘤总数的13%~26%，约占胶质瘤总数的21.2%~51.6%。

30. 自中脑背部发出的颅神经是

- A 动眼神经
- B 滑车神经
- C 外展神经
- D 面神经



正确答案：B

解题思路：颅神经中只有滑车神经自中脑背部发出。

