

乡村全科助理医师测试

1. 急性上呼吸道感染分为五型，其中不是这五型之一的是
 - A. 普通感冒
 - B. 咽结膜热
 - C. 急性咽喉炎
 - D. 细菌性咽-扁桃体炎
 - E. 食管炎(正确答案)
2. 急性上呼吸道感染主要的病原体为
 - A. 支原体
 - B. 真菌
 - C. 病毒(正确答案)
 - D. 细菌
 - E. 衣原体
3. 控制支气管哮喘气道炎症的首选药物是
 - A. 糖皮质激素(正确答案)
 - B. 乙酰半胱氨酸
 - C. 抗组胺药物
 - D. 抗胆碱药物
 - E. β 受体激动药
4. 引起咽结合膜热的病毒是
 - A. 科萨奇病毒
 - B. 麻疹病毒
 - C. 偏肺病毒
 - D. 呼吸道合胞病毒
 - E. 腺病毒(正确答案)
5. 引起疱疹性咽峡炎的病毒是

- B. 麻疹病毒
 - C. 偏肺病毒
 - D. 呼吸道合胞病毒
 - E. 埃可病毒
6. 肺炎球菌肺炎，痰呈铁锈色与哪一病理分期有关
- A. 水肿期
 - B. 消散期
 - C. 灰色肝变期
 - D. 充血期
 - E. 红色肝变期(正确答案)
7. 院内感染所致肺炎中，主要病原体是
- A. 真菌
 - B. 病毒
 - C. 耐药金葡菌
 - D. 需氧革兰阴性杆菌(正确答案)
 - E. 肺炎球菌
8. 小儿肺炎病理生理变化中，最重要的改变为
- A. 脏器功能异常
 - B. 酸碱代谢失衡
 - C. 机体缺氧(正确答案)
 - D. 毒血症
 - E. 肺水肿
9. 肺炎患儿出现下列哪种情况时可发生自主呼吸突然停止
- A. 动脉血二氧化碳分压 $>70\text{mmHg}$ (正确答案)
 - B. 动脉血氧分压 $<85\%$
 - C. 呼吸困难伴三凹征
 - D. 肝脏进行性增大
 - E. 肺部啰音密集

10. 下列哪项不是小儿肺炎的高危因素

- A. 营养性贫血
- B. 先天性心脏病

D. 营养不良

E. 婴儿肝炎综合征(正确答案)

11. 关于胸膜渗出液的叙述, 下列哪项不正确

A. 胸液李凡他试验(-)(正确答案)

B. 细胞数 $>500 \times 10^6 / L$

C. 蛋白含量 $\geq 30g / L$, 胸液 / 血清比值 >0.5

D. 胸液 LDH $>200U / L$, 胸液 LDH / 血液 LDH 比值 >0.6

E. 胸液中葡萄糖含量降低

12. 根据症状和体征提示有胸腔积液时, 需确定是否有胸腔积液应首选的检查是

A. 胸片

B. 超声波(正确答案)

C. 胸部 CT

D. 胸部 MRI

E. 血常规

13. 不符合肺结核活动期特点的是

A. 痰涂片找到抗酸杆菌

B. X 线胸片病灶扩大

C. 病灶边缘模糊

D. 空洞形成

E. 病灶密度高, 边界清楚(正确答案)

14. 心衰一般治疗措施包括

A. 维持水盐平衡

B. 适当运动

C. 积极控制心律失常

D. 避免使用负性肌力药

E. 以上均是(正确答案)

15. 关于无症状性心衰, 下列哪项正确

A. 左室已有功能下降, LVEF $<50\%$, 有神经内分泌激活(正确答案)

B. 左室已有功能下降, LVEF $>50\%$, 有神经内分泌激活

C. 左室已有功能下降, LVEF $<50\%$, 无神经内分泌激活

D. 左室已有功能下降, LVEF $>50\%$, 无神经内分泌激活

16. 预防房颤患者及卒中循环栓塞，应首选下列哪种药物

- A. 阿司匹林
- B. 华法林(正确答案)
- C. 噻乙吡啶
- D. 低分子肝素
- E. 普通肝素

17. 室速最常见于下列哪种器质性心脏病

- A. 冠心病心肌梗死(正确答案)
- B. 心力衰竭
- C. 心瓣膜病
- D. 二尖瓣脱垂
- E. 心肌病

18. 室速最常见于下列哪种器质性心脏病

- A. 冠心病心肌梗死(正确答案)
- B. 心力衰竭
- C. 心瓣膜病
- D. 二尖瓣脱垂
- E. 心肌病

19. 高血压性脑出血急性期最威胁病人生命的是

- A. 出血后血肿形成
- B. 出血后并发脑水肿
- C. 出血后并发脑疝(正确答案)
- D. 昏迷后肺感染
- E. 昏迷后电解质紊乱

20. 高血压联合用药的原则

- A. 无论血压多高，最好使用单一药物治疗
- B. 二级以上高血压开始治疗时应该采用联合治疗(正确答案)
- C. 一种药物出现副作用时应加用另一种药物
- D. 为了达到疗效，无论何种高血压都是用两种以上的药物治疗
- E. 首先用两种不同类药物，无效需加用第三种药物

21. 下列哪项最有助于区别心绞痛与心肌梗死

- A. 心电图变化(正确答案)

C. 疼痛性质

D. 有无发热

E. 有无心率增快

22. 采用 β 受体阻滞药治疗心绞痛，下列哪项叙述正确

A. 宜用小剂量来治疗心绞痛

B. 易产生耐药性，不宜长期应用

C. 多数患者对本药的耐受性较强

D. 与硝酸酯类药物有拮抗作用，需加大剂量

E. 突然停药有诱发急性心肌梗死的可能(正确答案)

23. 下列哪项不属于 GERD 患者的抗反流防御机制异常

A. 夜间胃酸分泌过多(正确答案)

B. 食管下括约肌压力降低

C. 异常的食管下括约肌一过性松弛

D. 胃排空异常

E. 食管酸廓清能力下降

24. 引起胃食管反流病的主要原因是

A. 一过性食管下括约肌(LES)松弛(正确答案)

B. 食管酸清除障碍

C. 胃排空延迟

D. 食管黏膜防御作用降低

E. 食管裂孔疝

25. 关于胃食管反流病内镜检查的描述，不正确的是

A. 内镜检查是反流性食管炎最准确的方法

B. 可判断反流性食管炎的严重程度

C. 可判断反流性食管炎有无并发症

D. 结合活检可与其他食管病变作鉴别

E. 内镜检查无食管炎表现可排除胃食管反流病(正确答案)

26. 下列用于胃食管反流病维持治疗的药物中，效果最好的是

A. 西沙比利

B. 吗丁啉

C. 氢氧化铝

E. 奥美拉唑(正确答案)

27. 诊断反流性食管炎最准确的方法是

A. 食管吞钡 X 线检查

B. 食管滴酸试验

C. 食管内镜检查(正确答案)

D. 食管 24 小时 pH 值监测

E. 食管测压

28. 关于胃食管反流病维持治疗的叙述, 错误的是

A. 通常选用 H2 受体拮抗剂和质子泵抑制剂

B. 有持续用药和按需治疗两种方法

C. 按需治疗更适宜有并发症者(正确答案)

D. 目前多采用递减策略

E. 以调整至患者无症状的最小剂量为适宜剂量

29. 对于有典型胃食管反流病症状而内镜检查阴性的患者, 以下哪种方法有助于诊断和治疗

A.

B 超

C. 24h 胃食管 pH 监测

D. 腹部 B 超

E. 质子泵抑制剂做试验性治疗(正确答案)

30. 鉴别良恶性溃疡的最重要方法是

A. 溃疡大小

B. 大便潜血

C. 胃液分析

D. 胃黏膜组织病理学检查(正确答案)

E. 幽门螺杆菌(Hp)检查

31. 关于肝硬化腹腔积液形成的因素, 不正确的是

A. 门静脉压力增高

B. 原发性醛固酮增多(正确答案)

C. 低清蛋白血症

D. 肝淋巴液生成过多

32. 男性肝硬化患者性欲减退、睾丸萎缩、肝掌的原因是
- A. 雄激素过多
 - B. 肾上腺皮质激素过多
 - C. 雌激素过多(正确答案)
 - D. 甲状腺激素过多
 - E. 醛固酮过多

33. 对肝硬化有确诊价值的是
- A. 肝肿大质地偏硬
 - B. 脾肿大
 - C. 丙种球蛋白升高
 - D. 肝穿刺活检有假小叶形成(正确答案)
 - E. 食管吞钡 X 线检查有虫蚀样充盈缺损
34. 下列表现中, 符合肝脏解毒功能下降的是
- A. 黄疸
 - B. 食管静脉曲张
 - C. 氨中毒(正确答案)
 - D. 凝血因子减少
 - E. 男性乳腺发育
35. 急性阑尾炎最严重的并发症是
- A. 门静脉炎(正确答案)
 - B. 阑尾化脓穿孔腹膜炎
 - C. 阑尾周围脓肿
 - D. 膈下脓肿
 - E. 肠间积液
36. 急性胆囊炎最严重的并发症是
- A. 细菌性肝脓肿
 - B. 胆囊积液
 - C. 胆囊坏疽穿孔引起胆汁性腹膜炎(正确答案)
 - D. 并发急性胰腺炎
 - E. 胆囊十二指肠内囊
37. 下列哪项不是重症胰腺炎的体征

- B. 腹肌紧张、反跳痛明显
- C. 上腹或全腹压痛明显

D. 肠鸣音增加(正确答案)

E. Grey-Turner 征

38. 在急性胰腺炎发病过程中起最主要作用的酶是

- A. 磷脂酶 A
- B. 糜蛋白酶
- C. 激肽释放酶
- D. 脂肪酶
- E. 胰蛋白酶(正确答案)

39. 与慢性支气管炎的发生关系最密切的是

- A. 吸烟(正确答案)
- B. 感染因素
- C. 理化因素
- D. 气候异常
- E. 过敏因素

40. 下列哪项不符合慢性支气管炎咳痰特点

- A. 多为白色粘痰
- B. 可为浆液泡沫痰
- C. 偶有痰中带血
- D. 夜间痰量较多(正确答案)
- E. 急性发作期常为粘液脓痰

41. 根据症状和体征提示有胸腔积液时,需确定是否有胸腔积液应首选的检查是

- A. 胸片
- B. 超声波(正确答案)
- C. 胸部 CT
- D. 胸部 MRI
- E. 血常规

42. 28 岁女性。出现心悸,多食,消瘦近半年。经查体及实验检查确诊为 Graves 病,患者幼年时有哮喘史。下述何种药物应禁忌

A. 普萘洛尔(正确答案)

B. 甲基硫氧嘧啶

C. 卡比马唑

D. 甲状腺素片

E. 甲巯咪唑

43. 患者, 男, 40 岁。因肺大疱 3 个月前行右肺上、中叶切除, 3 天来发热 39℃, 白细胞 $19 \times 10^9 / L$, 胸片右上肺野可见液平面, 胸穿抽出黄白色黏稠液体, 伴臭味。当前治疗应首先选择

A. 胸膜纤维板剥脱术

B. 余肺全部切除术

C. 胸膜腔闭式引流术(正确答案)

D. 胸廓成形术

E. 胸膜全肺切除术

44. 男, 56 岁, 冠心病病人。突感心悸、胸闷, 血压为 12/8kPa(90/60mmHg), 心尖部第一心音强弱不等; 心电图示心房率慢于心室率, 二者无固定关系, QRS 波增宽为 0.12 秒, 可见心室夺获和室性融合波。诊断为

A. 心房扑动

B. 心房颤动

C. 多发性室性早搏

D. 阵发性室上性心动过速

E. 阵发性室性心动过速(正确答案)

45. 患者女, 38 岁, 肥胖, 诊断为胃食管反流病, 经过正规内科治疗, 症状明显缓解。下列有关胃食管反流病烧心的描述, 错误的是

A. 烧心是指胸骨后或剑突下烧灼感

B. 常在餐后半小时出现(正确答案)

C. 腹压增高时可加重

D. 弯腰时可加重

E. 卧位可加重

46. 男性，55岁。上腹部不适伴反酸、胃灼热感5年，要确诊为胃食管反流病，最主要的检查是
- A. 内镜检查
 - B. 内镜检查+24小时食管pH监测(正确答案)
 - C. 食管测压+内镜
 - D. 上消化道造影
 - E. 上消化道造影+24小时食管pH监测
47. 一贲门失弛缓症患者，病史10余年，近1月症状加重，反复呕吐，此患者目前最为合适的治疗方法为
- A. 少食多餐
 - B. 饭后散步
 - C. 应用平滑肌松弛药
 - D. 扩张疗法
 - E. 食管下段及贲门肌层切开(正确答案)
48. 肝硬化患者，腹胀，肝胆脾超声显示肝硬化、腹水、腹腔游离液体深度
5. 1cm。下列有关肝硬化患者腹水形成的原因，不正确的是
- A. 血浆胶体渗透压下降
 - B. 门静脉压力增加
 - C. 淋巴回流受阻
 - D. 醛固酮减少(正确答案)
 - E. 有效循环血量减少
49. 男性，65岁。20年前诊断为右心衰竭，15年前诊断为肝硬化。下列不可能出现的是
- A. 肝脏增大
 - B. 肝脏缩小
 - C. AFP增高(正确答案)
 - D. 下腔静脉增宽
 - E. 肝静脉增宽

50. 男性，45岁。2个月前出现食欲缺乏，乏力，右上腹胀痛。查体：巩膜黄染，肝肋下5cm，表面凸凹不平，脾肋下3cm。下列诊断可能性不大的是

- A. 乙肝后肝硬化(正确答案)

C. 酒精性肝硬化

D. 淤血性肝硬化

E. 原发性胆汁性肝硬化

