

## 乡村全科执业助理医师考试模拟卷二

## 1. 吸气性呼吸困难常见于

- A. 慢性支气管炎
- B. 气管异物
- C. 支气管哮喘
- D. 肺炎球菌肺炎
- E. 气胸

解析: 吸气性呼吸困难, 常见于大气道堵塞, 比如气管异物、喉头水肿、急性喉炎、气管肿瘤或气管受压等。临床特点是吸气费力, 吸气时间延长, 患者可有刺激性干咳或吸气性喉鸣; 查体可见“三凹征”。故选B。

## 2. 严重吸气性呼吸困难的主要特点是

- A. 端坐呼吸
- B. 鼻翼扇动
- C. 哮鸣音
- D. 呼吸加深加快
- E. 三凹征

解析: 吸气性呼吸困难主要表现为吸气显著费力, 严重者可出现胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙明显凹陷, 称为“三凹征”。故选E。

## 3. 夜间阵发性呼吸困难常见于

- A. 胸腔积液
- B. 支气管哮喘
- C. 急性右心衰竭
- D. 急性左心衰竭
- E. 肺气肿

解析: 急性左心衰竭时, 常可出现夜间阵发性呼吸困难, 表现为夜间睡眠中突感胸闷气急, 被迫坐起, 惊恐不安。患者有明显的喘憋、呼吸急促, 伴有大汗、端坐呼吸, 严重者咳白色或粉红色泡沫痰; 查体可见口唇发绀, 呼吸加快、双肺湿啰音(肺底明显), 有时可伴有哮鸣音。故选D。

过关点睛: 夜间阵发性呼吸困难常见于左心衰竭。

## 4. 有关呼吸困难的描述, 不正确的是

- A. 肺水肿可以出现呼吸困难

## B. 大量腹腔积液导致呼吸困难

- C. 支气管哮喘常出现吸气性呼吸困难
- D. 左心衰竭出现端坐呼吸
- E. 大出血可以出现呼吸加快

解析: 吸气性呼吸困难主要表现为吸气显著费力, 常见于喉部、气管、大支气管的狭窄与阻塞。支气管哮喘常见呼气性呼吸困难伴哮鸣音, 故选C。

## 5. 慢性充血性心力衰竭的特征性表现为

- A. 劳力性呼吸困难
- B. 混合型呼吸困难
- C. 夜间阵发性呼吸困难
- D. 吸气性呼吸困难
- E. 呼气性呼吸困难

解析: 夜间阵发性呼吸困难是慢性充血性心力衰竭的特征性表现。吸气性呼吸困难主要见于大气道狭窄。呼气性呼吸困难主要见于哮喘、COPD。混合型呼吸困难常见于重症肺炎、大面积肺栓塞、气胸、大量胸腔积液、肺间质纤维化、尘肺等。故选C。

过关点睛: 慢性左心衰竭主要表现为活动后呼吸困难及夜间阵发性呼吸困难。

6. 女, 80岁。急性结石性胆囊炎术后, 因伤口疼痛肌注哌替啶1支, 半小时后昏睡, 呼吸10次/min, 可能原因是

- A. 术后伤口感染
- B. 腹腔感染
- C. 严重鼓肠
- D. 麻醉剂过量
- E. 休克

解析: 使用哌替啶药物, 呼吸中枢直接受到抑制, 致使呼吸减弱变慢。故选D。

7. 女, 23岁。生气后突发呼吸困难, 呼吸50次/min, 伴手足抽搐, 最可能的诊断是

- A. 支气管哮喘
- B. 气胸

- C. 心源性哮喘
- D. 肺梗死
- E. 分离(转换)性障碍

解析:患者生气后突发呼吸困难,呼吸50次/min,伴手足抽搐,最可能的诊断是分离(转换)性障碍。其发生机制多为过度通气而发生呼吸性碱中毒所致。故选E。

#### 8. 自发性气胸的常见症状为

- A. 呼吸困难伴胸痛
- B. 呼吸困难伴发热
- C. 呼吸困难伴昏迷
- D. 呼吸困难伴哮鸣音
- E. 呼吸困难伴大量泡沫痰

解析:自发性气胸在持重物或剧烈咳嗽后突然发病,一侧胸痛伴呼吸困难、干咳。查体:气管向健侧移位;叩诊患侧呈鼓音,患侧呼吸音减低或消失。胸部X线检查患侧肺压缩。故本题选A。

过关点睛:自发性气胸常表现为一侧胸痛伴呼吸困难、干咳。

#### 9. 胸痛的性质可提示某种疾病,下列正确的是

- A. 闷痛——肋间神经痛
- B. 撕裂痛——自发性气胸
- C. 撕裂痛——带状疱疹
- D. 刀割样痛——干性胸膜炎
- E. 尖锐刺痛——心绞痛

解析:心绞痛的胸痛特点是胸骨后或心前区压榨性疼痛/闷痛,E错误。带状疱疹胸痛特点是一侧刀割样剧烈胸痛,夜间重,C错误。干性胸膜炎常呈尖锐刺痛或撕裂痛,D错误。自发性气胸呈撕裂性胸痛,B正确。肋间神经痛的胸痛为刺痛、串痛,A错误。故选B。

过关点睛:心脏缺血性疼为压榨性疼痛或闷痛;神经病变引起的为瞬间即过的针刺或刀割样疼痛。

#### 10. 室性期前收缩引起心悸的感觉,正确的是

- A. 恐惧感
- B. 紧缩感
- C. 停跳感
- D. 饥饿感
- E. 灼热感

解析:心悸最常见的原因是各种心律失常,室性期前收缩后出现较长的停歇,患有心悸的感觉多为一种停跳

感。故选C。

#### 11. 呕吐宿食常见的原因是

- A. 幽门梗阻
- B. 食物中毒
- C. 颅脑外伤
- D. 妊娠
- E. 急性胰腺炎

解析:①餐后近期呕吐,特别是集体发病者,多由食物中毒所致;②进食过程中或餐后即刻呕吐,可能为精神性呕吐;③餐后数小时后呕吐称延迟性呕吐,提示胃动力下降或胃排空延迟;④餐后呕吐,见于幽门梗阻。故选A。

过关点睛:呕吐大量隔夜宿食,且在晚间发生,提示幽门梗阻、胃潴留或十二指肠壅滞。

#### 12. 颅内高压症所致呕吐的特点是

- A. 喷射性,有恶心,呕吐后轻松
- B. 喷射性,无恶心,呕吐后不轻松
- C. 非喷射性,有恶心,呕吐后不轻松
- D. 非喷射性,无恶心,呕吐后轻松
- E. 喷射性,无恶心,呕吐后轻松

解析:颅内高压症呕吐中枢直接受到强烈的刺激,迅速导致呕吐。故呕吐呈喷射性,呕吐后不能感到轻松。故选B。

过关点睛:中枢神经系统疾病所致的呕吐,以喷射行呕吐为特点。

#### 13. 急性腹膜炎所致呕吐属于

- A. 神经性呕吐
- B. 反射性呕吐
- C. 中枢性呕吐
- D. 胃肠源性呕吐
- E. 周围性呕吐

解析:反射性呕吐是由内脏等末梢神经传来的冲动刺激呕吐中枢引起的恶心、呕吐。反射性呕吐常见:①口咽部炎症、理化刺激;②胃肠疾病(如急性胃炎、慢性胃炎、幽门梗阻、肠梗阻、急性阑尾炎);③肝、胆、胰腺疾病(如肝炎、肝硬化、胆囊炎、胆石症、胆道蛔虫病、急性胰腺炎);④腹膜及肠系膜疾病(急性腹膜炎)。故选B。

#### 14. 女,28岁。晨起呕吐应考虑

- A. 盆腔炎
- B. 早孕

D. 迷路炎

E. 慢性肝炎

解析:晨起呕吐可见于育龄妇女早孕、亦可见于尿毒症、慢性酒精中毒或功能性消化不良等。故选B。

15. 急性结膜炎常引起脓性分泌物的病原菌是

A. 淋球菌和脑膜炎球菌

B. 病毒或衣原体

C. 大肠埃希菌

D. 肺炎链球菌

E. 真菌

解析:结膜炎常见的体征是结膜充血、结膜分泌物等。分泌物的性质可因致病原因不同而有所不同。淋球菌和脑膜炎球菌感染最常引起脓性分泌物,其他致病菌一般引起黏液脓性分泌物,过敏性结膜炎的分泌物一般呈黏稠丝状;病毒性结膜炎的分泌物呈水样或浆液性。故选A。

过关点睛:结膜分泌物是各种急性结膜炎共有的体征。不同致病原因,其分泌物也不尽相同,应注意区分。

16. 病毒性结膜炎除水样或浆液性结膜分泌物外,另外一个重要体征是

A. 耳前淋巴结肿大

B. 球结膜一定无水肿

C. 结膜无充血

D. 乳头增生上睑结膜比下睑结膜严重

E. 结膜分泌物涂片以多形核白细胞占多数

解析:病毒性结膜炎的分泌物呈水样或浆液性,涂片以淋巴细胞占多数,E错误。耳前淋巴结肿大是病毒性结膜炎的一个重要体征,可出现压痛,A正确。结膜炎的基本症状和体征包括结膜充血、分泌物增多、眼睑肿胀等,C错误。乳头增生是结膜炎的一种非特异性体征,沙眼时上睑结膜比下睑结膜严重,D错误。急性过敏性结膜炎、腺病毒结膜炎、淋球菌性结膜炎等都会出现明显的球结膜水肿,B错误。故选A。

17. 结膜炎的确诊依据是

A. 症状、体征

B. 血培养

C. 结膜分泌物涂片检查

D. 眼部B超

E. 影像学检查

解析:急性化脓性中耳炎的治疗原则是镇痛、控制感染、通畅引流、祛除病因。及早全身应用足量抗生素或其他

但结膜炎的病因多种多样,确诊是何种病因所致的结膜炎尚需实验室检查,包括:①病原学检查,结膜分泌物涂片检查,必要时可做细菌和真菌的培养、药物敏感试验等;②细胞学检查,结膜分泌物涂片有助于临床诊断,对鉴别诊断颇有意义。故选C。

18. 治疗结膜炎最基本的给药途径是

A. 静脉给药

B. 口服药物全身治疗

C. 结膜囊冲洗

D. 眼膏涂眼

E. 滴眼液滴眼

解析:滴眼液滴眼是治疗结膜炎最基本的给药途径。根据致病原因的不同,选用合适的滴眼剂。重症的微生物性结膜炎患者,可考虑多种抗生素混合滴用。急性期结膜炎应频繁滴眼,每1~2 h给药1次。故选E。

考点分析:本考点为常考内容,结膜炎的临床表现、治疗原则与预防为考试重点,复习时应注意。可进行对比记忆,不同病因所致结膜炎的特点不同。要求熟悉其常见病因、诊断和鉴别诊断。

19. 急性化脓性中耳炎常继发于

A. 中耳胆脂瘤

B. 鼻窦炎

C. 结核

D. 口腔溃疡

E. 上呼吸道感染

解析:化脓性中耳炎分为:①急性化脓性中耳炎,常继发于上呼吸道感染,主要致病菌为肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、乙型溶血性链球菌、葡萄球菌等,通过咽鼓管、鼓膜穿孔进入中耳,血行感染少见;②慢性化脓性中耳炎,主要见于急性化脓性中耳炎未获彻底治疗、鼻和(或)咽部存在慢性炎症病变、全身或局部抵抗力下降等致病程迁延。故选E。

20. 急性化脓性中耳炎早期最有效的治疗是

A. 抗生素加激素全身应用

B. 抗生素全身应用

C. 抗生素溶液滴耳

D. 2%酚甘油滴耳

E. 咽鼓管吹张

C. 持续性

D. 寒冷时加重



用足量抗菌药物。

考点分析:本考点的考题较少,重点集中在中耳炎的临床表现上,对分泌性中耳炎、化脓性中耳炎、中耳胆脂瘤的不同表现注意鉴别;要求熟悉其常见病因、诊断(鉴别诊断)、治疗原则与预防。

21. 急性鼻炎最常见致病微生物是

- A. 病毒
- B. 葡萄球菌
- C. 肺炎支原体
- D. 流感嗜血杆菌
- E. 肺炎链球菌

解析:急性鼻炎即俗称的“感冒”,是由病毒感染引起,故选A。

22. 变应性鼻炎鼻分泌物涂片检查可见

- A. 较多嗜酸性粒细胞
- B. 白细胞多见
- C. 红细胞多见
- D. 淋巴细胞多见
- E. 中性粒细胞多见

解析:变应性鼻炎是因机体接触变应原后由IgE介导的鼻黏膜变态反应性疾病,以鼻痒、阵发性喷嚏、大量清水样涕、鼻塞为主要特征并有不同程度的嗅觉减退。本病属I型变态反应,鼻分泌物涂片检查见嗜酸性粒细胞增多。故选A。

23. 慢性肥厚性鼻炎鼻塞的特点是

- A. 间歇性
- B. 交替性

理结构的改变,所以呈持续性。故选C。

考点分析:本考点的内容略多,但需掌握的内容并不多。重点掌握鼻炎与鼻窦炎的临床表现,尤其是各自临床分型的不同特点,注意区分。对其常见病因、诊断(鉴别诊断)、治疗原则与预防熟悉即可。

24. 判断有无牙周炎的重要指征是

- A. 龈袋 $>3\text{ mm}$
- B. 附着丧失
- C. 龈红肿
- D. 龈出血
- E. 龈乳头增生

解析:有没有附着丧失是判断有无牙周炎的主要指征。早期牙周炎与牙龈炎都有牙龈炎症、出血症状。故选B。

25. 牙周炎的诊断依据,错误的是

- A. 探诊深度 $>3\text{ mm}$ ,且能探到釉质牙骨质界,并有炎症
- B. 晚期牙松动或移位
- C. 有牙龈出血或牙周袋探诊后有出血
- D. 邻面临床附着丧失 $>3\text{ mm}$
- E. 牙槽骨有水平型或垂直型吸收

解析:牙周炎是由牙菌斑微生物引起的牙周组织感染性疾病,导致牙齿支持组织(牙龈、牙周膜、牙槽骨和牙骨质)的破坏,牙周袋形成和炎症、附着丧失和牙槽骨吸收,最后可导致牙齿的丧失。牙周炎的诊断依据之一是邻面临床附着丧失 $>1\text{ mm}$ ,D说法错误,故选D。

考点分析:本考点为重点内容,要求掌握牙周炎的临床表现、诊断(鉴别诊断),尤其是慢性牙周炎的临床表现,为常考点;熟悉本病的常见病因、治疗原则与预防。