

2021 年临床执业医师考试练习题及答案

1、婴儿甲低的表现有（ ）

A 症状不明显

B 新生儿最早的表现为生理性黄疸时间延长

C 腹胀、顽固性便秘

D 吸吮困难

E 以上都是

答案：E

2、苯丙酮尿症最突出的表现是（ ）

A、表情呆滞

B、易激惹

C、智力低下

D、皮肤白嫩

E、尿有“鼠臭”味

答案：E

3、下列不是风湿性心脏病的主要表现的是（ ）

A、心脏炎

B、关节炎

C、舞蹈病

D、皮下结节

E、发热

答案：E

4、预防风湿热复发的关键是首选（ ）

A、激素

B、布洛芬

C、雷公藤

D、环磷酰胺

E、长效青霉素医学全在线，搜集整，理

答案：E

5、关于风湿热的治疗，不正确的是（ ）

A、注意休息

B、控制B族链球菌感染

C、关节炎而无明显心肌炎者，选用水杨酸盐

D、激素可用为常规用药

E、血沉正常时可起床活动

答案：D

6、结核性脑膜炎中期的主要的临床表现是（ ）

A 结核的中毒症状

B 惊厥

C 颈强直、克氏征阳性

D 昏迷

E 发热/盗汗

答案：C

7、2岁小儿，出生时接种过卡介苗，1月来低热，轻咳，PPD

试验强阳性，据此考虑（ ）

- A 活动性肺结核
- B 接种卡介苗后的反应
- C 肺脓疡
- D 支气管肺炎
- E 支气管炎

答案：A

8、 小儿受结核菌感染至 PPD 出现阳性的时间是（ ）

- A 1—2 周
- B 2—4 周
- C 4—8 周
- D 8—10 周
- E 10—12 周

答案：C

9、 PPD 阳性反应的临床意义中，正确的是（ ）

- A 儿童 PPD 阳性表示体内有活动结核
- B 婴儿 PPD 强阳性 表示体内有活动结核
- C PPD 硬结直径 5 毫米以上为强阳性
- D PPD 强阳性表示病情较重
- E PPD 强阳性表示曾接种过卡介苗

答案：B

10、 结核菌素试验结果，正确的是（ ）

- A 卡介苗接种成功，结核菌素试验应（+++）
- B 粟粒性结核时，结核菌素试验可（-）
- C 结核菌素试验阴性时可排除结核病
- D 结核菌素试验阳性者，可肯定有结核病
- E 以上均有可能

答案：B

11、男性，50岁，安徽人。因反复腹泻腹胀6个月，呕血伴黑便2天就诊。体检：肝肋下2cm，脾肋下4cm。血常规示嗜酸性粒细胞增多，三系下降。肝脏B超提示网状分隔样纤维化。首先考虑的诊断是

- A. 血吸虫肝硬化并发上消化道出血
- B. 乙肝肝硬化并发上消化道出血
- C. 肝细胞肝癌并发上消化道出血
- D. 门脉性肝硬化并发上消化道出血
- E. 急性出血性胃炎

答案：A

12、21岁男性，持续发热，腹泻一周，2~3次/日，便中有黏液，右下腹隐痛，头疼、恶心、呕吐一次，伴食欲不振。体检：T39℃，神志清，表情淡漠，肝肋下2cm，脾肋下1cm。末梢血WBC $2.9 \times 10^9/L$ ，N0.80，L0.20，粪便常规检查WBC（+），RBC少许，未见虫卵，粪便培养无致病菌生长。该病例确诊最关键的检查是

- A. 骨髓穿刺常规检查

- C. 肥达反应
- D. 粪便检查阿米巴原虫
- E. 粪便细菌培养

答案：B

13、女性，30岁，2天来进行性双下肢瘫痪，大小便障碍，体温正常。胸4水平以下深浅感觉丧失和截瘫。脑脊液检查压力正常，白细胞 $80 \times 10^6/L$ (80个/mm³)，淋巴细胞占80%，蛋白轻度增高，最可能的诊断为

- A. 脊髓出血
- B. 急性脊髓炎
- C. 脊髓肿瘤
- D. 多发性硬化
- E. 急性硬膜外脓肿

答案：B

14、女性，30岁，左乳外上象限肿块2cm×2cm大小，质硬如橡皮球，肿块表面光滑、活动。其诊断可能是

- A. 乳腺皮下脂肪瘤
- B. 乳房纤维腺瘤
- C. 皮脂腺囊肿
- D. 叶状囊肉瘤
- E. 神经纤维瘤

答案：B

15、男性，50岁，消瘦无力3个月，呕吐宿吐宿食，X线钡餐见

胃小弯侧胃窦部有充盈缺损，应诊断为

- A. 胃溃疡
- B. 十二指肠溃疡
- C. 胃癌
- D. 胃溃疡并幽门梗阻
- E. 胃癌幽门梗阻

答案：E

16、男性，60岁，溃疡穿孔单纯修补术后7天，体温38℃，右上腹痛，肝区叩痛，右肺下野呼吸音弱，X线右膈升高，可能并发

- A. 右下肺炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 再穿孔
- D. 右膈下脓肿
- E. 急性胰腺炎

答案：D

17、患者40岁，排便后肛门外剧烈疼痛，并出现一触痛性明显的肿块，最可能的诊断是

- A. 内痔脱出嵌顿
- B. 直肠息肉脱出
- C. 肛周脓肿

D. 血栓性外痔

答案：D

18、女性，25岁，无意中发现甲状腺肿块7天，近3天肿块迅速增长，伴有胀痛，甲状腺SPECT检查甲状腺右叶冷结节，应初步诊断为

- A. 单纯性甲状腺肿
- B. 结节性甲状腺肿
- C. 甲状腺瘤
- D. 甲状腺癌
- E. 甲状腺囊腺瘤并囊内出血

答案：E

19、女性，18岁，因下腹部隐痛月余就诊，低热腹泻，贫血外观，右下腹触及肿块，压痛明显，白细胞 $10 \times 10^9/L$ ，血沉 25mm/h ，既往有结核病史医学全在线搜集整理，X线腹平片检查，小肠多处小液气平面，钡灌肠盲肠充盈缺损，黏膜破坏，阑尾未充盈，为明确诊断进一步检查应作

- A. 腹部B超
- B. 纤维结肠镜
- C. 选择性肠系膜血管造影
- D. 腹部CT
- E. 放射性核素显像

答案：B

20、患者阑尾炎穿孔致腹膜炎24小时，下列处置最关键的是

- B. 输血
- C. 应用大量有效抗生素
- D. 禁食、水，胃肠减压
- E. 急诊手术

答案：E

21、28岁，妊1产0，妊40周，胎位LOA，胎心140次/分，头浅定，骨盆测量：髂棘间径23cm，髂嵴间径27cm，骶耻外径20cm，坐骨结节间径6cm，后矢状径6.5cm，胎儿估计3000g，正确的分娩方式

- A. 自然分娩
- B. 会阴侧切术
- C. 胎头吸引术
- D. 产钳术
- E. 剖宫产术

答案：E

22、初产妇，33岁，41周妊娠，产前检查均正常。自觉胎动减少1天收入院。查体：血压110/75mmHg，宫高35cm，腹围100cm，胎位以)A，胎头先露，胎心率为120次/分。以下哪项并不提示胎儿窘迫

- A. 胎儿头皮血pH<7.2
- B. NST有反应型
- C. OCT频繁重度变异减速

E. 胎心率基线 110~120 次/分

答案: B

23、羊水栓塞的早期诊断依据是

- A. 典型的临床表现
- B. 下腔静脉采血查到羊水成分
- C. 胸部 X 线片
- D. 同位素肺部扫描
- E. 心电图

答案: A

24、50 岁女性，体检时发现宫颈中度糜烂，子宫正常大小，双附件未触及异常，宫颈活检示宫颈原位癌，应

- A. 子宫全切除术
- B. 宫颈锥形切除术后，根据病理结果决定手术方法
- C. 子宫全切除术及双侧附件切除术
- D. 子宫全切除术、双侧附件切除术及盆腔淋巴结清扫术
- E. 放疗

答案: B

25、45 岁女性，接触性阴道流血 5 个月，查宫颈重度糜烂状，

宫体前位，正常大小，宫旁主韧带有增厚感，未达盆壁。为确定诊断应作哪项检查

- A. 宫颈刮片细胞学检查

C. 宫颈活组织检查

D. 宫颈锥形切除术

E. 碘试验

答案：C

26、女性，30岁，已婚，放置宫内节育器2年，停经48天，少量阴道出血3天，突然右下腹剧烈撕裂样疼痛，血压80/40mmHg，右下腹压痛，反跳痛明显，但肌紧张不明显。妇科检查：后穹隆饱满，宫颈举痛(+)，宫口闭，子宫正常大小，呈漂浮感，双附件触诊不满意，本病例最可能的诊断是

A. 先兆流产

B. 黄体破裂

C. 卵巢囊肿蒂扭转

D. 急性阑尾炎

E. 输卵管妊娠

答案：E

27、55岁女性，绝经5年，近3个月阴道水样白带，近半个月出现阴道间断少量流血。查宫颈光滑，宫体稍大且软，附件未扪及。诊刮出较多量较脆内膜。本例最可能的诊断为

A. 颈管腺癌

B. 子宫内膜增生过长

C. 子宫内膜息肉

D. 子宫内膜癌

答案：D

28、患者 19 岁，未婚，原发性闭经，乳房发育正常，外阴无异常，子宫略小于正常，两侧附件正常，首先应如何处理

- A. 孕激素试验
- B. 雌激素试验
- C. 人工周期
- D. HCG
- E. 氯米芬

答案：A

29、10 岁女孩，常有活动后心悸、气促，心脏听诊于胸骨左缘第 2~3 肋间可闻及 II~III 级喷射性收缩期杂音，肺动脉瓣区第二音亢进和固定分裂。该患儿最可能的诊断是

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

答案：A

30、1 岁男婴，发现双下肢青紫 1 个月。查体：胸骨左缘第 2 肋间可闻及粗糙响亮的连续性机器样杂音，诊断考虑

- A. 房室隔缺损
- B. 室间隔缺损

D. 法洛四联症

E. 肺动脉狭窄

答案：C

31、2 个月婴儿，腹泻 3 天，大便每天 10 多次，呈蛋花汤样，伴呕吐，尿少，精神萎靡，拒奶，面色苍白，前囟、眼窝凹陷，口唇樱红皮肤弹性差。除诊断婴儿腹泻、中度脱水外，还应考虑

A. 低血容量休克

B. 代谢性碱中毒

C. 低镁血症

D. 代谢性酸中毒

E. 低钙血症

答案：D

32、女婴，9 个月，腹泻 2 天，轻度脱水，轻度酸中毒。在无明显呕吐腹胀时，第 1 天补液首选

A. 3: 2: 1 溶液静脉滴注

B. 2: 1 溶液静脉滴注

C. 4: 3: 2 溶液静脉滴注

D. ORS 溶液

E. 以上都不是

答案：D

33、2 岁小儿，出生时曾接种卡介苗，1 岁半时 PPD 试验为 6mm × 6mm，最近 PPD 试验为 13mm × 14mm。下列情况哪种可能性较大

A. 非典型分枝杆菌感染所致

- B. 曾经有结核感染
- C. 新近有结核感染
- D. 非典型分枝杆菌感染
- E. 假阳性反应

答案：C

34、肾病综合征患儿开始应用泼尼松治疗，口服泼尼松后，4周尿蛋白已经转阴，并且已经开始隔日顿服，突发上呼吸道感染，尿蛋白又（+++），经常规抗炎治疗后，尿蛋白仍（+++），下一步治疗应采用

- A. 治疗不变，泼尼松仍然隔日顿服
- B. 泼尼松重新开始起始治疗量日三次口服
- C. 应用环磷酰胺
- D. 应用激素+环磷酰胺
- E. 以上均不对

答案：B

35、4岁患儿，全身高度水肿2个月，尿蛋白（+++），血浆总蛋白30g/L，为明确诊断，以下哪项并非必须检查

- A. 尿常规
- B. 测血压
- C. 测血清补体
- D. 测血清尿素氮，血清蛋白电泳
- E. 测血清

答案：E

36、下列肝炎病毒基因组为 DNA 的是

- A. 甲型肝炎
- B. 乙型肝炎
- C. 丙型肝炎
- D. 丁型肝炎
- E. 戊型肝炎

答案：B

37、对重型肝炎的判断下列最重要的是

- A. ALT>500U/L
- B. 总胆红素>171 $\mu\text{mol/L}$
- C. PTA<40%
- D. 电解质紊乱
- E. WBC $15 \times 10^9/\text{L}$

答案：C

38、下列属于肝硬化门脉高压主要表现的是

- A. 肝掌
- B. 蜘蛛痣
- C. 脾肿大
- D. 肝肿大
- E. 男性乳房发育

答案：C

- A. 艾滋病病毒（HIV）
- B. 乙型肝炎病毒（HBV）
- C. 梅毒螺旋体
- D. 流行性乙型脑炎病毒
- E. 风疹病毒

答案：D

40、引起日本血吸虫病病理改变的主要是

- A. 虫卵
- B. 毛蚴
- C. 尾蚴
- D. 童虫
- E. 成虫

答案：A

41、下列疾病在传染过程中表现为“显性感染”多的是

- A. 乙脑
- B. 麻疹
- C. 白喉
- D. 流脑
- E. 脊髓灰质炎

答案：B

42、引起感染性休克的最常见病原体是

- A. 革兰阳性细菌

- C. 病毒
- D. 真菌
- E. 钩端螺旋体

答案：B

43、乙脑患者最主要的治疗目的是

- A. 抗病毒
- B. 提高免疫力医学全在线搜集整，理
- C. 对症、支持治疗，降低死亡率、减少后遗症
- D. 治疗并发症
- E. 抗菌治疗，预防感染

答案：C

44、构成血吸虫病传播必须具备的条件不包括

- A. 蚊虫寄生

- B. 钉螺寄生
- C. 接触疫水
- D. 粪便入水
- E. 易感人群

答案：A

45、流行性斑疹伤寒的治疗，首选药物为

- A. 氯霉素
- B. 四环素
- C. 青霉素

D. 环丙沙星

E. 头孢菌素类

答案：B

