

2022年临床执业助理医师真题

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、活动性风湿性心脏病时，下列哪项是阿绍夫小体常见的部位？（ ）

- A. 心外膜内
- B. 心内膜下
- C. 心瓣膜内
- D. 心肌间质
- E. 心肌传导系统

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2、《希波克拉底誓言》中提出的医德根本原则是（ ）。

- A. 为病家谋利益
- B. 不为妇人施堕胎手术
- C. 保守医密
- D. 平等对待患者
- E. 不伤害病人

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

3、患者饮水呛咳，声音嘶哑，右软腭抬举无力，病损位于（ ）。

- A. 右侧皮质脑干束
- B. 左侧皮质脑干束
- C. 双侧皮质脑干束
- D. 右舌下神经
- E. 右舌咽迷走神经

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

4、对于半抗原，正确的是（ ）。

- A. 既有免疫原性，又有抗原性
- B. 具有抗原性，而没有免疫原性
- C. 具有免疫原性，而没有抗原性
- D. 既没有免疫原性，也没有抗原性
- E. 与蛋白质载体结合后，可获得抗原性

【正确答案】

B

【答案解析】

抗原包括完全抗原和半抗原，通常所称抗原即为完全抗原，它既有抗原性，又有免疫原性，如细菌、病毒、血清、所用疫苗等。半抗原只具有抗原性，而不具有免疫原性。半抗原必须与相应载体蛋白等结合后，才称完全抗原(抗原)。故本题答案为B项。

5、下述哪项是慢性支气管炎患者发生通气和散气功能障碍的病变基础？（ ）

- A. 支气管软骨萎缩、纤维化
- B. 支气管平滑肌萎缩
- C. 支气管管壁钙化
- D. 黏膜腺体增生
- E. 细支气管炎及细支气管周围炎

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

6、患者，女性，33岁，恶心呕吐，体重下降半年。查体：血压90/60mmHg，皮肤色泽暗黑，口腔粘膜、舌可见黑色素沉着，化验：血糖3.0mmol/L，血钠120mmol/L，血钾5.8mmol/L。你认为此病人最可能的诊断是（ ）。

- A. 溃疡病
- B. 肝硬化
- C. 慢性肾上腺皮质功能减退症
- D. Cushing病
- E. 胰岛细胞瘤

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

7、在孕妇生产过程中，因何细菌进入子宫造成产褥热？（ ）

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. A群溶血性链球菌
- C. 肺炎链球菌
- D. 大肠杆菌
- E. 淋病奈瑟菌

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

8、2岁，青紫，哭后加重，有昏厥史，胸骨左缘第3肋间有2级收缩期喷射性杂音，无震颤；心脏X线摄片呈“靴型”阴影。应考虑（ ）。

- A. 艾森曼格综合征
- B. 肺动脉狭窄
- C. 房间隔缺损
- D. 动脉导管未闭
- E. 法洛四联征

【正确答案】

E

【答案解析】

法洛四联征的临床表现有青紫、蹲踞现象、杵状指和阵发性缺氧发作如突然昏厥、抽搐等；体格检查时患儿心前区略隆起胸骨左缘第2、3、4肋间可闻及2~3级粗糙喷射性收缩期杂音，一般无收缩期震颤。心脏X线摄片呈“靴型”阴影，即心脏圆钝上翘，肺动脉段凹陷。肺门血管影缩小，两肺纹理减少，透亮度增加。

- A. 创伤性关节炎
- B. 化脓性关节炎
- C. 股骨头缺血发生坏死
- D. 老年性退行性关节炎
- E. 关节结核

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

10、破伤风的潜伏期平均为（ ）。

- A. 24小时
- B. 2~5天
- C. 6~10天
- D. 20~30天
- E. 1~2个月

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

11、胃食管反流病的主要发病机制不包括（ ）。

- A. 夜间胃酸分泌过多
- B. 异常的下食管括约肌一过性松弛
- C. 下食管括约肌压力降低
- D. 胃排空异常
- E. 食管酸廓清能力下降

【正确答案】

A

【答案解析】

胃食管反流病是多种因素造成的以食管下括约肌功能障碍为主的胃食管动力障碍性疾病，直接损害因素是胃酸、胃蛋白酶及胆汁等反流物。①抗反流屏障结构与功能异常。抗反流屏障包括LES、膈肌脚、膈食管韧带、His角等。**a.** 贲门失弛缓症手术后、食管裂孔疝、腹内压增高及长期胃内压增高，均可使LES结构受损，LES压下降。**b.** LES功能障碍。某些激素、食物、药物等，均可引起LES功能障碍或一过性LES松弛。②食管清除作用降低。③食管黏膜屏障功能降低。食管黏膜屏障包括食管上皮表面黏液、不移动水层和表面HCO₃⁻、复层鳞状上皮和黏膜下丰富的血供等。

12、下列哪项是原核细胞型的微生物？（ ）

- A. 链球菌、念珠菌
- B. 放线菌、破伤风梭菌
- C. 酵母菌、淋球菌
- D. 隐球菌、结核分枝杆菌
- E. 小孢子菌、大肠埃希菌

【正确答案】

B

【答案解析】

原核细胞指核质和细胞质之间不存在明显核膜，其染色体由单一核酸组成的一类微生物细胞，原核细胞型的微生物包括细菌、放线菌、立克次氏体、支原体、衣原体和螺旋体。

13、破伤风病人注射大量破伤风抗毒素的目的是（ ）。

- A. 控制和解除痉挛

- D. 中和游离的毒素
- E. 中和游离及结合的毒素

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

14、8个月女，发热、腹泻、轻咳2天入院，大便10余次/日，蛋花汤样。大便镜检：白细胞2~3个/HP，大便细菌培养阴性。血常规：白细胞为 $7.5 \times 10^9/L$ 。除轻度脱水征外，无其他异常。最可能的诊断是（ ）。

- A. 细菌性痢疾
- B. 致病性大肠杆菌肠炎
- C. 病毒性肠炎
- D. 金黄色葡萄球菌肠炎
- E. 霉菌性肠炎

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

15、有关别构效应的叙述，错误的是（ ）。

- A. 某种小分子物质与蛋白质(酶)的某一部位特异结合
- B. 发生空间结构微妙而规律的变化
- C. 改变了蛋白质的一级结构
- D. 生物活性发生变化(增强或减弱)
- E. 在生物体内普遍存在

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

16、输血时主要考虑（ ）。

- A. 给血者血浆不使受血者血浆发生凝集
- B. 给血者红细胞不被受血者红细胞所凝集
- C. 给血者红细胞不被受血者血清所凝集
- D. 给血者血浆不使受血者红细胞凝集
- E. 受血者红细胞不与其血浆发生凝集

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

17、正常小儿前囟门闭合的年龄应是（ ）。

- A. 3~4个月
- B. 1岁左右
- C. 1~1岁半
- D. 2岁左右
- E. 2岁半

【正确答案】

C

18、Th1细胞分泌的细胞因子是（ ）。

- A. IL-4
- B. IL-5
- C. IFN- γ
- D. IL-10
- E. IL-6

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

19、溃疡性结肠炎并发中毒性巨结肠的常见诱因是（ ）。

- A. 低血镁
- B. 低血钠
- C. 低血钾
- D. 低蛋白血症
- E. 低血钙

【正确答案】

C

【答案解析】

低钾、钡剂灌肠及抗胆碱能、抗腹泻药物或阿片类麻醉性镇痛剂可降低肠道管壁肌肉张力，抑制肠运动，可诱发溃疡性结肠炎并发中毒性巨结肠。

20、干扰素抗病毒的作用机制是（ ）。

- A. 干扰病毒的穿入
- B. 干扰病毒的吸附
- C. 直接干扰病毒mRNA的转录
- D. 诱导抗病毒蛋白质的产生
- E. 干扰病毒的释放

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

21、颈椎压缩骨折合并脱位最先选择的治疗方法是（ ）。

- A. 颌枕带牵引
- B. 手法复位.石膏固定
- C. 颅骨牵引
- D. 两桌复位法
- E. 切开复位法

【正确答案】

C

【答案解析】

颈椎骨折脱位的治疗方法，应先采用持续颅骨牵引复位，不宜手法复位，以免加重神经症状。如复位不能，宜手术治疗。

22、下列不属于中毒性痢疾临床表现的是（ ）。

- A. 惊厥

- B. 神志不清
- C. 休克
- D. 呼吸衰竭

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

23、HIV与感染细胞膜上CD4分子结合的病毒刺突为（ ）。

- A. gp120
- B. gp41
- C. P24
- D. P17
- E. gp160

【正确答案】

A

【答案解析】

HIV的复制是一个特殊而复杂的过程。HIV病毒体的包膜糖蛋白刺突gp120与细胞膜上的特异性受体CD4分子结合，然后病毒包膜与细胞膜发生融合，核衣壳进入细胞质内，脱壳释放RNA；病毒的反转录酶以病毒RNA为模板，经反转录产生互补的负股DNA构成RNA：DNA杂交体，RNA股水解去除后，再由负股DNA产生正股DNA，从而组成双股DNA，整合入宿主细胞染色体中，这种整合的病毒双股DNA即前病毒。故本题答案为A项。

24、膜型IgM的形态为（ ）。

- A. 六聚体
- B. 五聚体
- C. 三聚体
- D. 单体
- E. 双体

【正确答案】

D

【答案解析】

IgM有两种，膜型IgM为单体，即为BCR，但必须同时在B细胞表面表达两个以上IgM。分泌型IgM为五聚体即为血中IgM。故本题答案为D项。

25、下列哪项为管理舌前2/3味觉的神经？（ ）

- A. 三叉神经
- B. 面神经
- C. 舌咽神经
- D. 迷走神经
- E. 舌下神经

【正确答案】

B

【答案解析】

味觉纤维起始于面神经管内膝状神经节的神经元，在面神经管内，离开面神经向前方走，形成鼓索，参加到舌神经中，终止于舌前2/3的味蕾。起到管理舌前2/3味觉的作用。面神经尚有副交感纤维支配舌下腺、颌下腺和泪腺的分泌。

C项的舌咽神经管理舌后1/3味觉。故本题答案为B项。

26、注意增强常发生于（ ）。

- A. 青春型精神分裂症
- B. 偏执型精神分裂症
- C. 单纯型精神分裂症

2022年临床执业助理医师真题

- D. 紧张型精神分裂症
- E. 慢性精神分裂症

【正确答案】

B

27、患儿女，5岁，因发热10天不退，皮肤出现环形红斑，并伴有肘膝关节游走性疼痛而入院，抗“O”>500U，考虑为风湿热，治疗中给予青霉素静脉滴注，目的是（ ）。

- A. 控制皮肤和关节症状
- B. 防止心脏病变
- C. 制止风湿的活动
- D. 清除链球菌感染病灶
- E. 防止感染加重

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

28、男性，27岁，入院前1小时右腕上6cm处被机器绞断，软组织挫伤严重，神经血管均较骨骼短缩2cm，该病人最好的治疗方案是（ ）。

- A. 清创后，残端缝合，断肢保存，待二期再植
- B. 清创后，残端缝合
- C. 包扎换药
- D. 立即行断肢再植术
- E. 清创后，做前臂分叉成形术

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

29、病儿跌伤，X线片示左肱骨下端骨骺分离。3周后到市医院就诊，接诊医生填x线申请单时将左写成右，放射科发现错后，拍了左手，却将一个“右”字铅号贴在X线片上。入院后值班医师在主诉中写左，诊断上又写右，手术通知单上也写右。术前备皮时，护士仍在右臂备皮。手术医生术前曾去查看患者，检查出是左臂跌伤，手术时竟仍在右臂上开了刀，暴露到关节囊未见异常时，经再次询问病儿，方发现开错了手术部位。该事件的主要责任者是（ ）。

- A. 放射线医师
- B. 接诊医师
- C. 经治医师
- D. 备皮护士
- E. 手术医师

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

30、1岁男孩，持续高热，咳嗽7天，伴喘憋，嗜睡2天，今日惊厥2次，抽后神志不清。体检：浅昏迷，体温39.5℃。呼吸80次/min，心率180次/min。面色苍白，口周发绀，三凹征明显，两肺呼吸音粗，左背下部叩诊浊音，可闻支气管呼吸音及中细湿啰音，心音低钝，肝肋下4cm，前囟饱满，Kerning征阴性，Barbinsid征阳性，血WBC $10 \times 10^9/L$ 。脑脊液检查：细胞数 $6 \times 10^6/L$ ，潘氏试验阴性，糖3.6mmol/L，氯化物102mmol/L。最可能的诊断是（ ）。

- A. 腺病毒性肺炎，心力衰竭，中毒性脑病
- B. 粟粒性肺结核，结核性脑膜炎
- C. 呼吸道合胞病毒性肺炎，心力衰竭，高热惊厥
- D. 金葡菌肺炎，心力衰竭，高热惊厥

7

2022年临床执业助理医师真题

- E. 支原体肺炎，心力衰竭，化脓性脑膜炎

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

- A. 血沉
- B. 细菌培养
- C. X线照片
- D. 结核菌素试验
- E. 血尿常规与血生化检查

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

32、金葡菌引起的急慢性骨髓炎最好选用（ ）。

- A. 红霉素
- B. 阿莫西林
- C. 头孢曲松
- D. 林可霉素
- E. 万古霉素

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

33、糖酵解最主要的生理意义在于迅速提供（ ）。

- A. 能量
- B. 乳酸
- C. 酮体
- D. 核糖
- E. 糖原

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

34、哪项是急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病最严重的危险症状？（ ）

- A. 心力衰竭
- B. 呼吸肌麻痹
- C. 肺部感染
- D. 吞咽困难
- E. 心肌炎

【正确答案】

B

2022年临床执业助理医师真题

【答案解析】

运动障碍表现为四肢对称性、弛缓性瘫痪，下肢重，远端重。15%~40%的严重病例可出现呼吸肌瘫痪，从而出现全身缺氧症状，是急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病最严重的并发症。

35、叶酸缺乏性巨幼红细胞贫血的主要诊断依据是（ ）。

- A. 典型血象改变
- B. 皮肤色黄、虚胖
- C. 血清叶酸含量降低

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

36、表位是（ ）。

- A. 半抗原
- B. 抗原与MHC分子结合的部分
- C. 新抗原
- D. 抗原决定簇
- E. 超抗原

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

37、患儿，4岁，既往接种卡介苗，做“OT”试验1:2000。下列哪一项结果不是接种卡介苗后的反应？（ ）

- A. 硬结质地较软
- B. 硬结直径多为5~9mm
- C. 硬结边缘不整
- D. 试验阳性持续时间较短
- E. 阳性反应变化少，无减弱倾向，持续终身

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

38、下列属于《母婴保健法》规定可以申请医学技术鉴定的是（ ）。

- A. 对孕妇、产妇保健服务有异议的
- B. 对婚前医学检查结果有异议的
- C. 对婚前卫生咨询有异议的
- D. 对孕产期保健服务有异议的
- E. 对医学指导意见有异议的

【正确答案】

B

【答案解析】

本题源于《母婴保健法》第八条和第二十五条的规定。一般讲，保健服务、卫生咨询、医学指导不会产生异议。而婚前医学检查是要对男女双方是否患有严重遗传病、指定传染病、有关精神病等作出明确诊断并出具医学检查证明，最终可以影响结婚与生育，因而影响重大且可能产生异议。

39、观察小儿结核菌素试验结果的时间是（ ）。

2022年临床执业助理医师真题

- A. 72~96小时
- B. 48~72小时
- C. 24~47小时
- D. 12~23小时
- E. 1~11小时

【正确答案】

B

【答案解析】

小儿结核菌素试验，应做结核菌素试验于48~72小时观察试验结果判断结果阳性、阴性、弱阳性。

- A. 血浆、组织间液都减少，以血浆减少为主
- B. 只有血浆减少
- C. 血浆、组织间液都减少，以组织间液减少为主
- D. 只有组织间液减少
- E. 以血液浓缩为主

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

41、从小鼠的一种有荚膜的致病性肺炎球菌中提取出的DNA，可使另一种无荚膜、不具有致病性的肺炎球菌转变为有荚膜并具致病性的肺炎球菌，而蛋白质、RNA无此作用，由此，可以证明（ ）。

- A. DNA是遗传物质，蛋白质是遗传信息的体现者
- B. DNA是遗传信息的体现者，蛋白质是遗传物质
- C. DNA与蛋白质均是遗传物质
- D. RNA是遗传物质，DNA和蛋白质是遗传信息的体现者
- E. DNA和蛋白质是遗传物质，RNA是遗传信息的体现者

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

42、患者10岁，发育正常，无明显症状。听诊于胸骨左缘第2、3肋间闻及II级收缩期杂音，心电图显示右心室肥厚及不完全性右束支传导阻滞。本病例诊断最可能是（ ）。

- A. 法洛四联症
- B. 肺动脉狭窄
- C. 室间隔缺损
- D. 房间隔缺损
- E. 右位心

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

43、50岁以上髌关节骨关节炎病人有明显疼痛和运动障碍者，应首选（ ）。

- A. 截骨术
- B. 髌关节融合术
- C. 人工关节置换术
- D. 关节清理术

2022年临床执业助理医师真题

- E. 钻孔减压术

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

44、男性，58岁，有轻度高血压病史两年，近来时有右手发麻，今晨醒来时右手活动不灵，站立时右腿也无力，随后数小时症状渐加重，意识一直清楚，无其他不适。最可能的诊断是（ ）。

- A. 脑出血
- B. 脑血栓形成
- C. 脑栓塞

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

45、肝脏中乙酰CoA来自下述物质，除了（ ）。

- A. α -磷酸甘油
- B. 脂肪酸
- C. 葡萄糖
- D. 甘油
- E. 酮体

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

46、DNA指导的RNA聚合酶由数个亚基组成，其核心酶的组成是（ ）。

- A. $\alpha\alpha\beta\beta'$
- B. $\alpha\alpha\beta\beta'\sigma$
- C. $\alpha\alpha\beta'$
- D. $\alpha\alpha\beta$
- E. $\alpha\beta\beta'$

『正确答案』

A

『答案解析』

目前已研究得比较透彻的是大肠杆菌的RNA聚合酶。这是一个分子量达480kDa，由四种亚基仅 $\alpha 2\beta\beta'\delta$ 组成五聚体的蛋白质。 $\alpha 2\beta\beta'$ 亚基合称核心酶。

47、麻疹病程中常见以下哪种维生素的缺乏？（ ）

- A. 维生素A
- B. 维生素B
- C. 维生素C
- D. 维生素D
- E. 维生素E

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2022年临床执业助理医师真题

48、病人静点时将直输液管看成是一条蛇是（ ）。

- A. 虚构
- B. 感知综合障碍
- C. 谵妄
- D. 幻觉
- E. 错觉

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

49、支气管肺炎合并心力衰竭的表现，以下错误的是（ ）。

- C. 极度烦躁不安
- D. 突然高热达40.0°C
- E. 肝脏迅速增大

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

50、成年男性患者，被确诊为HIV感染，在对其已妊娠3个月的妻子进行说明过程中，哪一项是不正确的？（ ）

- A. 应该立即中止妊娠
- B. 此病可经性交传播
- C. 此病具有较长潜伏期
- D. 应配合患者积极治疗
- E. 避免与患者共用餐具

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

51、病人坚持不在床上睡，因为他感到床在运动，实际上床是静止的，此症状是（ ）。

- A. 妄想
- B. 感觉倒错
- C. 非真实感
- D. 幻觉
- E. 空间感知障碍

【正确答案】

D

【答案解析】

运动性幻觉是幻觉的一种表现形式，是关于本体感受器如肌肉、肌腱、关节等运动和位置的幻觉，是一种虚幻的知觉体验，即无床的运动而产生的知觉体验——感觉到床在运动。妄想是思维内容的障碍；感觉倒错是感觉障碍，必须有现实的刺激存在，并产生于常人性质不同或相反的感觉；非真实感是对自己对周围现实的体验缺乏主观感觉。

52、支气管哮喘发作时最常见的血气改变是（ ）。

- A. pH上升，PaO₂下降，PaCO₂降低
- B. pH上升，PaO₂下降，PaCO₂上升
- C. pH下降，PaO₂下降，PaCO₂降低
- D. pH下降，PaO₂下降，PaCO₂上升

12

2022年临床执业助理医师真题

- E. pH正常，PaO₂下降，PaCO₂上升

【正确答案】

A

【答案解析】

支气管哮喘严重发作时可有缺氧（PaO₂降低），并出现过度通气（PaCO₂下降，pH上升），表现呼吸性碱中毒。

53、1岁患者，未接种过麻疹疫苗，于半个月前曾接触过麻疹病儿，近4天发热、流涕、打喷嚏、畏光、咳嗽，昨日体温稍降，今日又发热，耳后发际部出现红色斑丘疹，疹间有健康皮肤，周围血白细胞4.5×10⁹/L，最可能的诊断是（ ）。

- A. 幼儿急疹
- B. 麻疹
- C. 猩红热
- D. 风疹
- E. 荨麻疹

【答案解析】
暂无解析。

54、抑郁症治疗最首要的为（ ）。

- A. 改善情绪
- B. 改善睡眠
- C. 防止自伤自杀
- D. 预防复发
- E. 心理支持

【正确答案】

C

【答案解析】
暂无解析。

55、药物的首关消除可能发生于（ ）。

- A. 口服给药后
- B. 吸入给药后
- C. 舌下给药后
- D. 静脉注射后
- E. 皮下注射后

【正确答案】

A

【答案解析】

药物口服吸收后经门静脉入肝脏，如首次通过肝脏就发生转化，从而使进入体循环的药量减少，此即为首关消除。因而首关消除明显的药物应避免口服给药。舌下及直肠给药后其吸收途经不经肝门静脉，故可避免首关消除。

56、一位术后贫血合并有心功能不全的老年病人，输入血细胞制品最恰当的是（ ）。

- A. 浓缩红细胞
- B. 洗涤红细胞
- C. 冰冻红细胞
- D. 少含白细胞红细胞
- E. 库存全血

【正确答案】

A

2022年临床执业助理医师真题

【答案解析】

浓缩红细胞是压积红细胞，它不含或少含血浆，适用于血容量正常而需补充红细胞的贫血。尤其对本例合并有心功能不全的老年病人，不致引起不良反应或循环超负荷。而B、D两项适用于多次输血后产生白细胞凝集抗体有发热反应的贫血。C、E两项又不如浓缩红细胞容量小、效果大。

57、颈椎骨折脱位合并截瘫的严重并发症不包括（ ）。

- A. 呼吸道感染
- B. 心血管系统紊乱
- C. 泌尿系感染和结石
- D. 褥疮
- E. 高热

【正确答案】

B

【答案解析】

截瘫系脊髓受损，受损平面以下出现的瘫痪。颈椎骨折脱位伤及颈髓造成高位截瘫，可因呼吸肌麻痹，呼吸表浅，咳嗽无

58、羊水过多最常见的原因是（ ）。

- A. 妊娠合并糖尿病
- B. 胎儿畸形
- C. 妊娠高血压综合征
- D. 母子血型不合
- E. 双胎妊娠

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

59、新生儿黄疸的光疗指征不包括（ ）。

- A. 血清总胆红素大于205 $\mu\text{mol/L}$
- B. 极低出生体重儿大于103 $\mu\text{mol/L}$
- C. 超低出生体重儿大于85 $\mu\text{mol/L}$
- D. 新生儿溶血病者
- E. 生后7天黄疸尚未完全消退者

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

60、1岁男婴，因腹胀、便秘、反应低下，少哭多睡11个月来诊。查：体温36.2 $^{\circ}\text{C}$ ，四肢稍凉，皮肤粗糙，毛发枯黄稀疏，心率68次/分，心音低钝，眼距宽，唇厚舌大，身高70cm，四肢短粗，不会独坐及爬行，表情呆滞，哭声嘶哑，腹部膨隆，有脐疝。最可能的诊断为（ ）。

- A. 软骨发育不良
- B. 粘多糖病
- C. 苯丙酮尿症
- D. 先天性甲状腺功能减低症
- E. 染色体病

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

14

2022年临床执业助理医师真题

二、A2型题（每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、1岁男孩，发热2天，咳嗽、喘1日，已诊断为支气管肺炎，确诊最主要的体征是（ ）。

- A. 呼吸急促
- B. 双肺闻及细水泡音
- C. 三凹征（+）
- D. 口唇发绀
- E. 双肺闻及哮鸣音

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2、患者，女，22岁。十二指肠溃疡病史2年，口服药物治疗，因12小时前呕吐鲜血来诊，血压为80/50mmHg，输血1000mL后，血压仍有波动，心悸，贫血貌，剑突下压痛，腹胀。此患者最适宜的治疗方法是（ ）。

- B. 静脉注射止血药
- C. 快速补液、输血
- D. 抗休克治疗的同时行急诊剖腹手术
- E. 观察

【正确答案】

D

【答案解析】

输血后患者血压仍低，说明仍有活动性出血，应在抗休克治疗的同时行急诊剖腹手术，明确病因，手术止血。

3、不需与周期性瘫痪进行鉴别的是（ ）。

- A. 格林-巴利综合征
- B. 原发性醛固酮增多症
- C. 肾小管性酸中毒
- D. 瘧病性瘫痪
- E. 癫痫单纯运动性发作

【正确答案】

E

【答案解析】

癫痫单纯运动性发作表现为骨骼肌的抽搐性症状。

4、受挤压时，最容易发生挤压综合征的部位是（ ）。

- A. 胸部
- B. 上臂
- C. 大腿
- D. 小腿
- E. 臀部

【正确答案】

D

【答案解析】

最易发生挤压综合征的部位是前臂掌侧和小腿。主要是由于肢体伤后敷料包扎过紧、严重的局部压迫、缺血后水肿、软组织严重挫伤、挤压以及局部深度烧伤等原因引起一系列的症状和体征。

5、肝癌最常见的转移方式是（ ）。

15

2022年临床执业医师助理医师真题

- A. 门静脉转移
- B. 肝静脉转移
- C. 脾静脉转移
- D. 种植性转移
- E. 淋巴道转移

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

6、结核的微生物学诊断方法不包括（ ）。

- A. 标本直接或集菌后涂片
- B. 分离培养鉴定
- C. 血清学试验测抗体
- D. 锡克试验(Schick试验)
- E. 豚鼠试验

【正确答案】

【答案解析】
暂无解析。

7、男性，56岁，阵发性腹痛6d，伴恶心腹胀2d入院，无发热，体格检查：腹膨隆，见肠型，肠鸣音亢进，有气过水声，腹部X线平片见腹中部扩张小肠呈“阶梯状”液平，结肠内少量积气，可能的诊断是（ ）。

- A. 麻痹性肠梗阻
- B. 低位小肠梗阻
- C. 高位小肠梗阻
- D. 坏死性小肠炎
- E. 乙状结肠扭转

【正确答案】

B

【答案解析】

肠梗阻的诊断。患者老年男性，腹痛、腹胀，腹膨隆，见肠型，肠鸣音亢进，有气过水声，腹部X线平片见腹中部扩张小肠呈“阶梯状”气—液平面，结肠内少量积气，首先考虑诊断肠梗阻。患者没有明显的麻痹性肠梗阻病因，且肠鸣音亢进，故排除之。高位小肠梗阻者呕吐早而频繁，腹胀不明显；低位小肠梗阻和结肠梗阻，都表现腹胀严重，呕吐晚而轻，两者的区别是腹部X线平片：前者小肠呈“阶梯状”气—液平面，结肠内积气少；而后者盲肠部胀气明显，小肠胀气可不明显。

8、急性肾炎与慢性肾炎的根本区别是（ ）。

- A. 起病缓急
- B. 高血压程度
- C. 有无肾功能减退
- D. 肾组织病理改变
- E. 起病年龄、性别

【正确答案】

D

【答案解析】

急性肾炎与慢性肾炎可从临床及实验室进行鉴别。一般急性肾炎起病急、病程短、预后好，其病理改变多为渗出增生性。慢性肾炎病程长、多有肾功能损害、贫血、高血压等，其病理改变多为膜性或膜增殖，两者鉴别可通过肾活检明确区分。

9、急性乳腺炎最常见于（ ）。

- A. 哺乳半年后的妇女
- B. 初产哺乳的妇女

16

2022年临床执业助理医师真题

- C. 妊娠期妇女
- D. 长期哺乳的妇女
- E. 乳头凹陷的妇女

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

10、8个月婴儿，因皮肤黏膜苍白、食欲欠佳来诊，查体发现肝脾轻度肿大。血象：Hb 70g/L，RBC $3.5 \times 10^{12}/L$ 。血涂片可见RBC大小不等。以小细胞为主，中心淡染区扩大。最可能是（ ）。

- A. 再生障碍性贫血
- B. 地中海贫血
- C. 铁粒幼红细胞性贫血
- D. 营养性巨幼细胞性贫血
- E. 营养性缺铁性贫血

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

- A. 好发于子宫、胃肠道等部位
- B. 肿瘤境界清楚
- C. 切面灰白、质韧，呈编织状
- D. 不会恶性变
- E. 不转移

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

12、女，47岁，有10年糖尿病史。近一年来并发肺结核，并经常患有肺炎或支气管炎，长期局部肌肉注射下列药物，造成注射部位脂肪萎缩。系由哪一种药物引起？（ ）

- A. 青霉素
- B. 庆大霉素
- C. 链霉素
- D. 胰岛素
- E. 头孢唑啉

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

13、Ig分成KT两个型，其依据是（ ）。

- A. VH
- B. CL
- C. VL
- D. CH
- E. 铰链区

2022年临床执业助理医师真题

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

14、男性，12岁，学生。1年来常出现写作业时铅笔跌落，伴呆坐不动10秒左右。脑电图显示阵发性对称、同步的3Hz棘-慢波发放。诊断最可能是（ ）。

- A. 癫痫小发作
- B. 局限性发作
- C. 精神运动性发作
- D. 癫痫大发作
- E. 儿童良性发作

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

15、下列哪项不符合震颤麻痹的症状？（ ）

- A. 随意运动减少
- B. 静止性震颤
- C. 全身肌肉强直

【正确答案】

E

【答案解析】

震颤麻痹即帕金森病，是一种常见的中老年人神经系统变性疾病，主要病变在黑质和纹状体，以随意运动减少、全身肌肉强直、静止性震颤和体位不稳为主要症状，走路呈“慌张步态”，一般均不会引起瘫痪。

16、下列哪一项不符合震颤麻痹的症状？（ ）

- A. 慌张步态
- B. 面具脸
- C. 搓药丸样动作
- D. 小写症
- E. 动作时震颤加剧

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

17、我国流行的HCV的基因型主要是（ ）。

- A. I型
- B. II型
- C. III型
- D. V型
- E. VI型

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

18、重症肌无力患者应选用（ ）。

18

2022年临床执业助理医师真题

- A. 碘解磷定
- B. 氯磷定
- C. 阿托品
- D. 新斯的明
- E. 毛果芸香碱

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

19、下列哪项不是钙拮抗剂的适应证（ ）。

- A. 高血压
- B. 心绞痛
- C. 心律失常
- D. 水钠潴留
- E. Raynaud综合征

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

20、男性，40岁。血吸虫性肝硬化伴严重脾肿大及血小板减少，有上消化道出血史，胃镜示食管静脉曲张。该病人的最佳治疗方法是（

- B. 门腔静脉分流术
- C. 脾肾静脉分流术
- D. 脾切除加贲门周围血管离断术
- E. 曲张静脉套扎术

【正确答案】

D

【答案解析】

中年男性患者，血吸虫肝硬化、脾大、脾亢（血小板减少）、门腔静脉交通支扩张（食管静脉重度曲张），可诊断为肝硬化门静脉高压症。既往曾有上消化道出血的病史，为预防食管静脉曲张再次破裂出血应选择手术治疗。手术术式应以贲门周围血管离断术为首选，该术式对病人打击较小，能达到即刻止血的效果，又能维持入肝血流，对肝功能影响较小，手术死亡率及并发症发生率低，术后生存质量高，而且操作较简单，易于在基层医院推广。又因患者有脾功能亢进，故行脾切除加贲门周围血管离断术。

21、男性，31岁，不规则发热，咳嗽半年，间断腹泻，大便无脓血，病后体重由71kg降到70kg，3年前曾到非洲工作，1年前回国，诊断该病的实验检查是（ ）。

- A. 检测抗HIV
- B. 取血分离HIV
- C. 胸部X线片
- D. 大便培养
- E. 查血疟原虫

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

22、25岁初产妇，妊娠39周，宫口开全1小时，胎心110次/分，胎膜已破，羊水Ⅱ度混浊，胎头+4，左枕前位。此时正确的处理应是（ ）。

- A. 静脉滴注缩宫素加速产程进展

19

2022年临床执业助理医师真题

- B. 吸氧，等待自然分娩
- C. 立即行剖宫产术
- D. 产钳术助娩
- E. 胎头吸引术助娩

【正确答案】

D

【答案解析】

患者宫口开全1小时、羊水污染、胎心减慢，有胎儿窘迫表现，应尽快结束分娩。胎头+4，出口产钳助产是最快捷、安全的方法。

23、X-连锁低丙球蛋白血症属于（ ）。

- A. 联合免疫缺陷
- B. T细胞缺陷
- C. 吞噬细胞缺陷
- D. 补体缺陷病
- E. B细胞缺陷病

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

24、慢性丙型肝炎，抗HCV（+），HCVPCR（+），ALT120U/L，肝肋下1.0cm，脾界不大，侧卧未触及，下列哪项为此患根本的治疗？（ ）

- A. 应用甘利欣降酶

- C. 应用促肝细胞生长因子
- D. 调节免疫治疗
- E. 抗病毒应用干扰素治疗

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

25、下列哪项是莱姆病的病原体？（ ）

- A. 钩端螺旋体
- B. 梅毒螺旋体
- C. 回归热螺旋体
- D. 伯氏疏螺旋体
- E. 奋森疏螺旋体

【正确答案】

D

【答案解析】

钩端螺旋体病为人畜共患病，接触疫水为主要传播途径。梅毒螺旋体通过性接触传播，引起性病梅毒，也可经胎盘传给胎儿。回归热螺旋体由体虱或软蜱传播，导致流行性或地方性回归热。伯氏疏螺旋体由硬蜱传播，导致莱姆病。奋森疏螺旋体可引起咽峡炎、牙龈炎等。故本题答案为D项。

26、男，35岁。1年来反复出现腹泻，粪便糊状。结肠镜检查发现病变主要位于回肠末段，表现为多发的纵行溃疡，溃疡间黏膜正常。最可能的诊断是（ ）。

- A. 结肠癌
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 细菌性痢疾

2022年临床执业医师助理医师真题

- D. 克罗恩病
- E. 肠结核

【正确答案】

D

【答案解析】

克罗恩病多见于年轻人，病变可发生于消化道（自口腔至肛门）的任何部位，但以末段回肠和右半结肠最多见。主要症状有腹痛、腹泻、发热、消瘦、贫血、食欲减退、恶心、呕吐、腹部肿块、肠梗阻、瘘管形成等，伴有营养不良、贫血、关节炎、虹膜炎和肝病等。

27、需要给予肠外营养的患者不包括（ ）。

- A. 各种原因引起的不能正常进食者
- B. 各种营养不良患者
- C. 严重大面积烧伤者
- D. 急性重症坏死性胰腺炎者
- E. 严重的胃肠道功能低下者

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

28、HCV与HBV的区别在于（ ）。

- A. 主要经血液传播
- B. 可转为慢性肝炎、肝硬化和肝癌
- C. 不能细胞培养
- D. 表面蛋白抗原性易变异

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

29、下列哪项是氯丙嗪治疗精神分裂症时最常见的不良反应？（ ）

- A. 过敏反应
- B. 直立性低血压
- C. 内分泌障碍
- D. 锥体外系反应
- E. 消化系统症状

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

30、患者，女，50岁。因急性心肌梗死收入院。住院第2天心尖部出现2/6~3/6级粗糙的收缩期杂音，间断伴喀喇音，经抗缺血治疗后心脏杂音消失。该患者最可能的诊断为（ ）。

- A. 心脏乳头肌功能失调
- B. 心室膨胀瘤
- C. 心脏游离壁破裂
- D. 心脏二尖瓣穿孔
- E. 心脏功能性紊乱

2022年临床执业助理医师真题

【正确答案】

A

【答案解析】

心肌梗死后突然出现的乳头肌功能失调表现为突发心尖部杂音。

三、B1型题（以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、c、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。）

1、（共用备选答案）

- A.先天性甲状腺功能减低症
- B.佝偻病
- C.软骨发育不全
- D.垂体性侏儒症
- E.先天性巨结肠

1. 智能低下，特殊面容是（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2. 外观矮小，全身比例匀称是（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2、（共用备选答案）

- C.趋避冲突
- D.多重趋避冲突
- E.双重趋避冲突

1. 鱼和熊掌不可兼得属于（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 前有悬崖，后有追兵属于（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

双趋冲突是两个目标对个人具有相同的吸引力，并引起相同强度的动机。双避冲突是两个事物同时对个人会造成威胁或厌恶，产生同等强度的逃避动机。

3.（共用备选答案）

- A.大便呈暗绿色、海水样，黏液较多。便常规有大量脓细胞、革兰阳性细菌
- B.大便呈水样便、腥臭味，便常规有白细胞，少量红细胞
- C.大便呈稀黄色，泡沫较多，可呈豆腐渣样、便常规少量白细胞
- D.多夏季起病，黏液脓血便，便常规大量白细胞、可见红细胞
- E.秋季起病，大便呈蛋花汤样、量多、次数多、无腥臭味，便常规偶见白细胞

2022年临床执业助理医师真题

1. 侵袭性大肠杆菌肠炎（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 金黄色葡萄球菌肠炎（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

3. 轮状病毒肠炎（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

小儿腹泻病大便性状，对诊断及病因判断很有价值。侵袭性大肠杆菌肠炎特点是夏季起病，年龄婴幼儿，大便呈黏液脓血便，便常规大量白细胞、可见红细胞。应与细菌性痢疾鉴别。金黄色葡萄球菌肠炎，大便绿色或海水样，便常规有大量脓细胞、革兰阳性细菌。与应用大量抗生素有关。轮状病毒性肠炎，秋季起病，大便呈蛋花汤样，水分多、量多、次数多，无腥臭，便常规偶见白细胞。真菌性肠炎，大便呈稀黄色，泡沫较多，可呈豆腐渣样，便常规少量白细胞，常伴有鹅口疮。致病性大肠杆菌肠炎，大便呈水样便、腥臭味，便常规有白细胞、少量红细胞。

4.（共用备选答案）

- A.酸溶血试验阳性
- B.抗人球蛋白试验阳性
- C.红细胞渗透脆性试验阳性
- D.血红蛋白电泳试验异常
- E.高铁血红蛋白还原试验异常

1. 自身免疫性溶血性贫血（ ）。

『正确答案』

暂无解析。

2. 遗传性球形红细胞增多症（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

3. 海洋性贫血（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

5. （共用备选答案）

A.联想过程缺乏一定方向，概念间缺乏内在联系

B.大脑中反复出现的观念，明知不必要，却摆脱不了，感到非常痛苦

C.以往经验在记忆中大量脱失

D.持续地重复某一单调的语句

E.缺乏事实依据，患者却坚信不移的病理信念

2022年临床执业助理医师真题

1. 思维破裂是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 遗忘是（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

3. 强迫观念是（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

4. 妄想是（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

5. 刻板言语是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

四、A3型题（以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据考题所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，

1、（共用题干）

女性，62岁。绝经11年，阴道反复出血4个月就诊。查体：肥胖，一般情况好，血压150/105mmHg。妇科检查：阴道少许血液，宫颈光滑，子宫正常大，双附件正常。

2022年临床执业助理医师真题

1. 最可能的诊断是（ ）。

- A. 子宫颈癌
- B. 老年性子宫内膜炎
- C. 子宫内膜息肉
- D. 老年性阴道炎
- E. 子宫内膜癌

【正确答案】

E

【答案解析】

子宫内膜癌多发生于老年女性，主要症状为停经后阴道出血。老年性子宫内膜炎主要表现为宫体压痛、附件区压痛或宫颈触痛；子宫内膜息肉主要症状为月经量增多或不规则子宫出血，宫颈口处看到或触及息肉，子宫体略增大；老年性阴道炎表现为血性、脓性的阴道分泌物；子宫颈癌表现为接触性出血。

2. 确诊的最佳方法是（ ）。

- A. 宫腔涂片细胞学检查
- B. 宫颈管细胞学检查
- C. 宫颈活检
- D. 宫腔镜检查
- E. 子宫分段诊刮

【正确答案】

E

【答案解析】

在子宫内膜癌的诊断中，分段诊刮是最常用、最有价值的诊断方法，分段诊刮的优点是能鉴别子宫内膜癌和宫颈腺癌，也可明确子宫内膜癌是否累及宫颈管，为制订治疗方案提供依据。细胞学检查、宫腔镜检查也可作为辅助手段，但没有分段诊刮可靠。

2、（共用题干）

女，48岁，左中指发僵、疼痛，屈伸中指时有弹响。

2022年临床执业助理医师真题

1. 最可能的诊断是（ ）。

- A. 类风湿性关节炎
- B. 狭窄性腱鞘炎
- C. 腱鞘囊肿
- D. 滑囊炎
- E. 创伤性关节炎

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2. 疗效较好的方法是（ ）。

- A. 理疗
- B. 限制活动和石膏固定
- C. 体疗加内服药物
- D. 伤湿止痛膏局部贴敷
- E. 醋酸强的松龙局部封闭

【正确答案】

E

【答案解析】

根据典型的临床表现即可诊断。狭窄性腱鞘炎也是一种慢性损伤性炎症，与手指长期快速用力活动有关，好发于手的屈指肌腱鞘和腕部拇长展肌和拇短伸肌的腱鞘，后者称为桡骨茎突狭窄性腱鞘炎。疗效较好的治疗方法是腱鞘内醋酸强的松龙注射，注射一定要准确。局部制动也有一定疗效。如非手术治疗无效，可考虑行狭窄腱鞘切除术。

3. （共用题干）

患者，男，30岁，餐后突发右上腹及剑突下痛，放射到右肩及后背部，2h后疼痛剧烈，伴恶心，并吐出所进食物。仍不缓解，急诊就医。数年“胃病”史及胆石症历史，间有胆绞痛发作，查体：痛苦病容，体温37.2℃，呼吸28/min，浅快，律齐；全腹胀，上腹肌紧张，压痛反跳痛（+）；移动性浊音（±）。白细胞 $12 \times 10^9/L$ ，血红蛋白125g/L，尿淀粉酶400U（温氏法正常值32U）。

2022年临床执业助理医师真题

1. 下列初步诊断中，不可能的是（ ）。

- A. 胃十二指肠溃疡穿孔
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性肠梗阻
- D. 急性胰腺炎
- E. 急性胃肠炎

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

2. 排除该项诊断的最主要根据是（ ）。

- A. 患者有持续腹痛
- B. 尿淀粉酶轻度升高
- C. 上腹部存在肌紧张、反跳痛
- D. 患者体温轻度高
- E. 患者有腹胀

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

3. 为了确立诊断可选择的检查中，不包括（ ）。

- A. 急诊B超检查
- B. 立位腹部X线片检查
- C. 血淀粉酶检查
- D. 诊断性腹腔穿刺检查
- E. 急诊上消化道钡剂检查

【正确答案】

E

【答案解析】

患者中年男性，餐后突发右上腹及剑突下痛、放射到右肩及后背部，2h后疼痛剧烈，伴恶心、呕吐，吐后不缓解。数年“胃病”及胆石病史，间有胆绞痛发作。体检：腹软，脐窝压痛，体温轻度高，呼吸浅快，全腹膨隆，上腹局部腹膜刺激征，移动性浊音可

查、急诊B超检查、血淀粉酶检查、诊断性腹腔穿刺检查：因为患者可能为胃十二指肠溃疡穿孔，故不宜做急诊消化道钡剂检查，以免加重病情。

4、（共用题干）

一位20多岁女青年因情绪低落，兴趣减退，失眠，对未来失去希望，来心理门诊就医

2022年临床执业助理医师真题

1. 如果给她做临床心理症状评估。首先考虑的是（ ）。

- A. MMPI
- B. SAS
- C. HAMA
- D. H.R.神经心理成套测验
- E. HAMD

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

2. 如果给她做人格测定，首先考虑的是（ ）。

- A. MMPI
- B. 16-PF
- C. TAT
- D. EPQ
- E. 洛夏测验

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

5、（共用题干）

女性，44岁，反复发作上腹部疼痛3年，近3d上腹绞痛，伴发热寒战，皮肤巩膜黄染。

2022年临床执业助理医师真题

1. 该病人首选检查方法是（ ）。

- A. B超
- B. CT
- C. MRI
- D. PTC
- E. ERCP

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 该病最可能的原因是（ ）。

- A. 肿瘤
- B. 结石
- C. 蛔虫
- D. 炎性狭窄
- E. 先天畸形

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

3. 若病人出现神志淡漠、嗜睡，最有效的治疗措施是（ ）。

- A. 纠正水、电解质和酸碱平衡紊乱
- B. 给予有效足量抗生素
- C. 应用肾上腺皮质激素
- D. 紧急手术解除胆道梗阻并减压引流
- E. 使用多巴胺等药物维持血压

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

