

2022年执业助理医师考试分值分布

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、哪项是HIV侵犯的主要靶细胞？（ ）

- A. CD₄⁺T细胞
- B. 浆细胞
- C. 红细胞
- D. B细胞
- E. CD₈⁺T细胞

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2、关于结核化疗原则，下列选项不正确的是（ ）。

- A. 应坚持早期，联用，大量，规律，全程用药
- B. 临床有结核中毒症状，X线病灶有炎性成分，需用化疗
- C. 对病灶部分硬结，痰菌阴性者，可先观察，暂不用化疗
- D. 利福平对杀灭被吞噬在细胞内的结核菌有效
- E. 初治病例如条件允许，尽量采用短程化疗（6个月）

【正确答案】

A

【答案解析】

A项，合理化疗是指对活动性结核病坚持早期，联用，适量，规律和全程使用敏感药物的原则。B项，临床上有结核中毒症状，痰菌阳性，X线病灶具有炎症成分，或是病灶正在进展或好转阶段，均属活动性肺结核，是化疗适应证。C项，对部分硬结，痰菌阴性者，可先观察段时间，暂不用化疗；对硬结已久的病灶不需化疗。D项，利福平对于巨噬细胞内外的结核分枝杆菌均有快速杀菌作用，特别是对C菌群有独特的杀菌作用。E项，对于初治病例，如条件允许，可以用异烟肼+利福平+吡嗪酰胺组合为基础的短程化疗方案（6个月）。

3、法洛四联症不应存在下列哪一种？（ ）

- A. 右心室肥大
- B. 肺动脉狭窄
- C. 室间隔缺损
- D. 主动脉骑跨
- E. 动脉血氧饱和度>95%

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

4、下列临床表现中最不支持心绞痛诊断的是（ ）。

- A. 疼痛可在睡眠中发生
- B. 含服硝酸甘油，疼痛在3~5分钟内缓解
- C. 疼痛易被运动或情绪激动诱发
- D. 反复出现的局限性心前区刺痛，每次持续仅2~3秒

- E. 疼痛在休息时发生，持续1~10分钟

【正确答案】

D

【答案解析】

心脏神经症为短暂（几秒钟）的刺痛或持久（几小时）的隐痛。而心绞痛一般为3~5分钟的心前区疼痛，胸痛常为压迫、发闷或紧缩性，也可有烧灼感，但不像针刺或刀扎样锐性痛，偶伴濒死的恐惧感觉。

5、女性，30岁，左乳内上象限肿块，胀痛，与月经周期无明显关系，对该患者最恰当的处理是（ ）。

- A. 乳癌根治术
 B. 肿块切除并送快速病理检查
 C. 肿块切取活检
 D. 细针穿刺活检
 E. 粗针穿刺活检

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

6、成人心脏正常二尖瓣瓣口面积是（ ）。

- A. $0.5\sim 1.0\text{cm}^2$
 B. $2.0\sim 3.0\text{cm}^2$
 C. $4.0\sim 6.0\text{cm}^2$
 D. $6.5\sim 7.5\text{cm}^2$
 E. $8.0\sim 9.0\text{cm}^2$

【正确答案】

C

【答案解析】

成人心脏正常二尖瓣口面积约 $4\sim 6\text{cm}^2$ 。瓣口面积减小至 $1.5\sim 2.0\text{cm}^2$ 属轻度狭窄， $1.0\sim 1.5\text{cm}^2$ 属中度狭窄， $<1.0\text{cm}^2$ 属重度狭窄。

7、新生儿缺氧缺血性脑病的临床表现是（ ）。

- A. 不吃，不哭，不动
 B. 肝脾增大，皮肤出血点
 C. 意识改变，肌张力异常
 D. 进行性呼吸困难，呻吟
 E. 黄疸重，伴惊厥

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

8、为研究老年人的糖尿病患病率，拟进行抽样调查，下列不属于抽样调查中决定样本含量的因素的是下列哪项？（ ）

- A. 个体间的变异程度
 B. 调查者的数量
 C. 精确度
 D. 预期现患率
 E. 把握度

【正确答案】

B

暂无解析。

9、肱骨闭合性骨折出现桡神经损伤症状的处理原则是（ ）。

- A. 给予大剂量神经营养药物
- B. 立即手术探查
- C. 处理骨折后观察2~3个月
- D. 先手术吻合神经再处理骨折
- E. 物理疗法

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

10、女，24岁，因心悸、多食、消瘦、月经量少就诊，经查体及实验检查确诊为Graves病，病人幼年时有哮喘史，下列何种药物应禁忌？（ ）

- A. 他巴唑（甲巯咪唑）
- B. 甲硫氧嘧啶
- C. 卡比马唑
- D. 甲状腺素片
- E. 普萘洛尔

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

11、传播途径中哪项同艾滋病无关？（ ）

- A. 注射
- B. 性接触
- C. 虫媒
- D. 母婴
- E. 器官移植

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

12、定期考核不合格的医师暂停执业活动期满，再次考核仍不合格的（ ）。

- A. 可再试用一年
- B. 再次接受培训
- C. 在执业医师指导下从事执业活动
- D. 暂停执业活动三年
- E. 注销注册，收回医师执业证书

【正确答案】

E

【答案解析】

参见《执业医师法》第十六条：医师注册后有下列情形之一的，其所在的医疗、预防、保健机构应当在三十日内报告准予注册的卫生行政部门，卫生行政部门应当注销注册，收回医师执业证书：……（四）依照本法第三十一条规定暂停执业活动期满，再次考核仍不合格的……

13、非浸润性突眼的突眼度一般最多（ ）。

- A. 14mm

- B. 15mm

- D. 18mm
- E. 19mm

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

14、急性阑尾炎患者，当腹痛尚未转移至右下腹时，在诊断上具有重要意义的是（ ）。

- A. 便血
- B. 有白细胞显著升高
- C. 已有脐周压痛反跳痛
- D. 脐区及右下腹具有压痛反跳痛
- E. 压痛已固定在右下腹

【正确答案】

E

【答案解析】

压痛固定在右下腹说明此处有炎症，所以是最有意义的体征。

15、人类的MHC定位于哪号染色体？（ ）

- A. 第17号染色体
- B. 第9号染色体
- C. 第15号染色体
- D. 第6号染色体
- E. 第2号染色体

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

16、对于细胞凋亡坏死（固缩坏死），下述叙述中哪项不正确？（ ）

- A. 发生单个细胞坏死或小灶状坏死
- B. 凋亡坏死（固缩坏死）见于许多生理和病理过程
- C. 凋亡坏死不引起炎症反应
- D. 可见凋亡小体形成
- E. 凋亡坏死是由酶解作用所致

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

17、对于单克隆免疫球蛋白，下述哪一项是错误的？（ ）

- A. 是人体受抗原刺激后，由不同浆细胞产生的
- B. 多见于恶性浆细胞疾病
- C. 多不能检出抗体活性
- D. 是一种异常的免疫球蛋白或其片段
- E. 也可见于淋巴细胞恶性增生性疾病

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

- B. 12%
- C. 15%
- D. 18%
- E. 21%

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

19、颈椎病的手术指征是（ ）。

- A. 头痛、头晕、眩晕
- B. 颈痛伴手麻木
- C. 颈肩部较重，手握力减退，X线片有骨棘生成，椎间隙狭窄
- D. 反复发作，症状严重，长期保守疗法无效，有脊髓受压或瘫痪
- E. 颈肩部，手部肌力减弱，头痛头晕，耳鸣

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

20、正常摸到足背动脉搏动的位置在（ ）。

- A. 胫骨前肌腱的内侧
- B. 内踝前方
- C. 长伸肌腱的内侧
- D. 趾长伸肌腱的外侧
- E. 踇长伸肌腱的外侧

【正确答案】

E

【答案解析】

足背动脉位置表浅，位于足背部大踇趾和第二趾（第1、2跖骨之间的连线）中间，与内、外踝经足背连线的中点相交，通常在踇长伸肌腱的外侧可触知其搏动，用食指轻轻按放于此部位，即可扪到动脉的搏动。

21、下列哪种症状有助于抑郁发作的诊断？（ ）

- A. 智能障碍
- B. 晨重暮轻
- C. 遗忘综合征
- D. 晨轻暮重
- E. 意识障碍

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

22、依据细菌的营养类型分类，大部分细菌属于（ ）。

- A. 化能自养菌
- B. 光能自养菌

- C. 腐生菌
- D. 寄生菌
- E. 厌氧菌

【答案解析】
暂无解析。

- 23、一侧脊髓后索病变产生（ ）。
- A. 受累平面以下对侧触觉减退
 - B. 受累平面以下同侧深感觉减退
 - C. 受累平面以下对侧深感觉减退
 - D. 受累平面以下同侧痛、温觉减退
 - E. 以上均否

【正确答案】
B

【答案解析】
暂无解析。

- 24、妊娠早期羊水主要来自（ ）。
- A. 母血清经胎膜进入羊膜腔的透析液
 - B. 胎儿尿液
 - C. 胎儿皮肤
 - D. 胎儿肺
 - E. 胎膜

【正确答案】
A

【答案解析】

妊娠早期羊水主要来自母体血清经胎膜进入羊膜腔的透析液。妊娠中期以后，胎儿尿液成为羊水的主要来源。妊娠晚期胎儿肺参与羊水的生成。

- 25、患儿，男，10岁，发热20余天，伴游走性关节疼痛，抗“O” $\geq 500U$ ，临床诊断为风湿性关节炎。引起此病的病原体是（ ）。
- A. 腺病毒
 - B. 肺炎链球菌
 - C. A族 β 溶血性链球菌
 - D. 金黄色葡萄球菌
 - E. 肺炎支原体

【正确答案】
C

【答案解析】
暂无解析。

- 26、营养性巨幼红细胞性贫血的患者，当其无神经系统症状时，首选的治疗药物是（ ）。
- A. 维生素B₁₂
 - B. 叶酸
 - C. 维生素B₁₂+叶酸
 - D. 维生素C
 - E. 维生素B₆

【正确答案】
B

【答案解析】
暂无解析。

- 27、下列关于阑尾炎的叙述不正确的是（ ）。
- A. 阑尾动脉是终末动脉

- D. 成人切除阑尾将损害机体的免疫功能
- E. 阑尾深部黏膜有嗜银细胞，与类癌发生有关

【正确答案】

D

【答案解析】

阑尾的淋巴组织在出生后就开始出现，12~20岁时达高峰期，有200多个淋巴滤泡，以后逐渐减少，30岁后滤泡明显减少，60岁后完全消失，切除阑尾不会损害机体的免疫功能。

28、Courvoisier征是指胰腺癌患者出现（ ）。

- A. 无痛性胆囊肿大
- B. 左上腹或脐周血管杂音
- C. 肝大
- D. 腹膜转移
- E. 胰源性腹水

【正确答案】

A

【答案解析】

典型胰腺癌可见消瘦、上腹压痛和黄疸。有黄疸时，可因胆汁淤积而出现肝大、质硬、表面光滑。可扪及囊性、无压痛、光滑并可推移的肿大胆囊，称为Courvoisier征。

29、下列哪种症状有助于抑郁发作的诊断？（ ）

- A. 智能障碍
- B. 晨重暮轻
- C. 遗忘综合征
- D. 晨轻暮重
- E. 意识障碍

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

30、下列哪项不是主动脉瓣狭窄的主要临床表现？（ ）

- A. 栓塞
- B. 心绞痛
- C. 晕厥
- D. 左心功能不全
- E. 猝死

【正确答案】

A

【答案解析】

主动脉瓣狭窄的主要临床表现：①呼吸困难：劳力性呼吸困难为晚期肺淤血引起的常见首发症状，进而可发生阵发性夜间呼吸困难、端坐呼吸和急性肺水肿等左心功能不全等表现。②心绞痛：常由运动诱发，休息后缓解，主要由心肌缺血所致。③晕厥：室上性和室性心律失常，可导致脑血流灌注下降，诱发低血压和晕厥，甚至猝死。A项，主动脉瓣狭窄时不易形成血栓。栓塞不是主动脉瓣狭窄的主要临床表现。

31、人的心理实质是（ ）。

- A. 心脏的功能
- B. 思维的结果
- C. 脑的机能
- D. 个性的反映
- E. 对事物整体属性的反映

C

【答案解析】

暂无解析。

32、对于无家属签字的无自主意识患者的紧急输血，经治医师应上报哪个部门同意、备案，并记入病历（ ）。

- A. 医院职能部门
- B. 麻醉科
- C. 手术室
- D. 输血科
- E. 检验科

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

33、心脏病产妇胎儿娩出后应立即（ ）。

- A. 腹部放置沙袋
- B. 抗感染治疗
- C. 静注麦角新碱
- D. 鼓励下床活动
- E. 行绝育手术

【正确答案】

A

【答案解析】

心脏病产妇胎儿娩出后应立即腹部放置沙袋并用腹带包扎固定，以防腹压骤降而诱发心力衰竭。

34、女性，53岁，视物模糊4天来就诊。查体：右眼直接对光反射消失，间接对光反射存在，左眼直接对光反射存在，间接对光反射消失。病变位于（ ）。

- A. 右视神经
- B. 左视神经
- C. 右动眼神经
- D. 左动眼神经
- E. 右展神经

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

35、心理健康标准中不包括（ ）。

- A. 较高的个人心理效率
- B. 恰当的自我评价
- C. 良好的人际关系和心境
- D. 较高的工作学习效率

- E. 稳定的生活环境

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

36、关于支气管哮喘概念的描述正确的是（ ）。

- A. 支气管哮喘是一种气管慢性炎症性疾病，临床表现为反复喘息、吸气性呼吸困难等症状，多数患者可自行或经

行或经治疗后缓解

C. 支气管哮喘是多种炎性细胞参与的气管慢性炎症，临床表现为反复喘息、呼气性呼吸困难等症状，多数患者虽经治疗仍不能缓解

D. 支气管哮喘是支气管黏膜的慢性非特异性炎症，临床表现为反复喘息、吸气性呼吸困难等症状，多数患者可自行或经治疗后缓解

E. 支气管哮喘是多种炎性细胞参与的气管慢性炎症，临床表现为反复发作性的喘息、呼气性呼吸困难等症状，多数患者可自行或经治疗后缓解

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

37、下列哪项是来源于间叶组织的肿瘤？（ ）

A. 癌

B. 肉瘤

C. 母细胞瘤

D. 类癌

E. 临界肿瘤

【正确答案】

B

【答案解析】

间叶组织（纤维组织、脂肪、肌肉、骨、软骨等）来源的恶性肿瘤称肉瘤。

38、我国完全性葡萄胎的恶变率为（ ）。

A. 10.5%

B. 14.5%

C. 20.5%

D. 30.5%

E. 35%

【正确答案】

B

【答案解析】

葡萄胎恶变率为10%~25%，我国为14.5%。

39、人免疫缺陷病毒（HIV）主要感染的细胞是（ ）。

A. 单核巨噬细胞

B. CD₄⁺T淋巴细胞

C. CD₈⁺T淋巴细胞

D. B淋巴细胞

E. 小神经淋巴胶质细胞

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

40、我国古代最杰出的医德经典是（ ）。

A. 陈实功的《五戒十要》

B. 孙思邈的《大医精诚》

C. 张仲景的《伤寒杂病论》

D. 尚纲的《劝医论》

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

41、下列哪项是3~6个月婴儿维生素D缺乏性佝偻病激期骨骼改变最常见的表现？（ ）

- A. 颅骨软化
- B. 腕踝部膨大
- C. 前囟增大
- D. 方颅
- E. 肋骨串珠和肋膈沟

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

42、营养不良的最初症状是（ ）。

- A. 智力发育呆滞
- B. 肌张力低下
- C. 运动机能发育迟缓
- D. 身高低于正常
- E. 体重不增或下降

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

43、某青年长跑后发生绞痛样腰痛，继而出现肉眼血尿，最大可能是（ ）。

- A. 肾肿瘤
- B. 输尿管肿瘤
- C. 肾积水
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 上尿路结石

【正确答案】

E

【答案解析】

剧烈运动后尿路结石可出现位置改变而致尿路的机械性梗阻及损伤，产生绞痛样症状及肉眼血尿。**AB**两项，泌尿系肿瘤多见于中老年，通常为无痛性肉眼血尿，多与运动无关。**D**性，急性肾盂肾炎多由感染引起，可出现血尿，但其有特异的伴随症状，与运动无关。

44、男性，24岁，贫血1年，皮肤散在出血点，肝脾未及，血红蛋白65g/L，红细胞 $2.0 \times 10^{12}/L$ ，白细胞 $2 \times 10^9/L$ ，血小板 $27 \times 10^9/L$ ，骨髓增生活跃，粒系和红系多为晚期阶段，巨核细胞缺如，酸溶血试验阴性。最可能的诊断是（ ）。

- A. 急性白血病
- B. 原发性血小板减少性紫癜
- C. 骨髓增生异常综合征
- D. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
- E. 再生障碍性贫血

【正确答案】

E

【答案解析】

45、骨骼肌收缩的幅度主要取决于（ ）。

- A. 基本电节律的幅度
- B. 动作电位的频率
- C. 动作电位的幅度
- D. 基本电节律的频率
- E. 静息电位的幅度

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

46、格林-巴利征不常有的表现是（ ）。

- A. 四肢弛缓性瘫
- B. 双侧周围性面瘫
- C. 腱反射弱
- D. 肌肉萎缩
- E. 胸4以下传导束性痛温觉障碍

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

47、腕关节的功能位是背伸（ ）。

- A. $30^{\circ}\sim 40^{\circ}$
- B. $20^{\circ}\sim 25^{\circ}$
- C. $5^{\circ}\sim 15^{\circ}$
- D. $40^{\circ}\sim 50^{\circ}$
- E. 0°

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

48、67岁，女性，双膝关节痛、畸形5年，现只能忍痛行走100m。检查：O形腿，膝关节活动范围 $30^{\circ}\sim 60^{\circ}$ ，X线平片示双膝内侧关节间隙消失，股胫角 190° 。治疗首选（ ）。

- A. 卧床休息，保护患肢
- B. 关节内注射局麻药及类固醇激素
- C. 关节镜下膝关节清理

- D. 人工全膝关节置换
- E. 膝关节融合术

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

49、人乳营养价值高，吸收好，下列哪项是酪蛋白：乳清蛋白的值？（ ）

- A. 1: 4
- B. 4: 1
- C. 1:2
- D. 1: 3

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

50、一年轻患者，从敞篷卡车上摔下，枕部着地，颈部活动受限，下颈椎压痛明显，四肢迟缓性瘫痪，胸骨柄以下痛温觉消失，不能自行排尿，诊断考虑为（ ）。

- A. 颈部软组织损伤
- B. 颈椎间盘突出症
- C. 颈椎骨折脱位并颈髓损伤
- D. 胸椎骨折并脊髓损伤
- E. 颈椎骨折脱位并臂丛神经与腰骶丛神经损伤

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

51、一患者尿量为2000m/d，尿比重为1.028，此时应考虑（ ）。

- A. 肾硬化症
- B. 尿崩症
- C. 糖尿病
- D. 精神性多饮
- E. 大量饮水后

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

52、患儿，6个月，腹泻20余天，每日10余次，稀水样便，体重5.3kg，精神萎靡，皮肤弹性极差，前囟及眼窝明显凹陷，四肢凉，血压偏低，口渴轻度，尿量极少，血钠125mmol/L，考虑诊断为（ ）。

- A. 重度等渗脱水
- B. 中度等渗脱水
- C. 中度低渗脱水
- D. 重度低渗脱水
- E. 重度高渗脱水

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

53、按贫血的病因、机制下述哪一项组合是错误的？（ ）

- A. 红细胞破坏过多——慢性感染性贫血
- B. 骨髓红细胞生成被干扰——伴随白血病的贫血
- C. 红细胞慢性丢失过多——缺铁性贫血
- D. 红细胞生成减少——再生障碍性贫血
- E. 造血原料缺乏——巨幼红细胞贫血

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

- A. 一种可逆的共价调节
- B. 一种不可逆的非共价调节
- C. 通过磷酸化起作用
- D. 通过酶的调节部位起作用
- E. 别位酶的酶促反应动力学符合米氏方程

【正确答案】

D

【答案解析】

酶变构调节的特点：底物或底物以外的物质和别构酶分子相应部位非共价结合改变酶分子构象影响酶催化活性，反应初速度对底物浓度作图不符合米氏方程而是S型。

55、患儿2岁，生后半年发现尿有霉臭味，且经常呕吐，1岁时发现智力较同龄儿落后，目光呆滞，皮肤白皙，毛发浅黄。下述哪一项对该患儿诊断最有帮助？（ ）

- A. 脑电图
- B. 头颅CT
- C. 染色体核型分析
- D. 尿三氯化铁试验
- E. 血液T₃、T₄测定

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

56、哪项是免疫性非溶血性发热性输血反应的主要原因和发病机制？（ ）

- A. 输入血液中的白细胞和患者血浆中的白细胞抗体发生免疫反应
- B. 输入血液中污染的热原质导致发热性反应
- C. 输入血液中的血小板和患者血浆中相应抗体发生免疫反应
- D. 输入血液中的血浆蛋白在患者体内引起过敏反应
- E. 输入血液中的红细胞和患者血浆中相应抗体发生免疫反应

【正确答案】

A

【答案解析】

输血发热反应的最常见的原因因为受血者体内发生免疫反应导致，即受血者体内存在针对供血者白细胞各种抗原的已致敏抗体，发生抗原抗体反应导致发热。

57、一足月新生儿，顺产，生后立即出现呼吸快，频率70次/分，有三凹征，口周青紫，双肺可闻及湿啰音，生后1小时患儿症状明显改善，呼吸频率降至40次/分，除有轻度周围青紫外，余均正常。最可能的是（ ）。

- A. 吸入性肺炎
- B. 产前感染性肺炎
- C. 新生儿肺透明膜病
- D. 产时感染性肺炎
- E. 正常生理特点

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

58、知觉反映客观事物的哪种属性？（ ）

- A. 主要
- B. 整体
- C. 本质
- D. 个别

【正确答案】

B

【答案解析】

感觉是人脑对客观事物个别属性的反映，知觉是人脑对客观事物整体属性的反映。

59、关于脂肪合成所需原料的叙述，错误的是（ ）。

- A. 脂肪酸
- B. 甘油
- C. 脂肪酸主要由葡萄糖代谢提供
- D. 甘油主要由葡萄糖代谢提供
- E. 脂肪酸主要由氨基酸代谢提供

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

60、双下肢对称性紫癜伴荨麻疹者常见于（ ）。

- A. 过敏性紫癜
- B. 再生障碍性贫血
- C. 激素性紫癜
- D. 血小板减少
- E. 特发性血小板增多症

【正确答案】

A

【答案解析】

过敏性紫癜包括单纯型（紫癜型）、腹型（Henoch型）、关节型（Schonlein型）、肾型、混合型及其他型。其中单纯型紫癜最为常见。主要表现为皮肤紫癜，局限于四肢，尤其是下肢及臀部，紫癜常成批反复发生，对称分布，可同时伴发皮肤水肿、荨麻疹。可在7~14d后逐渐消退。故本题答案为A项。

二、A2型题（每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、男性，60岁，足刺伤10天，头痛、乏力、张口困难及颈项强直，伤口红肿临床诊断为（ ）。

- A. 气性坏疽
- B. 败血症
- C. 破伤风
- D. 脑血栓
- E. 牙周炎

【正确答案】

C

【答案解析】

患者足刺伤，局部有缺氧环境，破伤风潜伏期一般为6~12天，根据患者头痛、乏力、张口困难的前驱症状及颈项强直等典型临床表现可确定为C项。

2、男性，20岁，在一次体检中发现HBsAg阳性，当时无自觉症状及体征，肝功能正常。次年5月，因突然乏力、恶心、厌食、尿黄而入院。化验：ALT 500U，血清总胆红素85μmol/L，抗HAVIgM（+）。该患者的诊断可能为（ ）。

- A. 乙型肝炎，慢性迁延型，既往感染过甲型肝炎
- B. 乙型肝炎，慢性活动型，既往感染过甲型肝炎
- C. 急性甲型黄疸型肝炎，乙型肝炎病毒携带者

【正确答案】

C

【答案解析】

抗HAVIgM(+)提示存在HAV现症感染,患者有乏力、恶心、厌食、尿黄的症状,ALT及血清总胆红素增高明显,符合急性黄疸型诊断,考虑为HAV现症感染所致。HBsAg阳性提示表示存在HBV现症感染,但是无自觉症状及体征,肝功能正常,属于乙肝病毒携带者。

3、30岁患者,1年来反复发作瞪视不动,意识模糊,奔跑、游走等,持续约半小时逐渐清醒,事后对行为毫无记忆。诊断最可能是()。

- A. 精神分裂症
- B. Jackson癫痫
- C. 癔病
- D. 感染性精神病
- E. 复杂部分性发作

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

4、对于颅底骨折,下述哪一项是错误的?()

- A. 根据部位可分为三型
- B. 形态多为线形骨折
- C. 若伤及颈动脉,形成海绵窦瘘
- D. 可表现为中枢性面瘫
- E. X线片仅显示30~50%的骨折线

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

5、可诱发心绞痛的药物是()。

- A. 胰岛素
- B. 可的松
- C. 卡比马唑

- D. 甲状腺素
- E. 氯磺丙脲

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

6、女,52岁。绝经4年。阵发性阴道排液半年就诊,自诉偶有右下腹隐痛。妇科检查:右侧附件区可触及条状肿物。首先考虑的诊断是()。

- A. 宫颈癌
- B. 卵巢癌
- C. 输卵管癌
- D. 腹膜癌
- E. 子宫内膜癌

【正确答案】

C

【答案解析】

输卵管癌的主要症状为阵发性阴道排液、腹痛和附件区肿物

- A. 属于可诱导型调控
- B. 结构基因产物与分解代谢无关
- C. 结构基因产物抑制分解代谢
- D. 属于可阻遏型调控
- E. 受代谢终产物抑制

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

8、丘脑特异投射系统的主要作用是（ ）。

- A. 引起特定感觉
- B. 引起牵涉痛
- C. 调节内脏功能
- D. 维持觉醒
- E. 协调肌紧张

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

9、不属于化生的是（ ）。

- A. 支气管粘膜出现鳞状上皮
- B. 胃粘膜内出现胰腺组织
- C. 胃粘膜内出现肠上皮
- D. 食管粘膜内出现胃上皮
- E. 胆囊粘膜内出现鳞状上皮

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

10、能初步完成循环、呼吸等基本生命现象的反射调节部位是（ ）。

- A. 脊髓
- B. 延髓
- C. 脑桥
- D. 中脑
- E. 丘脑

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

11、医学心理学的研究对象为（ ）。

- A. 心理活动的规律的学科
- B. 人类行为的科学发展
- C. 疾病的发生发展的规律
- D. 影响健康的有关心理问题和行为
- E. 疾病的预防和治疗的原则

【正确答案】

医学心理学的研究对象为影响健康的有关心理问题（包括行为方面的问题）。A项是心理学的研究对象；C、E选项是医学的研究对象。

12、下列哪种病变属于渗出性炎？（ ）

- A. 水样变性
- B. 肝硬变腹水
- C. 气性坏疽
- D. 绒毛心
- E. 出血

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

13、在感染性休克的治疗中哪一项是最基本的？（ ）

- A. 补充血容量
- B. 维护重要脏器功能
- C. 血管活性药物的应用
- D. 纠正酸中毒
- E. 肾上腺皮质激素的应用

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

14、受MHC限制的细胞间相互作用出现在（ ）。

- A. 巨噬细胞与肿瘤细胞
- B. 肥大细胞与T淋巴细胞
- C. 中性粒细胞与B淋巴细胞
- D. NK细胞与病毒感染细胞

- E. T淋巴细胞与树突状细胞

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

15、男，43岁，吸烟20余年，右下肢疼痛，行走后加重3年。右小腿疼痛日益加重，时常出现沿表浅静脉走行的局部压痛、硬结。最有可能的诊断是（ ）。

- A. 动脉瘤
- B. 血栓闭塞性脉管炎
- C. 多发性动脉炎
- D. 雷诺综合征
- E. 动脉硬化性闭塞症

【正确答案】

B

【答案解析】

B项，患者系中年男性，既往吸烟20余年，现出现右下肢疼痛，行走后加重，结合沿表浅静脉走行的局部压痛、硬结，应考虑血栓闭塞性脉管炎。D项，雷诺病多见于女性，是由于寒冷或情绪激动引起发作性的手指（足趾）苍白、发紫，然后变为潮红的一组综合征，常为对称性双手手指发作。E项，若为老年患者，且既往有高血压、糖尿病等动脉硬化疾病，可考虑为动脉硬化性闭塞症，但其对浅静脉多无影响。

16、有关慢性肾盂肾炎的描述，下列哪项是错误的？（ ）

- C. 肾病综合征
- D. 肾性高血压
- E. 尿内有细菌

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

17、男，14岁。突发剑突下剧烈绞痛2小时，疼痛呈钻顶样，辗转不安。查体：腹肌柔软，右上腹部轻微压痛。首先考虑的诊断为（ ）。

- A. 急性胆囊炎
- B. 胆总管结石
- C. 胆道蛔虫病
- D. 急性胰腺炎
- E. 胃癌

【正确答案】

C

【答案解析】

青少年男性患者，突发剑突下剧烈绞痛2小时，疼痛呈钻顶样，辗转不安。查体：腹肌柔软，右上腹部轻微压痛，考虑初步诊断为胆道蛔虫病。该病特点是剧烈的腹痛与较轻的腹部体征不相称，所谓“症征不符”。

18、苯丙酮尿症患儿应采取的措施是（ ）。

- A. 观察，抽搐时给予止抽搐药物
- B. 口服甲状腺素片
- C. 静推10%葡萄糖酸钙，同时口服维生素D
- D. 限制苯丙氨酸摄入量
- E. 口服碘化钾

【正确答案】

D

【答案解析】

苯丙酮尿症关键在于早期诊断及治疗，尽早开始婴儿吃低苯丙氨酸奶。以后给予低苯丙氨酸饮食，终生治疗。

19、下述药物—适应证—不良反应中哪一组是不正确的？（ ）

- A. 苯巴比妥—癫痫大发作—嗜睡
- B. 乙琥胺—精神运动性发作—胃肠反应
- C. 对乙酰氨基酚—发热—肝损害
- D. 左旋多巴—震颤麻痹—精神障碍
- E. 米帕明—抑郁症—口干、便秘

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

20、对于重症肌无力的叙述下列哪项是错误的？（ ）

- A. 症状常晨轻暮重，重复活动后加重、休息后减轻
- B. 临床特征为部分或全身骨骼肌疲劳
- C. 是一种获得性自身免疫性疾病
- D. 抗胆碱酯酶药物治疗有效
- E. 腾喜龙（依酚氯铵）试验阴性

【答案解析】
暂无解析。

21、女，55岁，风湿性心脏瓣膜病二尖瓣狭窄15年，心房颤动1年。无活动后心悸和气短，无夜间阵发性呼吸困难。既往无高血压、糖尿病、脑血管病病史。超声心动图提示左房内径5.3cm。患者抗栓治疗的首选药物是（ ）。

- A. 华法林
- B. 潘生丁（双嘧达莫）
- C. 氯吡格雷
- D. 阿司匹林
- E. 替罗非班

【正确答案】

A

【答案解析】

以下情况应首选华法林抗凝：①合并各类房颤；②既往有栓塞史；③合并左心房血栓；④左房增大（左房内径>5.0cm）。患者风心病二尖瓣狭窄15年，合并房颤1年，左房内径5.3cm，应首选华法林抗凝，目标INR为2~3。

22、脊髓灰质炎病毒的致病特点不包括（ ）。

- A. 粪-口途径传播
- B. 两次病毒血症
- C. 5岁以下幼儿易感
- D. 易侵入中枢神经系统引起肢体痉挛性瘫痪
- E. 多为隐性感染

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

23、基因重组不包括（ ）。

- A. 整合
- B. 转换
- C. 转化
- D. 转导
- E. 转位

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

24、一名中年尸检病例，蛋白尿高血压多年。数年前有多尿、夜尿，多次化验无脓尿、菌尿，近日因面色苍白，呕吐入院，数日后，抽搐、昏迷而死亡，其肾脏肉眼观可能表现为（ ）。

- A. 大红肾
- B. 蚤咬肾
- C. 大白肾
- D. 颗粒固缩肾
- E. 多发性肾硬化

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

25、高分化鳞癌的病理形态特点是（ ）。

- A. 癌细胞突破基底膜

- C. 形成大小不一的鳞状细胞巢
- D. 癌巢细胞间可见间桥并见角化珠形成
- E. 癌细胞分化形态仍保留鳞状上皮特征

【正确答案】

D

【答案解析】

鳞状细胞癌可表现为角化珠形成和细胞间桥等特征，这些特征随分化程度而表现不同，在分化良好的肿瘤（高分化）中该特征表现明显，而在分化差的肿瘤中则少见。

26、男性，40岁，糖尿病患者，手外伤后1周，局部肿胀，跳痛，高热，咳脓性痰伴有右胸痛，查体：手外伤局部脓肿形成，X线胸片右肺多个液气囊腔，治疗上下列哪项是键错误的（ ）。

- A. 青霉素1000万单位，每日2次静脉滴注
- B. 应用胰岛素
- C. 手部换药每日1次
- D. 万古霉素1g静脉滴注，每日3次
- E. 营养支持，对症治疗

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

27、血浆胶体渗透压降低时会引起（ ）。

- A. 尿少
- B. 组织液增多
- C. 组织液减少

- D. 红细胞萎缩
- E. 红细胞膨胀和破裂

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

28、对于苯二氮䓬类的叙述，不正确的是（ ）。

- A. 治疗焦虑症有效
- B. 是最常用的镇静催眠药
- C. 可用于小儿高热惊厥
- D. 可用于心脏电复律前给药
- E. 长期用药不产生耐受性和依赖性

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

29、对于乳腺癌，下列哪项是错误的（ ）。

- A. 容易向周围浸润性生长
- B. 容易向局部淋巴结转移
- C. 容易出现血行转移
- D. 浸润皮肤淋巴管可导致皮肤的橘皮样改变
- E. 浸润乳管可出现乳头回缩现象

【答案解析】
暂无解析。

30、患者，男，28岁，有风湿性心脏病二尖瓣狭窄。现有龋齿需要拔掉，为防止亚急性感染性心内膜炎发生，正确的做法是（ ）。

- A. 术前休息一天，术后给以青霉素肌注3天
- B. 术前30分钟或1小时使用1次氨苄西林，高危者术后6小时重复使用1次
- C. 术后口服头孢氨苄
- D. 术后给予庆大霉素肌注3天
- E. 术后给予青霉素静脉滴注3天

【正确答案】

B

【答案解析】

对于接受高危牙科操作时需要使用抗生素预防IE的患者，主要的靶目标是口腔链球菌，推荐在操作开始前30~60分钟内使用1剂以下抗生素：阿莫西林或氨苄西林2g，口服或静脉给药。对青霉素或氨苄西林过敏的患者可用克林霉素600mg，口服或静脉滴注。高危者可术后6小时重复使用1次。

三、B1型题（以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。）

1、（共用备选答案）

- A.青光眼
- B.阵发性室上性心动过速
- C.有机磷酸酯类中毒

- D.琥珀胆碱过量中毒
- E.房室传导阻滞

1. 毛果芸香碱可治疗（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2. 新斯的明可治疗（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

3. 碘解磷定可治疗（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2、（共用备选答案）

- A.跨阈步态
- B.醉汉步态
- C.慌张步态
- D.剪刀样步态
- E.划圈样步态下述病变引起

1. 痉挛性偏瘫（ ）。

【答案解析】
暂无解析。

2. 痉挛性截瘫（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

3. 小脑病变（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

4. 震颤麻痹（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

5. 腓神经麻痹（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

3、（共用备选答案）

- A.雄激素
- B.糖皮质激素
- C.环孢素A
- D.脾切除
- E.一叶萩碱

1. 对皮肤粘膜有止血作用（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2. 刺激骨髓促进造血（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

3. 抑制T淋巴细胞，解除骨髓抑制（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

4、（共用备选答案）

- A.环性心境障碍
- B.恶劣心境障碍
- C.双相障碍混合性发作
- D.抑郁发作
- E.躁狂发作

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2. 心境高涨、低落反复交替出现，不符合躁狂或抑郁发作症状标准，病程至少2年（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

3. 以躁狂和抑郁症状迅速交替（数小时内）为特征，躁狂、抑郁均突出，至少持续2周（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

5.（共用备选答案）

A.无明显规律性

B.疼痛→排便→加重

C.进食疼痛缓解

D.疼痛进食缓解

E.疼痛→排便缓解

1. 胃溃疡腹痛的规律是（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

胃溃疡典型腹痛表现为餐后痛，即为进食疼痛缓解。

2. 肠易激综合征腹痛的规律是（ ）。

【正确答案】

E

【答案解析】

肠易激综合征腹痛的规律是疼痛→排便缓解。

四、A3型题（以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据考题所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1.（共用题干）

男婴，足月自然分娩，脐绕颈1周，Apgar评分1分钟与5分钟分别是3分、7分，体检：小儿易激惹，拥抱反射增强，肌张力增高，偶有惊厥。

1. 最可能的诊断是（ ）。

- A. 新生儿破伤风
- B. 新生儿缺氧缺血性脑病
- C. 新生儿脑膜炎
- D. 新生儿低钙血症
- E. 新生儿低血糖

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析

- A. 血常规检查
- B. 脑脊液检查
- C. 肝功能检查
- D. 头颅CT检查
- E. 血液细菌培养

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

3. 控制惊厥首选的药物是（ ）。

- A. 苯巴比妥
- B. 苯妥英钠
- C. 安定
- D. 水合氯醛
- E. 冬眠灵

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

4. 维持良好的通气功能应保持（ ）。

- A. 动脉氧分压在20~40mmHg左右
- B. 动脉氧分压在40~60mmHg左右
- C. 动脉氧分压在60~80mmHg左右
- D. 动脉氧分压在80~100mmHg左右
- E. 动脉氧分压在100mmHg以上

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

5. 治疗脑水肿用甘露醇，每次0.25~0.5g/kg，每4~6小时用1次，一般（ ）。

- A. 应该连续用1天
- B. 应该连续用1~2天
- C. 应该连续用2~3天
- D. 应该连续用3~5天
- E. 应该连续用5~7天

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2.（共用题干）

男，8岁，畏寒、高热、头痛、呕吐8h于3月2日急诊来院。查体：体温40.2℃，皮肤见散在瘀点、瘀斑，外周血白细胞 $32.5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.91，淋巴细胞0.09。初步诊断为流行性脑脊髓膜炎。

1. 为明确诊断，临床常用且阳性率较高的检验方法是（ ）。

- A. 特异性抗原检测
- B. 血培养
- C. 脑脊液培养
- D. 脑脊液涂片检菌
- E. 刺破皮肤瘀点取组织液涂片检菌

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

2. 该患者入院后皮肤黏膜瘀点、瘀斑迅速增多、融合，并出现嗜睡及意识障碍，面色苍白，四肢厥冷，测血压40/20mmHg。其临床类型应属于（ ）。

- A. 普通型流行性脑脊髓膜炎
- B. 暴发型流行性脑脊髓膜炎、休克型
- C. 暴发型流行性脑脊髓膜炎、脑膜脑炎型
- D. 暴发型流行性脑脊髓膜炎、混合型
- E. 轻型流行性脑脊髓膜炎

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

3. 针对患者目前情况，下列有关治疗措施不恰当的是（ ）。

- A. 尽早应用足量有效抗生素
- B. 积极扩容治疗
- C. 纠正酸中毒
- D. 积极应用脱水剂预防脑疝
- E. 短期应用糖皮质激素

【正确答案】

D

4. 对其密切接触者的药物预防以下列哪药物为主? ()

- A. 复方新诺明
- B. 氯霉素
- C. 四环素
- D. 青霉素
- E. 强力霉素

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

3. (共用题干)

1岁男孩, 发热、咳嗽5天, 精神尚可, 食欲不振。体检: 体温38.5°C, 呼吸50次/min, 心率150次/min, 口唇略青紫, 轻度三凹征, 两肺散在中小水泡音, 肝肋下2cm, 胸片示: 两肺散在小点片状阴影。

1. 最可能的诊断是 ()。

- A. 毛细支气管炎
- B. 腺病毒性肺炎
- C. 支原体肺炎
- D. 金葡菌肺炎
- E. 肺炎链球菌肺炎

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

2. 治疗首选何种抗生素? ()

- A. 头孢噻肟
- B. 红霉素
- C. 庆大霉素
- D. 青霉素
- E. 氧氟沙星

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

3. 用药时间应为 ()。

- A. 体温正常后5~7天, 临床症状消失后3天
- B. 至少2~3周
- C. 体温正常后1天停药
- D. 咳止停药
- E. 体温正常后继续用药2周

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

发绀，双肺可闻及中、小水泡音，P₂亢进；胸骨左缘第3、4肋间闻及3/6级粗糙的全收缩期杂音，向四周广泛传导，杂音最响亮的部位触及收缩期震颤，肝肋下3cm，质软。

1. 此患儿的诊断以下最正确的是（ ）。

- A. 先心病，室间隔缺损
- B. 先心病，室间隔缺损并支气管肺炎
- C. 先心病，室间隔缺损并肺动脉高压
- D. 先心病，室间隔缺损并心力衰竭
- E. 先心病，室间隔缺损并支气管肺炎、心力衰竭

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

2. 目前最紧急正确的治疗是（ ）。

- A. 纠正心力衰竭
- B. 控制感染
- C. 应用扩血管药减轻心脏负荷
- D. 室间隔缺损封堵术
- E. 室间隔缺损修补术

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

5. (共用题干)

患者女性，38岁，乘车时右腿放在左腿上，突然刹车时右膝受到撞击致右髌疼痛不能活动，4小时后来医院就诊，查体见患肢短缩，右髌屈曲、内收、内旋畸形。

1. 应首先考虑的诊断是（ ）。

- A. 右髋关节脱位
- B. 右髋关节后脱位
- C. 右髋关节前脱位
- D. 右髋关节脱位并右膝损伤
- E. 右髋关节中心脱位

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 应首先作下列哪项检查?（ ）

- A. 右髋关节X线侧位片
- B. 右髋关节X线正位片
- C. 双侧髋关节正侧位片
- D. 右髋关节正侧位片
- E. MRI检查

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

3. X线片未见明显的骨折征象, 应选择哪种治疗方法?（ ）

- A. 骨牵引后卧床4周
- B. 切开复位石膏托外固定
- C. 单纯手法复位
- D. 复位后卧床4周
- E. 手法复位后患肢皮牵引2~3周

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

4. 该病人复位固定4周后, 扶双拐下地活动, 需多长时间后才能完全承重（ ）。

- A. 1周后
- B. 2周后

- D. 4个月后
- E. 5个月后

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

