

2022年临床执业助理医师考试真题

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、下列哪项是血红素合成的限速酶？（ ）

- A. 尿卟啉原I合成酶
- B. ALA合酶
- C. ALA脱水酶
- D. 血红素合成酶
- E. 尿卟啉原III合成酶

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2、外科病人最常发生的缺水为（ ）。

- A. 慢性缺水
- B. 高渗性缺水
- C. 低渗性缺水
- D. 原发性缺水
- E. 等渗性缺水

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

3、不是学习的规律有（ ）。

- A. 经典条件反射
- B. 操作性条件反射
- C. 非条件反射
- D. 观察学习
- E. 替代学习

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

4、男性，28岁，自述脑子空洞洞的，整天什么事也不想，常沉默不语，交谈时词汇量特别少，如问“谁送你来的？”答“父亲”，问“以前做什么工作？”答“不知道”。该症状是（ ）。

- A. 思维中断
- B. 思维贫乏
- C. 思维迟缓
- D. 思维松弛
- E. 病理性赘述

【正确答案】

B

【答案解析】
暂无解析。

5、骨关节结核病人需要手术病灶清除时，应（ ）。

- A. 立即手术
- B. 术前至少抗结核治疗2~4周
- C. 术前5天开始抗结核治疗
- D. 先做手术，然后立即开始抗结核治疗
- E. 死骨形成后再手术

【正确答案】

B

【答案解析】

骨关节结核是继发结核。如需行病灶清除术，应在全身抗结核治疗下进行。术前后均应该用抗结核药物。另外手术有造成血源性播散可能，为提高安全性，术前应用抗结核药2~4周。

6、单纯性甲状腺肿的主要原因是（ ）。

- A. 甲状腺合成障碍
- B. 需要甲状腺素量增加
- C. 合成甲状腺素的原料碘缺乏
- D. 甲状腺素分泌障碍
- E. 应用甲状腺抑制剂

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

7、关于正常足月儿的生理特点，下述错误的是（ ）。

- A. 安静时呼吸40次/min
- B. 睡眠时平均心率140次/min
- C. 脊髓末端约在第3、4腰椎下缘
- D. 腹壁反射，提睾反射均可引出
- E. 生后10日内不需补钾

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

8、长期应用易使血钾升高的药物（ ）。

- A. 布美他尼
- B. 呋塞米
- C. 依他尼
- D. 螺内酯
- E. 氢氯噻嗪

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

9、F药厂销售代表和某医院多名医师约定，医师在处方时使用F药厂生产的药品，并按使用量的多少给予提成。事情曝光以后，按《药品管理法》的规定，对F药厂可以作出行政处罚的部门是（ ）。

- A. 药品监督管理部门
- B. 工商行政管理部门

- D. 医疗保险部门
- E. 卫生行政部门

【正确答案】

A

【答案解析】

药品的生产企业、经营企业、医疗机构在药品购销中暗中给予、收受回扣或者其他利益的，药品的生产企业、经营企业或者其代理人给予使用其药品的医疗机构的负责人、药品采购人员、医师等有关人员以财物或者其他利益的，由工商行政管理部门处1万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，予以没收；情节严重的，由工商行政管理部门吊销药品生产企业、药品经营企业的营业执照，并通知药品监督管理部门，由药品监督管理部门吊销其《药品生产许可证》、《药品经营许可证》；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

10、交界性肿瘤是指（ ）。

- A. 既有癌组织、又有肉瘤组织的肿瘤
- B. 既有鳞癌、又有腺癌的肿瘤
- C. 既有上皮组织、又有间叶组织的肿瘤
- D. 介于良性和恶性之间的肿瘤
- E. 以局部浸润为主要特点的低度恶性肿瘤

【正确答案】

D

【答案解析】

交界性肿瘤是指介于良性和恶性之间的肿瘤。既有癌组织、又有肉瘤组织的肿瘤称为癌肉瘤。既有鳞癌、又有腺癌的肿瘤称为腺鳞癌。既有上皮组织、又有间叶组织的肿瘤可以是良性混合性肿瘤，如乳腺纤维腺瘤，也可以是腺鳞癌。以局部浸润为主要特点的低度恶性肿瘤有基底细胞癌。

11、男性，40岁，2个月来左颈部淋巴结进行性肿大、无痛，周期性发热，消瘦。近1周上胸部水肿，颈粗，淋巴结活检有里-斯细胞，胸片示纵隔有肿块。选择哪一种治疗显效最快（ ）。

- A. MOPP
- B. 苯丁酸氮芥
- C. 放射治疗
- D. 肾上腺皮质激素+长春新碱
- E. 阿霉素（多柔比星）

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

12、ACh使窦房结细胞自律性降低是通过（ ）。

- A. 阈电位水平下降
- B. 最大复极电位降低
- C. If电流增强
- D. 膜对K⁺通透性增大
- E. Ca²⁺内流增强

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

13、下列疾病中属于继发性肾小球疾病的是（ ）。

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 急进性肾炎
- C. 慢性肾小球肾炎

D. 紫癜性肾炎

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

14、细菌性肝脓肿的主要治疗是（ ）。

- A. 抗生素治疗
- B. 穿刺抽脓，脓腔注入抗生素
- C. 切开引流
- D. 理疗
- E. 肝切除

【正确答案】

A

【答案解析】

抗生素治疗为细菌性肝脓肿的主要治疗手段，可选用较大剂量的敏感抗生素进行治疗。切开引流适用于较大脓肿有穿破可能的或已穿破者、胆源性肝脓肿、慢性肝脓肿、左外叶肝脓肿。

15、肺癌的肺外表现常见的是（ ）。

- A. 杵状指
- B. 锁骨上淋巴结肿大
- C. 吞咽困难
- D. 一侧瞳孔缩小
- E. 腹泻

【正确答案】

A

【答案解析】

肺外表现指肺癌非转移性胸外表现，包括：①肥大性肺性骨关节病：多侵犯上、下肢长骨远端，发生杵状指（趾）和肥大性骨关节病；②异位促性腺激素；③分泌促肾上腺皮质激素样物；④分泌抗利尿激素；⑤神经肌肉综合征；⑥高钙血症；⑦类癌综合征。BCD三项，均为肺外胸内扩展引起的症状和体征。

16、治疗大肠杆菌脑膜炎首选的抗生素为（ ）。

- A. 先锋霉素V+氨苄西林
- B. 青霉素+氯霉素
- C. 氨苄西林+庆大霉素
- D. 红霉素+庆大霉素
- E. 青霉素+庆大霉素

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

17、我国的《传染病防治法》适用于下列人员，除了（ ）。

- A. 外国公民
- B. 我国境内的无国籍人员
- C. 我国境内的外国人
- D. 驻我国的外国使、领馆外交人员
- E. 我国公民

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

- B. CD3
- C. CD56
- D. TCR
- E. CD80

【正确答案】

C

【答案解析】

CD56是NK细胞表面的分子。

19、婴儿维生素D缺乏佝偻病初期的主要表现为（ ）。

- A. 嗜睡、疲乏无力
- B. 方颅、鸡胸
- C. 生长发育迟缓
- D. “O”形腿
- E. 多汗、睡眠不安、易激惹

【正确答案】

E

【答案解析】

维生素D缺乏佝偻病症状分四期：①初期多见于6个月内的婴儿。表现非特异性神经精神症状，多汗、烦躁、睡眠不安、夜惊、易激惹。②活动期（激期）：主要表现骨骼发育不良，多种血生化改变。③恢复期：经过治疗症状改善，骨骼、血生化改善。④后遗症期：2~3岁留下不同骨骼系统改变。

20、对临床鉴别流行性乙型脑炎和流行性脑脊髓膜炎意义较大的是（ ）。

- A. 发病季节
- B. 皮肤黏膜瘀点、瘀斑
- C. 是否出现意识障碍
- D. 是否出现病理反射
- E. 颅内压增高程度

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

21、半数有效量（ED₅₀）是（ ）。

- A. 引起50%动物中毒的剂量
- B. 引起50%动物死亡的剂量
- C. 引起50%动物产生阳性反应的剂量
- D. 和50%受体结合的剂量
- E. 达到50%有效血药浓度的剂量

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

22、下述哪项是人体的主要散热部位？（ ）

- A. 皮肤
- B. 消化道

- C. 泌尿道
- D. 呼吸道
- E. 肺循环

【答案解析】
暂无解析。

23、增生型皮质醇增多症伴垂体微腺瘤，首选的治疗方案是（ ）。

- A. 肾上腺次全切除加神经递质抑制剂
- B. 双肾上腺全切加垂体放疗
- C. 肾上腺次全切除加垂体放疗
- D. 经蝶窦切除垂体微腺瘤
- E. 一侧肾上腺全切，一侧大部分切除

【正确答案】

D

【答案解析】
暂无解析。

24、铁锈色痰常见于大叶性肺炎的（ ）。

- A. 灰色肝样变期
- B. 红色肝样变期
- C. 充血水肿期
- D. 溶解消散期
- E. 中毒性休克

【正确答案】

B

【答案解析】
暂无解析。

25、不是矽肺诊断主要依据的是（ ）。

- A. 接触粉尘的职业史
- B. 临床症状
- C. CT检查
- D. 胸片
- E. 活检

【正确答案】

B

【答案解析】
矽肺患者的临床症状无特异性。

26、下列哪项不参与三酰甘油的合成？（ ）

- A. DG
- B. 磷脂酸
- C. 脂酰CoA
- D. α -磷酸甘油
- E. CDP-DG

【正确答案】

E

【答案解析】
暂无解析。

27、小儿腹泻伴脱水，应首选的检查是（ ）。

- A. 肝功能检查

- D. 腹部B超检查
- E. 胸部X线检查

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

28、男性，26岁，明显的“三多一少”，症状10年，经胰岛素治疗，症状时轻时重，有明显的低血糖症状，近2个月眼睑及下肢浮肿、乏力、腰痛，血压160/100mmHg，尿蛋白（++），颗粒管型少许，尿糖（++）。诊断应为（ ）。

- A. 糖尿病肾病
- B. 肾炎
- C. 肾盂肾炎
- D. 肾动脉硬化
- E. 胰岛素副作用

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

29、母乳性黄疸出现的时间是（ ）。

- A. 生后2~3天
- B. 生后1天
- C. 生后4~7天
- D. 生后8~9天
- E. 生后10天

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

30、传染病防治法规定，有关人员不得隐瞒、谎报或者授意他人隐瞒、谎报疫情。没有这项法定义务的为（ ）。

- A. 从事传染病监督管理的
- B. 从事传染病科研的
- C. 从事传染病医疗保健的
- D. 从事卫生防疫的
- E. 各级政府有关主管人员

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

31、传染病暴发、流行时，当地政府不可以采取的紧急措施是（ ）。

- A. 停工、停业、停课
- B. 限制或者停止集市、集会、影剧院演出或者其他人群聚集的活动

- C. 临时征用房屋、交通工具
- D. 封闭被传染病病原体污染的公共饮用水源
- E. 对所有传染病病人实行强制隔离治疗

【正确答案】

E

【答案解析】

32、一青年近3日咳嗽，高热39℃，咳铁锈色痰，WBC $18.5 \times 10^9/L$ ，X线胸片发现右肺中叶有大片阴影，临床诊断为大叶性肺炎。请问致病菌是哪一种？（ ）

- A. 肺炎杆菌
- B. 肺炎球菌
- C. 嗜肺军团菌
- D. 肺炎支原体
- E. 肺炎衣原体

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

33、原发性肝癌肝外转移最主要的部位是（ ）。

- A. 肺
- B. 骨
- C. 肝内
- D. 腹腔内种植
- E. 左锁骨上淋巴结

【正确答案】

A

【答案解析】

原发性肝癌肝内转移最多见，肝外转移最多发生在肺部。

34、小儿肾功能达成人水平的的时间是（ ）。

- A. <1岁
- B. 1~1.5岁
- C. 2岁
- D. 2~2.5岁
- E. 3岁

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

35、男，54岁，建筑工人，不慎从高处坠落，不省人事送入医院抢救。医院虽进行了抢救，但周后，病情未好转并出现了感染性中毒性休克，继而发生循环功能障碍。预后估计不好，当家属和单位得知病人预后消息后，表现为两种态度：家属要求放弃治疗和抢救，而单位则要求继续抢救和治疗。面对这两种态度，医生应该做何种选择最符合伦理原则（ ）。

- A. 尊重家属的意见，停止抢救和治疗
- B. 尊重单位的意见，继续抢救和治疗
- C. 在取得家属和单位的共同支持下，停止抢救与治疗
- D. 在意见不统一情况下，采取一般疗法
- E. 医生可根据情况作出决定

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

36、关于大肠癌的描述，下列选项。正确的是（ ）。

- A. 盲肠癌最多见
- B. 类癌由腺瘤癌变而来
- C. 少数癌瘤产生CEA

E. 未分化癌多见

【正确答案】

D

【答案解析】

大肠癌以直肠和乙状结肠最多见。多为高分化和中分化腺癌，并多数产生CEA。少数为类癌，是由嗜银细胞发生的。未分化癌少见。Dukes D期大肠癌伴有远隔脏器转移。

37、下述哪项是NK细胞所不具备的生物学功能？（ ）

- A. 非特异杀伤肿瘤靶细胞
- B. 非特异杀伤某些病毒感染的靶细胞
- C. 通过ADCC作用杀伤肿瘤和病毒感染的靶细胞
- D. 通过释放穿孔素杀伤肿瘤靶细胞
- E. 通过释放蛋白水解酶杀伤病毒感染的靶细胞

【正确答案】

E

【答案解析】

NK细胞是一种非常重要的非特异性杀伤细胞，但它的杀伤作用并不是由于释放蛋白水解酶而杀伤靶细胞的。故本题答案为E项。

38、对于手部皮肤切割伤的处理，下述哪一项不正确？（ ）

- A. 最好在止血带下进行清创
- B. 清创术应在伤后6~8小时内进行
- C. 切除皮缘宁多勿少，以防感染
- D. 创口应力争一期闭合
- E. 伤后超过24小时，可行二期处理

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

39、下列哪项是以变质为主的炎症？（ ）

- A. 感冒初期鼻黏膜炎
- B. 假膜性炎
- C. 绒毛心
- D. 脓肿
- E. 流行性乙型脑炎

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

40、6岁小儿，持续发热伴有咽痛、游走性大关节炎，抗链球菌抗体阳性，诊断为风湿热，给予青霉素治疗的目的是（ ）。

- A. 抗风湿治疗
- B. 保护心肌治疗
- C. 清除链球菌感染
- D. 中和体内抗原抗体
- E. 对症治疗

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

- A. 胃癌
- B. 食管狭窄
- C. 食管腺癌
- D. 消化道出血
- E. Barrett食管

【正确答案】

A

【答案解析】

胃食管反流病的受损部位主要位于食管下段，故不会产生胃癌。

42、对于共价修饰调节的叙述正确的为（ ）。

- A. 该酶在细胞内合成或初分泌时，没有酶活性
- B. 代谢物作用于酶的别位，引起酶构象改变
- C. 该酶是在其他酶作用下，某些特殊基团进行可逆共价修饰
- D. 调节过程无逐级放大作用
- E. 共价修饰消耗ATP多，不是经济有效的方式

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

43、《中华人民共和国执业医师法》适用于（ ）。

- A. 依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格的专业医务人员
- B. 依法取得执业医师资格的人
- C. 依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格，在医疗机构中执业的专业医务人员
- D. 依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格，经注册在医疗机构中执业的专业医务人员
- E. 依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格，经注册在医疗、预防、保健机构中执业的专业医务人员

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

44、战伤救护中，遇肠管脱出体外，转运前下列处理最恰当的是（ ）。

- A. 立即送回腹腔，包扎伤口
- B. 缝线缝扎固定肠管与腹壁再行包扎
- C. 直接用急救包覆盖包扎固定
- D. 敷料覆盖再以钟型器皿盖住再包扎
- E. 以生理盐水冲洗后常规包扎保护

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

45、幼儿，7岁，骤然起病，恶寒、高热3周，右小腿肿痛，膝关节活动受限，右小腿弥漫性红肿，广泛压痛，膝关节积液，浮髌试验阳性，关节穿刺为浆液性渗出，X线片示右胫骨上端骨皮质散在虫蚀样骨破坏，骨膜反应明显，血白细胞 $15.6 \times 10^9/L$ ，分层穿刺见软组织内与骨膜下大量蓄脓，切开引流后体温下降，急性症状消退，其转归是（ ）。

- A. 形成硬化性骨髓炎
- B. 形成慢性骨髓炎
- C. 痊愈
- D. 形成D. 脓肿

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

46、导致老年前期痴呆最常见的疾病是（ ）。

- A. 肝豆状核变性
- B. 帕金森病
- C. 阿尔茨海默病
- D. 匹克病
- E. 亨廷顿病

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

47、垂体微腺瘤是指直径小于多少的肿瘤？（ ）

- A. 15mm
- B. 12mm
- C. 20mm
- D. 10mm
- E. 18mm

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

48、有关重症昏迷病人的护理，下述哪项不全对？（ ）

- A. 呼吸道内定时滴入生理盐水，每次5ml
- B. 根据颅内压的变化进行处理
- C. 鼻饲或静脉营养：2500kcal/d
- D. 抗酸药物及预防惊厥的药物
- E. 加强雾化吸入，勤吸痰，少翻身

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

49、下列哪项不属于处理医务人员之间关系的道德原则？（ ）

- A. 共同维护病人利益和社会公益原则
- B. 彼此平等、互相尊重原则
- C. 知情同意和保守秘密原则
- D. 彼此独立、互相支持和帮助原则
- E. 互相学习、共同提高和发挥优势原则

【正确答案】

C

【答案解析】

共同维护病人利益和社会公益原则；彼此平等、互相尊重原则；彼此独立、互相支持和帮助原则；互相学习、共同提高和发挥优势原则属于处理医务人员之间关系的道德原则。此外还有彼此信任、互相协作和监督原则。故本题答案为C项。

- B. 保健药品
- C. 有禁忌证的药品
- D. 副作用大的药品
- E. 麻醉药品

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

51、患儿，2岁，生后半年发现智力落后，尿有霉臭味，8个月开始出现癫痫小发作，诊断为典型苯丙酮尿症，给予低苯丙氨酸饮食，每日允许摄入量应为（ ）。

- A. 10~30mg/kg
- B. 5~10mg/kg
- C. 30~50mg/kg
- D. 50~70mg/kg
- E. 70~90mg/kg

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

52、2个月小儿，腹泻2天，大便1日10余次，蛋花汤样，呕吐、尿少，精神萎靡，拒奶、面色苍白、前囟明显凹陷，大便镜检每高倍视野2~3个白细胞，应考虑小儿腹泻伴有（ ）。

- A. 低钾血症
- B. 酸中毒
- C. 休克
- D. 食物中毒
- E. 败血症

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

53、脑疝发生的原因是（ ）。

- A. 眼压增高
- B. 颅内压增高的中期
- C. 颅内压增高的晚期

- D. 腰穿诱发
- E. 排便困难诱发

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

54、下述哪一种细胞是永久性细胞？（ ）

- A. 表皮细胞
- B. 间皮细胞
- C. 神经细胞
- D. 呼吸及消化道黏膜上皮细胞
- E. 淋巴造血细胞

【答案解析】
暂无解析。

55、下列哪种细胞与急性同种异基因移植排斥关系最密切？（ ）

- A. NK细胞
- B. 肥大细胞
- C. CD_8^+ T细胞
- D. B细胞
- E. 嗜酸性粒细胞

【正确答案】

C

【答案解析】
暂无解析。

56、关于细胞间信息物质的叙述，错误的是（ ）。

- A. 是指具有调节细胞生命活动的化学物质
- B. 细胞释放的所有化学物质均属信息物质
- C. 特定的细胞释放特定的信息物质
- D. 信息物质也存在于细胞内
- E. 会引起靶细胞产生生物学效应

【正确答案】

B

【答案解析】
暂无解析。

57、治疗系统性红斑狼疮的主要药物是（ ）。

- A. 肾上腺糖皮质激素
- B. 非甾体抗炎药
- C. 抗疟药
- D. 免疫抑制剂
- E. 雷公藤

【正确答案】

A

【答案解析】
暂无解析。

58、儿童肱骨髁上骨折，有尺侧侧方移位，未能矫正时，最常见的后遗症是（ ）。

- A. 肘关节后脱位
- B. 尺神经损伤
- C. 肘内翻畸形
- D. 肘关节前脱位
- E. 前臂缺血性肌挛缩

【正确答案】

C

【答案解析】

肱骨髁上骨折，好发生于儿童，儿童期肱骨下端有骨骺，如尺侧移位未能矫正，影响骨骺发育，可发生肘内翻畸形。

59、哪项是交叉性感觉障碍的病变水平？（ ）

- A. 中脑下丘
- B. 颈髓
- C. 桥脑

E. 中脑上丘

【正确答案】

D

【答案解析】

交叉性感觉障碍常见于延髓损害：①延髓内部病变：损害内侧丘系，产生病灶对侧肢体深浅感觉分离现象—深感觉缺失、痛温觉正常。②延髓外侧病变：损害三叉神经降核和脊髓后脑束，产生同侧面部和对侧面部以下半身感觉障碍。同侧面部皮肤、口腔粘膜、舌、软腭和咽部感觉减退或消失；对侧颈部、上下肢、躯干痛温觉障碍，病变广泛者深感觉减退或缺失。病变位于延髓与上颈髓交界部，面部感觉障碍位于面周边部；病变位于延髓上端，同侧感觉障碍位于口周围。延髓交叉性感觉障碍多见于小脑后下动脉血栓形成。

60、60岁，男性，活动中突发头痛，右侧肢体瘫痪。查体：右侧同向性偏盲，右侧中枢性偏瘫，右侧偏身痛觉减退，右下肢病理征（+）。病变位于（ ）。

- A. 左侧大脑皮质
- B. 左侧内囊
- C. 左侧中脑
- D. 左侧桥脑
- E. 左侧延髓

【正确答案】

B

【答案解析】

本例为典型的内囊区损害引起的三偏综合征。

二、A2型题（每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、关于半抗原的叙述哪一项是恰当的？（ ）

- A. 有免疫原性
- B. 相对分子质量较大
- C. 有免疫反应性
- D. 只有与载体结合后才具有免疫反应性
- E. 与抗原决定簇同义

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2、对于情绪情感概念的理解不正确的是（ ）。

- A. 是对客观事物是否符合自身需要而产生的态度体验
- B. 人本身的生理状态也可以成为情绪情感的来源
- C. 在情绪和情感的产生过程中，需要起着关键性作用
- D. 情绪情感从本质上来讲是一种态度
- E. 两极性是情绪情感的重要性质

【正确答案】

D

【答案解析】

情绪情感是对事物态度的体验而不是态度本身。

3、患者，男，32岁。1周来发热伴会阴部疼痛，逐渐加重。大便有里急后重感，且排尿困难。盲肠指诊因疼痛不合作未能进行，白细胞 $75 \times 10^9/L$ 。最可能的诊断是（ ）。

- A. 急性膀胱炎

- C. 盆腔脓肿
- D. 坐骨直肠窝脓肿
- E. 盆腔脓肿

【正确答案】

D

【答案解析】

中年男性患者，发热伴会阴部痛，有里急后重，排尿困难，化验检查白细胞增高，应该考虑初步诊断为坐骨直肠窝脓肿。具体鉴别诊断参见下表。

疾病	特点
急性膀胱炎	发病突然，有尿急、尿频、尿痛等症状
肛旁脓肿	位置表浅，主要症状为肛周持续性跳痛，全身感染性症状（如白细胞增高等）不明显，一般无排尿困难
血栓性外痔	肛周暗紫色长条圆形肿物，表面皮肤水肿、质硬、压痛明显，一般不伴会阴部疼痛，也无排尿困难
坐骨直肠窝脓肿	由于脓肿位置深大，因此全身症状重，可有会阴部持续性疼痛，伴排尿困难和里急后重

4、对于IgE下述哪一项是错误的？（ ）

- A. 56°C30分钟可使IgE灭活
- B. IgE的H链有4个CH区
- C. δ链无铰链区
- D. 寄生虫感染使IgE水平降低
- E. 在个体发育过程中发育较晚

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

5、艾滋病病毒主要侵害人体细胞中的（ ）。

- A. B淋巴细胞
- B. T淋巴细胞

- C. 抑制性T细胞
- D. 辅助性T细胞
- E. 巨噬细胞

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

6、卧床、无发热或异常消耗的成年男性病人每天最低热卡需要是（ ）。

- A. 15~20kCal/kg
- B. 25~30kCal/kg
- C. 30~50kCal/kg
- D. 50~60kCal/kg
- E. 75kCal/kg

【正确答案】

B

【答案解析】

7、Horner征由下述哪一种病因引起？（ ）

- A. 眼交感神经麻痹
- B. 眼副交感神经兴奋
- C. 眼副交感神经麻痹
- D. 眼交感神经兴奋
- E. 动眼神经麻痹

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

8、下列关于肺淤血的描述哪一项是错误的？（ ）

- A. 肺泡壁毛细血管扩张
- B. 肺泡腔内有红细胞
- C. 肺泡腔内有大量的白细胞和纤维蛋白
- D. 肺泡腔内有水肿液
- E. 肺泡腔内有心肌细胞

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

9、干扰血红素合成的物质是（ ）。

- A. 氨基酸
- B. 铅
- C. 维生素C
- D. Fe^{2+}
- E. 葡萄糖

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

10、重症肌无力的主要病理生理机制是（ ）。

- A. 乙酰胆碱释放量减少
- B. 乙酰胆碱释放量增多
- C. 乙酰胆碱受体数目增多
- D. 乙酰胆碱受体数目减少
- E. 乙酰胆碱抗体数目减少

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

11、28岁妇女，主诉白带增多，检查宫颈阴道部宫口周围外观呈细颗粒状红色区，占整个宫颈面积的2/3，宫颈刮片巴氏染色H级。本例恰当处置应是（ ）。

- A. 涂硝酸银腐蚀
- B. 阴道内放置药物
- C. 物理治疗
- D. 宫颈锥形切除

【正确答案】

C

【答案解析】

宫颈糜烂表现为宫颈阴道部宫口周围外观呈细颗粒状红色区，根据糜烂的面积分3度。轻度指糜烂面小于整个宫颈面积的1/3，中度指糜烂面占整个宫颈面积的1/3~2/3，重度指糜烂面大于整个宫颈面积的2/3。宫颈刮片巴氏染色是为了除外宫颈癌，本例宫颈糜烂为中度，治疗可用物理治疗。

12、移植排斥反应损伤机制中能激活CTL，NK杀伤移植体，使B细胞产生Ab，介导ADCC的细胞因子是（ ）。

- A. γ -IFN
- B. α -TNF
- C. IL-2
- D. IL-4
- E. IL-5

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

13、患者，男，20岁。3天前受凉后出现咳嗽、咳白黏痰，发热39℃，胸片示左下肺大片渗出影，予青霉素静点，如有效则最先出现的是（ ）。

- A. 胸片示片状阴影消散
- B. 咳嗽好转
- C. 体温降至正常
- D. 痰色转黄
- E. 痰量减少

【正确答案】

C

【答案解析】

本例青年男性，院外获得性肺炎，胸片示左下肺大片渗出影，考虑肺炎球菌肺炎可能性大。予青霉素静点，如有效则最先出现的应是体温下降，其次是咳嗽、咳痰症状减轻，最后是胸片渗出性病灶吸收。

14、下列关于大叶性肺炎的描述，哪项错误？（ ）

- A. 由细菌感染引起
- B. 病变多从肺泡开始
- C. 炎症以嗜酸性粒细胞渗出为主
- D. 不破坏肺泡壁结构
- E. 患者常有胸痛及咳铁锈色痰

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

15、女性，40岁，四肢无力1年，有时饮水呛咳，咀嚼费力，持续活动后明显加重，休息后减轻，一日因四肢完全不能活动入院，如要诊断是否为重症肌无力应首选的检查为（ ）。

- A. 新斯的明试验
- B. 疲劳试验
- C. 胸腺CT
- D. 脑脊液检查
- E. 心电图检查

【正确答案】

A

16、下列哪项为兴奋的指标? ()

- A. 局部电位
- B. 阈电位
- C. 动作电位
- D. 静息电位
- E. 反应

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

17、下列化合物不属于糖异生的原料的是 ()。

- A. 甘油
- B. 氨基酸
- C. 丙酮酸
- D. 乳酸
- E. 脂肪酸

【正确答案】

E

【答案解析】

脂肪酸不能转变为糖；甘油、氨基酸、丙酮酸和乳酸则可以。

18、易患强直性脊柱炎的患者通常有 ()。

- A. HLA-DR2
- B. HLA-DR3
- C. HLA-DR4
- D. HLA-DR5

- E. HLA-B27

【正确答案】

E

【答案解析】

该病是人类最古老的疾病之一，特点为患者男/女比例为9:1，同时患者90%以上携带HLA-B27，健康人仅为7%，血中RF为阴性。故本题答案为E项。

19、苯丙酮尿症患儿最突出的临床表现是 ()。

- A. 惊厥
- B. 智能发育落后
- C. 肌张力增高
- D. 毛发皮肤色泽变浅
- E. 尿和汗液有鼠臭味

【正确答案】

B

【答案解析】

苯丙酮尿症临床表现为智力低下，惊厥，皮肤白嫩，毛发黄，尿有“鼠尿”样气味。最突出的临床表现是智能发育落后。但是早期进低苯丙氨酸饮食，脑损伤减少，智力可达到正常水平。

20、法洛四联症最早且主要的表现是 ()。

- A. 蹲踞
- B. 发绀
- C. 突然晕厥

○ E. 活动耐力下降

【正确答案】

B

【答案解析】

法洛四联症表现有生长发育缓慢、青紫、蹲踞现象、杵状指、晕厥、抽搐。但法洛四联症最早出现的症状是发绀，一般于生后2~6个月左右出现，逐渐明显，此时动脉导管关闭，致右向左分流加大，临床出现发绀。发绀轻重程度差异较大。缺氧发作常见于剧烈哭闹、排便、感染、贫血等诱因引起，蹲踞见于年长儿。

21、排便反射的初级中枢位于（ ）。

- A. 脊髓腰骶段
- B. 脊髓胸段
- C. 延髓
- D. 脑桥
- E. 中脑

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

22、男，60岁。直肠癌切除术后4天。晨起时突发左下肢肿胀，左腿皮温增高，股三角区有深压痛。最可能的诊断是左下肢（ ）。

- A. 血栓性浅静脉炎
- B. 动脉栓塞
- C. 深静脉血栓形成
- D. 大隐静脉曲张
- E. 淋巴水肿

【正确答案】

C

【答案解析】

C项，患者直肠癌术后，突发左下肢肿胀，左腿皮温增高，股三角区有深压痛，结合患者术后长时间卧床史，应考虑左下肢深静脉血栓形成。B项，动脉栓塞是指栓子脱落栓塞在动脉系统，常表现为肢体苍白、皮温凉。A项，血栓性浅静脉炎是位于人体体表的可视静脉的急性非化脓性炎症，常表现为静脉区呈条索状红肿、皮肤肿胀，伴明显疼痛和压痛。

23、晚期胃癌，最常发生转移的远处淋巴结为（ ）。

- A. 颈部
- B. 腋窝
- C. 腹股沟
- D. 左锁骨上
- E. 胃窦部小弯处

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

24、老年患者，突发剧烈胸痛2小时入院，诊断为急性前壁心肌梗死。溶栓后出现非阵发性室性心动过速。此时针对室速，应采取的措施为（ ）。

- A. 严密观察
- B. 胺碘酮静注
- C. 维拉帕米静注
- D. 利多卡因静注
- E. 异丙肾上腺素静滴

【正确答案】

患者为急性心肌梗死，行溶栓治疗后出现非阵发性室性心动过速，考虑再灌注心律失常表现，应严密观察。再灌注性心律失常是指冠状动脉血栓形成后自溶或药物溶栓等方法使闭塞的冠状动脉再通及冠状动脉痉挛的缓解等恢复心肌再灌注所致的心律失常。溶栓后出现再灌注性心律失常，说明血栓溶解，暂不需特殊处置，应严密观察病情。

25、患者男性，65岁，因肺癌行右下肺叶切除，术后送重症监护室，胸腔闭引流通畅。术后2小时观察引流血液约400ml左右，患者血压100/70mmHg，心率102次/分，此时最佳的处理措施为（ ）。

- A. 视引流量增加输液、输血量
- B. 大量止血药物使用
- C. 增加抗生素用量，防止感染
- D. 重返手术室手术止血
- E. 高半坐卧位保持引流通畅

【正确答案】

D

【答案解析】

典型的术后出血病案，每小时出血量超过100ml出现早期休克的临床表现，可辅助性床头拍胸片，如片示“胸腔积液”则术后出血诊断确立，需再次手术止血。故本题答案D项。

26、女孩，2岁半，心前区听到2~3级收缩期杂音，胸部X线片显示两肺野肺纹理减少。下列哪种先天性心脏病的可能性最大？（ ）

- A. 室间隔缺损
- B. 房间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

27、不属于红细胞的生理特征的是（ ）。

- A. 红细胞膜的通透性
- B. 红细胞胞的可塑变形性
- C. 红细胞的悬浮稳定性
- D. 红细胞的渗透脆性
- E. 红细胞的趋化性

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

28、破伤风最初的症状是（ ）。

- A. 角弓反张
- B. 四肢抽搐
- C. 张口困难
- D. 呼吸急促
- E. 神志不清

【正确答案】

C

【答案解析】

破伤风典型的临床表现是肌肉痉挛性收缩。阵发性肌肉强烈痉挛，首先影响咀嚼肌，随后影响的肌群顺序是：面部表情肌，颈、背、胸、四肢肌，最后是膈肌。相应最先出现的表现是：张口困难（牙关紧闭）。

- A. 家庭脱敏
- B. 冲击疗法
- C. 厌恶疗法
- D. 松弛疗法
- E. 自由联想

『正确答案』

C

『答案解析』

恋物癖患者的问题是迷恋于社会习俗所不能接受的事物，因此治疗的目标是要使患者远离该事物。当患者出现迷恋该物品的欲望时给予电击，使之产生负性的条件反射，逐渐对原来迷恋的事物产生厌恶情绪，故此题正确选择为C项。脱敏疗法是使患者逐步能接受原来害怕、敏感的事物，但方式是一步步进行的。而冲击疗法是一下到达害怕或敏感的事物，不是分步骤进行。以上都属行为治疗，但原理不同，注意区分其差别。

30、婴儿腹泻重型与轻型的主要区别点是（ ）。

- A. 发热、呕吐的程度
- B. 腹泻，每日10余次
- C. 大便蛋花汤样，混有黏液
- D. 大便镜检有大量脂肪球
- E. 有水及电解质紊乱

『正确答案』

E

『答案解析』

婴儿腹泻重型除较重的胃肠道症状外，还有较明显的脱水和电解质紊乱症状。

三、B1型题（以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、c、

D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。）

1、（共用备选答案）

- A.空腹血糖
- B.尿糖
- C.胰岛素释放试验
- D.葡萄糖耐量试验
- E.糖化血红蛋白

1. 诊断糖尿病最常用的指标是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 鉴别型或2型糖尿病最常用的指标是（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

3. 判断糖尿病控制程度的指标是（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2、（共用备选答案）

A.>13.5cm

B.>15.5cm

C.13.5~12.5cm

D.<12.5cm

E.<10.5cm

1. 5岁以下小儿营养状态较好时上臂围应该是（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2. 5岁以下小儿营养状态不良时上臂围应该是（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

3. 5岁以下小儿营养状态中等时上臂围应该是（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

3、（共用备选答案）

A.缩窄型或硬化型

B.髓质型

C.溃疡型

D.蕈伞型

E.腔内型

1. 上述哪一型食管癌较早引起梗阻？（ ）

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

3. 上述哪一型食管癌恶性程度较高？（ ）

【正确答案】

B

【答案解析】

按病理形态，临床上食管癌可分为四型：①缩窄型：瘤体形成明显的环行狭窄，累及食管全部周径，较早出现阻塞症状。②髓质型：管壁明显增厚并向腔内外扩展，使癌瘤的上下端边缘呈坡状隆起。多数累及食管周径的全部或绝大部分。切面呈灰白色均匀致密的实体肿块。恶性程度最高。③溃疡型：瘤体的黏膜面呈深陷而边缘清楚的溃疡。溃疡的大小和外形不一，深入肌层，阻塞程度较轻。④蕈伞型：瘤体呈卵圆形扁平肿块状，向腔内呈蘑菇样突起。隆起的边缘与其周围的黏膜境界清楚，瘤体表面多有浅表溃疡，其底部凹凸不平。

4. （共用备选答案）

A.消毒

B.灭菌

C.无菌

D.抑菌

E.防腐

1. 不含活菌的状态（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2. 防止或抑制微生物生长繁殖（ ）。

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

3. 杀灭物体上病原微生物（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

4. 杀灭物体上包括芽孢在内的所有微生物（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

5. （共用备选答案）

A.髓关节功能保存

B.局部形成窦道

C.髓关节骨性强直

D.局部形成寒性脓肿

E.髓关节形成前屈内收畸形

1. 髓关节单纯滑膜结核或单纯骨结核早期及时治疗，其结果可能是（ ）。

【答案解析】
暂无解析。

2. 髋关节全关节结核晚期病灶清除术，最终达到的结果是（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

3. 髋关节结核，未经治疗常发生的畸形是（ ）。

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

四、A3型题（以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据考题所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1.（共用题干）

女性，26岁，牙龈出血伴月经过多1年，双下肢可见散在出血点及紫癜，肝脾不大，血红蛋白90g/L，白细胞 $5.5 \times 10^9/L$ ，分类正常，血小板 25

$\times 10^9/L$ ，尿常规正常。

1. 最可能的诊断为（ ）。

- A. 过敏性紫癜
- B. 急性白血病
- C. 特发性血小板减少性紫癜
- D. 再生障碍性贫血
- E. 缺铁性贫血

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2. 明确诊断需做（ ）。

- A. 骨髓检查
- B. Coombs试验
- C. 出血时间测定
- D. 铁蛋白测定
- E. 网织红细胞

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

3. 首选治疗为（ ）。

- A. 抗纤溶药物
- B. 输血小板浓缩液
- C. 免疫抑制剂
- D. 肾上腺皮质激素
- E. 脾切除

【答案解析】
暂无解析。

4. 下述治疗，除了（ ）。

- A. 长春新碱1~2mg/次，每周1次连用4—6周
- B. 脾切除
- C. 大剂量丙种球蛋白0.4g/kg。连用5天
- D. 血浆置换
- E. 骨髓移植

【正确答案】

E

【答案解析】
暂无解析。

2. (共用题干)

男性，36岁，翻车肩部外伤，半小时后来院，查左锁骨中外1/3处明显畸形，局部肿胀明显、淤血，桡动脉搏动触不到，手部发凉，皮色苍白，血压80/40mmHg。

1. 该患者应首先做哪一项处置？（ ）

- A. 立即做各项化验
- B. 立即摄X线片
- C. 做血管造影
- D. 立即补液、输血
- E. 整复骨折，固定

【正确答案】

D

【答案解析】
暂无解析。

2. 该患者正确的治疗方法是（ ）。

- A. 手法复位，石膏固定
- B. 手法复位，横8字绷带固定
- C. 牵引治疗
- D. 手术切开复位，内固定探查臂丛神经
- E. 立即手术探查受损血管并修复血管，骨折复位内固定，再加适当的外固定

【正确答案】

E

【答案解析】
暂无解析。

3. (共用题干)

患者，男，50岁，进行性贫血、消瘦、乏力半年。有时右腹隐痛，无腹泻。查体：右中腹部扪及肿块，肠鸣音活跃。

1. 下列各项检查可明确诊断的是（ ）。

- A. 纤维结肠镜
- B. CEA
- C. CT
- D. B超
- E. X线钡餐造影

【答案解析】

中年男性患者，进行性贫血，伴消瘦、乏力，有腹隐痛，右中腹扪及肿块，首先考虑升结肠癌。对此患者行纤维结肠镜检查可明确诊断。

2. 如果需要手术治疗，术前准备最重要的是（ ）。

- A. 纠正营养
- B. 肠道准备
- C. 心肺功能检查
- D. 肝肾功能检查
- E. 心理准备

【正确答案】

B

【答案解析】

结肠癌术前准备最重要的是肠道准备。常用口服肠道抗菌药物、泻剂及多次灌肠方法，使结肠排空，并尽量减少肠腔内细菌数，以减少术后感染。

4. (共用题干)

女性，42岁，2个月来，情绪低落，兴趣索然，自觉“高兴不起来”，生不如死，“自己的脑子不灵了”，“像是生了锈的机器”，认为自己成了家庭

和社会的累赘，“成了废物”，有胸闷、心悸、心慌的症状，自认为有严重心脏病，不能治愈。主动性言语及活动明显减少，生活被动，愿独处。曾多次自杀未遂，睡眠不好，早醒。

1. 该病人的精神症状不包括（ ）。

- A. 思维迟缓
- B. 情绪低落
- C. 自责自罪观念
- D. 夸大妄想
- E. 意志活动减退

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2. 该病人的思维表现不包括（ ）。

- A. 思维云集
- B. 疑病观念
- C. 自杀企图
- D. 思维迟缓
- E. 自责自罪观念

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

3. 该病人首要注意的问题是防止（ ）。

- A. 拒食导致营养不良
- B. 活动少而引起的合并感染
- C. 自杀行为
- D. 冲动伤人
- E. 症状波动的规律

【正确答案】

C

5、（共用题干）

男性，45岁。突发头痛伴恶心、呕吐1d来诊，高血压病史10年，平日血压控制在120~140/80~90mmHg，查体：血压230/20mmHg（右上肢），220/110mmHg（左上肢），肌力5级，双侧病理反射未引出，尿蛋白（-）。

1. 最可能的诊断是（ ）。

- A. 脑出血
- B. 脑血栓形成
- C. 高血压脑病
- D. 恶性高血压
- E. 主动脉夹层

【正确答案】

C

【答案解析】

患者有高血压病史，突发头痛、恶心、呕吐等表现，查体血压升高。结合患者高血压病史、颅内压增高的临床表现及查体，首先应考虑高血压脑病的诊断。脑出血或脑血栓患者患侧肌力多下降，病理反射可引出。恶性高血压除血压升高外多伴有血管损害表现，如视网膜出血、渗出和视盘水肿等。主动脉夹层多有胸部刀割样剧烈疼痛，向胸前及背部放射，患者可伴有休克表现，两侧脉搏血压多不等。

2. 如诊断已经成立，出现上述症状的主要发病机制是（ ）。

- A. 血液渗入主动脉壁中层
- B. 脑微小动脉瘤破裂
- C. 脑动脉硬化并发血栓形成
- D. 脑组织血流灌注过多引起脑水肿
- E. 周围小动脉痉挛

【正确答案】

D

【答案解析】

高血压脑病患者，由于血压急剧升高引起脑膜和脑细小动脉持久性痉挛，毛细血管血流减少，导致缺血和毛细血管通透性增加，继而脑细小动脉被动性或强制性扩张，脑组织灌注过多，发生急性脑循环障碍，出现脑水肿和颅内压升高。

