

1. 马斯洛需要层次论中的最低层需要是 A
 - A 生理需要
 - B 安全需要
 - C 尊重需要
 - D 爱与归属需要
 - E 自我现实需要
2. 婚前医学检查不包括对下列疾病的检查的是： D
 - A. 严重遗传性疾病
 - B. 指定传染病
 - C. 有关精神病
 - D. 不育症
 - E. 精神分裂症
3. 《执业医师法》规定，医师因考核不合格被责令暂停执业活动 3~6 个月，期满后再次考核仍不合格的，由县级以上卫生行政部门对其 B
 - A. 变更注册
 - B. 注销注册
 - C. 重新注册
 - D. 不予注册
 - E. 暂缓注册
4. 普鲁卡因不宜用于哪一种局麻： D
 - A. 蛛网膜下腔麻醉
 - B. 浸润麻醉
 - C. 硬膜外麻醉
 - D. 表面麻醉
 - E. 传导麻醉
5. 内环境稳定是指： E
 - A 细胞外液的物理、化学因素保持着动态平衡
 - B 细胞内液理化性质保持不变
 - C 细胞外液理化性质保持不变
 - D 细胞内液的化学成分相对恒定
 - E 细胞外液的化学成分相对恒定
6. 急性肾功能衰竭造成死亡的常见电解质紊乱是 A
 - A. 高血钾
 - B. 高血镁
 - C. 低血钾
 - D. 低血钙
 - E. 低血钠
7. 急性病毒性肝炎（普通型）的病变特点是肝细胞： B
 - A 广泛坏死，变性轻微
 - B 广泛变性，坏死轻微
 - C 广泛再生，变性较轻
 - D 广泛坏死，再生较轻
 - E 变形、坏死、再生均广泛
8. 与 A 型行为性格关系最密切的疾病是： C

- A 溃疡病
- B 风心病
- C 冠心病
- D 癌症
- E 神经症

9. 公卫医师何某在取得医师资格证书和执业许可证后的一年里，擅自从事婚前医学检查、遗传病诊断和产前诊断，虽经卫生行政部门制止，仍不改正，并又施行终止妊娠手术。依据《母婴保健法》规定，应对何某给予的行政处罚是 D

- A. 处以罚款
- B. 没收违法所得
- C. 没收非法财物
- D. 吊销执业许可证
- E. 行政拘留

10. 新斯的明最强的作用是 A

- A 兴奋骨骼肌
- B 兴奋胃肠道平滑肌
- C 兴奋膀胱平滑肌
- D 缩小瞳孔
- E 增加腺体分泌

11. 二氧化氮在血液中运输形式是： D

- A 物理溶解
- B 与水结合成碳酸
- C 形成氧合血红蛋白
- D 形成碳酸氢盐
- E 形成氨基甲酸血红蛋白

12. 组成蛋白质的基本单位是： A

- A L - -氨基酸
- B D- -氨基酸
- C L- -氨基酸
- D D- -氨基酸
- E 以上都不是

13. .纠正低钾血症必须是： D

- A. 先补钠离子
- B. 先补氯离子
- C. 5%葡萄糖
- D. 尿量大于 40ML
- E. 先纠正代酸

14. 炎症的基本病理变化： C

- A 组织细胞的变性坏死
- B 组织的炎性充血和水肿
- C 病变组织的变质、渗出、增生
- D 红、肿、热、痛、功能障碍
- E 周围血液中自细胞增多和炎区白细胞浸润

15. 最易发生出血性梗死的是： E

- A 脾、肾
- B 心、脑
- C 肾、肺
- D 心、肾
- E 肺、肠

16. 饮水消毒的主要目的是 C

- A. 预防化学性中毒
- B. 预防食物中毒
- C. 防止肠道传染病的发生
- D. 预防“三致”作用的发生
- E. 保证水的感官性状良好

17. 动作电位的传导正确的是： B

- A 呈单向传导
- B 呈双向传导
- C 呈衰减性传导
- D 电位幅度越大，传导越远
- E 刺激越强，传导越远

18. 不能透过肾小球滤过膜的是： E

- A 钠离子
- B 氨基酸
- C 甘露醇
- D 葡萄糖
- E 血浆白蛋白

19. 夜盲是缺乏： A

- A 维生素 A
- B 维生素 B
- C 维生素 C
- D 维生素 D
- E 维生素 E

20. 药物的副作用： A

- A 即在治疗剂量时出现的与治疗目的无关的作用
- B 用量过大或用药时间过长出现的对机体有害的作用
- C 继发于治疗作用后出现的一种不良后果
- D 与剂量无关的一种病理性免疫反应
- E 停药后血药浓度降至阈浓度以下时出现的生物效应

21. 有机磷农药中毒的机理是： C

- A 抑制琥珀酸脱氢酶
- B 抑制己糖激酶
- C 抑制胆碱酯酶
- D 抑制柠檬酸合成酶
- E 抑制异柠檬酸脱氢酶

22. 医疗机构设备不齐全，难以对急诊病人救治： B

- A 立即抢救
- B 及时转诊

- C 继续观察
- D 提请上级医院派人会诊
- E 请示当地卫生局依法处理

23-24

- A 动物肝、肾、牛奶
- B 粮谷类
- C 绿叶类
- D 酱菜类
- E 干豆、花生

23. 膳食中维生素 A 的来源: A

24. 膳食中维生素 B 的来源: B

25. 伦理学任务不包括: C

- A 确定符合时代要求的医德原则和规范
- B 反映社会对医学职业道德的需求
- C 直接提高医务人员的医疗水平
- D 为医学的发展导向
- E 为符合道德的医学行为辩护

26. 磷酸戊糖途径主要生理意义: E

- A 生成 ATP
- B 防止酸中毒
- C 维持血糖浓度
- D 抑制脂肪合成
- E 将 NADP⁺还原成 NADPH

27. 常用的精神分析法: E

- A 系统脱敏
- B 厌恶治疗
- C 患者中心
- D 催眠治疗
- E 自由联想

28. 酶促反应中决定酶专一性的是: A

- A 酶蛋白
- B 辅基或辅酶
- C 金属离子
- D 底物
- E 催化基团

29. 可引起促胰液素的释放,从而促进胰液、胆汁和小肠液的分泌: D

- A 脂肪酸
- B 氨基酸
- C 甘油
- D 盐酸
- E 乳酸

30. 在驾驶员、接线院、银行出纳员等工作人群中,高血压患病人数增加,此病属于: D

- A 工伤
- B 职业病

D 与工作有关的疾病
E 非职业性疾病

31. 早餐占一天能量的：C

A 5%~10%

B 15%~20%

C 25%~30%

D 35%~45%

E 45%~50%

32. 雷尼替丁属于：E

A M受体阻断药

B H⁺ K⁺ -ATP酶抑制药

C H₁受体阻断药

D 胃泌素受体阻断药

E H₂受体阻断药

33. 属于抗代谢的药物：E

A 乙胺嘧啶

B 环丙沙星

C 利福平

D 氟尿嘧啶

E 磺胺嘧啶

34. 在氧气充足的条件下，1mol以下物质产生ATP最多的是：E

A. 葡萄糖

B. 糖原

C. 丙酮酸

D. 1、3-二甘油酸脂

E. 16 二磷酸果糖

35. 用于支气管哮喘，又能用于心源性哮喘：E

A 肾上腺素

B 吗啡

C 异丙肾上腺素

D 特布他林

E 氨茶碱

36. III度房室传导阻滞最有效的措施是：B

A 口服β受体阻滞剂

B 植入心脏起搏器

C 口服阿托品

D 冠状动脉内支架置入

E 静脉推注利多卡因

37. 只能用于心源性哮喘，不能用于支气管哮喘：B

A 肾上腺素

B 吗啡

38. Austin-Flint 杂音的发生与以下哪项有关: D

- A 二尖瓣狭窄
- B 二尖瓣关闭不全
- C 主动脉狭窄
- D 主动脉关闭不全
- E 肺动脉关闭不全

39. 下列关于条件反射说法正确的是: B

- A 先天遗传而获得
- B 后天训练而建立
- C 种族共有的反射
- D 是一种初级的神经活动
- E 反射弧固定不变

40. 血站违反献血法规定, 向医疗机构提供不符合国家规定标准的血液的, 应当 B

- A 由县级以上卫生行政部门处以罚款
- B 由县级以上卫生行政部门责令改正
- C 由县级以上卫生行政部门限期整顿
- D 依法赔偿
- E 依法追究刑事责任

41. 能抑制尿液的稀释和浓缩过程, 产生强大利尿作用的药物是: A

- A 呋塞米
- B 氢氯噻嗪
- C 高渗葡萄糖
- D 山梨醇
- E 甘露醇

42. 甲状腺手术前用的药物是: C

- A 甲状腺素
- B 受体阻滞剂
- C 复方碘溶液
- D 氢化可的松
- E 去氨加压素

43. 蜘蛛痣不应出现的部位: D

- A. 面 B 肩 C 上胸 D 腹 E 颈

44. 阿托品不能缓解的症状: C

- A 瞳孔缩小
- B 流涎流汗
- C 腹痛腹泻
- D 骨骼肌震颤
- E 小便失禁

45. 有机磷中毒时, 属于烟碱样症状的是: C

- A 恶心、呕吐、腹痛

- B 多汗、流涎、流泪、流涕
- C 肌纤维颤动, 肌肉强直性痉挛

46-48

- A 窦房结
- B 心房肌
- C 房室交界
- D 心室肌
- E 浦肯野纤维

46. 传导速度最慢的是： C

47. 传导速度最快的是： E

48. 自律性最高的是： A

49. 双人复苏时，心脏按压与口对口人工呼吸的比例是 E

A4: 1

B5: 1

C6: 1

D7: 1

E15: 2

50. 口服避孕药后月经第9天不规则出血，正确的处理方法是： E

A 停药

B 用止血药

C 减少避孕药量

D 加服避孕药

E 加服少量雌激素

51. 复方短效避孕药是： B

A 从月经开始第一天开始服用

B 从月经开始第五天开始服用

C 从月经干净第五天开始服用

D 从月经周期第七天开始服用

E 从月经周期第十天开始服用

52. 手术时用利多卡因麻醉，出现利多卡因过敏属于： -C

A 药物的毒性作用大

B 药物对机体的选择性高

C 特殊体质

D 药物的广泛作用

E 机体对药物过于敏感

53. 腹部损伤时行诊断性腹腔穿刺，抽出不凝固血液，最可能的诊断是 D

A 空腔脏器官破裂

B 误穿入腹腔血管

C 前腹壁血肿

D 实质性器官破裂

E 后腹膜间隙血肿

54. 血流动力学不稳定的持续性室性心动过速： D

A 利多卡因

B 食道调搏复律

C 心律平

D 直流电复律

- A. 特发性紫癜
- B. 血友病
- C. 过敏性紫癜
- D. 弥漫性
- E. 血小板增高

56. 新生儿每小时胆红素是： B

A10. 5BR>58. 炎热环境中(30℃以上)机体维持体热平衡是通过： D

- A 增加有效辐射面积
- B 增加皮肤与环境之间的温度差
- C 交感神经紧张性增加
- D 发汗及增加皮肤血流量
- E 发汗及减少皮肤血流量

59. 将 28 周新生儿放入暖箱，湿度应该调至多少： C

- A80%
- B70%
- C60%
- D50%
- E40%

60. 阴道最多的菌群是： A

- A 乳酸杆菌
- B 棒状杆菌
- C 大肠杆菌
- D 类杆菌
- E 梭状杆菌

61. 下列疾病中，有胃癌发病率增高的是 D

- A 十二指肠溃疡
- B 胃食管反流病
- C 慢性浅表性胃炎
- D 慢性萎缩性胃炎
- E 十二指肠球炎

62. 肝硬化最常见的并发症是： A

- A 上消化道大量出血
- B 感染
- C 肝性脑病
- D 原发性肝癌
- E 门静脉血栓形成

63. 含 8%糖的牛奶 100ml 约供能量 B

- A80kcal
- B100kcal
- C120kcal
- D140kcal
- E160kcal

64. 当患者对医生所实施的诊治手段有质疑时，医生必须详细地向患者说明、解释，在患者愿意时才能进行，这属于患者的 C

- A 平等医疗权
- B 疾病认知权
- C 知情同意权
- D 社会责任权
- E 保护隐私权

65. 全脂奶粉加开水冲调，使其成分与鲜牛奶相似，其容积比应是 C

- A 1: 1
- B 1: 2
- C 1: 4
- D 1: 6
- E 1: 8

66. 怀疑甲级传染病人在明确诊断前，应该在指定场所进行：A

- A 医学观察
- B 留验
- C 隔离
- D 访视
- E 就地诊验

67. 最常见的鞘膜积液： E

- A 精索鞘膜积液
- B 继发性鞘膜积液
- C 睾丸精索鞘膜积液
- D 交通性鞘膜积液
- E 睾丸鞘膜积液

68. X 线出现蚕蚀空洞的是： E

- A 原发型肺结核
- B 浸润型肺结核
- C 结核性胸膜炎
- D 血行播散型肺结核
- E 慢性纤维空洞型肺结核

69. 急性胰腺炎最常见的并发症是： C

- A 上消化道大出血
- B 血栓性静脉炎
- C 胰腺假性囊肿
- D 胰性脑病

E 急性肾衰竭

70. 对 21-三体综合征最有确诊价值的是： C

- A 智力低下
- B 特殊面容
- C 染色体核型分析
- D 通贯手
- E 肌张力低下

- E. 下肢畸形
- B. 胸廓畸形
- C. 手镯、脚镯征
- D. 颅骨软化
- E. 下肢畸形

72-73

- A 无明显规律性
- B 疼痛-排便-加重
- C 进食-疼痛-餐前缓解
- D 疼痛-进食-缓解
- E 疼痛-便意-缓解

72. 十二指肠球部的溃疡的腹痛规律是： D

73. 胃溃疡疼痛： C

74. 直肠检查的体位错误的是： B

- A 左侧卧位
- B 右侧卧位
- C 胸膝位
- D 截石位
- E 蹲位

75. 宫颈糜烂的分型依据： C

- A 糜烂深度
- B 糜烂类型
- C 糜烂面积
- D 糜烂性质
- E 糜烂位置

76. 我国葡萄胎的恶变率为： C

- A 12%
- B 13.5%
- C 14.5%
- D 16%
- E 17.5%

77. 对慢性化脓性骨髓炎最有意义的诊断是： A

- A 皮肤有窦道并见死骨排出
- B 局部肿痛及患肢功能障碍
- C 寒战、高热等全身感染中毒症状
- D 白细胞总数及中西白细胞增高

EX 线未见显示骨皮质破坏和骨膜反应

78. 根据世界卫生组织规定，诊断高血压的标准： A

- A $\geq 140/90\text{mmHg}$
- B $> 120/80\text{mmHg}$
- C $> 130/85\text{mmHg}$
- D $> 135/80\text{mmHg}$
- E $> 120/75\text{mmHg}$

79. 干啰音的听诊特点错误的是： D

C 持续时间较长

D 性质和部位固定不变

E 音调较高

80. 弛张热见于： D

A 伤寒

B 肺炎

C 支气管炎

D 败血症

E 布鲁菌病

81. 上尿路结石出现血尿的特点是： B

A 尿频、尿急、尿痛

B 活动后绞痛并有血尿

C 间歇性无痛血尿

D 下腹部疼痛并有恶心

E 排尿突然中断

82. 上腹部钻顶样剧痛症状的疾病是： E

A 胆囊结石

B 胆管结石

C 胆囊癌

D 胆管癌

E 胆道蛔虫症

83. 对风湿性心脏病最具有诊断意义的病变是 D

A. 心肌变性、坏死

B. 纤维蛋白性心外膜炎

C. 心瓣膜赘生物

D. 风湿小体 (Aschoff 小体)

E. 心肌间质炎细胞浸润

84. 上节育器的适应症正确的是： D

A 月经过多

B 宫颈内口松弛

C 子宫脱垂

D 剖宫产术后半年

E 生殖道炎症

85. 最容易发生扭转的卵巢肿瘤是 D

A 无性细胞瘤

B 内胚窦瘤

C 颗粒细胞瘤

D 囊性畸胎瘤

E 两性母细胞瘤

86. 溃疡病行胃大部分切除手术适应征的是 C

A 单纯穿孔

B 第一次出血

C 瘢痕性幽门梗阻

D 胰源性溃疡

- A 原发型肺结核
- B 浸润型肺结核
- C 结核性胸膜炎
- D 血行播散型肺结核
- E 慢性纤维空洞型肺结核

88. 男性 45 岁，外伤致骨盆骨折，会阴部裂伤，术后尿储留、烦躁。最佳处理方法：E

- A 肌注安定 10 毫克
- B 下腹部热敷
- C 口服止痛药
- D 静注氨甲酰甲胆碱
- E 留置导尿管

89. 诊断感染性心内膜炎的最有效的方法似：D

- A 免疫学检查
- B 心电图检查
- C X 线检查
- D 血培养
- E 常规生化检查

90. 危险三角的疔肿一般发生在 E

- A 背部
- B 胸部
- C 臀部
- D 颈部
- E 面部

91. 随着小儿年龄增长，母乳的量和质逐渐不能满足小儿所需，一般最迟断奶的时间是：E

- A 6 个月左右
- B 8 个月左右
- C 10 个月左右
- D 12 个月左右
- E 18 个月左右

92. HCG 最高出现在怀孕：B

- A 妊娠 5~7 周
- B 妊娠 8~10 周

- C 妊娠 11~13 周
- D 妊娠 14~16 周
- E 妊娠 17~19 周

93. 腰椎间盘突出症 C

- A 托马斯征阳性
- B 拾物试验阳性
- C 直腿抬高试验和加强试验阳性
- D 患部活动受限，好发于 50 岁左右
- E 早期局部分层穿刺有助于诊断

94. 男性，18 岁，由于侧身倒地右掌支撑，致右肩部肿胀，疼痛剧烈，检查：右肩轻度外展，弹性固定，方肩畸形，Dugas 征（搭肩试验），临床诊断是：E

C 锁骨骨折

D 肩关节挫伤

E 肩关节脱位

95. 男性, 30 岁, 右胸外伤后 2 小时, 呼吸困难。气管左移, 右侧呼吸音消失, 叩诊右侧实音, 应考虑为 A

A 血胸

B 肋骨骨折

C 脓胸

D 肺栓塞

E 张力性气胸

96. 出现呼吸音增强的疾病是 D

A 伤寒

B 肺炎

C 支气管炎

D 败血症

E 布鲁菌病

足月婴儿, 生后一天内出现黄疸, 拒哺。查体: 嗜睡, 面色苍白, HB90g/L, 血清未结合胆红素 $342 \mu\text{mol/L}$ 。

97. 此患婴的可能诊断是 C

A 新生儿肝炎

B 新生儿胆管发育不佳

C 新生儿溶血病

D 新生儿败血症

E 新生儿硬肿症

98. 首先要做的检查是: C

A 肝功能

B 血常规

C 血培养

D 血型,

E 肾功能

99. 首选的治疗: D

A 输注葡萄糖液

B 应用抗生素

C 应用病毒唑

D 换血疗法

E 光照疗法

100. 典型苯丙酮尿症, 是由于缺乏: B

A 酪氨酸羟化酶

B 苯丙氨酸羟化酶

C 二氢生物蝶呤还原酶

D 鸟苷三磷酸环化水合酶

E 丙酮酰四氢生物蝶呤合成酶

证性心

- A. 有高血压家族史
 - B. 眼底可见动脉交叉受压
 - C. 上腹部可闻连续高调杂音
 - D. 血浆肾素水平升高
 - E. 尿蛋白(++)，红细胞 5 / HP
102. 标准口服葡萄糖耐量试验葡萄糖负荷量应为 D
- A 60g
 - B 65g
 - C 70g
 - D 75g
 - E 80g

103. 有晨僵的是：D

- A 骨性关节炎
- B 痛风
- C 银屑病关节炎
- D 类风湿关节炎
- E 风湿性关节炎

104. 能扩张支气管平滑肌。又能减轻支气管粘膜水肿： A

- A 肾上腺素
- B 吗啡
- C 异丙肾上腺素
- D 特布他林
- E 氨茶碱

105. 胰腺炎的淀粉酶测定的意义错误的是 D

- A. 8-12 小时升高
- B. 比正常值大三倍
- C. 尿淀粉酶升高比血清淀粉酶升高持续时间长
- D. 血清淀粉酶升高与症状成正比

E. 是急腹症血清淀粉酶都会增高

106. 成瘾小，影响快动眼睡眠时相小的安眠药：B

- A 哌替啶
- B 地西洋
- C 氯丙嗪
- D 甲丙氨脂
- E 苯巴比妥

107. 社会主义市场经济条件下得医德建设，重点是纠正和防止： E

- A 稀有卫生资源分配不公的现象
- B 追求个人正当利益的现象
- C 淡化卫生事业的福利性
- D 强调医务人员的社会价值
- E 医院片面追求经济效益

B 胎头拨露

C 胎头着冠

D 肛门括约肌松弛

E 宫口开大 10cm

109. 在门静脉与腔静脉间的交通支中最主要的是： A

A 胃底食管下段交通支

B 直肠下段、肛管交通支

C 前腹壁交通支

D 腹膜后交通支

E 肝被膜交通支

110. 结核性腹膜炎常见的并发症： D

A 急性肠穿孔

B 慢性肠穿孔

C 感染中毒性休克

D 肠梗阻

E 腹腔脓肿

111. 胃溃疡（错误）答案： B

A 多发生于慢性萎缩性胃炎背景

B 好发胃体大弯侧

C 与口服非甾体抗炎药有密切关系

D 根除幽门螺杆菌可降低复发率

E 可发生癌变

112. 自 HESSELBACH 三角外突出的疝称为： B

A 股疝

B 腹股沟直疝

C 腹股沟斜疝

D 脐疝

E 白线疝

113. 以醋酸纤维素薄膜做支持物进行血清蛋白质电泳的缓冲液常用 PH 值为： E

A 3.5

B 5.5

C 6.5

D 7.5

E 8.6

114-116

男，49 岁，胃溃疡病史 12 年，近三个月，上腹痛无规律，食欲减退，粪便隐血检查多次阳性。术后出现腹胀、呕吐等胃肠症状。

114. 最有可能的诊断为： D

A 溃疡并出血

B 幽门管溃疡

C 幽门梗阻

D 应激性溃疡

E 溃疡伴息肉

115. 治疗首选： B

- D 口服止血
- C 静脉注射雷尼替啶
- D 口服凝血酶盐水溶液
- E 口服氢氧化铝凝胶

116. 若经上述处理后出现板状腹，全腹压痛、反跳痛等症状，则诊断为： B

- A 胆石症
- B 应激性溃疡穿孔
- C 十二指肠溃疡
- D 慢性萎缩性胃炎
- E 胃溃疡

117-119

男性，26岁，左膝持续性隐痛1月余。查体：左小腿上端内侧略肿，压痛，X线摄片见左胫骨上端内侧有一肥皂泡样的阴影，膨胀性生长，骨皮质变薄。

117. 应首先考虑的诊断： E

- A 骨结核
- B 骨髓炎
- C 骨肉瘤
- D 骨软骨瘤
- E 骨巨细胞瘤

118. 其最佳治疗措施为： C

- A 单纯性化疗
- B 单纯性截肢手术
- C 病灶刮除植骨
- D 单纯放疗
- E 抗炎抗结核

119. 如果是骨肉瘤，其最佳治疗方案为： E

- A 单纯化疗
- B 单纯放疗
- C 单纯截肢手术
- D 肿瘤切除，人工关节置换
- E 化疗—肿瘤切除—化疗

120. 短效. 避孕药的禁忌症不包括： E

- A 慢性肝炎
- B 哺乳期
- C 月经稀少
- D 血栓性疾病
- E 宫颈糜烂

121. 老人收缩期高血压者患者降压宜选： A

- A 利尿药氢氯噻嗪
- B β 受体阻滞剂
- C α 受体阻滞剂
- D 血管紧张素转化酶抑制剂

断是：C

- A 黄体功能不全
- B 黄体萎缩不全
- C 无排卵型功能失调性子宫出血
- D 子宫内膜息肉
- E 粘膜下子宫肌瘤

123. 产妇骨盆的几条径线低于正常的是：E

- A. 髂棘间径 24cm
- B. 髂嵴间径 27cm
- C. 骶耻外径 18cm
- D. 坐骨棘间径 10cm
- E. 坐骨结节间径 7cm

124. 二尖瓣狭窄典型的杂音是： D

- A 颈静脉怒张
- B 第一心音亢进
- C 肺动脉瓣区第二心音亢进伴分裂
- D 心尖部舒张期隆隆样杂音
- E Graham Steell 杂音

125. 合并糖尿病、蛋白尿的高血压患者降压宜用： D

- A 二氢吡啶类钙通道阻滞剂
- B 受体阻滞剂
- C 受体阻滞剂
- D 血管紧张素转化酶抑制剂
- E 中枢交感神经抑制剂

126. 抗甲状腺素最常见的不良反应： E

- A 甲状腺肿大
- B 永久性甲减
- C 肝功能损害
- D 肾功能损害
- E 粒细胞减少

127. 小儿肾病综合征出现最早的表现是： B

- A 肉眼血尿
- B 水肿
- C 少尿
- D 面色苍白
- E 精神萎靡

128. 肾盂癌常见症状： D

- A 高血压
- B 腰部包块
- C 肾绞痛并有血尿
- D 间歇无痛性血尿
- E 精索静脉曲张

129. 降血糖药能引起乳酸酸中毒是： D

D 本中酸菌生物

C α 葡萄糖苷酶抑制剂

D 双呱类

E 噻唑烷二酮类

130. 骨折的晚期并发症是：D

A 脂肪栓塞

B 休克

C 出血

D 内脏损伤

E 创伤性关节炎

131-132

A 卵黄囊

B 胆囊

C 淋巴管

D 肝脾

E 骨髓

131. 胚胎期造血 5 周出现在- A

132. . 胚胎期第 5 月的重要造血器官 D

133. 女性，51 岁，乙型肝炎病史 30 余年，2 小时前进食烧饼后突然出现呕血，量 800ML，查体：全身皮肤黏膜无黄染，无腹水，如果急诊手术，最佳的手术方式是： D

A 经颈静脉肝内门体分流术

B 非选择性门体分流术

C 选择性的门脉分流术

D 贲门周围血管离断术

E 脾切除术

134. 中度低渗性脱水补，第一天应补： D

A 1/3 张

B 1/2 张

C 2/3 张

D 等张

E 2 倍张力

135. 10 岁女孩，发热 3 周，查体：神清，胸腹部可见环形红斑，心率 160 次/MIN，奔马律，血沉 60mm/h，OT(-)，血培养（-），该患儿的可能诊断是 B

A 肺结核

B 风湿热

C 败血症

D 伤寒

E 扁桃体炎

136. 三个小儿，母乳喂养，腹泻 2 月，大便 3-4 次/日，糊状，无粘液浓血。精神食欲好，多种药物治疗无效。诊断为： D

A 霉菌性肠炎

B 病毒性肠炎

C 大肠杆菌肠炎

137 婴儿期白细胞总数维持在 B

A $>20 \times 10^9 / L$

B $15 \times 10^9 / L$ C $10 \times 10^9 / L$

D $5 \times 10^9 / L$

E $<5 \times 10^9 / L$

138. 有新月体形成的是 A

A 急进性肾小球肾炎

B 原发性肾病综合征

C 隐匿性肾炎

D 急进性肾炎

E 狼疮性肾炎

139. 一个月婴儿，冬季出生，母乳喂养，为预防佝偻病的发生，最好的办法是 C

A 母亲摄入富含钙、磷的食物

B 母亲摄入富含维生素 D 的食物

C 婴儿每日补充维生素 D 400IU

D 婴儿每日补充维生素 D 1 万 IU

E 婴儿每日肌注维生素 D 30 万 IU

140. 急性感染性心内膜炎最常见的致病菌是 B 亚急性感染性心内膜炎最常见的致病菌：E

A 乙型溶血性链球菌

B 金黄色葡萄球菌

C 革兰阴性杆菌

D 白色葡萄球菌

E 草绿色链球菌

141. 单纯性左心衰的表现： A

A. 双下肺细小湿罗音

B. 腹胀、食欲不振、恶心、呕吐

C. 颈静脉怒张

D. 水肿

E. 肝脏肿大

142. 关于计算预产期最准确的是 C

A. 开始胎动的日期

B. 开始早孕反应的日期

C. 末次月经第 1 日

D. 基础体温测定

E. 妇科检查确诊早孕日期

143. 子宫内膜腺上皮细胞的核下开始出现含糖原小泡，相当于子宫内膜周期中的 C

A、增生期中期

B、增生期晚期

C、分泌期早期

D 分泌期中期

E 分泌期晚期

144. 上消化道出血时对病因诊断最有帮助的检查方法是： B

- B. 内窥镜检查
- C. X线钡餐检查
- D. 胃粘膜活检
- E. 核素检查

145. 阑尾炎的主要症状：D

- A 畏寒、发热
- B 恶心、呕吐
- C 腹泻或便秘
- D 转移性腹痛和右下腹疼痛
- E 食欲下降

146. 输卵管绝育术并发症不包括：D

- A 出血与血肿
- B 月经异常
- C 脏器损伤
- D 子宫内膜异位症
- E 肠粘连

147. 哮喘引起电解质紊乱为：E

- A 呼吸性碱中毒
- B 呼吸性碱中毒合并代谢性碱中毒
- C 呼吸性碱中毒合并代谢性酸中毒
- D 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒
- E 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒

E 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒

148. 有机磷农药中毒导致肺水肿的主要用药是-B

- A 西地兰
- B 阿托品
- C 解磷定
- D 安定（地西洋）
- E 底塞米松

149. 子宫内膜异位症的确诊依据是 D

- A 典型病史
- B B型超声波检查
- C 血CA125增高
- D 病理组织学检查
- E 妇科检查

150 心理评估常用的方法不包括 C

- A 会谈法
- B 调查法
- C 实验法
- D 作品分析法
- E 心理测验法

151-153

- A 会谈法
- B 调查法
- C 实验法

151 应用统计图必须根据资料的性质和分析目的, 正确选择适宜的图形是: E

- A. 连续性分组资料宜选用直条图
- B. 比较两种和两种以上事物变化速度, 宜选用普通线图
- C. 表示某现象数量随另一现象而变动的幅度和趋势宜选用半对数线图
- D. 无连续关系的, 相互独立的分组资料宜选用方图
- E. 要表示构成比与分布, 可选构成图

152 肉芽肿性炎症的主要炎细胞是 C

- A 嗜中细胞
- B 淋巴细胞
- C 巨噬细胞
- D 嗜酸性粒细胞
- E 浆细胞

153 男性, 22 岁。大学生, 有礼貌, 帮助他人, 尊师爱校, 这位男同学的行为方式: E

- A 态度特征
- B 理智特征
- C 意志特征
- D 情绪特征
- E 行为特征

154-156

- A. 医生对病人的呼叫或提问给予应答
- B. 医生的行为使某个病人受益, 但却给别的病人带来了损害
- C. 妊娠危及母亲的生命时, 医生给予引产
- D. 医生给病人实施必要的检查或治疗
- E. 医生满足病人的一切要求

154 项中属于医生违背尊重原则的是 E

155. 医生违背伤害原则的是 B

156. 医生违背有利于原则的是 C

157. 不是弥漫性结缔组织病的是: B

- A 类风湿关节炎
- B 骨性关节炎
- C 系统性红斑狼疮
- D 多发性肌炎
- E 原发性干燥综合征

158. 急性梗阻性化脓性胆管炎的常见原因: B

- A 胆囊结石
- B 胆管结石
- C 胆囊癌
- D 胆管癌
- E 胆道蛔虫

159. 大多数可以经非手术治疗的是: B

- A 瘢痕性幽门梗阻
- B 胃十二指肠溃疡大出血
- C 胃十二指肠溃疡急性穿孔

160. 男性 39 岁，体重 45 千克，外伤引起的出血 800ML。经手术后已经止血，现脉搏 90 次/分，血压 105/70 血红蛋白 60，患者家属强烈要求输血，此时一生应该： E

- A 给患者输全血 200ML
- B 给患者输红细胞悬液 1 单位
- C 给患者输血浆 200ML
- D 给患者输洗涤红细胞 1 单位
- E 不给患者输血

161. 夏季，3 岁小儿突然高热，体温 40℃，惊厥一次，体检：神清、面色红、咽红、心、肺、腹（-），神经系统未见异常，最可能的诊断是 A

- A 高热惊厥
- B 中毒性痢疾
- C 流行性脑膜炎
- D 结核性脑膜炎
- E 脑脓肿

162-163

- A 肺气肿
- B 肺不张
- C 肺水肿
- D 肺脓肿
- E 肺褐色硬化

162. 慢性心力衰竭： E

163. 急性心力衰竭导致： C

164-166

女性，26 岁，产前检查发现子宫肌瘤直径 2cm，足月顺产后，阴道流血淋漓 2 月余，前日妇科检查子宫如孕 10 周，均匀增大，血 HCG 阳性。

164. 此病例最大可能是 C

- A 子宫复旧差
- B 子宫内膜炎
- C 滋养细胞疾病
- D 肌瘤变性
- E 月经不调

165 为明确诊断应行的检查是 A

- A 型超声波检查
- B 宫腔镜检
- C 盆腔 CT
- D 盆腔磁共振成像
- E 腹部平片

166 首选的治疗是 C

- A 全子宫切除+双附件切除

D 全子宫切除+化疗

E 广泛性子宫切除

167. 一成年男性，右肩部摔伤活动受限，来诊时见其以手托右侧前臂，房肩基性，将其右手搭在左侧肩部，则右肘不能靠近胸壁。应首先考虑的诊断为：A

A 肩关节脱位

B 肩锁关节脱位

C 锁骨骨折

D 肩关节周围炎

E 肩部骨折

168. 在再生障碍性贫血的治疗中，下列属于促进造血的药物是 E

A 抗淋巴细胞球蛋白

B 环孢素 A

C 环磷酰胺

D 甲泼尼龙

E 司坦唑醇（康力龙）

169. 重度贫血的血红蛋白浓度是 B

A <30G/L

B 30~50G/L

C 60~89G/L

D 90~100G/L

E >100G/L

170. 光镜下见子宫颈粘膜上皮全层异型增生并延伸到腺体，病理性核分裂相多见，但病变尚未突破基底膜，应诊断为：C

A 重度非浸润性增生

B 原位癌

C 原位癌累及腺体

D 早期浸润癌

E 浸润癌

171. 关于脊柱结核正确描述的是：B

A 主要累及棘突

B 可有拾物试验阳性

C 可有托马斯征阳性

D 手术治疗无需抗痨药物配合

E 早期易形成寒性脓肿

172. 女性，50岁，右肩痛，右上肢上举、外展受限8个月，无肩周红、肿、热等现象，疼痛可向颈、耳、前臂及手放射。最可能的诊断是：B

A 肩关节骨关节炎

B 肩周炎

C 肩关节结核

D 颈椎病

E 类风湿性关节炎

173. 输血是救治患者重要的医疗手段，为做好医疗服务，保证临床治疗效果，应当 D

A 使用全血

C 给所有手术患者输血

D 使用成分血

E 使用 3 天内采集的新鲜血

174. 很少经输血传播的病原体是：B

A 巨细胞病毒

B 脊髓灰质炎病毒

C 梅毒螺旋体

D 疟原虫

E 丙型肝炎病毒

10 个月男孩，诊断为“化脓性脑膜炎”，经有效抗生素的治疗 10 天，病情好转，体温正常，近三天又发烧、抽搐、前卤饱满，颅缝分离。

175. 首先考虑到：D

A 脑水肿

B 脑室管膜炎

C 脑性低钠血症

D 硬脑膜下积液

E 脑积水

诊断：

176 为确诊，必要的检查是：E

A 血常规

B 血培养

C 脑电图

D 脑脊髓液检查

E 头颅 CT

177. 在通常情况下，手术治疗前最重要的伦理原则是--- B

A 检查周全

B 知情同意

C 减轻病人的疑惑

D 安慰家属

E 确定手术方式

178 距肛门 7cm 的直肠癌，最适宜的手术方式是 C

A 保留肛门直肠癌切除术

B 经腹直肠癌切除、人工肛门、远端封闭术

C 腹会阴联合直肠癌根治术

D 拉下式直肠癌切除术

E 直肠镜肿瘤切除术

179. 男性 55 岁，2 天前，发生急性心肌梗死，一小时前突发喘憋、咯粉红色泡沫痰，不能平卧，既往体检时心脏听诊无异常发现。体检 BP90/60mmHg，心尖部可闻及 4/6 级粗糙的收缩期杂音，双肺满布中小水泡音及哮鸣音。该患者喘憋最可能的原因是 B

A 心肌梗死后综合征

B 心脏乳头肌断裂

C 心脏游离壁破裂

D 心室膨胀瘤

- A 皮肤过敏
- B 胃肠道症状
- C 低血糖
- D 乳酸性酸中毒
- E 水肿

181. 继发性甲减治疗用：A

- A 甲状腺素
- B 受体阻滞剂
- C 复方碘溶液
- D 氢化可的松
- E 去氨加压素

182-183

女性，76岁，因乳腺癌手术治疗，术后病理检查结果：浸润性导管癌，2cm×2cm大小，淋

巴结无转移，ER(++) PR(+)

182 该病人最佳的定性诊断方法是：E

- A 粗针穿刺活检
- B 钼靶X线摄片
- C 切取活检
- D 近红外线扫描
- E 细针穿刺细胞学

183 该病人若诊断为乳腺癌，手术方式应选择 A

- A 乳腺癌根治术
- B 乳腺癌扩大根治术
- C 保留胸大肌、小肌的乳腺癌改良根治术
- D 保留胸大肌、切除胸小肌的乳腺癌改良根治术
- E 保留乳房的乳腺癌切除术

乳房外象肿块的治疗：根治术？改良根治术？

184 骨折休克的主要原因是：B

- A 肿胀
- B 出血
- C 疼痛
- D 惊吓
- E 发热

185. 脑血栓形成的重要危害因素之一：D

- A 抽烟史
- B 蛛网膜下腔出血史
- C 脑出血史
- D 短暂脑缺血发作史
- E 梅毒史

186 最容易发生休克的肺炎是 E

- A 军团菌
- B 肺炎球菌
- C 肺炎支原体
- D 革兰阴性杆菌

D 四肢下运动神经亢进

E 双侧腓肠肌按痛

188 关于肩后位难产的正确处理是 A

A 剖宫产 B 肩法 C 续待产 D 观察产程 E 内倒转术

189. 精神性疾病观察服药后有没有效: A

A2W

B3W

C4W

D5W

E6W

190. 结核性脑膜炎最易受损的是: A

A. 外展神经 B. 面神经 C. 动眼神经 D. 滑车神经

191. 当心脏处于全心舒张期时, 下列说法正确的是: D

A 心室达到最大充盈

B 房室瓣关闭

C 心室容积不变

D 动脉瓣关闭

E 心室内压略高于心房内压

192-193

一人发生车祸 诊断骨盆骨折 尿道滴鲜血, 尿潴留

192 该诊断为 A

A 肾挫伤

B 肾实质部分裂伤

C 肾盂、肾盏裂伤

D 肾实质全层裂伤

E 肾蒂损伤

193 治疗首选 E

A 肌注安定 10 毫克

B 下腹部热敷

C 口服止痛药

D 静注氨甲酰甲胆碱

E 留置导尿管

194 女性 25 岁, 妊娠 35 周, 头痛乏力 5 天, 治疗 3 天无效。今晨突然出现腹痛, 并且逐渐加重, 呈持续性, 检查腹部发现子宫板状硬。本例最可能的诊断 B

A 轻型胎盘早剥

B 重型胎盘早剥

C 先兆子宫破裂

D 前置胎盘

E 先兆早产

195 对肝硬化诊断有确诊价值的检查是 B

A. X 线钡餐检查

B. 腹腔镜检查+活检

C. 胃镜检查

D. 腹部 B 超

- A 中央前回破坏
 - B 中央前回刺激
 - C 中央前回破坏
 - D 中央前回刺激
 - E 中央前回、中央前回均破坏
- 197 关于结核性腹膜炎的叙述错误的是 D
- A. 可长期低热或中度发热
 - B. 腹壁柔韧感是特异性体征
 - C. 腹水伴肠粘连时可无移动性浊音
 - D. 肿块易于推动，境界较清

- E. 肿块多位于脐周
- 198 26岁，初产妇，妊娠40周，规律宫缩13小时，自然破膜2小时，宫口开大4厘米，胎心110次/分，胎心监测频繁出现晚期减速，本例正确处置应是 E
- A 急查尿雌激素/肌酐比值
 - B 吸氧，左侧卧位
 - C 静注25%葡萄糖液内加维生素C
 - D 静脉滴注缩宫素，加速产程进展
 - E 立即行剖宫产术
- 199 2个月婴儿，拒食，吐奶，嗜睡3天，查体：面色青灰，前卤紧张，脐部少许脓性分泌物，最应该进行的检查是 C
- A 脐部分泌物培养
 - B 血常规检查
 - C 血培养
 - D 脑脊液检查
 - E 头颅CT检查
- 200 绞窄性肠梗阻是指肠梗阻并伴有 B
- A 肠袢两端均完全阻塞
 - B 肠壁血运障碍
 - C 肠壁穿孔、坏死
 - D 肠系膜扭转
 - E 肠腔高度扩张
- 201 急性前壁心肌梗死后24小时内出现急性肺肿时应该慎用：A
- A 西地兰
 - B 速尿
 - C 硝酸甘油
 - D 硝普钠
 - E 氨茶碱
- 202 关于脑干损伤，错误的是 B
- A 原发昏迷
 - B 双侧瞳孔大小多变
 - C 双侧病理征阳性
 - D 高热
 - E 尿崩
- 203 右侧结肠癌最常见的体征是 C

- B 溃疡型
- C 肿块型
- D 浸润溃疡型
- E 弥漫型

204 慢性支气管炎呼吸功能开始出现异常最主要的表现为 A

- A 小气道阻塞
- B FEV₁/FVC < 70%
- CMV 降低

DRV 增加

E D_{lco} 降低

205 小儿重症肺炎最常见的酸碱平衡紊乱是 E

- A 呼吸性酸中毒
- B 代谢性酸中毒
- C 呼吸性碱中毒
- D 代谢性碱中毒
- E 混合性酸中毒

206 有一个题目是被害幻想

207 母乳喂养的优点应除外 D

- A 三大物质比例适宜
- B 含很多的抗感染物质
- C 钙磷的含量很高
- D 维生素 D 含量高
- E 容易消化吸收

208 在两样本均数推断两总体均数差别的 T 检验中，无效的假设是 D

- A 两样本均数差异无统计学意义
- B 两总体均数差异无统计学意义
- C 两样本均数相等
- D 两总体均数相等
- E 两总体均数不等

209 女性，68 岁，不慎跌倒，手掌着地受伤，腕部出现“枪刺”样疾行，X 线检查证实为 COLLES 骨折。其最适合的固定方法是：D

- A 持续骨牵引
- B 持续皮牵引
- C 外固定架固定
- D 手法复位小夹板固定
- E 切开复位髓内针固定

210 疱疹性咽峡炎的主要病原体是 C

- A 流感病毒
- B 副流感病毒
- C 柯萨奇病毒
- D 单纯疱疹病毒
- E 支原体

211-212

C 金黄色葡萄球菌肺炎

D 肺炎链球菌肺炎

E 肺炎支原体肺炎

以下病例中最可能的诊断是

211 胸部 X 线长有不同程度梗阻肺气肿和支气管周围炎。或肺不张 B

212. 胸部 X 线常见肺浸润，多发生肺脓肿，肺大泡和脓胸、脓气胸 C

213 癌性放疗几次：B

A3W

B4W

C5W

D6W

E7W

214 下列疾病中属于心身疾病的是 C

A 精神分裂症

B 抑郁症

C 消化性溃疡

D 大叶性肺炎

E 精神发育迟滞

215 减少或停酒后出现情绪和睡眠障碍的现象是 E

A 病理性醉酒

B 慢性酒精中毒

C 酒精滥用

D 酒精依赖

E 戒断综合症

21615 岁，女性，月经不规则，子宫附件都是（-），需要的检查是 B

AB 型超声检查

B 基础体温测定

CX 线检查

D 雌激素水平测定

E 诊断性刮宫

217 在原发性肾小球肾炎的病理分型中，预后最好的是-D

A 轻微病变

B 硬化性病变

C 系膜毛细血管性病变

D 膜性肾病

E 局灶节段性病变

218-219

A. 癔症性遗忘

B. 癔症性失明

C. 癔症性瘫痪

D. 癔症性失音

E 癔症性抽搐

218 不属于癔症转换症状的是 A

219 癔症不引起 A

- A 言语增多
 - B 不发生幻觉
 - C 常有兴奋冲动
 - D 紧张性兴奋
 - E 被迫妄想
- 221-222

男性，18岁，在车上突然发生：口似咀嚼某物，双手不断搓捏衣角，10秒钟即过。过后不能回忆此事。类似发作10次，脑电图呈双侧额颞叶区阵发性慢波—棘慢波

221 可能的癫痫发作类型是 D

- A 单纯性部分发作
- B 失神发作
- C 全面发作
- D 复杂部分性发作
- E 全身性挛发作

222 最佳选用的治疗药物 D

- A 乙琥氨
- B 扑米酮
- C 氯硝西洋
- D 卡马西平
- E 水合氯醛

223 符合过敏性紫癜的实验检查是 E

- A 血小板减少
- B 出血时间延长
- C 凝血时间延长
- D 血块收缩不良
- E 毛细血管脆性试验可阳性

224 三级预防措施中的第一级预防是指 A

- A 病因预防
- B 三早预防
- C 临床前期预防
- D 临床期预防
- E 病残预防

225 人工流产后10天仍有出血是 C

- A 子宫穿孔
- B 子宫复旧不良
- C 吸宫不全
- D 子宫内膜炎
- E 宫颈裂伤

226 治疗小面积烧伤过程中错误的是 B

- A 局部应用抗生素溶液控制烧伤面感染
- B 全身使用抗生素预防或控制感染
- C 注射破伤风抗毒素
- D 深2度烧伤应去除水泡皮
- E 口服止痛药

- B 肺炎球菌
- C 肺炎枝原体
- D 革兰阴性杆菌
- E 金黄色葡萄球菌

228 呼吸衰竭患者缺氧的典型表现是 C

- A. 呼吸困难
- B. 呼吸急促
- C. 发绀
- D. 心率增快
- E. 神经精神症状

229 无杀菌作用的是 C

- A 氨卡西林
- B 青霉素
- C 乙胺丁醇
- D 利福平
- E 异烟肼

230 高血压患者，伴发心悸（HR99 次/分）和劳力性心绞痛时，应首选哪种药物 A

- A β 受体阻滞剂
- B 血管紧张素转换酶抑制剂
- C 受体阻滞剂
- D 钙离子拮抗剂
- E 利尿剂

231 使用环磷酰胺治疗系统性红斑狼疮的指征是 C

- A 口腔溃疡
- B 关节炎
- C 肾炎
- D 浆膜炎
- E 蝶形红斑

232 女性，18 岁，心慌，怕热、多汗、体重下降 3 个月，双手有细颤，突眼不明显，甲状腺 II 度弥漫性肿大、质地软、有血管性杂音，心率 108 次/分，两肺呼吸音清，考虑为 GRAVES 病，为明确诊断，首先要检查

甲亢首选什么检查 B

- A 甲状腺 ^{131}I 率
- B 血 TSH、FT3、FT4
- C 抗甲状腺抗体 TG-Ab、TOP-Ab
- D 甲状腺 B 型彩超
- E 甲状腺放射性核素扫描

233 男性 67 岁，身高 17cm，体重 80kg，因肺部肿瘤准备近日手术切除。术前检查空腹血糖 $102 \sim 11.8 \text{mmol/L}$ ，既往无糖尿病史，针对血糖最合理的处理是 D

- A 饮食控制
- B 服用双胍类降血糖药物
- C 服用磺脲类降血糖药物
- D 胰岛素治疗
- E 不需要治疗

- A 溶血性链球菌
- B 肺炎球菌
- C 白色葡萄球菌

- D 厌氧菌
- E 金黄色葡萄球菌

235 某地区欲找出对病人的声明威胁最大的疾病，以便制定防治对策，需要计算和评价的统计指标是 A

- A 病死率
- B 患病率
- C 死亡率
- D 患病构成比
- E 发病率

236 关节内骨折最常见的并发症是 A

- A 创伤性关节炎
- B 缺血性骨坏死
- C 骨化性肌炎
- D 骨生成异常
- E 骨折不愈合

237 对于开放性颅脑损伤的首选紧急处理应该是 C

- A 立即应用大剂量抗生素
- B 应用人工材料修补创伤性缺损
- C 立即去除创腔内异物和污染物
- D 立即应用止血剂
- E 立即应用抗癫痫药物预防癫痫

238 水杨酸易引发 B

- A 胃溃疡
- B 急性黏膜胃炎
- C 溃疡性结肠炎
- D 消化性溃疡
- E 胃黏膜脱垂

239 下列哪项病变不是维生素 D 缺乏的临床 状 C

- A 牙齿钙化发育不良
- B 牙齿萌出延缓
- C 皮肤淤斑
- D 佝偻病
- E 成人骨质疏松

240 女性，62 岁，冬季房屋内煤火取暖，次日晨被发现昏迷。查体：呼吸 30 次/分，心率 96 次/分，昏迷，口唇呈樱桃红色。最适宜的治疗是 D

- A 静脉用抗生素
- B 静脉用呼吸兴奋剂
- C 静脉用甘露醇
- D 高压氧治疗
- E 机械通气

241 胸骨左缘第 2 肋间可闻及 VI 级连续性机器样杂音，诊断为： A

D 右位心

E 大血管错位

242 男性,80岁,体重45KG因胃痛需要手术治疗。脉搏100次/分,血压140/95mmHg,Hb60g/L。血小板 90×10^9 /L,医生决定给予输血,此时应该选用 D

A 新鲜全血

B 浓缩红细胞

C 红细胞悬液

D 浓缩红细胞和血浆

E 红细胞悬液和血浆

243. 引起慢性支气管炎最常见的细菌是 C

A 奈瑟球菌

B 甲型链球菌

C 流感嗜血杆菌

D 草绿色链球菌

E 金黄色葡萄球菌

244. 风湿热诊断指标的主要表现 D

A 发热

B 关节酸痛

C 肝肿大

D 皮下结节

E 手足震颤

245 男性,25岁,腹部被倒墙压伤,中腹部剧痛伴呕吐3小时。血压120/86mmHg,体温38°C;腹胀,肌肉紧张、压痛、反跳痛阳性,肠鸣音消失,最可能的诊断是 D

A 腹膜挫伤

B 腹膜后血肿

C 肝破裂

D 小肠破裂

E 右肾挫伤

246 急性盆腔炎 A

247 维生素B12 D

248 生殖器结核 E

249 初产妇,妊娠40周,滞产,产钳助产4000g女婴,胎盘娩出后阴道流血,量时多时少,检查子宫软,本例应诊断为 D

A 胎膜残留

B 软产道损伤

C 胎盘残留

D 子宫收缩乏力

E 凝血功能障碍

250 初产妇,胎儿娩出5分钟后,阴道流血达300ML,暗红色,有凝血块,首先考虑的是 D

A 宫颈裂伤

B 凝血功能障碍

C 子宫收缩乏力

E 子宫胎盘卒中

251 医疗机构的医务人员违反献血法规定，将不符合国家规定标准的血液用于患者的，应当

B

A 由县级以上卫生行政部门处以罚款

B 由县级以上卫生行政部门责令改正

C 由县级以上卫生行政部门限期整顿

D 依法赔偿

E 依法追究刑事责任

252-253

男性，71岁，吸烟患者，反复咳嗽气喘40年，近一周来，白天嗜睡，夜间不眠。查体：BP148/90mmHg，瞳孔增大，球结膜水肿，双肺可闻及较多干湿啰音。心率120次/分，可闻及早搏，双下肢凹陷性水肿，未引起病理发射。

肺性脑病

252 该患者昏睡的最可能的原因是 D

A 脑出血

B 脑血栓

C 脑梗死

D 肺性脑病

E 代谢性碱中毒

253 进一步确定昏睡的原因，最有意义的检查是 D

A 心脏超声波

B 胸部X线

C 血气分析

D 肺部CT

E 心电图

254 男性，20岁，右胸装上后疼痛，呼吸20次/分，脉搏85次/分，胸廓挤压征阳性，胸片右肺压缩5%，最恰当的处理是 B

A 胸膜腔穿刺抽气

B 胸腔闭式引流

C 镇痛观察

D 输液

E 吸氧

255-256

24岁初产妇，妊娠39周，规律宫缩9小时入院，查：髂棘间径24cm，坐骨结节间径7.5cm。枕左前位，胎心140次/分。肛查宫口开大4cm，S=0。2小时后产妇呼叫腹痛难忍，检查宫缩1分钟一次，持续40秒，宫缩时胎心116次/分，子宫下段压痛明显。阴道检查宫口开大5cm，先露胎头

255 此时产程受阻的原因是 E

A 骨盆入口狭窄

B 骨盆出口狭窄

C 中骨盆狭窄

D 扁平骨盆

E 漏斗骨盆

256 此时，最可能的诊断是 D

A 胎儿窘迫

B 不协调性子宫收缩过强

C 不协调性子宫收缩乏力

D 先兆子宫破裂

E 重型胎盘早剥

257 应采取的措施是 E

A 即刻作宫缩应激试验，若异常行剖宫术

B 停止静滴缩宫素，继续观察产程

C 立即肌注哌替啶或地西洋

D 等待宫口开全行产钳术

E 立即行剖宫产术

258 慢性支气管炎急性发作期治疗最主要的措施是 B

A. 止咳祛痰

B. 控制感染

C. 解痉平喘

D. 菌苗注射

E. 吸氧补液

259 对判断慢性粒细胞白血病预后最有价值的是 C

A. Plt 计数

B. WBC 计数

C. Ph 染色体测定

D. 中性粒细胞碱性磷酸酶积分

E. 外周血幼稚粒细胞计数

260 某医生，争强好胜，总觉得时间不够用，说话快，走路快，脾气暴躁，容易激动，其行为类型属于 A

AA 型行为

B B 型行为

C C 型行为

D D 型行为

E E 型行为

261 女，1 岁，发热咳嗽 3 天，口周围稍紫青。用鼻前庭导管吸氧，氧流量应为 A

A0. 5~1L/分

B1. 5~2 L/分

C2. 5~3 L/分

D3. 5~4 L/分

E4. 5~5 L/分

262 某单位一周内发生伤寒病人 30 例，患率为 15%，判断该疾病发生于 E

A 流行

B 大流行

C 散发

D 爆发

E 局部流行

263 手术病人在术前[阿托品]是： B

A 防止伤口出血

B 防止麻醉或术中发生并发症

C 防止术后腹胀

D 防止术后伤口裂开

E 防止手术中呕吐

264 女性，27 岁，双手近端指间关节痛 2 个月，有时肿胀，伴不规则低热。体检双手近端指间关节有压痛，肿胀不明显，无急性。血白细胞 $3.2 \times 10^9 / L$ ，尿蛋白 100mg/dl，血沉 35mm/h，本例最可能的诊断是 D

A 风湿性关节炎

B 类风湿关节炎

C 反应性关节炎

D 系统性红斑狼疮

E 急性白血病

265. 霍乱的临床表现特点是 E

A. 发热、腹痛、大量水样便

B. 发热、剧烈腹痛、水样便或血样便

C. 发热、腹痛、粘性脓血便

D. 不发热、剧烈腹痛、剧烈呕吐、少量水样便

E. 不发热、无腹痛、大量水样便、呕吐

266 男性，50 岁，骑垮在树干上，会阴部受伤。伤后排尿困难及尿潴留，会阴部积阴囊肿胀，淤斑伴剧痛，可能的最大诊断是：E

A 会阴部软组织损伤

B 尿道球部损伤

C 尿道膜部损伤

D 膀胱破裂

E 骨盆骨折

267 女性，67 岁，活动后心悸，气短 3 年，患有慢性支气管炎 10 年病史。体检：心脏听诊发现心率 127 次/分，心率不齐。心电图 P 波小时，代之 F 波，心室律绝对不规律，QRS 波群形态正常，该患者心律不齐最可能的诊断是 B

A 室性期前收缩

B 心房颤动

C 阵发性室性心动过速

D 阵发性室上性心动过速

E 二度 I 型房室传导阻滞

268 女孩，8 岁，近一年来活动后感心悸，气促，生长发育尚可，无紫绀，胸骨左缘第 3~4 肋间可闻及第 3~4 级收缩期杂音，传导广泛，有震颤，胸片示：肺血管影增粗，肺动脉段突出，左右心室大，左心房亦增大，可能的诊断是 A

A 室间隔缺损

B 房间隔缺损

C 动脉导管未闭

D 法洛四联症

E 肺动脉狭窄

269 孕妇进入第二产程，胎头+4，胎心 120 次/分，此时的处理应该为 C

A 立即行剖宫术

B 等待自然分娩

- C 行产钳术助娩
- D 静脉滴注缩宫素加强宫缩
- E 静注地西洋（安定）加速产程进展

270-271

270 男性，55岁，有饮酒史20年，每日半斤白酒2年来间断上腹隐痛，腹胀乏力，大便不成形，双下肢水肿，B超：肝脏回升不均匀增强，脾大，少量腹水，该患者最可能的诊断是 C

- A 慢性胰腺炎
- B 胰腺癌
- C 酒精性肝硬化
- D 慢性胆囊炎
- E 胃癌

271 为明确诊断，最有价值的检查方法：C

- A 腹部CT
- B ERCP造影
- C 肝脏穿刺
- D 腹部核磁
- E 静脉胆囊造影

272 膀胱刺激症：E

- A 尿频、尿血
- B 尿急、脓尿
- C 尿痛、排尿困难
- D 血尿、脓尿、尿频
- E 尿频、尿急、尿痛

273 下列不符合腹型过敏性紫癜临床表现的是 C

- A 皮肤紫癜
- B 恶心、呕吐
- C 便秘
- D 腹泻
- E 便血

274 两岁半小儿，头大颈短，面容呆板，身高为80CM前卤未闭，乳牙18个，不会走路，反应迟钝，X线摄片见胸部有2个骨化中心，碘吸收率为19%，诊断为散发性呆小病，应尽早使用 A

- A 甲状腺片
- B 碘剂
- C 钙剂
- D 生长激素
- E 维生素D

275 男，50岁，昏倒在浴室中，被人发现送来急诊，体检：面色潮红、口唇呈樱红色。该患者最可能是 C

- A. 脑出血
- B. 心肌梗死
- C. 一氧化碳中毒
- D. 低血糖昏迷

E. 糖尿病酮症酸中毒

276 对脑和长骨的发育最为重要的激素是 B

A. 生长素

B. 甲状腺激素

C. 雄性激素

D. 雌性激素

E. 甲状旁腺激素

277 重症哮喘时最多见的酸碱失衡是 E

A 呼吸性碱中毒

B 呼吸性碱中毒合并代谢性碱中毒

C 呼吸性碱中毒合并代谢性酸中毒

D 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒

E 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒

278 男性，18 岁。慢性肾炎 5 年，肌酐清除率 65ml/min，3 天前患肺炎。应选用哪种抗生素

B

A. 卡那霉素

B. 羧苄青霉素

C. 四环素

D. 庆大霉素

E. 链霉素

279 男性，36 岁，便血 2 年，初为排便后有少量鲜血滴出，无痛，便后出血自行停止，半年
来偶有少量鲜血滴出，便后自行回缩，最可能的诊断是 D

A 直肠癌

B 混合痔

C 外痔

D 内痔

E 直肠脱垂

280 非胃肠道手术和乳腺癌根治手术，术前禁食时间是 D

A 4 小时

B 6 小时

C 8 小时

D 12 小时

E 24 小时

补充：乳腺癌根治手术，术前禁食时间也 12 小时

281 支配肱三头肌的神经是 C

A. 肌皮神经

B. 尺神经

C. 桡神经

D. 腋神经

E. 正中神经

282 哺乳期妇女患滴虫性阴道炎，适宜的治疗方法是 B

滴虫性阴道炎选甲硝唑

A 甲硝唑口服

B 甲硝唑栓置入阴道

C 甲硝唑口服及置入阴道

D 1%龙胆紫涂阴道粘膜

E 乙烯雌酚置入阴道

283 甲类传染病，要求： C

A 城市须在 3 小时之内上报卫生防疫机构

B 城市须在 4 小时之内上报卫生防疫机构

C 城市须在 6 小时之内上报卫生防疫机构

D 城市须在 7 小时之内上报卫生防疫机构

E 城市须在 8 小时之内上报卫生防疫机构

284 男性，28 岁，低热、乏力伴左上腹肿块半年，检查肝肋下 3cm 脾肋下 8cm，化验血红蛋白 85g/L，白细胞 $100 \times 10^9 / L$ ，骨髓象原始粒细胞 3%，PH 染色体阳性，正确的治疗是 C

A DA 方案

BCHOP 方案

C 羟基脲

DVP 方案

E 脾切除

285 女性，28 岁，烦渴多尿 1 年，不规则用胰岛素治疗，纳差、呕吐 3 天。体检：T 36.2℃，呼吸深大有异味。血糖 22mmol/L，尿糖(++++)，酮体(++)。最可能的诊断为 D

A. 急性肠炎+代谢性酸中毒

B. 代谢性碱中毒

C. 乳酸酸中毒

D. 糖尿病酮症酸中毒

E. 非酮症高渗性糖尿病昏迷

286 诊断消化性溃疡并发幽门梗阻最有价值的临床表现是 D

A. 易呕吐

B. 呕吐物量大

C. 呕吐物内无胆汁

D. 呕吐物内含大量宿食

E. 呕吐后症状可暂时缓解

287 某患者，因支气管哮喘住院治疗 10 余天，今晨突感左上胸短暂刺痛，逐渐感呼吸困难，不能平卧。心率 120 次/分，律不齐，左肺呼吸音减弱，此患者首先考虑并发下列何种情况 C

A. 支气管哮喘急性发作

B. 心绞痛

C. 自发性气胸

D. 肺不张

E. 急性心力衰竭

288 幽门梗阻时禁用下列哪类药物 A

A. 抗胆碱能药

B. 胶体次枸橼酸铋

C. H₂ 受体拮抗剂

D. 酸泵抑制剂

E. 抗菌药物

289 上消化道出血最常见的原因是 B

A 胃癌

- B 消化性溃疡
- C 为粘膜脱垂
- D 急性糜烂出血性胃炎
- E 肝硬化食管胃底静脉曲张

290 腹膜炎的主要标志是 E

- A 明显的腹胀
- B 剧烈的腹绞痛
- C 腹部转移性浊音
- D 肠鸣音消失或减弱
- E 腹膜刺激征

291. 预防菌痢的措施中，最重要的是 A

- A. 切断传播途径
- B. 隔离并治疗病人
- C. 治疗慢性菌痢病人
- D. 流行季节预防服药
- E. 口服多价减毒活菌苗

292~293

- A 骨髓
- B 胸腺
- C 脾
- D 中胚叶
- E 肝

292 胚胎第四周时造血器官是 D

293 胚胎第六周后主要造血器官是 E

294 消化性溃疡伴上消化道出血时候，最有效的止血措施是：E

- A 口服去甲肾上腺素盐水溶液
- B 口服凝血酶盐水溶液
- C 口服氢氧化铝凝胶
- D 静脉注射雷尼替丁
- E 静脉注射奥美拉唑

295 慢支伴小气道阻塞时，最早出现的肺功能改变是 A

- A. 流量-容积曲线降低
- B. 残气容积增加
- C. 闭合容量减小
- D. 肺最大通气量降低
- E. 第 1 秒肺活量占用力肺活量的比值减小

296 抗癫痫药物治疗用药的原则是 C

- A. 大剂量、突击、静脉用药
- B. 按发作类型短期用药，随时改变品种
- C. 按发作类型长期、规则用药
- D. 长期、规则用药，禁酒
- E. 大剂量、短期，合并用药

297 老年患者，常于夜间发作哮喘，伴频繁咳嗽，咳出泡沫痰，有时带血性，双肺底闻湿性

哮音。以下哪一种疾病可能性大 A

- A. 心源性哮喘
- B. 支气管哮喘
- C. 过敏性肺炎
- D. 肺癌
- E. 喘息型支气管炎

298 抢救糖尿病酮症酸中毒应用碳酸氢钠的指征是 D

- A. 出现低钾血症
- B. 常规应用
- C. 出现严重心律失常
- D. 二氧化碳结合力 $<5.9\text{mmol/L}$ 或血 $\text{pH}<7.1$
- E. 合并严重感染

本题正确答案：D

299 心绞痛急性发作时,为迅速缓解症状,应该选用 D

- A 皮下注射阿托品
- B 肌内注射派替啶
- C 口服对乙酰氨基酚
- D 舌下含化硝酸甘油
- E 口服硝酸甘油

300 某生参加高考前数月产生严重焦虑,来到咨询室后,该生讲述了其内心的恐惧与担心,治疗师只是认真地倾听,不做指令性指导,这种心理治疗理论属于 C

- A. 精神分析理论
- B. 认知理论
- C. 人本主义理论
- D. 心理生理理论
- E. 行为理论

