

中西医执业助理医师（中西医结合外科学）-试卷 1

(总分: 54.00, 做题时间: 90 分钟)

一、 A3/A4 型题(总题数: 1, 分数: 4.00)

患者, 65岁。在连续硬膜外麻醉下行腹股沟疝修补术, 硬膜外置管后即给予1%利多卡因和0.2%地卡因混合液(含肾上腺素)8ml, 数分钟后患者心跳呼吸骤停。(分数: 4.00)

(1). 最可能的原因是 (分数: 2.00)

- A. 局麻药对心脏的毒性
- B. 迷走反射
- C. 心肌梗塞
- D. 局麻药误入血管中毒反应
- E. 全脊麻 ✓

解析:

(2). 最有效的预防措施是 (分数: 2.00)

- A. 穿刺置管顺利
- B. 注药前回抽无血液
- C. 注药前回抽无脑脊液
- D. 正确使用试验剂量 ✓
- E. 预防性用阿托品、麻黄素

解析:

二、 B1 型题(总题数: 1, 分数: 4.00)

A. 驱蛔承气汤 B. 桃仁承气汤 C. 甘遂通结汤 D. 复方大承气汤 E. 温脾汤 (分数: 4.00)

(1). 对于肠梗阻气滞血瘀证者, 宜用 (分数: 2.00)

- A.
- B. ✓
- C.
- D.
- E.

解析:

(2). 对于肠梗阻肠腑寒凝证者, 宜用 (分数: 2.00)

- A.
- B.
- C.
- D.
- E. ✓

解析:

三、 A1 型题(总题数: 14, 分数: 28.00)

1. 不属于氯胺酮麻醉的禁忌证的是

(分数: 2.00)

- A. 高血压
- B. 冠心病
- C. 颅高压
- D. 法洛四联症 ✓
- E. 青光眼

解析: 对于法洛四联症等紫绀性先天心血管畸形者, 氯胺酮是较好的诱导药物, 它可使心排血量增加。体循环阻力增加, 可减少有向左的分流。

2. 成人失血 500~800ml，首先考虑输入的是

(分数: 2.00)

- A. 晶体液 ✓
- B. 血浆
- C. 浓缩红细胞
- D. 白蛋白
- E. 全血

解析:

3. 不属于术后镇痛的方法是

(分数: 2.00)

- A. 口服给药
- B. 肌肉注射
- C. 心理疗法 ✓
- D. 静脉注射
- E. 硬膜外腔注药镇痛

解析: 解析: 术后镇痛的方法包括口服、肌肉注射、静脉注射及硬膜外腔注射镇痛药。

4. 不属于腹腔镜胆囊切除术的禁忌证的是

(分数: 2.00)

- A. 高度怀疑胆囊癌
- B. 胆囊无功能 ✓
- C. 伴严重腹腔内感染
- D. 重度肝硬化门静脉高压症
- E. 6 个月以上妊娠

解析: 解析: 腹腔镜胆囊切除术禁忌证: ①疑有胆囊癌变; ②合并有原发性胆管结石及胆管狭窄者; ③腹腔内严重感染及腹膜炎; ④疑有腹腔广泛粘连; ⑤合并妊娠; ⑥有出血倾向或凝血功能障碍者; ⑦有严重心肺等重要脏器功能障碍而难以耐受全身麻醉及手术者。

5. 有关痈处理方法不正确的是

(分数: 2.00)

- A. 中央部坏死组织多, 全身症状重者, 应手术治疗
- B. 切口应超出炎症范围
- C. 唇痈不宜切开
- D. 尽量剪除坏死组织
- E. 切开至皮肤全层 ✓

解析:

6. 进行性血胸的诊断依据不包括

(分数: 2.00)

- A. 胸腔引流连续 3 个小时总量 300ml ✓
- B. 脉快血压持续下降
- C. Hb、RBC 反复测定呈持续下降
- D. 胸膜腔穿刺抽不出血, 但 X 线示胸内阴影增大
- E. 经输血补液后血压不回升逐渐下降

解析: 解析: 早期胸部损伤发现有血胸, 需进一步判断出血是否已经停止或还在进行。以下征象提示进行性出血: ①脉搏逐渐增快, 血压持续下降; ②经输血补液后, 血压不恢复或升高后又迅速下降; ③血红蛋白、红细胞计数和血细胞比容等重复测定, 持续降低; ④胸膜腔穿刺因血液凝固抽不出血液, 但连续 X 线胸片检查显示胸膜腔阴影继续增大; ⑤呼吸困难症状逐渐加重; ⑥闭式胸腔引流后, 引流血量每小时超过 200ml, 连续 3 小时以上。

7. 下列除哪项外, 均是血管瘤的治疗方法

(分数: 2.00)

- A. 穿刺 ✓

- B. 手术
- C. 放射
- D. 硬化剂注射
- E. 冷冻

解析：

8. 下列哪项不属于急性胰腺炎的常见病因

(分数: 2.00)

- A. 肝功异常 ✓
- B. 高脂血症
- C. 暴饮暴食
- D. 过量饮酒
- E. 梗阻因素

解析：

9. 关于甲亢手术治疗的适应证，错误的是

(分数: 2.00)

- A. 高功能腺瘤
- B. 中度以上原发性甲亢
- C. 甲状腺肿大有压迫症状
- D. 青少年患者 ✓
- E. 抗甲状腺药物或放射性 ^{131}I 治疗无效者

解析：解析：甲亢手术治疗适应证包括：①毒性弥漫性中重度甲状腺肿，长期药物治疗无效；②甲状腺很大，有压迫症状；③胸骨后甲状腺；④毒性结节性甲状腺肿；⑤毒性甲状腺腺瘤。

10. 肝硬化门静脉高压症最具诊断价值的表现是

(分数: 2.00)

- A. 腹水
- B. 食管下段、胃底静脉曲张 ✓
- C. 腹壁静脉曲张
- D. 脾肿大，脾功能亢进
- E. 黄疸

解析：解析：肝硬化门静脉高压症的始动因子是门静脉阻力的增加。在门静脉高压的后果中，依次是侧支循环建立、腹腔积液形成、脾肿大。在肝硬化早期，35%~50%的患者有脾肿大。在门静脉的侧支循环中，临幊上特别重要的是胃冠状静脉、胃短静脉与奇静脉分支间交通支，也就是食管胃底静脉丛的曲张。这一交通支离门静脉主干最近，离腔静脉主干也较近，压力差最大，经受门静脉高压也最早、最大，因而食管下段和胃底黏膜下层发生静脉曲张最早、最显著。

11. 肛管直肠周围脓肿最多见的是

(分数: 2.00)

- A. 肛门旁皮下脓肿 ✓
- B. 坐骨肛管间隙脓肿
- C. 直肠后间隙脓肿
- D. 骨盆直肠间隙脓肿
- E. 直肠黏膜下脓肿

解析：解析：直肠肛管周围脓肿的感染灶多来自肛腺。多因粪便损伤所致，引起肛腺脓肿后，上下蔓延或穿过肠壁，引起直肠肛管周围间隙的感染及扩散。最多见的是肛腺感染向下蔓延至肛门周围皮下形成脓肿，其他几种较少见，所以本题应选 A。

12. 血栓闭塞性脉管炎早期最主要的临床表现是

(分数: 2.00)

- A. 患肢萎缩
- B. 足部及小腿酸痛
- C. 持续性静息痛

D. 间歇性跛行 ✓

E. 肢端青紫

解析：

13. 不用于尖锐湿疣涂敷的药是

(分数：2.00)

- A. 10%~25%的足叶草酯
- B. 1%~5%氟尿嘧啶
- C. 30%~50%三氯醋酸
- D. 地塞米松软膏 ✓
- E. 3%~5%酞丁胺

解析：解析：尖锐湿疣药物外涂根据病情选用 10%~25%足叶草酯、1%~5%氟尿嘧啶、30%~50%三氯醋酸、3%~5%酞丁胺等疣体表面涂敷。注意保护正常皮肤黏膜。

14. 金黄膏的主要作用是

(分数：2.00)

- A. 清热消肿，散瘀化痰 ✓
- B. 清热消肿，活血化瘀
- C. 行气活血，散瘀消肿
- D. 散瘀化痰，行气止痛
- E. 清热解毒，理气消肿

解析：解析：金黄膏以散瘀消肿、清热止痛见长，因此，临床主要用于各种肿毒和跌打损伤。对于脓溃不收，烧伤和金刃所伤者，应先采取一般外科处理，然后敷药方获良效。对体表肿瘤患者，须在放疗、化疗、支持疗法的基础上外贴金黄膏，方可奏效。临床不可不察。

四、A2型题(总题数：9，分数：18.00)

15. 患者，男，60岁。颈后部肿块，红肿热痛，上有多个脓头，溃破后形似蜂窝，腐肉阻塞，脓液积蓄难出，肿痛难消。外治应首选

(分数：2.00)

- A. 八二丹、金黄膏
- B. 玉露散箍围
- C. 垫棉法
- D. 生肌散、白玉膏
- E. 切开引流术 ✓

解析：解析：本题所述重点在腐肉阻塞，积脓难出，本着急治其标的原则，应采用 E 法治疗，以迅速使引流通畅，肿痛快消。

16. 患者因外伤性肝破裂行急诊手术，术前血压 82 / 58mmHg，脉搏 130 次 / 分。下列麻醉处理原则不正确的是

(分数：2.00)

- A. 立即开放静脉，加快输血输液
- B. 纠正电解质，酸碱紊乱
- C. 待休克纠正后马上手术 ✓
- D. 首选气管内全麻
- E. 加强呼吸循环功能监测

解析：解析：外伤性肝破裂的急救处理：①首先要保持呼吸道通畅，充分给氧；②迅速建立两条以上的静脉通道保证输血输液通畅，避免重要脏器的血流灌注不足，并留置尿管，观察每小时尿量；③休克严重者可在输血、补液扩容的同时积极手术，不能等到休克纠正后再处理损伤，这样会失去挽救患者生命的机会。

17. 患者，女，28岁。手术后出现表情淡漠、嗜睡、烦躁、腹胀、心律加快，心电图早期 T 波低平、双相倒置，继之 S-T 段下降、Q-T 间期延长和 u 波出现，是因为

(分数：2.00)

- A. 轻度脱水

C. 低钾血症 ✓

D. 中度脱水

E. 重度脱水

解析：根据患者表情淡漠、嗜睡、烦躁、腹胀、心律加快，心电图早期T波低平、双相倒置，继之S-T段下降、Q-T间期延长和u波出现，诊断为低钾血症。

18. 患者，男，55岁。患肝炎已10余年，因无力、纳差、腹胀20天诊断为肝炎后肝硬化(失代偿期)入院。肝功能试验显著异常，其中白蛋白降低，球蛋白增高，白蛋白/球蛋白比率倒置。为治疗低蛋白血症，首选的血液制品是

(分数：2.00)

A. 全血

B. 新鲜冰冻血浆

C. 普通冰冻血浆

D. 白蛋白 ✓

E. 冷沉淀

解析：解析：肝硬化患者肝脏合成蛋白功能降低，自身合成不足，目前存在低蛋白血症，因此首选白蛋白。

19. 患者，男，35岁。饮酒后出现上腹疼痛，伴恶心、腹胀，血、尿淀粉酶大于1000U，疼痛向腰背部放射，应诊断为

(分数：2.00)

A. 慢性阑尾炎

B. 急性阑尾炎

C. 慢性胰腺炎

D. 急性胰腺炎 ✓

E. 急性肠梗阻

解析：

20. 患者，女，26岁。双侧乳房周期性胀痛3年，并可触及不规则包块，伴有触痛，月经过后疼痛缓解，包块略缩小，可能是由于

(分数：2.00)

A. 乳腺癌

B. 乳腺炎

C. 乳腺囊性增生病 ✓

D. 乳腺纤维瘤

E. 乳管内乳头状瘤

解析：解析：据年轻女性，与月经周期有关的乳房胀痛考虑为乳腺囊性增生病。

21. 患者，男，45岁。消化性溃疡反复发作20年，近1个月来出现食欲减退，上腹部饱胀及沉重感，呕吐频繁，呕吐量大且含有酸臭味的宿食，呕吐物中不含胆汁，吐后上腹饱胀减轻，腹痛消失，明显消瘦，可见到上腹部的胃蠕动波、胃型、胃震水声，应诊断为

(分数：2.00)

A. 消化性溃疡合并幽门梗阻 ✓

B. 肠梗阻

C. 贲门梗阻

D. 弥漫性腹膜炎

E. 食管癌

解析：

22. 患者，2岁3个月，其母发现其右腹股沟区肿块3个月，在哭闹时明显，查右腹股沟区肿块约鸽卵大小，压迫内环后肿块不出现。其手术治疗方法为

(分数：2.00)

A. McVay法

