

# 2022 中医执业医师历年真题

一、A1型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、火的特性是（ ）。

- A. 曲直
- B. 稼穡
- C. 从革
- D. 炎上
- E. 润下

【正确答案】

D

【答案解析】

①火性炎上：火热有升腾上炎的特性，故其致病多表现在人体上部。如风热上壅可见头痛、咽喉红肿疼痛；心火上炎可见口舌生疮；肝火上炎可见目赤肿痛及头痛；胃火上炎可见牙龈肿痛。②火易消灼津液：火热燔灼，最易伤津耗液，故火热之邪致病除有明显热象外，尚有汗大出，口渴喜冷饮，咽干舌燥，小便短赤，大便干结等津液耗伤症状。③火易生风动血：火热之邪易燔灼肝经，劫耗阴液，使筋脉失去滋养濡润，而致肝风内动，表现为高热、神昏谵语、四肢抽搐、两目上视、颈项强直、角弓反张等症。同时，火热之邪可加速血行，灼伤血脉，迫血妄行，而致各种出血症状，如吐血、衄血、便血、尿血、皮肤发斑及芷女月经过多、崩漏等。④火易扰心神：火热之邪入于营血，常扰乱心神，轻者心神不宁而心烦失眠，重者狂躁不安，或神昏谵语。⑤火易致疮疡：火热之邪入于血分，可聚于局部，腐蚀血肉而发为疮疡痈肿。故前人有“痈疽原是火毒生”之说。临床上以疮疡局部红肿热痛者为属阳属火。避错的最好方法是记住古典的语句“火曰炎上”。

2、关于外阴炎的叙述，不正确的是（ ）。

- A. 局部原因是外阴部与尿道、阴道和肛门邻近，经常受经血、尿液、阴道分泌物及粪便的浸渍和刺激
- B. 重者可有糜烂或溃疡
- C. 患者自觉外阴灼热、痒痛，排尿时疼痛加剧
- D. 湿热下注型外阴炎的首选方剂是柴胡疏肝散
- E. 外阴、大小阴唇肿胀充血

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

3、肾虚胎漏、胎动不安的最佳治法是（ ）。

- A. 补肾养血，益气安胎
- B. 补肾健脾，益气安胎
- C. 滋肾补肾，固冲安胎
- D. 温补肾阳，固冲安胎
- E. 补肾养肝，健脾安胎

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

4、消渴之下消证，若出现阴阳气血俱虚证。治疗应首选（ ）。

- A. 补中益气汤
- B. 六味地黄丸
- C. 归脾汤

- D. 鹿茸丸
- E. 金匱肾气丸

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

5、经筋的生理功能是（ ）。

- A. 主蓄积渗灌气血
- B. 主联络机体内外
- C. 主运行气血津液
- D. 主束骨而利机关
- E. 主经气的感应传导

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

6、某校食堂，午饭后20~30名学生进食后1小时出现严重的恶心、呕吐、烦躁、腹泻，拟诊断为食物中毒，此时重要检查应做（ ）。

- A. 血常规
- B. 大便常规
- C. 细菌培养
- D. 呕吐物等标本毒物鉴定分析
- E. X线检查

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

7、白虎加人参汤证出现背微恶寒的病机是（ ）。

- A. 阳虚阴盛，肌肤失温
- B. 痰实阻遏，阳不外达
- C. 热盛气津两伤，汗出肌腠疏松
- D. 风寒外束，卫阳被郁
- E. 寒湿凝滞，背阳不充

【正确答案】

C

【答案解析】

白虎加人参汤证为邪入阳明化热，进而耗伤气阴所致。里热逼迫津液外泄则大汗出，汗出肌疏，津气两伤，不胜风袭故见背微恶寒。

8、口服胆囊造影使用的造影剂是（ ）。

- A. 低密度造影剂
- B. 40%碘化钠
- C. 碘番酸
- D. 12.5%碘化钠
- E. 50%胆影葡胺

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

- A. 肺阴虚
- B. 脾胃阴虚
- C. 肝阴虚
- D. 肾阴虚
- E. 心阴虚

【正确答案】

B

【答案解析】

不思饮食为脾虚，运化无权；干呕，呃逆为胃气上逆；口干唇燥，大便燥结为热邪伤津液；面色潮红，舌红干少苔，脉细数为阴虚火热之象，可知本病病位在脾、胃，由阴虚火热引起。

10、与肺相表里的是（ ）。

- A. 胆
- B. 胃
- C. 大肠
- D. 三焦
- E. 膀胱

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

11、关于侵蚀性葡萄胎的特点、诊断和治疗，下列哪项错误？（ ）

- A. 多发生在葡萄胎术后6个月内
- B. 葡萄胎术后仍有阴道出血，子宫仍大于正常
- C. 葡萄胎术后8周HCG下降不满意或又升高
- D. 早期以血性转移为主
- E. 有绒毛结构滋养细胞增生伴分化不良者为侵蚀性葡萄胎的病理特点

【正确答案】

D

【答案解析】

侵蚀性葡萄胎可侵入子宫肌层，或转移至子宫以外部位，具有恶性行为。早期以局部直接蔓延，部分可血性转移至肺或其他器官。其他几项均正确。

12、患者胃脘灼痛，痛势急迫，烦躁易怒，泛酸嘈杂，口干口苦，纳呆，恶心，舌红苔黄，脉弦数。应诊断为（ ）。

- A. 胃痛之肝肾阴虚证
- B. 胃痛之肝胃郁热证
- C. 胃痛之脾胃虚弱证
- D. 胃痛之脾肾阳虚证
- E. 以上均不是

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

13、尿路感染的病原体，最常见的是（ ）。

- A. 结核杆菌
- B. 淋球菌
- C. 大肠埃希菌

D. 变形杆菌

【正确答案】

C

【答案解析】

革兰阴性杆菌是尿路感染最常见的致病菌，其中以大肠埃希菌最为常见，约占全部尿路感染的85%，其次是克雷伯杆菌、变形杆菌。

14、患者，男，42岁。小便频数，夜尿尤多，阳事无力。用药宜首选（ ）。

- A. 鸡内金
- B. 桑螵蛸
- C. 海螵蛸
- D. 乌药
- E. 益智仁

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

15、患者因乏力、心悸、头晕、感染、发热2个月来医院检查，诊断为再障，其发病首位病因是（ ）。

- A. 药物及化学物质
- B. 电离辐射
- C. 感染
- D. 慢性失血
- E. 遗传

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

16、患者从事日常活动即出现心悸、气短症状，休息后即缓解。其心功能分级应为（ ）。

- A. 心功能1级
- B. 心功能2级
- C. 心功能3级
- D. 心功能4级
- E. 以上都不是

【正确答案】

B

【答案解析】

美国纽约心脏病学会根据患者自觉的活动能力将心脏病患者心功能分为四级：

I级：患者患有心脏病，但活动量不受限制，平时一般活动不引起疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。

II级：心脏病患者的体力活动受到轻度的限制，休息时无自觉症状，但平时一般活动下可出现疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。

III级：心脏病患者体力活动明显受限，小于平时一般活动即引起上述的症状。

IV级：心脏病患者不能从事任何体力活动。休息状态下也出现心衰的症状，体力活动后加重。

17、“乳房结核，初如梅子，数月不疔，渐大如鸡子，串延胸胁，破流稀脓白汁而内实相通，外见阴虚等证”。《外科大成》这段描述的是什么病？（ ）

- A. 乳癖
- B. 慢性乳痈
- C. 乳疔
- D. 乳癆

- E. 乳疽

【答案解析】  
暂无解析。

18、按“经脉所通，主治所及”的理论，巅顶痛最好选用（ ）。

- A. 太冲
- B. 列缺
- C. 足临泣
- D. 后溪
- E. 内庭

【正确答案】

A

【答案解析】

太冲属足厥阴肝经穴，足厥阴肝经循行：向上通过横膈，分布于胁肋，沿喉咙的后面，向上进入鼻咽部，连接于“目系”（眼球连系于脑的部位），向上出于前额，与督脉会合于巅顶。故选太冲穴。

19、未婚患者适合的检查方法是（ ）。

- A. 双合诊
- B. 三合诊
- C. 肛腹诊
- D. 阴道B超
- E. 阴道窥器检查

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

20、下述哪项是宫颈癌好发部位？（ ）

- A. 鳞状上皮
- B. 柱状上皮
- C. 宫颈上皮移行带
- D. 成熟鳞状上皮化生区
- E. 宫颈糜烂面

【正确答案】

C

【答案解析】

宫颈癌好发于宫颈上皮移行带，即原始鳞柱上皮交界和新的鳞柱上皮交界之间的区域。此区的鳞状上皮是由柱状上皮转化（化生）而来，在化生过程中受到致癌因素影响时可发生癌变。

21、流行性腮腺炎的临床特征为（ ）。

- A. 腮腺非化脓性肿胀，疼痛，发热
- B. 腮腺化脓性肿胀，疼痛，发热
- C. 发热，头痛，呕吐，嗜睡
- D. 发热，头痛，睾丸肿胀、疼痛
- E. 发热，腹痛，呕吐

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

22、治疗聚之肝气郁结证，最佳方剂为（ ）。

- A. 柴胡疏肝散合失笑散加减
- B. 四逆散合血府逐瘀汤加减

E. 以上都不是

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

23、某单纯型肾病患者，有高度浮肿，蛋白尿，已服用糖皮质激素3周，尿蛋白仍未转阴，仍有浮肿，下肢明显，伴有五心烦热，面色潮红，口干咽燥，腰膝酸软，汗多便干，舌质红，苔少，脉弦细数。治疗首选方剂为（ ）。

- A. 金匱肾气丸
- B. 知柏地黄丸
- C. 八珍汤
- D. 杞菊地黄丸
- E. 六君子汤

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

24、温脾汤的组成药物中不含（ ）。

- A. 白术
- B. 附子
- C. 人参
- D. 芒硝
- E. 当归

【正确答案】

A

【答案解析】

温脾汤的组成为大黄五两；当归、干姜各三两；附子、人参、芒硝、甘草各二两。

25、口疮病变涉及脏腑主要在（ ）。

- A. 心、脾、胃、肾
- B. 心、肝、脾、胃
- C. 心、肝、肺、肾
- D. 脾、胃、肺、肾
- E. 肝、肺、肾、胃

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

26、温经汤的功用是（ ）。

- A. 温经散寒，活血祛瘀
- B. 活血化瘀，温经止痛
- C. 活血祛瘀，散结止痛
- D. 温经散寒，养血祛瘀

E. 温经散寒，养血通脉

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

- A. 荆芥
- B. 白芷
- C. 薄荷
- D. 葛根
- E. 柴胡

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

28、男，28岁，3年来反复乏力、纳差、肝区隐痛，血清转氨酶反复升高，胆红素偏高，血清球蛋白升高，类风湿因子阳性。体检：面色灰暗、肝掌及蜘蛛痣，肝右肋下2cm质地中等，脾肋下0.5cm。对此病例的诊断应是（ ）。

- A. 慢性迁延性肝炎
- B. 慢性活动性肝炎
- C. 慢性重型肝炎
- D. 胆道感染
- E. 类风湿关节炎

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

29、患者反复呕吐隔夜食物。查体：消瘦，上腹部膨胀，并见胃型。应首先考虑的是（ ）。

- A. 肝炎
- B. 肝硬化
- C. 胃炎
- D. 幽门梗阻
- E. 胆囊炎

【正确答案】

D

【答案解析】

幽门梗阻患者多有溃疡病史，吐出物通常为数小时以前所进的饮食或宿食，不含胆汁，有腐败酸味，呕吐逐渐频繁，腹部饱满并诉有移动性包块，能看见胃型和自左向右移动之胃蠕动波。叩诊上腹鼓音，振水音明显。A、B不常有呕吐，也不见胃型，多有HBsAg（+），肝功能受损；C多为不洁饮食引发的上腹部不适或出现呕吐；E进油腻食物后或夜间发作。

30、产后病的定义（ ）。

- A. 产妇在新产后及产褥期内发生的与分娩或产褥有关的疾病
- B. 产妇在新产后发生的与分娩有关的疾病
- C. 产妇在新产后及产褥期内发生的疾病
- D. 产妇在产褥期内发生的与分娩或产褥有关的疾病
- E. 产妇在产褥期内发生的疾病

【正确答案】

A

【答案解析】

产后病是指产妇在新产后及产褥期内发生的与分娩或产褥有关的疾病；B、C、D、E均不准确。

31、茯苓的功效是（ ）。

- A. 利水渗湿，清热，除痹
- B. 利水渗湿，消肿，散结
- C. 利水渗湿，止咳，除痹

E. 利水渗湿，止呕，通乳

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

32、蛇咬伤后早期结扎的松紧度应为（ ）。

- A. 能阻断动脉，但不阻断静脉和淋巴
- B. 能阻断静脉，但不阻断动脉和淋巴
- C. 能阻断淋巴，但不阻断动脉和静脉
- D. 能阻断淋巴和静脉，但不阻断动脉
- E. 能阻断动脉和淋巴，但不阻断静脉

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

33、患者，男，25岁。头痛、咽痛三四天，出现心烦郁闷，躁扰不宁，夜不能寐，小便黄，舌尖红，脉数。用药宜首选（ ）。

- A. 栀子、淡豆豉
- B. 黄连、黄芩
- C. 麻黄、石膏
- D. 栀子、黄柏
- E. 赤芍、牡丹皮

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

34、健脾和胃法最常用于哪项疾病？（ ）

- A. 阻病
- B. 经间期出血
- C. 逆经
- D. 月经先后无定期
- E. 咽痕

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

35、治疗胃痛饮食停滞证，应首选（ ）。

- A. 良附丸
- B. 理中汤
- C. 保和丸

D. 小建中汤

E. 大建中汤

【正确答案】

C

【答案解析】

胃痛饮食停滞证治宜消食导滞，和胃止痛，方选保和丸。良附丸温胃散寒，理气止痛，适用于寒邪客胃证。理中汤温中健脾，主治脾胃虚寒型腹痛。小建中汤温中补虚，和里缓急，主治虚劳里急腹痛。大建中汤温中补虚，降逆止痛，主治虚寒腹痛。



- A. 乳头部位
- B. 内上象限
- C. 外上象限
- D. 内下象限
- E. 外下象限

【正确答案】

C

【答案解析】

外上象限是乳腺癌的好发部位，约1/3的乳腺癌发生于此，是临床重点检查部位。

37、“夺血者无汗，夺汗者无血”的理论依据是（ ）。

- A. 气能生血
- B. 气能化津
- C. 气能摄血
- D. 津能载气
- E. 津血同源

【正确答案】

E

【答案解析】

血与津液的关系是津血同源。津血同源是指血和津液都来源于水谷精气，并可相互化生，两者关系密切，盛则同盛，衰则俱衰。病理上，血和津液之间也多相互影响。《灵枢·营卫生会》所说的“夺血者无汗，夺汗者无血”之说，即是“津血同源”理论的实际应用。

38、关于急性脑血管病的中医病因病机，不正确的是（ ）。

- A. 病位在脑与心、肾、肝、脾密切相关
- B. 病机归纳为虚、火、风、痰、气、血六端
- C. 病位为本虚标实、上盛下虚之证
- D. 基本病机为阴阳失调，气血逆乱，上犯于脑
- E. 发病与心、脾关系最为密切

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

39、身体浮肿，呕吐呃逆，肠鸣泄泻，口糜满布，为（ ）。

- A. 心恶
- B. 肝恶
- C. 脾恶
- D. 肾恶
- E. 脏腑败坏

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

40、女性，18岁。每次行经血量多，色紫红，味臭秽，夹有瘀块。常伴有便秘，口干。舌红苔黄，脉弦数有力。针灸取穴为（ ）。

- A. 三阴交、隐白、内关、太溪
- B. 三阴交、隐白、血海、水泉
- C. 三阴交、隐白、脾俞、足三里
- D. 三阴交、隐白、百会、气海

【正确答案】

B

【答案解析】

根据症状“色紫红，有瘀块”可判断有瘀血，根据“便秘，口干。舌红苔黄，脉弦数有力”可判断有血热，故针灸治疗除用主要穴位三阴交、隐白外，应加活血清热之穴，选项B中的血海可活血清热，水泉为肾经郄穴，阴经的郄穴擅治出血性疾病，在这里可调经止血，故该选项是正确的。

41、下列各项中，属于使药功用范畴的是（ ）。

- A. 缓和君、臣药之峻烈
- B. 消除或减低君、臣药之毒性
- C. 协助君臣药治疗兼证
- D. 针对某一症状发挥治疗作用
- E. 引药至病所或特定部位

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

42、肝主疏泄的基本生理功能是（ ）。

- A. 调畅情志活动
- B. 调畅全身气机
- C. 协助脾胃运化
- D. 促进血行和津液代谢
- E. 调节月经和精液的排出

【正确答案】

B

【答案解析】

肝的疏泄功能主要表现在三个方面：①调节气机：气机，即气的升降出入运动。机体的脏腑、经络等活动，全赖气的升降出入运动调节。肝具有疏通、畅达、促进气机正常升降出入的作用。因此，肝的疏泄功能对气机的升降出入之间的平衡协调，起着调节作用。肝的疏泄功能正常，则气机调畅，气血调和，经络通利，脏腑的功能活动也就正常协调。如果肝的疏泄功能异常，肝失疏泄，气机的疏通和畅达就会受到阻碍，从而形成气机不畅、气机郁滞，出现胸胁、两乳或小腹等局部胀痛不适；如肝的升发太过，则肝气横逆，从而形成肝气上逆的病理变化，出现头目胀痛、面红目赤、急躁易怒等症。气升太过，则血随气逆，导致吐血、咯血等血从上溢的表现；甚则可以出现卒然昏倒不省人事，称为气厥。“气行则血行，气滞则血凝”。肝气不畅，气机郁滞，而致血液运行障碍从而形成血瘀证。临床可出现胸胁刺痛、少腹痞块、月经不调、痛经等症。②促进消化功能：脾胃的运化功能与脾的升清和胃的降浊之间是否协调平衡密切相关。而肝的疏泄功能，和脾胃气机的升降密切相关。肝的疏泄，有助于脾胃的运化功能，还体现于胆汁的分泌与排泄；胆汁是肝之余气积聚而成。胆汁的分泌与排泄，实际上也是肝主疏泄功能的一个方面。肝的疏泄正常，则胆汁能正常地分泌和排泄，有助于脾胃的运化，促进消化吸收。肝的疏泄功能正常，全身气机疏通畅达，则有助于脾胃升降，共同完成消化功能；若肝的疏泄功能异常，影响脾的运化，症见两胁胀满，肠鸣泄泻。影响胃的降浊功能，在上则为呕逆、嗝气；在中则为脘腹胀满、疼痛；在下则为便秘。③调畅情志：情志，是人的精神、意识、思维活动的一个组成部分，与肝的疏泄功能密切相关。正常的情志活动有赖于气血的正常运行，肝的疏泄功能具有调畅情志的作用，实际上也是调畅气机的功能。肝的疏泄功能正常，则气机调畅，气血调和，心情开朗；肝的疏泄功能失常，则肝气郁结，心情抑郁，稍受刺激，则抑郁难解；肝的升发太过，阳气升腾而上，则情志不舒，急躁易怒，这是肝的疏泄功能对情志的影响。反之，持久的情志异常，亦影响肝的疏泄功能，而致肝气郁结，或升发太过的病理变化。由上所述应在A、B、C三项中选择，但肝主疏泄是指肝具有保持全身气机通畅，通而不滞，散而不郁的作用，故其基本功能是调畅全身气机，故正确应选择B项。

43、省、自治区、直辖市人民政府在接到应急报告时，凡是应当报告的，应当在几小时内向国务院卫生行政主管部门报告（ ）。

- A. 1小时
- B. 2小时
- C. 3小时
- D. 4小时
- E. 5小时

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

- A. 口干但不欲饮
- B. 口渴饮水不多
- C. 口渴喜热饮
- D. 口干但欲漱水不欲咽
- E. 口渴喜冷饮

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

45、指导医患双方行为的准则（ ）。

- A. 举止端庄，文明礼貌
- B. 尊重病人，一视同仁
- C. 言语谨慎，保守秘密
- D. 钻研医术，精益求精
- E. 以上都是

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

46、患者，男，58岁。头目眩晕，目胀耳鸣，脑部热痛，心中烦热，面色如醉，舌红少苔，脉弦长有力，治疗应选用（ ）。

- A. 羚角钩藤汤
- B. 防风通圣散
- C. 镇肝息风汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 天麻钩藤饮

【正确答案】

C

【答案解析】

镇肝息风汤、天麻钩藤饮均可治疗肝阳上亢所致头目晕痛。镇肝息风汤以肝肾阴虚，阴不制阳，风阳上扰，挟气血上冲为主要病机，临床应用以脑中热痛，面色如醉，脉长有力为辨证要点；而天麻钩藤饮病机为肝阳偏亢，风阳上扰，临床应用以头痛，眩晕，失眠，舌红苔黄，脉弦为辨证要点，全方力量较弱，兼具清热活血安神之力。

47、哺乳期患者，一侧乳房广泛紧韧肿硬，皮色紫红，皮肤呈橘皮样变，全身炎症反应不明显，应首先考虑为（ ）。

- A. 乳岩
- B. 乳癆
- C. 乳痈
- D. 乳发

- E. 以上都不是

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

48、《脾胃论》提出的“甘温除热”的代表方剂是（ ）。

- A. 小建中汤
- B. 黄芪建中汤
- C. 升阳益胃汤
- D. 补中益气汤
- E. 六君子汤

D  
【答案解析】  
暂无解析。

49、治疗多发性抽搐症脾虚痰聚证首选方剂为（ ）。

- A. 暖肝理脾汤
- B. 十味温胆汤
- C. 大定风珠
- D. 固真汤
- E. 六君子汤

【正确答案】

B

【答案解析】  
暂无解析。

50、下列均是抢救休克型中毒性菌痢的措施，但应除外的是（ ）。

- A. 低分子右旋糖酐
- B. 5%碳酸氢钠
- C. 西地兰
- D. 蒙脱石散
- E. 氨苄青霉素

【正确答案】

D

【答案解析】  
暂无解析。

51、患者，女，19岁。无明显不适，月经周期正常，最近体检所见子宫正常大小，子宫左侧可及一7cm×6cm×5cm硬度不均肿块，表面光滑，可活动，临床上最可能的诊断是（ ）。

- A. 子宫内膜异位囊肿
- B. 卵巢畸胎瘤
- C. 输卵管积水
- D. 浆膜下子宫肌瘤
- E. 卵巢炎性囊肿

【正确答案】

B

【答案解析】  
暂无解析。

52、阳脉之海指的是（ ）。

- A. 阳跷脉
- B. 阳维脉
- C. 带脉
- D. 督脉
- E. 冲脉

【正确答案】

D

【答案解析】

督脉总督一身之阳经，故称为“阳脉之海”。带脉能约束纵行之脉。阳跷脉和阴跷脉共同调节肢体运动，主司眼睑开合。阳维脉调节六阳经经气。冲脉能调节十二经气血，故称为十二经脉之海。其与生殖机能关系密切，冲、任脉盛，月经才能正常排泄，又称血海。

53、下列哪项不是代赭石的功效？（ ）

- C. 降逆止呕
- D. 降气平喘
- E. 重镇安神

【正确答案】

E

【答案解析】

代赭石的功效是平肝潜阳，降逆止呕，降气平喘，凉血止血，故答案是E项。

54、男性患者，28岁。1年来阵发性血压升高，发作时有剧烈头痛、面色苍白、心动过速等。平时血压正常且无症状，应首先考虑做下列哪项检查？（ ）

- A. 肾动脉造影
- B. 测定24小时尿儿茶酚胺和香草基杏仁酸
- C. 24小时尿17-羟皮质类固醇
- D. 血浆肾素活性测定
- E. 静脉肾盂造影

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

55、手厥阴心包经主治（ ）。

- A. 前头、口齿、咽喉
- B. 肝病
- C. 心病
- D. 心、胃病
- E. 前头、鼻、口、齿病

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

56、四逆汤与当归四逆汤二方组成中均含有的药物是（ ）。

- A. 当归
- B. 附子
- C. 桂枝

- D. 干姜
- E. 甘草

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

57、有关消毒的描述，正确的是（ ）。

- A. 消毒是针对有确定传染源存在的场所进行的
- B. 对传染病死亡患者的尸体按规定的处理也属消毒
- C. 对传染病住院患者污染过的物品可待其出院后集中消毒
- D. 对有病原体携带者（没有发病）存在的场所可以不消毒
- E. 饭前便后的洗手不属消毒的范畴

【正确答案】

暂无解析。

58、患者，女，44岁。心下坚满一周，自利，利后反快，虽利心下续坚满。舌苔白腻，脉沉弦。治疗宜选（ ）。

- A. 甘遂半夏汤
- B. 枳术丸
- C. 半夏泻心汤
- D. 香砂六君子汤
- E. 十枣汤

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

59、智力发展的关键期在（ ）。

- A. 3岁前
- B. 4岁前
- C. 5岁前
- D. 6岁前
- E. 7岁前

【正确答案】

E

【答案解析】

7岁前小儿脑的发育基本完成，智力发育很快，早期教育智力开发至关重要，可塑性很强。

60、膻中又称作（ ）。

- A. 气海
- B. 血海
- C. 髓海
- D. 水谷之海
- E. 经脉之海

【正确答案】

A

【答案解析】

宗气又称大气，是积于胸中之气。《灵枢·海论》说：“膻中者，为气之海。”宗气在胸中积聚之处，称作“气海”，又称“膻中”。

61、有关医院感染的概念，错误的是（ ）。

- A. 是指在医院内获得的感染
- B. 出院之后的感染有可能是医院感染
- C. 与上次住院有关的感染是医院感染
- D. 入院时处于潜伏期的感染一定不是医院感染
- E. 婴幼儿经胎盘获得的感染属医院感染

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

62、肺心病肺动脉高压形成的主要原因是（ ）。

- A. 肺细小动脉痉挛
- B. 肺血管玻璃样改变
- C. 血容量增加
- D. 右心室肥大

【正确答案】

A

【答案解析】

肺心病肺动脉高压早期，右心室尚能代偿，随着病情进展，特别是急性加重期，肺动脉压持续升高，超过右心室的代偿能力，右心失代偿。故本题选A。

63、关于意识障碍的说法，不正确的是（ ）。

- A. 中毒性肺炎可以导致意识障碍
- B. 尿毒症很少发生意识障碍
- C. 心血管疾病因脑组织缺氧可发生意识障碍
- D. 某些理化因素引起的脑组织受损可导致意识障碍
- E. 颅脑疾患是引起意识障碍的常见病因

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

64、患者，男，69岁，反复咳嗽、喘息20余年，加重伴少尿、双下肢水肿偶来院。查体：颈静脉怒张，双肺散在湿啰音及哮鸣音，心率120次/分，律齐，肝肋下2cm，双下肢压迹(+)，该病人关键的治疗措施为（ ）。

- A. 祛痰止咳
- B. 预防心律失常
- C. 控制呼吸道感染
- D. 纠正酸碱平衡失调
- E. 强心利尿

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

65、下列关于内生肌酐清除率的叙述，正确的是（ ）。

- A. 肾功能严重损害时，开始升高
- B. 高于80mL预后不良
- C. 肾功能损害愈重，其清除率愈低
- D. 肾功能损害愈重，其清除率愈高

- E. 其测定与肾功能损害程度无关

【正确答案】

C

【答案解析】

在严格控制饮食条件和肌肉活动相对稳定的情况下，血肌酐的生成量和尿的排出量较恒定，其含量的变化主要受内源性肌酐的影响，而且肌酐分子量为113，大部分从肾小球滤过，不被肾小管重吸收，排泌量很少，故肾单位时间内把若干毫升血液中的内在肌酐全部清除出去，称为内生肌酐清除率。成人80~120mL/min，老年人随年龄增长有自然下降趋势，肾功能损害愈重，其清除率愈低。

66、下列哪项多为胃热病人的口气？（ ）

- A. 腥气
- B. 腐臭气
- C. 臭秽气
- D. 恶臭气
- E. 酸气

【正确答案】

C

【答案解析】

- A. 有利于医学和社会发展
- B. 受试者知情同意
- C. 试验者多数同意
- D. 严谨认真的科学态度
- E. 有科学对照

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

68、与白血病的发病关系不密切的是（ ）。

- A. 氯霉素
- B. 病毒
- C. 遗传因素
- D. 电离辐射
- E. 饮食因素

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

69、以下哪一项属于白疔的病因病机？（ ）

- A. 风湿热之邪阻滞肌肤，日久血虚生风化燥而成
- B. 多因素体营血亏损，血热内蕴，化燥生风，肌肤失养而成
- C. 禀赋不耐，皮肤腠理不密，毒邪入侵，蕴郁化热，与气血相搏而成
- D. 总由禀赋不耐，邪毒侵犯所致
- E. 以上均不是

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

70、患者，男，30岁，在进行胸部听诊时，发现肺部呼吸音声似“哈”音，音强、调高、吸气时弱而短，呼气时强而长，应考虑为（ ）。

- A. 支气管肺泡呼吸音
- B. 正常支气管呼吸音
- C. 正常肺泡呼吸音
- D. 肺泡呼吸音，呼吸时间延长
- E. 支气管呼吸音，呼吸时间延长

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

71、妊娠伴急性病毒性肝炎的严重性不包括（ ）。

- A. 发生在妊娠早期，可加重早孕反应，且易误诊失治
- B. 发生在妊娠晚期，可使妊娠期高血压疾病的发生率增加
- C. 容易发生产后出血
- D. 重症肝炎常并发
- E. 以上都不是



【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

72、属于“五行相侮”的脏病传变是（ ）。

- A. 心病及脾
- B. 心病及肾
- C. 心病及肺
- D. 心病及肝
- E. 脾病及心

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

73、高血压性脑出血最主要的诱发因素是（ ）。

- A. 外伤
- B. 感染
- C. 电解质紊乱
- D. 情绪激动或过度用力
- E. 高脂血症

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

74、患者，男，70岁。患有“冠心病”8年。今上午突然心痛剧作，面色青灰，冷汗淋漓，四肢厥冷，呼吸微弱，舌淡白，苔白润，脉微欲绝。其证候是（ ）。

- A. 心阳虚证
- B. 寒凝心脉证

- C. 痰阻心脉证
- D. 气滞心脉证
- E. 心阳暴脱证

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

75、患者，男，56岁。进行性尿频、排尿困难1年。应首先考虑的是（ ）。

- A. 急性前列腺炎
- B. 尿道结石
- C. 前列腺增生症
- D. 肾结石
- E. 膀胱结石

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

二、A<sub>2</sub>型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个

1、无过错输血感染造成不良后果的，属于（ ）。

- A. 一级医疗事故
- B. 二级医疗事故
- C. 三级医疗事故
- D. 四级医疗事故
- E. 不属于医疗事故

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

2、某男，55岁。高血压病史10年。3日前，头晕目眩，下肢麻木，胸闷，昨夜突然昏迷，呼吸困难，经心肺复苏急救苏醒，继续进行脑复苏治疗，不正确的是（ ）。

- A. 降温脱水
- B. 大剂量硫喷妥钠
- C. 尼莫地平联合用药
- D. 高压氧治疗
- E. 自由基清除剂

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

3、甘露消毒丹的功用是（ ）。

- A. 宣畅气机，清热解毒
- B. 宣畅气机，清利湿热
- C. 利湿化浊，清热解毒

- D. 清热化湿，理气和中
- E. 利湿化浊，利水通淋

【正确答案】

C

【答案解析】

甘露消毒丹重用滑石、茵陈、黄芩，其中滑石清热解暑，渗利湿热；茵陈清利湿热而退黄；黄芩清热燥湿，泻火解毒，共为君药。石菖蒲、藿香、白蔻仁芳香化浊，行气悦脾；木通清热利湿通淋，共为臣药。连翘、射干、贝母、薄荷清热解毒，散结消肿，为佐药。全方共奏利湿化浊，清热解毒之功。

4、既能运脾消食，固精止遗，又能化坚消石的药物是（ ）。

- A. 神曲
- B. 麦芽
- C. 鸡内金
- D. 贯众
- E. 莱菔子

【正确答案】

C

【答案解析】

鸡内金功效是消食健胃，固精止遗，化坚消石。神曲消食和胃，善消金石贝壳之品，略兼解表之功。麦芽的功效是消食和中，回乳消胀，善消谷面积滞。莱菔子消食除胀，降气化痰。贯众的功效是清热解毒，凉血止血，能杀绦虫、钩虫、蛲虫等。

5、小剂量阿司匹林预防血栓形成的机制是（ ）。

- C. 抑制环氧酶，减少血栓素A<sub>2</sub>生成
- D. 抑制环氧酶，减少前列环素生成
- E. 直接溶解血栓

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

6、主要作用是延长动作电位时程和有效不应期的抗心律失常药物是（ ）。

- A. 奎尼丁
- B. 维拉帕米
- C. 利多卡因
- D. 普萘洛尔
- E. 胺碘酮

【正确答案】

E

【答案解析】

胺碘酮阻滞钾通道、抑制K<sup>+</sup>外流，明显抑制复极过程，延长动作电位和有效不应期，用于各种室上性和室性心律失常。

7、慢性肾功能不全的主要病机是（ ）。

- A. 肾与膀胱气化失司
- B. 肺气不宣，脾失健运
- C. 脾肾两虚，精微下注
- D. 脾肾亏虚，湿浊内聚
- E. 肺脾气虚，卫表不固

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

8、库瓦济埃征阳性应考虑（ ）。

- A. 胆囊炎
- B. 胆石症
- C. 胰头癌
- D. 肝脓肿
- E. 溶血性黄疸

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

9、某男，58岁，因糖尿病合并皮肤感染长期服用四环素，近来咽部出现白色薄膜，并伴腹泻，宜选用（ ）。

- A. 磺胺甲恶唑
- B. 阿昔洛韦
- C. 红霉素
- D. 制霉菌素
- E. 甲硝唑

【正确答案】

D

10、伴有左心室肥厚的高血压患者降压立首选（ ）。

- A. 卡托普利
- B. 硝苯地平
- C. 普萘洛尔
- D. 利血平
- E. 氢氯噻嗪

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

11、消谷善饥兼大便溏泄者，属（ ）。

- A. 胃强脾弱
- B. 脾胃虚弱
- C. 肝胆湿热
- D. 痰湿困脾
- E. 食滞胃脘

【正确答案】

A

【答案解析】

胃的消磨功能过亢，则消谷善饥；脾虚健运，脾的运化功能减弱，则大便溏泄。所以本题选择A项。

12、与女子胞生理功能最为密切的是（ ）。

- A. 心、肝、脾、冲脉、督脉
- B. 心、肝、肾、冲脉、带脉

- C. 心、肝、肾、冲脉、督脉
- D. 心、脾、冲脉、带脉、任脉
- E. 心、肝、脾、肾、冲脉、任脉

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

13、肝硬化食管静脉曲张破裂大出血休克时，首选治疗为（ ）。

- A. 人工冬眠
- B. 卧床休息
- C. 药物止血
- D. 补充液体
- E. 紧急输血

【正确答案】

D

【答案解析】

肝硬化食管静脉曲张破裂大出血休克时，应立即查血型和配血，尽快建立有效的静脉输液通道，在配血过程中，可先输平衡液或葡萄糖盐水。

14、雷尼替丁抑制胃酸分泌的机制是（ ）。

- A. 阻断H<sub>1</sub>受体
- B. 阻断H<sub>2</sub>受体
- C. 阻断M<sub>1</sub>受体
- D. 促进PGE<sub>2</sub>合成

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

15、辛味药的作用之一是（ ）。

- A. 补益
- B. 活血
- C. 利尿
- D. 收敛
- E. 通便

【正确答案】

B

【答案解析】

辛味具有发散、行气行血的作用。

16、患者，女，47岁，五心烦热，潮热盗汗，腰酸腿软，行走无力，舌质红，脉细。用药宜首选（ ）。

- A. 龟甲
- B. 牡蛎
- C. 知母
- D. 黄柏
- E. 地骨皮

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

17、下列哪项不属于哮喘的临床特征？（ ）

- A. 发热
- B. 喘息气促
- C. 喉间痰鸣
- D. 呼气延长
- E. 甚者紫绀

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

18、治疗硬肿症阳气虚衰证首选方是（ ）。

- A. 四逆汤
- B. 参附汤
- C. 金匮肾气丸
- D. 当归四逆汤
- E. 血府逐瘀汤

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

19、完全断奶时间一般在（ ）。

- A. 6~8个月，最迟不超过10个月

- C. 6~10个月, 最迟不超过1岁半
- D. 10~12个月, 最迟不超过1岁半
- E. 12~18个月, 最迟不超过2岁

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

20、患者腹大胀满, 按之如囊裹水, 伴下肢水肿, 胸脘痞胀, 精神困倦, 怯寒懒动, 尿少便溏, 舌苔白腻, 脉缓。其治法是 ( )。

- A. 温中健脾, 行气利水
- B. 温补脾肾, 化气行水
- C. 健脾益气, 化气行水
- D. 理气疏肝, 化瘀利水
- E. 健脾渗湿, 行气利水

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

21、氯丙嗪不适用于 ( )。

- A. 低温麻醉
- B. 抑郁症
- C. 人工冬眠

- D. 精神分裂症
- E. 呕吐

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

22、对幽门螺杆菌有杀灭作用的抗溃疡药物是 ( )。

- A. 雷尼替丁
- B. 西咪替丁
- C. 枸橼酸铋钾
- D. 奥美拉唑
- E. 氢氧化铝

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

23、入汤剂宜后下的是 ( )。

- A. 佩兰、藿香
- B. 藿香、草果
- C. 砂仁、白豆蔻
- D. 郁李仁、砂仁
- E. 以上均不是

【正确答案】

C

【答案解析】

- )。。
- A. 气营热盛证
  - B. 瘀热伤肝证
  - C. 脑虚瘀热证
  - D. 瘀热痹阻证
  - E. 气分热盛证

【正确答案】

C

【答案解析】

患者脉细数，为阴虚之象，真阴不足，水亏火旺，复受外感，郁而化热，血热则瘀，阻塞脑络而见高热，体温38.7℃，肢厥，神昏谵语，舌蹇。舌色鲜绛亦为热象，故证属脑虚瘀热证。

25、下列哪项是普通型流行性脑脊髓膜炎脑膜炎期的病变部位？（ ）

- A. 硬脑膜
- B. 脑组织
- C. 蛛网膜
- D. 软脑膜和蛛网膜
- E. 软脑膜

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

三、B1型题（以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次，多次或不被选择。）

1、（共用备选答案）

- A.礞石滚痰丸
- B.半夏秫米汤
- C.琥珀多寐丸
- D.保和丸
- E.天王补心丹

1. 胸闷泛恶，彻夜不寐，大便秘结者，当用（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2. 不寐而脘腹胀满，嗝腐吞酸者，当用（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2、（共用备选答案）

- A.荆芥 防风 牛蒡
- B.荆芥 白芷 牛蒡
- C.荆芥 薄荷 秦艽
- D.荆芥 白芷 羌活

1. 消风散的组成药物中含有（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 川芎茶调散的组成药物中含有（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

3.（共用备选答案）

A.胸部刺痛，入夜尤甚

B.胸闷隐痛，时作时止

C.胸闷如窒，气短喘促

D.胸闷气短，畏寒肢冷

E.胸痛彻背，感寒痛甚

1. 胸痹气阴两虚证，其临床特点是（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 胸痹阴寒凝滞证，其临床特点是（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

4.（共用备选答案）

A.支气管哮喘

B.支气管扩张

C.慢性支气管急性发作期

D.慢性支气管炎慢性迁延期

E.慢性支气管炎临床缓解期

1. 患者女性，67岁。有慢性咳嗽史12年，近日感冒后加重，咳嗽，气息喘促，胸中烦闷胀痛，痰多色黄黏稠，痰中带血，渴喜冷饮，面红咽干，苔黄腻，脉滑数。此人为什么病？（ ）

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 某男，患咳嗽病多年，近两月来咳嗽气短，痰涎清稀，反复感冒，自汗畏风。查体背部双下肺可闻及湿性啰音。应诊断为（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

5.（共用备选答案）

A.青色、赤色



E.赤色、黑色

1. 出现瘀血证时，面部颜色可见（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2. 水湿内停时，面部颜色可见（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

黑色与青色皆主瘀血证。黄色与黑色皆主水湿内停。

6. (共用备选答案)

A.寒湿阻络

B.血脉瘀阻

C.湿热毒盛

D.热毒伤阴

E.气阴两虚

1. 脱疽表现为患肢暗红、紫红或青紫，下垂更甚，肌肉萎缩，趺阳脉搏动消失，患肢持久性疼痛，夜间尤甚。其证候是（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2. 脱疽表现为患肢暗红而肿，患肢如煮熟之红枣，渐变为紫黑色，呈浸淫蔓延，溃破腐烂。疼痛异常，彻夜不得安眠。其证候是（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

寒湿阻络，见患趾（指）喜暖怕冷，肤色苍白冰凉，麻木疼痛，遇冷痛剧。步履不利，多走则疼痛加剧，小腿酸胀，稍歇则痛缓（间隙性跛行）。苔白腻，脉沉细，趺阳脉减弱或消失。血脉瘀阻，见患趾（指）酸胀疼痛加重，步履沉重乏力，活动艰难。患趾（指）肤色由苍白转为暗红，下垂时更甚，抬高则见苍白。小腿可有游走性红斑、结节或硬索，疼痛持续加重，彻夜不能入寐。舌暗红或有瘀斑，脉弦或涩。趺阳脉消失。湿热毒盛，见患肢剧痛，日轻夜重，喜凉怕热。局部皮肤紫暗，肿胀，渐变紫黑，浸淫蔓延，溃破腐烂，气秽，疮面肉色不鲜，甚则五趾相传，波及足背，或伴有发热等症。舌红，苔黄腻，脉弦数。热毒伤阴，见皮肤干燥，毫毛脱落，趾（指）甲增厚变形，肌肉萎缩，趾（指）多呈干性坏疽。舌红，苔黄，脉弦细数。气血两虚，见面容憔悴，萎黄消瘦，神情倦怠。坏死组织脱落后疮面久不愈合，肉芽暗红或淡红而不鲜。舌淡胖，脉细无力。

7. (共用备选答案)

A.面瘫局部选颊车、地仓

B.胃痛选足阳明胃经的足三里

C.胃火牙痛选内庭、二间

D.哮喘选定喘穴

E.肝阳化风导致的抽风选太冲、行间

1. 属于近部选穴的是（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2. 属于远部选穴的是（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

- A.相对密度>1.018, 蛋白定量<25g/L, 白细胞>400×106/L  
B.相对密度<1.018, 蛋白定量<35g/L, 白细胞>500×106/L  
C.相对密度>1.018, 蛋白定量>30g/L, 白细胞>500×106/L  
D.相对密度<1.018, 蛋白定量<25g/L, 白细胞<100×106/L  
E.相对密度>1.018, 蛋白定量>30g/L, 白细胞<100×106/L

1. 浆膜腔渗出液 ( )。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2. 浆膜腔漏出液 ( )。

【正确答案】

D

【答案解析】

这是两道记忆题, 浆膜腔渗出液相对密度>1.018, 蛋白定量>30g/L, 白细胞>500×106/L; 浆膜腔漏出液相对密度>1.018, 蛋白定量<25g/L, 白细胞<100×106/L。

9、(共用题干)

张某, 男, 40岁, 胃脘胀满, 攻撑作痛, 脘痛连胁, 暖气频繁, 大便不畅, 每因情志因素而痛作, 苔薄白, 脉弦。

1. 此时辨证属于 ( )。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2. 若经治疗后未见好转, 而见胃脘灼痛, 痛势急迫, 烦躁而怒, 泛酸嘈杂, 口干口苦, 舌红苔黄, 脉弦数。治疗宜 ( )。

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

3. 若治疗后仍不见好转, 症见吐血, 面赤舌红, 心烦便秘, 脉弦数有力等, 治疗宜 ( )。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

4. 若治疗后, 症状有所好转, 症见胃脘隐痛, 口燥咽干, 大便干结, 舌红少津, 脉细数, 治疗宜 ( )。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

10、(共用备选答案)

- A.喜伤  
B.怒伤  
C.思伤  
D.悲伤  
E.恐伤

1. 胆怯易惊, 恐惧不安属于 ( )。

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

11、（共用备选答案）

- A.利水渗湿，健脾止泻
- B.利尿通淋，渗湿止泻，明目，祛痰
- C.化湿行气，温中止泻
- D.清热解毒，燥湿止泻
- E.利尿通淋，破血通经

1. 瞿麦的功效是（ ）。

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

2. 车前子的功效是（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

12、（共用备选答案）

- A.曲池、神门
- B.心俞、脾俞
- C.肝俞、太冲
- D.膈俞、内关
- E.合谷、风池

1. 痫证属于瘀阻脑络者，除选主穴外，宜加用（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2. 痫证属于痰火扰神者，除选主穴外，宜加用（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

13、（共用备选答案）

- A.头皮下血肿
- B.帽状腱膜下血肿
- C.骨膜下血肿
- D.颅骨凹陷性骨折
- E.头皮裂伤

1. 以骨缝为界，质地坚硬，常见于新生儿产伤的是（ ）。

【答案解析】  
暂无解析。

2. 易于发现，疼痛较重，扣诊时有凹陷感，易误认为是凹陷性颅骨骨折的是（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】  
暂无解析。

