

2022执业医师考试真题及答案

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、某幼儿园小班发现一患白喉的小朋友，那么对同班小朋友应采取下列哪项紧急预防措施？（ ）

- A. 注射丙种球蛋白
- B. 注射白喉类毒素
- C. 注射白喉抗毒素
- D. 注射百白破三联疫苗
- E. 注射抗生素

『正确答案』

C

『答案解析』

白喉是由白喉棒状杆菌引起的急性呼吸道传染病，主要通过呼吸道飞沫或与感染病人接触传播。按计划注射百白破（含白喉类毒素）三联疫苗是预防白喉的根本措施；注射白喉抗毒素是紧急预防的主要措施。

2、辅助生育技术运用的医德要求不包括（ ）。

- A. 严格保密，实行三盲法
- B. 严格履行知情同意程序，尊重供受双方的意愿
- C. 坚持为计划生育和优生优育服务的目的，严格掌握适应症
- D. 坚持为大众服务的原则，任何人都可以使用
- E. 精心施术，确保手术安全和质量

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

3、下述哪一项结果不符合溶血性贫血？（ ）

- A. 骨髓幼红细胞增加
- B. 网织红细胞增加
- C. 尿中尿胆原排泄增加
- D. 血中非结合性胆红素增加
- E. 血清结合珠蛋白增加

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

4、治疗化脓性脑膜炎，选择易透过血脑屏障的药物，以哪一种抗生素为最好？（ ）

- A. 氨苄西林
- B. 青霉素
- C. 庆大霉素
- D. 氯霉素
- E. 先锋霉素

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

5、2岁患儿，自幼反复肺炎，身体瘦弱。查体：发育落后，胸骨左缘第2肋间听到收缩期、舒张期双期杂音，X线示左房、左室增大，主动脉弓增大，最可能的诊断为（ ）。

- A. 室间隔缺损
- B. 房间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

『正确答案』

C

『答案解析』

动脉导管未闭特点：左房、左室大；胸骨左缘第2肋间粗糙响亮的连续性机器样杂音；X胸片左心大，主动脉弓增大。

6、74岁，男性，跌倒后致股骨头头下型骨折有移位。选择哪种治疗最合适？（ ）

- A. 骨牵引治疗
- B. 皮牵引治疗
- C. 髋人字石膏固定
- D. 股骨粗隆间截骨术
- E. 人工股骨头置换术

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

7、关于尊重原则，下列描述正确的是（ ）。

- A. 尊重原则是指尊重那些值得尊重的人和他们的决定
- B. 尊重原则是指尊重所有的人和他们的决定
- C. 尊重原则不包括尊重那些没到法定年龄的人和他们的决定
- D. 尊重原则也包括尊重那些没到法定年龄的人，有时甚至还包括他们的有些决定
- E. 尊重原则与有利原则冲突时，绝对要以尊重原则为主

『正确答案』

D

『答案解析』

尊重原则，要求尊重的是自主的人和他的自主决定。自主的人不完全以是否达到法定年龄来定，有的达到法定年龄，但没有自主能力的人的决定也不能尊重。所以要根据病人的自主能力情况来定尊重的是什么。故本题答案为D项。

8、过敏性紫癜哪一种类型最常见？（ ）

- A. 皮肤型
- B. 肾型
- C. 关节型
- D. 腹型
- E. 中枢神经系统受累

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

9、小儿化脓性脑膜炎，最可靠的诊断依据是（ ）。

- A. 脑脊液细胞数显著增加
- B. 脑脊液外观混浊或脓性

- D. 脑脊液检菌阳性
- E. 脑膜刺激征阳性

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

10、有关输血的适应证，正确的是（ ）。

- A. 出血补充血容量
- B. 纠正贫血或低蛋白血症
- C. 严重感染输入抗体补体
- D. 凝血异常补充各种凝血因子
- E. 以上均正确

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

11、就医学伦理学的学科性质而言，在伦理学理论中属（ ）。

- A. 描述伦理学
- B. 传统伦理学
- C. 元伦理学
- D. 应用伦理学
- E. 精神伦理学

『正确答案』

D

『答案解析』

医学伦理学的学科性质是医学和伦理学的交叉学科，从伦理学的角度而言，属于应用伦理学。故本题答案为D项。

12、急性肾小球肾炎水肿的主要机制为（ ）。

- A. 肾小球滤过率下降，水钠潴留
- B. 低蛋白血症
- C. 毛细血管通透性增加
- D. 继发性醛固酮增多症
- E. 抗利尿激素增加

『正确答案』

A

『答案解析』

急性肾小球肾炎的病理特点决定了其水肿机制。由于肾小球滤过率降低，肾小管重吸收功能正常，造成球-管失衡和肾小球滤过率下降，因而水、钠排泄减少。水、钠潴留，血容量常增多，血压升高。此外，毛细血管通透性增高可进一步加重水肿。

13、原发性三叉神经痛的诊断最重要的依据是（ ）。

- A. 脑电图的检查
- B. 头部CT检查
- C. 临床的症状体征
- D. 药物治疗效果
- E. 手术治疗效果

『正确答案』

C

『答案解析』

14、患者女性，35岁，外伤后患肢垂腕畸形，各指、掌指关节不能伸直，拇指不能伸直，手背桡侧皮肤感觉麻木，考虑哪条神经损伤（ ）。

- A. 尺神经
- B. 桡神经
- C. 正中神经
- D. 腋神经
- E. 肌皮神经

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

15、下列哪项是免疫球蛋白分子对胃蛋白酶敏感的有关部位？（ ）

- A. CH₁、CL
- B. VH、VL
- C. CH₂
- D. CH₃
- E. 铰链区

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

16、门脉高压症合并食管静脉曲张手术治疗的最主要目的是（ ）。

- A. 防止肝癌的发生
- B. 减少腹腔积液
- C. 预防上消化道出血
- D. 防止肝功能衰竭
- E. 提高抵抗力

『正确答案』

C

『答案解析』

门脉高压症的外科治疗主要是针对并发症脾亢、消化道出血和腹水的治疗。肝硬化患者中仅有40%出现食管胃底静脉曲张，而这部分患者中有50%~60%并发大出血，这说明有食管胃底静脉曲张的患者不一定并发出血。外科治疗的目的是预防上消化道出血。

17、一般来说下列传染病感染后免疫持续时间最长的是（ ）。

- A. 病毒性传染病
- B. 细菌性传染病
- C. 螺旋体性传染病
- D. 原虫性传染病
- E. 蠕虫病

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

18、下列不属于IV型超敏反应的是（ ）。

- A. 接触性皮炎
- B. 移植排斥反应

- D. 寻麻疹
- E. 以上都不是

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

19、先天性风疹综合征(CRS)即胎儿或新生儿患先天性白内障(失明)、心脏病、耳聋等缘由孕妇()。

- A. 在孕期1~5个月患风疹
- B. 在孕期6~7个月患风疹
- C. 在孕期8~9个月患风疹
- D. 分娩时患风疹
- E. 缺乏血清特异性风疹抗体

『正确答案』

A

『答案解析』

先天性风疹综合征是由于孕1~5个月感染风疹，风疹病毒通过胎盘感染胎儿，导致胎儿的先天性畸形。出生的新生儿可为未成熟儿、先天性心脏病、白内障、耳聋、发育障碍等，称为先天性风疹，或先天性风疹综合征。

20、治疗小儿肺炎球菌性肺炎，首选抗生素是()。

- A. 青霉素
- B. 氯霉素
- C. 红霉素
- D. 氨苄青霉素
- E. 羟氨苄青霉素

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

21、下列选项中，哪项不属于无张力疝成形术的优点？()

- A. 适应于某些有腹压增高的患者
- B. 术后下地早，恢复快
- C. 复发率低
- D. 较常规手术不易感染
- E. 缝合张力小

『正确答案』

D

『答案解析』

无张力疝修补术是在无张力情况下，利用人工高分子修补材料进行缝合修补，克服了传统疝修补术的缺点，如缝合张力大、术后手术部位有牵扯感、疼痛等，其具有术后疼痛轻、恢复快、复发率低等优点；由于无张力，因此适用于某些右腹压增高的患者；但是人工高分子修补材料毕竟属于异物，因此有潜在的排异和感染危险，故临幊上应选择适应证应用。

22、受体激动剂的特点是()。

- A. 与受体有亲和力，有内在活性
- B. 与受体有亲和力，有弱的内在活性
- C. 与受体有亲和力，无内在活性
- D. 与受体无亲和力，有内在活性
- E. 与受体有亲和力，有强的内在活性

『正确答案』

A

23、女性，24岁，贫血1年，血红蛋白 $809/\text{L}$ ，红细胞 $3.0\times 10^{12}/\text{L}$ ，网织红细胞2.7%，白细胞、血小板正常，经用铁剂治疗7天后，血红蛋白不升，网织红细胞4.3%，最可靠的诊断是（ ）。

- A. 铁粒幼细胞性贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 营养性巨幼红细胞性贫血
- D. 溶血性贫血
- E. 以上都不是

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

24、男性，70岁，高中文化，患糖尿病，高血压多年，有脑卒中病史10多年，近2年来出现话多，常为重复话题，情绪不稳，计算力逐渐减退，有时不能算出100以内的减法，自觉记忆力下降明显，此病人最可能的诊断是（ ）。

- A. 遗忘综合征
- B. 阿尔茨海默病
- C. 血管性痴呆
- D. 假性痴呆
- E. 意识障碍

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

25、6-磷酸葡萄糖脱氢酶缺陷的病人可导致溶血性贫血，被称为蚕豆黄病，此病的直接原因是（ ）。

- A. NADH不足
- B. GSH不足
- C. NADPH不足
- D. 葡萄糖醛酸不足
- E. 6-磷酸葡萄糖酸不足

『正确答案』

C

『答案解析』

有些人群（我国南方）的红细胞内缺乏6-磷酸葡萄糖脱氢酶，不能经磷酸戊糖途径得到充分的NADPH，则难使谷胱甘肽保持于还原状态，此时红细胞尤其是较老的红细胞易于破裂，发生溶血性黄疸。他们常在食用蚕豆以后诱发，故称为蚕豆病。

26、下列哪项是与免疫复合物无关的肾小球肾炎？（ ）

- A. 新月体性肾炎
- B. 膜性肾炎
- C. 轻微病变性肾炎（脂性肾病）
- D. 急性弥漫增生性肾炎
- E. 膜性增生性肾炎

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

27、皮质醇增多症特有的临床表现是（ ）。

- A. 皮肤多毛
- B. 高血压

- D. 向心性肥胖
- E. 糖耐量低减

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

28、根据研究发现，具有C型人格特征的人易患（ ）。

- A. 高血压
- B. 恶性肿瘤
- C. 支气管炎
- D. 冠心病
- E. 偏头痛

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

29、患者，男，因发热而入院，疑患伤寒。肥达反应结果是TO1: 80; TH1: 40、PA (-)、PB (-)，2周后再次做肥达反应，其结果是TO1: 160、TH1: 320、PA1: 40、PB1: 40，其诊断可能是（ ）。

- A. 伤寒早期
- B. 伤寒感染期
- C. 伤寒恢复期
- D. 曾注射预防疫苗
- E. 来自疫区健康者

『正确答案』

B

『答案解析』

因沙门菌隐性感染或预防接种，血清中可含有一定量的有关抗体，一般伤寒沙门菌O凝集效价小于1:80，H凝集效价小于1:160，引起副伤寒的沙门菌H凝集效价小于1:80，当检测结果大于或等于上述数值时才有诊断价值。

30、《医院感染管理规范》规定，置于无菌储槽中的灭菌物品(棉球、纱布等)一经打开，使用时间最长不得超过（ ）。

- A. 12小时
- B. 18小时
- C. 24小时
- D. 36小时
- E. 48小时

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

31、新生儿溶血病如需要换血疗法，其程序如下，除了（ ）。

- A. 患儿家属或监护人签字同意
- B. 由院长审批
- C. 由经治医师申请，主治医师核准
- D. 由血站和医院输血科提供适合的血液
- E. 换血由经治医师和输血科人员共同实施

『正确答案』

32、职业病指（ ）。

- A. 与职业有关的疾病
- B. 在职业活动中由理化因素引起的疾病
- C. 由职业性有害因素直接引起的疾病
- D. 由职业因素引起的疾病
- E. 由物理、化学、生物因素所引起的疾病

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

33、小儿腹泻脱水无明显循环障碍时，前8~12小时最合适的补液速度[m]/(kg·h)是（ ）。

- A. 5~7
- B. 2~4
- C. 8~10
- D. 11~13
- E. 14~16

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

34、血红素合成的步骤是（ ）。

- A. ALA→胆色素原→尿卟啉原III→血红素
- B. 胆红素原→ALA→尿卟啉原III→血红素
- C. ALA→粪卟啉原III→尿卟啉原III→血红素
- D. ALA→原卟啉原IX→尿卟啉原III→血红素
- E. 胆色素→原卟啉原IX→粪卟啉原III→血红素

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

35、患儿，5岁，发热5天，头痛，呕吐3天。查体：心肺无异常，脑膜刺激征阳性。脑脊液：外观透明，细胞数 $100\times10^6/L$ ，蛋白质0.8 g/L，糖3.0mmol/L，氯化物122mmol/L，脑脊液留置24小时无薄膜形成。诊断为（ ）。

- A. 结核性脑膜炎
- B. 病毒性脑膜炎
- C. 中毒性脑病
- D. 化脓性脑膜炎
- E. 新型隐球菌脑膜炎

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

36、在中国，Adison病最常见的病因是（ ）。

- A. 肾上腺结核
- B. 自血病浸润

E. 淀粉样变

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

37、典型溃疡性结肠炎患者粪便的特点是（ ）。

- A. 稀水样便
- B. 黏液便
- C. 蛋花样便
- D. 糊状便
- E. 黏液脓血便

『正确答案』

E

『答案解析』

溃疡性结肠炎粪便中的黏液脓血则为炎症渗出、黏膜糜烂及溃疡所致。黏液脓血便是本病活动期的重要表现。大便次数及便血的程度反映病情轻重，轻者每日排便2~4次，便血轻或无。重者每日10次以上，脓血显见，甚至大量便血。

38、小儿化脓性脑膜炎选择抗生素治疗时很重要的是（ ）。

- A. 对致病菌敏感
- B. 副作用要小
- C. 能透过脑脊液
- D. 能抑制脑脊液内的致病菌
- E. 疗程应该在5~7天

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

39、消化性溃疡最常见的并发症是（ ）。

- A. 穿孔
- B. 出血
- C. 幽门梗阻
- D. 癌变
- E. 狹窄

『正确答案』

B

『答案解析』

消化性溃疡常见并发症见下表。

出血	①15% ~25% 患者可并发出血。出血是消化性溃疡最常见并发症，也是上消化道大出血最常见病因 ②10% ~25% 的患者以消化道出血为首发症状；③十二指肠溃疡比胃溃疡更易出血
穿孔	穿孔率1% ~5%。穿孔后果：溃破入腹腔引起腹膜炎；穿孔受阻于毗邻器官；穿入空腔器官形成瘘管
梗阻	发生率2% ~4%。主要由十二指肠溃疡或幽门管溃疡引起
癌变	十二指肠溃疡不癌变；胃溃疡癌变率在1% 左右。癌变常发生在溃疡边缘，故活检时应取此处组织

- A. 1个月
- B. 2个月
- C. 3个月
- D. 4个月
- E. 5个月

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

41、关于乳房纤维腺瘤说法错误的是（ ）。

- A. 约占乳房良性肿瘤的3/4
- B. 好发于20~25岁女性
- C. 发病原因与乳腺小叶内纤维细胞对雌激素的敏感性异常增高有关
- D. 好发于乳房外上象限
- E. 月经周期对肿块大小影响较大

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

42、病毒性心肌炎的确诊有赖于（ ）。

- A. 血肠道病毒核酸阳性
- B. 血清柯萨奇B组病毒IgG 1:640以上
- C. 心肌组织内病毒的检出
- D. 血C反应蛋白水平增高
- E. 血清柯萨奇B组病毒IgM 1:320以上

『正确答案』

C

『答案解析』

C项，病毒性心肌炎指病毒感染引起的心肌局限性或弥漫性的急性或慢性炎症病变，多由柯萨奇A组或B组病毒引起，明确诊断有赖于心肌组织内病毒的检出。

43、女孩，11个月，多汗，烦躁，睡眠不安，可见肋膈沟，下肢轻度“O”形腿，血清钙稍低，血磷降低，碱性磷酸酶增高，其佝偻病应处于（ ）。

- A. 前驱期
- B. 初期
- C. 激期
- D. 恢复期
- E. 后遗症期

『正确答案』

C

『答案解析』

佝偻病激期除初期症状外，主要表现为骨骼改变和运动功能发育迟缓。骨骼改变往往在生长最快的部位最明显，故不同年龄有不同的骨骼表现。例如下肢畸形常见于1岁左右站立行走后小儿，由于骨质软化和肌肉关节松弛，在立、走的重力影响下可出现“O”形腿或“X”形腿；血清钙稍降低，血磷明显降低，钙磷乘积常低于30，碱性磷酸酶明显增高。X线检查干骺端临时钙化带模糊或消失，呈毛刷样，并有杯口状改变；骺软骨明显增宽，骨骺与干骺端距离加大；骨质普遍稀疏，密度减低，可有骨干弯曲或骨折。

44、接触麻疹几日内采取被动免疫措施有预防麻疹的作用（ ）。

- A. 3天

- D. 10天
- E. 14天

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

45、介导I型超敏反应的免疫球蛋白是（ ）。

- A. IgA
- B. IgD
- C. IgG
- D. IgE
- E. IgM

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

46、胸膜腔内压等于（ ）。

- A. 大气压+肺弹性回缩力
- B. 大气压-非弹性阻力
- C. 大气压+跨肺压
- D. 大气压+跨胸壁压
- E. 大气压-肺回缩力

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

47、易患强直性脊柱炎的患者通常具有（ ）。

- A. HLA-DR2
- B. HLA-DR3
- C. HLA-DR4
- D. HLA-DR5
- E. HLA-B27

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

48、最易引起血管神经损伤的股骨干骨折部位在（ ）。

- A. 上1/3
- B. 中1/3
- C. 下1/3
- D. 上中1/3交界处
- E. 以上都不是

『正确答案』

C

『答案解析』

- A. 右肾肿瘤
- B. 右肾盂肾炎
- C. 右肾炎
- D. 右肾结核
- E. 右肾乳头炎

『正确答案』

D

『答案解析』

肾结核最常见、最具特征性的临床表现是慢性膀胱刺激症状。IVU检查早期表现为肾盏边缘“虫蛀样”破坏，随病情进展其肾盏出现不规则扩大或模糊变形。

50、偏头痛的预防治疗药物是（ ）。

- A. 咖啡因麦角胺
- B. 英明格
- C. 吲哚美辛
- D. 小剂量阿司匹林
- E. 苯噻啶

『正确答案』

E

『答案解析』

偏头痛的预防分为避免诱发因素和药物预防，其中临床用于偏头痛预防的药物包括：① β 肾上腺素能受体阻滞剂，如普萘洛尔、美托洛尔；②钙离子拮抗剂，如氟桂利嗪、维拉帕米；③抗癫痫药，如丙戊酸、托吡酯；④抗抑郁药，如阿米替林、氟西汀；⑤5-HT受体拮抗剂，如苯噻啶。其中，普萘洛尔、阿米替林和丙戊酸三种在结构上无关的药物，是主要的预防性治疗药物，一种药物无效可选用另一种药物。

51、外展神经受损时表现为（ ）。

- A. 眼球向外侧运动障碍
- B. 眼球向外下方运动障碍
- C. 眼球向内上方运动障碍
- D. 眼球向内下方运动障碍
- E. 眼球向内侧注视有复视

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

52、一名女性患者因不孕症、闭经，伴厌食、消瘦到妇科就诊。妇科做了各种常规检查后，决定行腹腔镜检查，通知患者准备。患者不知该检查如何做，便随医生进入处置室检查，检查中发现作了切口。患者及家属均不满意开刀，遂向院方提出了赔偿要求。该案例中行腹腔镜检查应

如何决定为合理？（ ）

- A. 必须征得患者同意
- B. 可以征得患者同意
- C. 可以由医生决定
- D. 必须由医院决定
- E. 可以由医院或科室决定

『正确答案』

A

『答案解析』

参见《医疗事故处理条例》第十一条：在医疗活动中，医疗机构及其医务人员应当将患者的病情、医疗措施、医疗风险等如实告知患者，及时解答其咨询；但是，应当避免对患者产生不利后果。

53、隐性手足搐搦症可有以下体征（ ）。

- A. 克氏征阳性

- C. 布氏征阳性
- D. 面神经征阳性
- E. 霍夫曼征阳性

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

54、具有吞噬作用、抗原提呈作用和免疫调节作用的细胞是（ ）。

- A. 巨噬细胞
- B. 中性粒细胞
- C. B细胞
- D. NK细胞
- E. 内皮细胞

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

55、关于清创缝合错误的是（ ）。

- A. 清除伤口污物和异物，切除失去活力的组织
- B. 清创术最好在伤后6~8小时以内施行
- C. 面部头颈部的伤口超过14小时，清创后应尽可能缝合
- D. 关节、大血管或神经暴露的伤口清创后不缝合
- E. 污染严重的伤口，清创后不缝合

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

56、女性童尸，尸检见双肺重量增加，充血，密布灰白色粟粒大小结节，微隆起于切面。病理诊断是（ ）。

- A. 麻疹性肺炎
- B. 间质性肺炎
- C. 粟粒性肺结核
- D. 小叶性肺炎

- E. 葡萄球菌性肺炎

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

57、抗生素治疗肺炎一般需用至（ ）。

- A. 体温正常即停药
- B. 体温正常5~7天，肺部体征基本消失3天停药
- C. 体温下降后10天，胸部X线检查正常后停药
- D. 体温正常，胸部X线检查正常后停药
- E. 体温下降3天，肺部体征基本消失即后停药

『正确答案』

B

『答案解析』

58、骨折特有的体征是（ ）。

- A. 局部皮下瘀斑
- B. 功能障碍
- C. 反常活动
- D. 轴向叩击痛
- E. 局部压痛

『正确答案』

C

『答案解析』

骨折特有的体征包括：①畸形；②反常活动；③骨摩擦音或骨擦感。

59、结核性腹膜炎不可能出现的体征是（ ）。

- A. 腹部压痛
- B. 腹部触诊呈揉面感
- C. 移动性浊音阴性
- D. 振水音
- E. 腹部包块

『正确答案』

D

『答案解析』

胃内有多量液体及气体存留时可出现振水音。正常人在餐后或饮进多量液体时可有上腹部振水音，但若在清晨空腹或餐后6~8小时以上仍有此音，则提示幽门梗阻或胃扩张。因此该体征与结核性腹膜炎无关。

60、喹诺酮类抗菌药抑制（ ）。

- A. 细菌二氢叶酸还原酶
- B. 细菌二氢叶酸合成酶
- C. 细菌RNA多聚酶
- D. 细胞依赖于DNA的RNA多聚酶
- E. 细菌DNA螺旋酶

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

二、A2型题（每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、钩端螺旋体病患者，什么时候在外周血中可找到钩端螺旋体（ ）。

- A. 发病第1周内
- B. 发病第4周内
- C. 发病第3周内
- D. 发病第2周内
- E. 发病第5周内

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

WBC 11×10⁹/L，血沉20mm/h。最可能的诊断是（ ）。

- A. 心肌梗死扩展
- B. 不稳定型心绞痛
- C. 变异型心绞痛
- D. 肺栓塞
- E. 心肌梗死后综合征

『正确答案』

E

『答案解析』

E项，患者在急性心梗后，又出现持续性胸痛、胸膜炎（胸腔积液）、心包炎（心包摩擦音）、肺炎（右肺底部叩浊）等表现，为心肌梗死后综合征，多发生在急性心肌梗死后数周至数月，为机体对坏死物质的过敏反应。A项，心肌梗死扩展，即再梗。患者本次胸痛的特点明显与上次心梗发生时的胸痛症状不一致，胸痛与呼吸、体位有关，不符合急性心肌梗死的特点。BC两项，梗死后心绞痛，患者胸痛的特点与一般的心绞痛不同，同时表现出有心包炎、胸膜炎、肺部疾患等表现，与本病不符。D项，肺栓塞主要表现为胸痛伴呼吸困难，临床有严重的低氧血症，并难以用一般的吸氧方式来缓解，与本病不符。

3、急性有机磷农药中毒发生肺水肿，首要措施是（ ）。

- A. 强心苷静脉注射
- B. 彻底洗胃
- C. 静脉注射阿托品
- D. 吗啡静脉注射
- E. 解磷胺静脉注射

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

4、全胃切除后的病人可能出现（ ）。

- A. 糖类食物消化吸收障碍
- B. 蛋白质食物消化吸收障碍
- C. 脂肪吸收不良
- D. 维生素B₁₂吸收障碍
- E. 铁和钙的吸收显著减少

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

5、应激的概念可理解为（ ）。

- A. 对外界刺激和环境要求的反应
- B. 外界刺激和环境要求
- C. 对环境不适应或适应的反应
- D. 在对环境要求与应付能力评估后的状态
- E. 以上都不是

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

6、下列关于外科营养的叙述，正确的是（ ）。

- A. 营养状态差的患者首先考虑肠内营养
- B. 肠外营养的营养价值可以替代肠内营养

- D. 肠外营养较肠内营养安全、并发症少
- E. 肠外营养可使消化道处于休息状态，可保护胃肠道的结构和功能

『正确答案』

A

『答案解析』

肠内营养和肠外营养是临床常用的两种方法，应根据病人的具体情况选择。原则上当患者的疾病可经口进食应首先考虑肠内营养。尽管肠外营养不断完善，但仍不能完全替代肠内营养。肠瘘、短肠综合征等应考虑行肠外营养。但肠外营养比肠内营养有一定的并发症如营养并发症、穿刺的并发症等，而且长期的肠外营养可使消化道粘膜萎缩、变薄。故本题答案A项。

7、牵涉痛是指（ ）。

- A. 内脏疾病引起体表特定部位的疼痛或痛觉过敏
- B. 伤害性刺激作用于皮肤痛觉感受器
- C. 伤害性刺激作用于内脏痛觉感受器
- D. 肌肉和肌腱受牵拉时所产生的痛觉
- E. 皮肤受切割等刺激时产生的痛觉

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

8、下列哪一项属于胆碱受体？（ ）

- A. M、α
- B. M、β
- C. M、α₁和β₁
- D. M、α₁和β₂
- E. M、N₁和N₂

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

9、心肌收缩力加强引起静脉回心血量增加的机制为（ ）。

- A. 血流速度快
- B. 动脉血压升高
- C. 心缩期室内压较低
- D. 心舒期室内压较低
- E. 静脉血流阻力下降

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

10、下述哪个症状属于交感神经节后纤维的兴奋症状？（ ）

- A. 流涎
- B. 肌束颤动
- C. 多汗
- D. 呼吸肌麻痹
- E. 支气管痉挛

『正确答案』

C

11、已婚妇女，32岁，停经58天，阴道流血7天，尿hCG阳性，诊断为异位妊娠。最具特征性的B超检查为（ ）。

- A. 盆腔有积血
- B. 子宫旁见液性暗区
- C. 子宫腔外见胚囊样结构及胎心搏动
- D. 宫腔内见胚囊样结构
- E. 卵巢内侧见液性暗区

『正确答案』

C

『答案解析』

异位妊娠的超声特点：宫腔内未探及妊娠囊，若宫旁探及异常低回声区，且见胚芽及原始心管搏动，可确诊为异位妊娠；若宫旁探及混合回声区，子宫直肠窝有游离暗区，虽未见胚芽及胎心搏动，也应高度怀疑异位妊娠。

12、有机磷农药中毒的发病机制主要是有机磷抑制了什么酶（ ）。

- A. 胆碱酯酶
- B. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶
- C. 细胞色素氧化酶
- D. 磷蛋白酶
- E. 乳酸脱氢酶

『正确答案』

A

『答案解析』

胆碱酯酶复活剂主要对解除烟碱样中毒症状有效。碘解磷定、氯解磷定对内吸磷、硫磷、甲胺磷、甲拌磷中毒疗效好，对敌敌畏、美曲膦酯效果差，对乐果、马拉硫磷效果可疑。双复磷对敌敌畏、敌百虫效果好。胆碱酯酶复活剂应及早应用。若用药过量，可抑制胆碱酯酶的活力，且可引起中枢神经和心脏毒副作用。故本题答案为A项。

13、下列哪项不是肝素的临床适应证？（ ）

- A. 肺栓塞
- B. DIC早期
- C. 严重高血压
- D. 心脏瓣膜置换术
- E. 血液透析

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

14、应用巴比妥类所出现的下列现象中哪一项是错误的？（ ）

- A. 长期应用会产生身体依赖性
- B. 酸化尿液会加速苯巴比妥的排泄
- C. 长期应用苯巴比妥可加速自身代谢
- D. 苯巴比妥的量效曲线比地西洋要陡
- E. 大剂量对中枢抑制程度远比苯二氮卓类要深

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

15、45岁妇女，患慢性肾炎4年，半年前因早孕行药物流产，现要求避孕指导，应采取的措施是（ ）。

- A. 阴茎套避孕
- B. 口服短效避孕药
- C. 皮下埋植避孕

E. 行输卵管结扎术

『正确答案』

E

『答案解析』

45岁妇女，患慢性肾炎4年，为应用避孕药物的禁忌，安全期避孕不安全，半年前因早孕行药物流产，已无生育要求，可行输卵管结扎术。

16、新生儿化脓性脑膜炎，脑膜刺激征不明显的原因是（ ）。

- A. 机体的反应能力差
- B. 脑膜炎症不如年长儿强
- C. 颅缝及前囟未闭，对颅压升高起缓冲作用
- D. 颈肌尚不发达
- E. 大脑处于抑制状态

『正确答案』

C

『答案解析』

新生儿化脓性脑膜炎，脑膜刺激征不明显，原因是颅缝及前囟未闭，对颅压升高起缓冲作用。主要表现：眼神发直，抽搐，前囟膨隆，触之紧张感，颅缝增宽，提示颅压已明显升高。

17、膝腱反射中枢在（ ）。

- A. T12~L2
- B. L1~2
- C. L2~4
- D. L3~5
- E. L5~S2

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

18、消毒染有霍乱弧菌食具的最佳消毒措施是（ ）。

- A. 2%漂白粉
- B. 煮沸
- C. 紫外线
- D. 3%的来苏儿
- E. 3%的石炭酸（苯酚）

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

19、女，45岁。间断干咳3年，无低热、咯血等。反复抗生素治疗无效。查体无明显阳性体征。胸部X线片未见明显异常。最可能的诊断是（ ）。

- A. 支原体肺炎
- B. 支气管结核
- C. 支气管扩张
- D. 咳嗽变异型哮喘
- E. 慢性支气管炎

『正确答案』

D

『答案解析』

咳嗽变异型哮喘的诊断特点：①咳嗽持续发生或者反复发作一个以上月，常在夜间发生或清晨发作性咳嗽，运动后加重。痰

染等诱发哮喘发作；⑥哮喘有季节性，多见于春、秋两季且反复发作；⑦胸部X线片显示正常或者肺纹理增加但无其他器质性改变。符合以上特点的患者应当确诊为咳嗽变异型哮喘。

20、男性，30岁。左侧腰部疼痛3年，近一年余尿中带血、尿频、尿急和尿痛，时有脓尿，尿中可查见结核菌。其原因可能为（ ）。

- A. 左肾、输尿管及膀胱结核
- B. 左侧输尿管结石
- C. 前列腺肥大
- D. 慢性膀胱炎
- E. 膀胱移行细胞癌

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

21、长期保存病毒的方法是（ ）。

- A. 冷冻真空干燥
- B. 置50%中性甘油盐水中保存
- C. 4°C冰箱保存
- D. -20°C冰箱保存
- E. 细胞培养反复传代

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

22、下列哪项是与接合有关的细菌结构？（ ）

- A. 普通菌毛
- B. 微绒毛
- C. 性菌毛
- D. 鞭毛
- E. 纤毛

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

23、患者男性，22岁，不慎跌入80°C热水池内，池水淹没臀部，估计烫伤面积为（ ）。

- A. 30%~35%
- B. 35%~40%
- C. 40%~45%
- D. 45%~50%
- E. >60%

『正确答案』

D

『答案解析』

成年男性双下肢加双臀部面积达46%，加上下腹部及会阴的面积，总计应在50%左右，答案D项与题干最为接近。

24、患者，男，钡剂胃透检查，见胃壁僵硬，胃腔变小，黏膜皱襞大部分消失。应诊断为（ ）。

- A. 隆起型胃癌
- B. 弥漫浸润型胃癌
- C. 浅表扩散性胃癌

『正确答案』

B

『答案解析』

弥漫浸润型胃癌病理表现为胃壁变厚、僵硬，胃腔变窄，胃壁蠕动消失，粘膜表面仅见充血、糜烂，胃镜下缺乏粘膜征象，黏膜皱襞大部分消失。

25、乳房发生乳腺癌最常见的部位为（ ）。

- A. 乳头部位
- B. 内上象限
- C. 外上象限
- D. 内下象限
- E. 外下象限

『正确答案』

C

『答案解析』

外上象限是乳腺癌的好发部位，约1/3的乳腺癌发生于此，是临床重点检查部位。

26、颅底骨折合并脑脊液漏时，下列哪项处理是错误的？（ ）

- A. 应用抗生素
- B. 抬高床头
- C. 腰穿放脑脊液减压
- D. 保持口鼻腔清洁
- E. 避免用力咳嗽

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

27、编码HLA-II类抗原的基因位于（ ）。

- A. HIA-C
- B. HLA-B
- C. HLA-D
- D. HLA-E
- E. HLA-F

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

28、下列关于肺通气的叙述，错误的是（ ）。

- A. 呼吸运动是肺通气的原动力
- B. 肺内压和大气压之间的压力差是气体进出肺的直接动力
- C. 安静时正常成人呼吸频率为20~25次 / 分
- D. 平静呼吸时吸气是主动的，呼气是被动的
- E. 用力呼吸时吸气和呼气都是主动的

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

29、β受体阻断药对下述何种心律失常疗效最好？（ ）

- B. 心房扑动
- C. 窦性心动过速
- D. 室性心动过速
- E. 阵发性室上性心动过速

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

30、某一细胞群体杀伤肿瘤细胞的机制为释放溶酶体直接杀伤、ADCC效应、分泌TNF等细胞因子。该细胞是（ ）。

- A. Mφ
- B. LAK
- C. Tc
- D. NK
- E. TIL

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

三、B1型题（以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。）

1、（共用备选答案）

- A.甲苯磺丁脲
- B.格列本脲
- C.格列齐特
- D.格列吡嗪
- E.氯磺丙脲

1. 司用于治疗尿崩症（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 可改变血小板功能，改善糖尿病病人血小板并发症（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2、（共用备选答案）

- A.结核性脑膜炎
- B.B族溶血性链球菌脑膜炎
- C.脑膜炎双球菌脑膜炎
- D.流感嗜血杆菌脑膜炎
- E.真菌性脑膜炎

1. 易合并硬膜下积液（ ）。

『正确答案』

暂无解析。

2. 新生儿常见（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

3. 易出现皮肤出血点、瘀斑（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

3、（共用备选答案）

- A.全身性萎缩
- B.生理性萎缩
- C.神经性萎缩
- D.压迫性萎缩
- E.内分泌性萎缩

1. 小儿麻痹患者下肢肌肉萎缩（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 肾盂积水时，肾皮质变薄（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

3. 青春期胸腺退化（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

4、（共用备选答案）

- A.膜性肾小球病
- B.急性肾盂肾炎
- C.慢性肾盂肾炎
- D.快速进行性肾小球肾炎
- E.慢性肾炎

1. 肾脏出现不规则疤痕（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

3. 颗粒性固缩肾（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

5、（共用备选答案）

- A.中度慢性肝炎
- B.急性普通型肝炎
- C.急性重症肝炎
- D.轻度慢性肝炎
- E.亚急性重症肝炎

1. 肝细胞变性广泛，坏死轻微（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 肝细胞中度碎片状坏死及桥接坏死（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

3. 起病急，肝细胞坏死严重而广泛（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

四、A3型题（以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据考题所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、（共用题干）

成年男性，3个月来双下肢无力、双下肢麻木，逐渐发展到腰部，后背疼痛且咳嗽时加剧。查体：左半侧T₈以下痛温觉消失；右下肢肌力Ⅲ度，腱反射亢进，Babinski征阳性，右下肢足趾振动觉、位置觉消失。

1. 可能的诊断为（ ）。

- A. T₈附近脊髓髓内病变
- B. 左T₈附近脊髓髓外病变
- C. 右T₈附近脊髓髓外病变
- D. T₈附近脊髓休克性病变
- E. 右T₈附近脊髓髓内病变

『正确答案』

E

『答案解析』

髓内病变根痛少见，症状常为双侧性。感觉障碍自病变节段开始呈下行性发展，常为分离性感觉障碍，有马鞍回避；括约肌功能障碍出现早且严重。椎管梗阻出现较晚，常不完全，脑脊液蛋白质含量增加多不明显。

2. 病变脊髓处，MRI表现为（ ）。

- A. 脊髓呈梭形膨大，广泛低信号
- B. 正常脊髓
- C. 脊髓不膨大，髓内广泛点状高信号
- D. 脊髓外高信号肿块
- E. 中央管扩大呈空腔

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

3. 该脊髓损害为（ ）。

- A. 脊髓半切综合征
- B. 脊髓横贯性损害
- C. 脊髓后角损害
- D. 脊神经根损害
- E. 脊髓后索和侧索联合损害

『答案解析』

暂无解析。

2、(共用题干)

患儿，10个月，生后反复患肺炎，2天前开始发热咳嗽、气促、烦躁不安。查体：口唇发绀，呼吸48次/分，心率198次/分，心音低钝，胸骨左缘第3、4肋间可闻及III级收缩期杂音，双肺中、小水泡音，肝肋下3.0cm，双足背轻度水肿。

1. 其诊断可能是（ ）。

- A. 室间隔缺损合并心力衰竭
- B. 室间隔缺损
- C. 室间隔缺损合并肺炎和心力衰竭
- D. 室间隔缺损合并亚急性细菌性内膜炎
- E. 室间隔缺损合并肺炎

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 对其处置错误的是（ ）。

- A. 应用利尿剂
- B. 吸氧
- C. 静脉滴注抗生素
- D. 静脉注射钙剂
- E. 快速洋地黄化

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

3. 治疗该病的原则不正确的是（ ）。

- A. 手术治疗大多能根治
- B. 按时预防接种
- C. 手术最适年龄多在学龄前
- D. 积极防治感染
- E. 慎用洋地黄，不能长时间用

『正确答案』

E

『答案解析』

3、(共用题干)

女性，45岁，诊断为巨大结节性甲状腺肿，在颈丛麻醉下行一侧甲状腺全切，另一侧甲状腺大部切除术，术后第2天突然发生窒息，面肌和手足持续性痉挛。

1. 此时首要的处理是()。

- A. 检查引流管通畅与否
- B. 拆除颈部切口缝线，检查有无积血
- C. 气管切开
- D. 立即静脉注射10%氯化钙20ml
- E. 立即喉镜检查

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 进一步的检查是()。

- A. 抽血查血清钙、磷浓度
- B. 抽血查T₃、T₄
- C. 抽血查血糖
- D. 抽血进行血气分析
- E. 抽血查肝功能

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

3. 预防此种并发症的关键是()。

- A. 结扎、切断甲状腺上动脉应紧贴甲状腺上极
- B. 结扎甲状腺下动脉要靠近颈总动脉
- C. 保留腺体要适当
- D. 术中常规做气管切开
- E. 必须保存两叶腺体背面部分

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

1. 此小儿的年龄最可能是（ ）。

- A. 1岁
- B. 1岁半
- C. 2岁半
- D. 3岁
- E. 3岁半

『正确答案』

B

『答案解析』

根据体重和身长的计算公式可以算出小儿的年龄。

2. 按公式计算此小儿的体重约是（ ）。

- A. 15kg
- B. 13.5kg
- C. 12kg
- D. 10.5kg
- E. 9kg

『正确答案』

D

『答案解析』

儿童可按以下公式粗略计算体重： $<6\text{月龄婴儿体重(kg)} = \text{出生体重} + \text{月龄} \times 0.7\text{kg}$ ； $7\sim12\text{月龄婴儿体重(kg)} = 6 + \text{月龄} \times 0.25\text{kg}$ ； $2\text{岁}\sim\text{青春期体重(kg)} = \text{年龄} \times 2 + 8\text{kg}$ 。

5、（共用题干）

8岁女孩，8天前突发左膝关节剧痛、不能活动，畏寒、发热。体检：T39.2°C，P110次/分，左膝关节肿胀明显，膝表面皮温高。发病前左膝轻微外伤史。

1. 最可能的诊断为（ ）。

- A. 左膝急性风湿性关节炎
- B. 左膝急性化脓性关节炎
- C. 左胫骨上段急性血源性骨髓炎
- D. 左膝关节创伤
- E. 左膝关节结核

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 最可能出现的X线表现为（ ）。

- A. 膝关节周围骨破坏
- B. 膝关节半脱位
- C. 关节间隙变窄
- D. 关节间隙增宽，髓上囊肿胀
- E. 关节周围骨内死骨

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

3. 为证实临床诊断，最有价值的检查手段是（ ）。

- A. MRI
- B. 血沉
- C. 血类风湿因子
- D. 血尿酸定量
- E. 关节穿刺液检查

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

