

2021 年初级护师考试相关专业基础知识真题

(总分: 100.00, 做题时间: 120 分钟)

一、单项选择题(总题数: 100, 分数: 100.00)

1. 以下可以进行膀胱镜检查的患者是

- A. 膀胱结石 ✓
- B. 尿道结石
- C. 膀胱容量过小
- D. 严重的心功能不全
- E. 急性尿路感染

解析: 可进行膀胱镜检查的患者是膀胱结石, 膀胱镜可以直观地看到结石。

2. 治疗休克的基本措施主要是

- A. 治疗原发病
- B. 补充血容量 ✓
- C. 应用血管活性药物
- D. 纠正代谢紊乱
- E. 增强心功能

解析: 休克最基本的治疗措施是补充血容量, 以改善循环血量, 增加组织灌注, 纠正组织缺血缺氧。

3. 患者, 女, 28 岁, 3 天前出现肛周肿胀, 持续性跳痛。查体: 局部红肿、触痛, 肿物质软, 有波动感。

以下首先应该考虑的治疗方法是

- A. 手术切开排脓 ✓
- B. 抗生素治疗
- C. 局部理疗
- D. 局部涂止痛膏
- E. 热水坐浴

解析: 肛周脓肿表现为肿物质软, 有波动感时, 最有效的方法为手术切开排脓。

4. 患者, 女, 38 岁, 因便意频繁、便前肛门下坠感、里急后重, 排便不尽感来医院就诊。对于诊断该病最重要且简单易行的检查是

- A. 大便隐血检测
- B. 内镜检查
- C. 直肠指检 ✓
- D. CT 检查
- E. B 超检查

解析: 直肠指检对于直肠癌, 是最重要且简便易行的方法。直肠癌大多情况发生在直肠的中下段, 75%以上的直肠癌在肛门指检时就可以触及。

5. 阴道脱落细胞中发现不典型细胞, 但无恶性特征细胞, 属良性改变。按照巴氏 5 级分类法诊断以下属于

- A. I 级
- B. III 级
- C. V 级
- D. IV 级

E. II级 ✓

解析：巴氏II级表现为发现不典型细胞，但没有恶性特征细胞，属良性改变或炎症。结合本题为不典型细胞，但无恶性特征细胞，考虑巴氏II级。

6. 下列关于静脉输液补钾，属于先决条件是

- A. 最多不要超过 6~8g/d
- B. 浓度在 0.3%以上
- C. 速度在 60 滴/min 以下
- D. 总量在 3~6g/d 以下
- E. 尿量在 40ml/h 以上 ✓

解析：静脉补钾原则：“见尿补钾”为先决条件，意为尿量超过 40ml/h 方可补钾；氯化钾浓度一般不超过 0.3%，总量不超过 36g/d，补钾速度不宜超过 1.5g/h。补钾应稀释后经静脉滴注，禁止直接静脉注射，以免血钾突然升高，导致心搏骤停。

7. 慢性胃炎的主要确诊方法是

- A. 胃液分析
- B. 纤维胃镜检查 ✓
- C. 幽门螺杆菌检查
- D. 胃肠钡剂 X 线检查
- E. 大便隐血试验

解析：胃镜检查是诊断慢性胃炎最可靠的方法。

8. 患者，男，59 岁，排尿困难 3 个月。B 超检查可见前列腺增大，血清总 PSA 为 20ng/ml。为明确诊断，以下最可靠的检查方法是

- A. 前列腺 CT
- B. 前列腺 MRI
- C. 经直肠腔内超声
- D. 前列腺穿刺活检 ✓
- E. 血清特异性抗体检查

解析：患者出现排尿困难，B 超检查示前列腺增大，且患者的血清 PSA 升高，以上所述综合判断首先考虑患者罹患前列腺癌。前列腺癌的确诊依靠前列腺穿刺活检。

9. 患儿，男，4 岁，原发型肺结核。服利福平治疗 1 个月后出现食欲下降，疲乏无力，巩膜稍黄染，此时应该采取

- A. 加用利尿药物
- B. 加用异烟肼
- C. 输新鲜全血
- D. 利福平的正常治疗反应，不必处理
- E. 加用保肝药物，并改用其他抗结核药物 ✓

解析：患者出现巩膜黄染，提示出现肝功能损害。利福平的不良反应是肝损害，同时可有消化道及过敏反应等。此时应立即停用利福平，改用其他抗结核药物，并且加用保肝药物。

10. 以下对确诊中毒型细菌性痢疾最有价值的检查是

- A. 粪便镜检
- B. 血白细胞计数

- C. 粪便细菌培养 ✓
- D. 血清特异性抗体检查
- E. 咽拭子细菌培养

解析：志贺菌属（痢疾杆菌）是中毒型细菌性痢疾确诊的最直接的证据，因次从粪便标本中培养出痢疾杆菌是最有价值的检查。

11. 脓性指头炎需要及早切开的目的是

- A. 防止全身感染
- B. 防止肿胀
- C. 防止指骨坏死 ✓
- D. 防止皮肤坏死
- E. 减轻疼痛

解析：脓性指头炎若治疗的不及时，经常会引起指骨缺血性坏死，形成慢性骨髓炎，伤口长久不愈合。

12. 宫腔镜检查一般选择月经干净后

- A. 3 天
- B. 6 天
- C. 5 天 ✓
- D. 8 天
- E. 7 天

解析：宫腔镜检查一般选择月经干净 5 天之内检查，因为此时子宫内膜比平时薄，检查时不容易出血，子宫镜下图像显示清晰。

13. 做尿常规检查，应留取

- A. 清晨新鲜尿液 ✓
- B. 12 小时尿液
- C. 12 小时尿液，检查前低蛋白饮食 1 天
- D. 24 小时尿液，加入防腐剂
- E. 24 小时尿液，检查前低蛋白饮食 1 天

解析：尿常规一般取晨起首次中段尿液送检。

14. 患者，男，62 岁，因患糖尿病 9 年而长期接受胰岛素治疗，尿糖基本控制在（+~++）。昨晚因多食后，今天上午尿糖定性试验为（+++），自行增加了胰岛素剂量，1 小时后突然感到心悸、饥饿、出冷汗，随即昏迷。该患者被送来医院后，为明确诊断，应立即进行下列哪项检查

- A. 血糖 ✓
- B. 尿糖
- C. 血酮
- D. 尿酮
- E. 血气分析

解析：该患者自行增加胰岛素剂量后出现心悸、饥饿、出冷汗，随后昏迷。首先应考虑为胰岛素的低血糖反应，因此应立即检查血糖。

15. 国际上通用的肿瘤“TNM”分期法，其中“N”表示的是

- A. 原发肿瘤
- B. 骨转移

- C. 肝转移
- D. 肾转移
- E. 区域淋巴结转移 ✓

解析：目前临床常用国际抗癌联盟组织提出的 TNM 分期法。T 代表原发肿瘤，M 为远处转移，N 代表淋巴结。

16. 患儿，男，5 岁，发热伴腮腺大 2 天，诊断为“流行性腮腺炎”。目前该患儿适合的护理措施是

- A. 易消化的半流质饮食 ✓
- B. 禁用盐水漱口
- C. 可口的酸辣食物
- D. 少量饮水
- E. 局部热敷

解析：流行性腮腺炎患儿因张口及咀嚼食物会使局部疼痛感加重（A 对 C 错），影响其进食，应给予富有营养、易消化的半流质或软食。可使用温盐水漱口或多饮水，保持口腔清洁以防止出现继发感染（B、D 错）；为减轻腮腺肿痛可采用局部冷敷收缩血管达到减轻炎症充血的目的（E 错）。

17. 以下尿液有烂苹果样气味的是

- A. 服维生素 B 后
- B. 尿放置过久
- C. 糖尿病酮症 ✓
- D. 尿路结石
- E. 肾盂肾炎

解析：呼吸有烂苹果味最常见于糖尿病酮症酸中毒。以下相关知识点需区别记忆：有机磷中毒呼吸蒜臭味，尿毒症呼吸尿臭味，肝性脑病呼吸肝臭味。

18. 慢性肾小球肾炎常见的尿液特点为

- A. 血尿
- B. 蛋白尿 ✓
- C. 乳糜尿
- D. 脓尿
- E. 多尿

解析：慢性肾小球肾炎常见的尿液特点为蛋白尿，是本病典型表现，尿蛋白量常在 1~3g/d。

19. 为确诊化脓性脑膜炎，主要检查方法是

- A. 血常规
- B. 血培养
- C. 脑脊液检查 ✓
- D. 脑电图检查
- E. 头颅 MRI

解析：化脓性脑膜炎脑脊液检查会出现压力升高，外观混浊或者呈脓性，白细胞数增多可达

1000×10⁶ /L 以上，以中性粒细胞为主；糖和氯化物下降，蛋白升高。

20. 治疗系统性红斑狼疮的首选药物是

- A. 氯丙嗪

- C. 泼尼松 ✓
- D. 胍苯达唑
- E. 普鲁卡因酰胺

解析：治疗系统性红斑狼疮时，首选糖皮质激素，如地塞米松、泼尼松（强的松）等；不能用激素者可用免疫抑制药如环磷酰胺、硫唑嘌呤、长春新碱等，此类药物毒性大，需定期复查血常规及肝功能。

21. 患者，女，52岁，因内痔住院，拟行手术治疗，经检查发现直肠后正中位有一痔核，在截石位是

- A. 3点 ✓
- B. 4点
- C. 6点
- D. 10点
- E. 12点

解析：内痔位于齿状线以上，表面覆盖直肠黏膜。好发于直肠下端的左侧、右前或右后方（截石位3、7、11点）。

22. 患儿，男，1岁，高热惊厥入院，治疗1周痊愈出院。出院前对其家长进行健康教育的重点是

- A. 正确的喂养方法
- B. 身体锻炼的方法
- C. 惊厥预防及急救措施 ✓
- D. 预防接种的时间
- E. 门诊复查的时间

解析：高热惊厥的患儿日后发热还可能出现惊厥，应告知家长物理降温的正确方法，讲解惊厥发作时的急救措施；对癫痫患儿应嘱咐家长遵医嘱按时给患儿服药，不能随便停药，避免诱发惊厥；并嘱咐患儿避免到危险的地方及易受伤的环境中，以免发作时出现危险。

23. 消化道下段出血的时候，粪便性状是

- A. 鲜血便
- B. 黏液脓血便
- C. 白陶土样便
- D. 果酱样便
- E. 暗红色便 ✓

解析：消化道有出血会出现暗红色血便。

24. 患者，男，32岁，左胸部受伤后，烦躁不安，极度呼吸困难伴发绀。查体：脉搏110次/min，血压80/60mmHg，左胸叩诊鼓音，呼吸音消失，左胸广泛皮下气肿。其首要的急救措施是

- A. 吸氧
- B. 镇静止痛
- C. 穿刺排气 ✓
- D. 剖胸探查
- E. 应用抗生素

解析：通过患者的表现可判断患者此时为张力性气胸。张力性气胸时，胸腔内压大于大气压，患者呼吸极度困难，此时立即需行胸膜腔穿刺抽气，减轻肺萎陷，必要时行胸膜腔闭式引流术，以排除积气，促进肺脏的恢复。

25. 患者，男，69岁，尿频及排尿困难5年余，无心肺疾病，BP160/100mmHg，诊断为良性前列腺增生，残

- B. 经尿道高温治疗
- C. 体外高强度聚焦超声
- D. 经尿道前列腺电切术 ✓
- E. 开放式前列腺切除术

解析：膀胱残余尿超过 50ml 或曾经出现过急性尿潴留者，应手术治疗。最合适的手术方式有经尿道前列腺切除术（TURP）。

26. 患者，男，45 岁，因上消化道大量出血给予静脉输血 1500ml，其间出现手足抽搐、牙龈出血、血压下降、心率缓慢，该患者可能发生

- A. 枸橼酸钠中毒反应 ✓
- B. 空气栓塞
- C. 过敏反应
- D. 急性溶血反应
- E. 急性肺水肿

解析：枸橼酸钠中毒症状：主要表现为手足抽搐、血压下降、出血倾向、心室颤动、心率缓慢，甚至发生心脏停搏。结合本题患者静脉输血期间出现手足抽搐、牙龈出血、血压下降、心率缓慢，考虑枸橼酸钠中毒。

27. 我国对食管癌采取的一种简便易行的普查筛选诊断方法是

- A. 食管吞钡 X 线双重对比造影
- B. 脱落细胞学检查 ✓
- C. CT 检查
- D. 纤维食管镜检查
- E. 超声内镜检查

解析：我国对食管癌采取的简便易行的普查筛选诊断方法为脱落细胞学检查，早期病变阳性率可达 90%~95%，是一种简便易行的普查筛选诊断手段（B 对）。

28. 下列关于急性乳腺炎的治疗，不正确的是

- A. 停止哺乳
- B. 排空乳汁
- C. 局部冷敷 ✓
- D. 应用抗菌药物
- E. 按摩

解析：急性乳腺炎治疗原则：患乳排空乳汁，停止哺乳，应用抗生素；局部热敷或理疗以利于早期炎症消散。

29. 以下急性感染性多发性神经根神经炎患者脑脊液的典型改变是

- A. 压力增高
- B. 均匀血性
- C. 氯化物减少
- D. 糖明显减少

- E. 蛋白—细胞分离 ✓

解析：急性感染性多发性神经根神经炎：脑脊液检查 80%~90% 的患儿脑脊液蛋白含量增高，2~3 周可达正常

30. 患者，男，28岁，因咳嗽、咳痰3个月，咯血1周就诊。查体：背部可闻及固定且持久的局限性粗湿啰音，X线显示双下肺肺纹理增粗，可见气道壁增厚。患者的初步诊断是

- A. 支气管扩张 ✓
- B. 支气管炎
- C. 支气管哮喘
- D. 肺炎
- E. COPD

解析：支气管扩张临床表现：慢性咳嗽、咳大量脓痰，有不同程度的反复咯血，继发感染时病变部位听到局限性、固定性湿啰音，X线检查：可见一侧或双侧下肺纹理增多或增粗。结合本题患者的临床表现，可考虑患者的初步诊断为支气管扩张。

31. 以非手术治疗为主的乳房疾病是

- A. I期乳癌
- B. II期乳癌
- C. 乳腺纤维腺瘤
- D. 乳管内乳头状瘤
- E. 乳腺囊性增生病 ✓

解析：乳腺囊性增生病的治疗原则首先以对症治疗为主，主要是非手术治疗。

32. 如果护士发现医生医嘱有疑问时应当

- A. 执行医嘱
- B. 修改医嘱
- C. 报告护士长或者上级主管部门
- D. 向医生核实医嘱 ✓
- E. 自行更改

解析：如护士发现医嘱有明显错误的时候，有权利拒绝执行，并向医生提出质疑或申辩。

33. 原发性癫痫的病因是

- A. 遗传 ✓
- B. 脑膜炎
- C. 先天性脑发育异常
- D. 颅脑外伤
- E. 全身疾病

解析：原发性癫痫原因不明，有可能与遗传因素相关。

34. 患儿，男，35个月。未接种过卡介苗，结核菌素试验阳性。按照小儿结核病预防的原则，以下正确的处理措施是

- A. 送入隔离病房
- B. 密切随访观察
- C. 重新做结核菌素试验

- D. 可用异烟肼预防性服药 ✓
- E. 不用做任何处理

解析：对于未接种过卡介苗、但是结核菌素试验为阳性的3岁以下儿童，可服用异烟肼进行药物预防。

35. 急性重症胆管炎的治疗原则是

- B. 禁饮食，胃肠减压
- C. 紧急抗休克同时手术 ✓
- D. 行急诊胆囊切开引流术
- E. 纠正水、电解质和酸碱平衡紊乱

解析：患者出现急性重症胆管炎时，应实施紧急手术解除胆道梗阻并减压引流。术前短期积极准备，包括纠正水、电解质紊乱，同时给予有效足量的抗生素、肾上腺皮质激素，及时使用多巴胺等急救药物，防止休克及多脏器功能衰竭。

36. 急性心力衰竭时，患者应采取的体位是

- A. 两腿下垂端坐位 ✓
- B. 侧卧位
- C. 仰卧位
- D. 头低足高位
- E. 膝胸卧位

解析：急性心力衰竭患者置于两腿下垂坐位或半卧位，可以减少静脉回流。

37. 刚排出的尿液就有氨味，表明该患者是

- A. 尿崩症
- B. 膀胱直肠瘘
- C. 慢性膀胱炎 ✓
- D. 糖尿病酮症
- E. 膀胱癌晚期

解析：尿液放置太久，因尿素分解的原因会出现氨臭味，如刚排出的尿液就有氨味，为慢性膀胱炎及尿潴留的表现。

38. 抗甲状腺药物的主要副作用是

- A. 粒细胞减少 ✓
- B. 中毒性肝炎
- C. 剥脱性皮炎
- D. 皮肤瘙痒
- E. 心律失常

解析：抗甲状腺药物：目前常用药物分为硫脲类及咪唑类。作用机制主要是抑制甲状腺过氧化物酶，阻断

甲状腺激素合成，有一定的免疫抑制作用。丙硫氧嘧啶可抑制 T₄ 转变为 T₃。不良反应主要是粒细胞减少和药疹。粒细胞缺乏是致命性的，多于初治 2~3 个月及复治 1~2 周发生。

39. 肺癌的早期症状表现为

- A. 食欲减退
- B. 持续性胸痛

- C. 咳嗽、痰中带血 ✓
- D. 大咯血
- E. 胸腔积液

解析：①常以阵发性刺激性呛咳为早期症状。可无痰或者少量白色黏液痰。继发感染时痰量增多。②部分患者以咯血为首发症状。多为间断血痰或痰中带血。当癌肿侵犯大血管可引起大咯血。

查体：血压 100/60mmHg，心率 120 次/min，下腹部压痛，反跳痛，阴道后穹窿穿刺抽出暗红色不凝血，以下正确的处理措施是

- A. 给予止痛药
- B. 输液输血
- C. 升压药物
- D. 休克纠正后手术
- E. 抗休克同时手术 ✓

解析：根据患者的临床表现，可判断患者出现异位妊娠并伴有休克，对于异位妊娠并发休克者，应积极纠正休克的同时进行手术。

41. 小儿肥胖病主要的治疗手段是

- A. 控制食物总量的摄入
- B. 培养良好的饮食
- C. 控制饮食，进行有效的运动 ✓
- D. 消除患儿的心理障碍
- E. 多吃饱腹感明显的食物

解析：小儿肥胖症主要的治疗原则是控制饮食量，加强运动，并配合药物治疗。

42. 患者，女，42 岁，因严重感染入院。查体：T 39.5℃，P 90 次/min，R 25 次/min、BP 116/80mmHg。

血气分析：PaO₂ 55mmHg, PaCO₂ 30mmHg。首先应该考虑为

- A. 急性肾衰竭
- B. 急性呼吸窘迫综合征 ✓
- C. DIC
- D. 急性肝衰竭
- E. 急性心力衰竭

解析：急性呼吸窘迫综合征可由多种病因引起，例如各种类型的休克、败血症、急性重症胰腺炎等。动脉

血气分析以低 PaO₂、低 PaCO₂ 和高 pH 为典型表现。此题中患者感染后发病，呼吸频率增快，血

气分析示 PaO₂ 低，PaCO₂ 低，即可判断患者此时出现急性呼吸窘迫综合征。

43. 类风湿关节炎患者进行关节功能锻炼的最佳时期是

- A. 恢复期 ✓
- B. 急性期
- C. 症状后期
- D. 病变前期

E. 僵期

解析：类风湿关节炎的基本病理改变为滑膜炎，逐渐出现关节软骨和骨破坏，最终可能导致关节畸形和功能丧失。其中恢复期是患者进行功能锻炼的重要时期（A 对）；急性期关节应制动，避免进行功能锻炼（B 错）；其他选项皆不是适合功能锻炼的时期（CDE 错）

44. 对开放性损伤患者进行清创术，一般不能超过伤后的

- A. 1~2h

D. 6~8h ✓

E. 8~12h

解析：

45. 少尿是指 24 小时尿量少于

A. 800ml

B. 600ml

C. 400ml ✓

D. 200ml

E. 100ml

解析：每天的尿量少于 400ml 即为少尿。

46. 低钾血症时最早表现是

A. 肌肉无力 ✓

B. 腱反射减退

C. 肾小管变坏

D. 心电图出现“U”波

E. 恶心，呕吐

解析：发生低钾血症后患者最早出现的临床表现为肌无力，最初表现是四肢软弱无力，以后可延及躯干和呼吸肌。

47. 血红蛋白尿见于

A. 肾盂肾炎

B. 急性肾炎

C. 尿路结石

D. 肾结核

E. 急性溶血 ✓

解析：血红蛋白尿颜色为酱油色，可见于急性溶血。

48. 右心房与右心室之间的瓣膜是

A. 二尖瓣

B. 三尖瓣 ✓

C. 主动脉瓣

D. 肺动脉瓣

E. 以上都不是

解析：房室瓣分隔心房与心室，左心房与左心室之间的瓣膜称为二尖瓣右心房与右心室之间的瓣膜称为三尖瓣，而右心房与右心室之间的瓣膜称为三尖瓣。

49. 休克时体温降低，应予以保暖，一般室内温度应保持在

A. 15℃左右

B. 20℃左右 ✓

C. 22℃左右

D. 24℃左右

E. 25℃左右

皮肤血管扩张，加重心、肺、脑等重要脏器的血流灌注不足的情况。另外，体表加热可增加局部组织耗氧量，加重缺氧，不利于休克的纠正。

50. 早期妊娠最快速、准确的检查方法是

- A. 基础体温测定
- B. 超声检查 ✓
- C. 血尿 hCG 测定
- D. 黄体酮试验
- E. 胎儿心电图

解析：诊断早期妊娠最快速、准确的检查方法为超声检查。

51. 心搏骤停患者最重要的诊断依据是

- A. 血压降低
- B. 意识突然丧失
- C. 颈动脉搏动消失 ✓
- D. 无意识动作
- E. 两侧瞳孔不等大

解析：触摸颈动脉搏动，时间小于 10 秒，若无搏动即可判断患者此时心搏骤停。

52. 一氧化碳中毒首选治疗措施是

- A. 氧气疗法，迅速纠正缺氧 ✓
- B. 防止脑水肿
- C. 促进脑细胞代谢
- D. 冬眠疗法
- E. 控制高热

解析：一氧化碳中毒会造成体内 COHb 蓄积，COHb 不能携氧，而且还影响氧合血红蛋白正常分解，氧不容易释放到组织，致使组织细胞缺氧。一氧化碳中毒时心、脑对缺氧最敏感，常最先受损，所以要纠正缺氧需要立马进行氧疗。

53. 以下意识和反射全部丧失的意识障碍是

- A. 嗜睡
- B. 昏睡
- C. 意识模糊
- D. 深昏迷 ✓
- E. 浅昏迷

解析：深昏迷则对疼痛刺激、呼唤等外界各种刺激均无反应，无任何无意识自发动作，腱反射和光反射均消失，而且呼吸不规律，出现了生命体征的显著变化。

54. 特发性血小板减少性紫癜的首选用药

- A. 糖皮质激素 ✓
- B. 长春新碱
- C. 环磷酰胺
- D. 合成雄性激素
- E. 环孢素

解析：治疗特发性血小板减少性紫癜时，首选药为糖皮质激素，其作用是减少血小板自身抗体生成及减轻

55. 中心静脉压正常值是

- A. 40~100mmH 0
- B. 60~100mmH 0
- C. 50~120mmH 0 ✓
- D. 80~120mmH 0
- E. 60~140mmH 0

解析：成人中心静脉压正常值为正常值 5~12cmH₂O，也就是 50~120mmH₂O。

56. 患者，男，42 岁，肝硬化病史 2 年，高蛋白饮食后出现睡眠障碍，定向力减退，脑电图异常。下列治疗措施中，错误的是

- A. 精氨酸滴注
- B. 硫酸镁导泻
- C. 限制蛋白饮食
- D. 弱碱性溶液灌肠 ✓
- E. 乳果糖口服

解析：忌用肥皂水等碱性溶液灌肠，因为碱性溶液灌肠会使肠腔内呈碱性，使氨离子弥散入肠黏膜进入血液循环至脑组织，加重肝昏迷的程度。

57. 问诊避免使用的用语是

- A. 里急后重 ✓
- B. 大便带血
- C. 咳嗽
- D. 头痛
- E. 心慌

解析：里急后重是专业性术语，患者不易理解。与患者沟通时要采用通俗易懂的语言，避免采用专业性术语。（A 对）

58. 颅内压增高明显时应该避免

- A. MRI 检查
- B. 腰椎穿刺 ✓
- C. CT 检查
- D. 彩超检查
- E. 颅脑多普勒检查

解析：腰椎穿刺可以直接测量颅内压力，同时取脑脊液做化验。但颅内压明显增高时，行腰椎穿刺有造成枕骨大孔疝的危险，所以颅内压明显增高时应避免腰椎穿刺。

59. 大隐静脉曲张术后早期活动的主要目的是防止

- A. 患肢出血
- B. 患肢僵硬

E. 血管痉挛

解析：手术治疗是治疗下肢静脉曲张最有效的方法，术后病情允许的情况下，应鼓励患者早期下床活动，预防血栓形成（D对）。

60. 目前根治原发性肝癌的最好方法是

- A. 免疫治疗
- B. 放射治疗
- C. 手术治疗 ✓
- D. 物理治疗
- E. 肝脉化疗栓塞治疗

解析：目前治疗肝癌最有效的方法是肝部分切除术。肝癌的手术切除率可以高达 80%以上，术后 5 年生存率可达 60%~70%。

61. 有关急性胰腺炎患者尿淀粉酶与血清淀粉酶描述正确的是

- A. 两者同时增高
- B. 尿淀粉酶先增高
- C. 血清淀粉酶先增高 ✓
- D. 尿淀粉酶不增高
- E. 尿淀粉酶持续增高

解析：患者出现急性胰腺炎时，血清淀粉酶在发病后 1~2 小时即开始增高，8~12 小时标本最有价值，至 24 小时达最高峰。

62. 患者，女，60 岁，突然摔倒后昏迷约 10 分钟，随即清醒，出现头痛、恶心、呕吐，伴有逆行性遗忘，查体无异常。考虑为

- A. 颅内水肿
- B. 脑震荡 ✓
- C. 脑挫裂伤
- D. 脑内血肿
- E. 脑疝

解析：患者摔倒后昏迷，随即清醒，出现头痛、呕吐，伴有逆行性遗忘，神经系统检查无明显阳性体征，以上均为脑震荡的典型临床表现。

63. 输尿管结石的临床表现的特点是

- A. 少尿无尿
- B. 肾后型肾功能不全
- C. 肾区包块
- D. 肾绞痛和镜下血尿 ✓
- E. 肾盂积水

解析：输尿管结石为上尿路结石，典型的症状有肾区疼痛、血尿、膀胱刺激征等。

64. 患者，男，21 岁，被车撞伤 2 小时，右上腹痛来诊。查体：血压 80/60mmHg，脉搏 120 次/min。右肋见擦皮伤，右上腹压痛明显，全腹轻度肌紧张，移动性浊音阳性，肠音弱，尿色正常。应首先进行的检查是

- A. 尿常规
- B. 腹腔穿刺 ✓
- C. 腹部 B 超

E. 腹部 CT

解析：患者被车撞伤，血压低、脉搏快，并且出现腹部移动性浊音，此时应首先考虑实质性脏器损伤导致的出血。当腹部损伤时，进行诊断性腹腔穿刺，若穿刺出不凝液体即可初步确诊。

65. 过敏性紫癜的治疗措施中不包括

- A. 止血
- B. 控制感染
- C. 激素和免疫抑制药
- D. 输血 ✓
- E. 脱敏

解析：过敏性紫癜的治疗原则：急性发作期注意卧床休息，控制感染，对症处理和积极寻找并避免过敏原。包括应用肾上腺糖皮质激素与免疫抑制药及止血、脱敏等对症处理。

66. 患儿，男，5岁，幼儿园老师反映患儿上课时不停摇椅，多跑动，不专心，不能完成课堂手工作业，但智力正常。最可能的诊断是

- A. 注意缺陷多动障碍 ✓
- B. 多发性神经根神经炎
- C. 大脑发育不全
- D. 脑性瘫痪
- E. 癫痫小发作

解析：注意缺陷多动障碍的表现：注意力缺陷和活动过度。主要表现为上课时离位走动，叫喊讲话，扰乱课堂秩序，翻箱倒柜，干扰别人的活动，引人厌烦，小动作不停，摇椅转身。但其智力正常。以上描述符合本题患儿的表现。

67. 面容枯槁，面色灰白或发绀，双眼无神，表情淡漠可称为

- A. 慢性病容
- B. 急性病容
- C. 甲亢病容
- D. 危重病容 ✓
- E. 二尖瓣病容

解析：面容枯槁，面色灰白或发绀，表情淡漠可称为危重病容。

68. 护理体检内容不包括

- A. 瞳孔大小、形状、对光反射
- B. 意识状态
- C. 心脏功能 ✓
- D. 体温、脉搏、呼吸、血压
- E. 皮肤颜色、水肿、皮疹、压疮

解析：护理体检内容：（患者的皮肤、毛发、皮下脂肪、肌肉发育等）、体位、四肢步态。体温、呼吸、血压、脉搏、意识状态、面容和表情、发育和体型、营养状态等。排除法选 C。

69. 初产妇，27岁，剖宫产术后10天，突然阴道大量流血4小时，入院时血压 80/55mmHg，心率 116 次/min，血红蛋白 60g/L。首要的处理原则是选项

- A. 加强宫缩
- B. 按摩子宫

- D. 抢救休克 ✓
E. 预防感染

解析：此产妇出血 4 小时，已出现心率快、血压和血红蛋白下降，考虑已出现循环血容量不足型休克。此时首要应进行抗休克抢救治疗。

70. 某孕妇，25 岁，孕 1 产 0，孕 8 周，早孕反应重，常呕吐。皮肤黏膜苍白，毛发干枯无光泽，活动无力、易头晕。实验室检查：血红蛋白 70g/L，血细胞比容 0.15，血清铁 6.0 μmol/L。下列孕期健康宣教内容，错误的是

- A. 重点评估胎儿宫内生长发育状况
B. 应列为高危妊娠，加强母子监护
C. 如果服用铁剂时胃肠道反应较轻，则不需同服维生素 C ✓
D. 给予心理支持，减少心理应激
E. 重点监测胎心率变化

解析：患者皮肤黏膜苍白，毛发干枯无光泽，活动无力、易头晕。实验室检查：血红蛋白 70g/L，血细胞比容 0.15，血清铁 6.0 μmol/L，根据患者表现，首先考虑患者为缺铁性贫血。缺铁性贫血补充铁剂时，应首选口服制剂。每天遵医嘱服用铁剂，同时服维生素 C，可以促进铁的吸收。

71. 关于髋关节结核的叙述，正确的是

- A. “4”字试验结果为阴性
B. 双侧发病居多
C. 不会形成寒性脓肿
D. 髋关节过伸试验结果为阴性
E. 多见于儿童 ✓

解析：髋关节结核：发病率占全身骨关节结核第三位。儿童多见，单侧居多。4 字试验和髋关节过伸试验均为阳性。会形成寒性脓肿。

72. 患者，男，78 岁，反复咳嗽、咳痰十余年，近三年来劳累后心悸、气促。入院时发绀明显，呼吸困难，应取

- A. 头高足低位

- B. 侧卧位
C. 膝胸位
D. 端坐位 ✓
E. 仰卧位

解析：患者的临床表现为心肺功能不全，采取端坐位，利于呼吸，可使胸腔容量扩大，缓解不适。

73. 轻度新生儿缺氧缺血性脑病，其症状逐渐减轻的时间为

- A. 6 小时后
B. 48 小时后
C. 24 小时后 ✓
D. 18 小时后
E. 12 小时后

解析：轻度新生儿缺氧缺血性脑病主要表现为：一般不会出现惊厥。兴奋、激惹，肢体及下颏可出现颤动，拥抱反射敏感，肌张力正常，呼吸平稳。上述症状一般在出生后 24 小时内明显，3 天内可逐渐消失。

74. 患者，女，32 岁，糖尿病 15 年，因突发昏迷送来急诊。呼吸深大而快，且有烂苹果气味。实验室检查：

- B. 慢性肾功能衰竭
- C. 周围神经病变
- D. 自主神经病变
- E. 酮症酸中毒 ✓

解析：患者昏迷，呼吸深大而快，有烂苹果气味。实验室检查示：尿糖(+++)、尿酮体(+)、血糖 12.6mmol/L，血酮增高，通过以上症状可考虑患者出现酮症酸中毒。酮症酸中毒若不及时治疗，后期可出现脱水，尿少、皮肤干燥、血压下降、休克、昏迷，重者导致死亡。

75. 对水痘出疹特点描述正确的是

- A. 在起病当日或次日出现皮疹
- B. 皮疹集中出现，先见于耳后
- C. 皮疹呈向心性分布 ✓
- D. 黏膜疱疹可出现在口腔、咽、眼结膜处，疼痛明显
- E. 为自限性疾病，15 天左右自愈

解析：发热第一天就可出皮疹，皮疹连续分批出现，同一部位可见不同性状的皮疹；皮疹向心性分布，躯干多四肢少；部分患儿疱疹可发生在口腔、咽喉、结膜和阴道黏膜，破溃后形成浅溃疡；预后多不留瘢痕；为自限性疾病，一般 10 天左右自愈。

76. 诊断血液病最有价值的辅助检查是

- A. B 型超声
- B. X 线检查
- C. CT
- D. 骨髓检查 ✓
- E. 血常规检查

解析：骨髓检查可用于造血系统疾病的诊断，如对白血病的鉴别诊断、各种贫血的鉴别诊断、血小板增加或减少性疾病的诊断等。

77. 下肢深静脉回流是否通畅的检查试验是

- A. 波氏试验 ✓
- B. 屈氏试验 I
- C. 屈氏试验 II
- D. 下肢静脉测压
- E. 直腿抬高实验

解析：波氏试验，又称深静脉回流试验，是检查深静脉是否通畅的方法。

78. 现场抢救一氧化碳中毒者的首选措施是

- A. 给予高压氧舱治疗
- B. 将其转移到空气新鲜处 ✓
- C. 使其平卧
- D. 给予脱水剂
- E. 开放气道

解析：一氧化碳中毒者进行现场抢救时，应立即将患者转移到空气新鲜处，松开衣服，保持呼吸道通畅，同时注意保暖。

79. 患者，女，17 岁，月经周期不规律，月经期有时持续 3 天，有时持续 2~3 周，出血量时多时少，上次

- A. 痛经
- B. 有排卵性功血
- C. 继发性闭经
- D. 无排卵性功血 ✓
- E. 原发性闭经

解析：无排卵性功血多发生于青春期与绝经过渡期妇女。其特点是：月经周期紊乱，经期长短不出血量时多时少。失血过多者可出现贫血，一般无腹痛。符合本题中患者的临床表现。

80. 急性盆腔炎治疗的主要措施是

- A. 物理疗法
- B. 手术治疗
- C. 卧床休息
- D. 抗生素治疗 ✓
- E. 中医外治

解析：抗生素治疗是急性盆腔炎治疗的主要治疗措施。可根据细菌培养和药物过敏试验选择细菌敏感抗生素。要求足量、联合用药。

81. 患者，男，27岁，近日体重逐渐下降，今日午后出现低热，咯血症状，今来医院就诊。胸部CT示肺外围支气管末梢呈2~4mm，大小结节与树枝状的高密度影。结核菌素试验（PPD）阳性，该患者最可能的诊断是

- A. 肺炎
- B. 肺气肿
- C. 支气管哮喘
- D. 肺结核 ✓
- E. 脓胸

解析：肺结核临床表现：午后低热、盗汗、乏力、食欲缺乏、体重下降等。PPD试验可呈阳性。呼吸系统症状为咳嗽，多以干咳为主，可伴有咯血、胸痛及呼吸困难。

82. 妊娠合并心脏病患者最易发生心力衰竭的时期是

- A. 妊娠32~34周、分娩期及产褥期 ✓
- B. 妊娠28~36周
- C. 妊娠28周及分娩期
- D. 妊娠28~30周、分娩期及产褥期
- E. 分娩期及产褥期最初3天

解析：妊娠32~34周、分娩期及产褥期最初3日内，是患有心脏病的孕妇最危险的时期。考点妊娠期合并心脏病妇女的护理

83. 下列局部麻醉药物中，属于酰胺类的是

- A. 普鲁卡因
- B. 可卡因
- C. 利多卡因 ✓
- D. 肾上腺素复合丁卡因
- E. 氯普鲁卡因

解析：酰胺类：包括利多卡因、罗哌卡因、布比卡因、依替卡因等。酰胺类局麻药不易引起过敏反应。

有胚胎组织堵塞，最有效的紧急止血措施是

- A. 腹部压迫，排出胚胎组织
- B. 刮宫术 ✓
- C. 输血
- D. 注射止血药
- E. 纱布填塞阴道，压迫止血

解析：根据题干所述，可判断该患者是不全流产状态。一旦确诊，应该进行吸宫术或钳刮术，以清除子宫腔内残留组织，迅速止血并控制感染。

85. 白血病的发病原因不包括

- A. 药物化学因素
- B. 病毒因素
- C. 放射因素
- D. 遗传因素
- E. 气候因素 ✓

解析：白血病的病因可能与以下因素有关：病毒、放射、化学因素、遗传因素以及其他血液病等。

86. 易发生房室传导阻滞的是

- A. 下壁心肌梗死 ✓
- B. 正后壁心肌梗死
- C. 前壁心肌梗死
- D. 低侧壁心肌梗死
- E. 右室心肌梗死

解析：下壁心肌梗死常易发生慢性心律失常，如房室传导阻滞等，同时可伴有血压下降。

87. 易发生室性期前收缩的是

- A. 下壁心肌梗死
- B. 正后壁心肌梗死
- C. 前壁心肌梗死 ✓
- D. 低侧壁心肌梗死
- E. 右室心肌梗死

解析：前壁心肌梗死，易发生快速室性心律失常，如室性心动过速，频发性、多源性室性期前收缩等，心室颤动常是急性心肌梗死致死原因。

88. 小儿营养性缺铁性贫血应主要补充

- A. 钠盐
- B. 叶酸
- C. 铁剂 ✓
- D. 钙剂
- E. 蛋白质

解析：营养性缺铁性贫血的治疗方式主要为去除病因和铁剂治疗。铁剂多选用易吸收的二价铁盐，临床上常用制剂有硫酸亚铁等。疗程至血红蛋白正常后 2 个月左右停药。

89. 小儿营养性巨幼红细胞性贫血应主要补充

- A. 钠盐

- D. 钙剂
- E. 蛋白质

解析：营养性巨幼红细胞性贫血一般以补充维生素 B 和叶酸为主。

90. 急腹症患者应选用

- A. 抗休克 ✓
- B. 高压灌肠
- C. 低压灌肠
- D. 应用缓泻药
- E. 应用止痛药

解析：急腹症诊断明确者，应进行急诊手术治疗。暂时诊断不明者，应积极对症治疗，观察其病情变化，进行抗休克、补液等治疗。

91. 肾绞痛患者可选用

- A. 抗休克
- B. 高压灌肠
- C. 低压灌肠
- D. 应用缓泻药
- E. 应用止痛药 ✓

解析：肾绞痛发作时可通过单独或联合药物应用，如注射阿托品、哌替啶等可缓解肾绞痛。

92. 输卵管妊娠辅助检查，最简单常用的是

- A. CT
- B. B 超 ✓
- C. X 线
- D. 腹腔镜
- E. 阴道后穹窿穿刺

解析：B 超是输卵管妊娠时最简单常用的检查方法。

93. 诊断异位妊娠破裂的方法是，简单可靠的是

- A. CT
- B. B 超
- C. X 线
- D. 腹腔镜
- E. 阴道后穹窿穿刺 ✓

解析：阴道后穹窿穿刺术可用于诊断异位妊娠引起的内出血，盆腔炎症积脓、积液的检查。

94. 一氧化碳中毒最先受损的部位是

- A. 大脑 ✓
- B. 肝脏
- C. 肾脏
- D. 脾脏
- E. 肺脏

解析：因为脑、心对缺氧最敏感，所以 CO 中毒时，脑和心常最先受损。

- A. 大脑
- B. 肝脏
- C. 肾脏 ✓
- D. 脾脏
- E. 肺脏

解析：几乎所有系统性红斑狼疮的患者均有肾脏损害，每个人的肾脏功能损害程度不同，但是肾衰竭和感染仍是 SLE 主要的致死原因。

96. 结核性腹膜炎腹水的性质为

- A. 渗出性 ✓
- B. 血性
- C. 脓性
- D. 介于渗出液、漏出液之间
- E. 漏出液

解析：结核性腹膜炎的腹水为渗出性。

97. 肝硬化并自发性腹膜炎腹水的性质为

- A. 渗出性 ✓
- B. 血性
- C. 脓性
- D. 介于渗出液、漏出液之间

- E. 漏出液

解析：肝硬化腹水为漏出液，但若合并原发性腹膜炎时，呈渗出液。

98. 潜伏期是指

- A. 宫口开大 3cm 到宫口开全
- B. 宫口开大 1~5cm
- C. 胎儿娩出到胎盘娩出
- D. 宫口开全到胎儿娩出
- E. 从临产到宫口开大 3cm ✓

解析：第一产程又分为潜伏期和活跃期。潜伏期是指从临产出现规律宫缩至子宫颈扩张 3cm。

99. 活跃期是指

- A. 宫口开大 3cm 到宫口开全 ✓
- B. 宫口开大 1~5cm
- C. 胎儿娩出到胎盘娩出
- D. 宫口开全到胎儿娩出
- E. 从临产到宫口开大 3cm

解析：第一产程又分为潜伏期和活跃期。活跃期是指从宫颈扩张 3cm 至宫口开全 10cm。

100. 第二产程是指

- A. 宫口开大 3cm 到宫口开全
- B. 宫口开大 1~5cm
- C. 胎儿娩出到胎盘娩出
- D. 宫口开全到胎儿娩出 ✓

解价：第二产程包括宫口开全到胎儿娩出。

