

C. 低碳水化合物流质饮食

知识》200 题及答案

1. 肺炎球菌肺炎高热病人降温不宜采用

- A. 温水擦身
- B. 酒精擦浴
- C. 退热药
- D. 大血管区放置冰袋
- E. 多饮水

2. 有机磷农药中毒的烟碱样症状是

- A. 瞳孔小如针尖
- B. 大汗淋漓
- C. 呕吐物有大蒜味
- D. 肌纤维颤动
- E. 呼吸困难

3. 休克患者每小时尿量应维持在多少毫升以上

- A. 15
- B. 30
- C. 60
- D. 80
- E. 100

4. 急进型高血压最常见的致死原因为

- A. 脑梗死
- B. 心肌梗死
- C. 心乃衰竭
- D. 尿毒症
- f. 脑出血

5. 中毒性肺炎病人出现哪种表现提示病情严重

- A. 烦躁不安
- B. 尿量增加
- C. 体温升高
- D. 脉搏加快
- E. 脉压差变小

6. 腹痛剧烈的急性胰腺炎病人宜

- A. 低脂肪流质饮食
- B. 低蛋白流质饮食

- D. 高维生素半流质饮食
- E. 禁食

7. 下列除哪项外均提示脑出血未停止

- A. 瞳孔先缩小后散大
- B. 意识障碍加深
- C. 血压继续升高
- D. 脉搏加快
- E. 呼吸不规则

8. 呼吸困难病人常取的体位址

- A. 平卧位
- B. 头低脚高位
- C. 侧卧位
- D. 俯卧位
- E. 半坐位

9. 有关口服铁剂的洋意事项，错误的是

- A. 向病人说明服用铁剂后可出现黑粪
- B. 服用铁剂前后 1h 禁饮浓茶
- C. 避免铁剂溶液与牛奶同服
- D. 服铁剂溶液时要用吸管吸人咽下
- E. 症状改善后可停药

10. 癫痫强直阵挛发作呈持续状态时，最重要的护理措施是

- A. 注意保暖
- B. 吸氧 3~5l/min
- C. 防止跌伤
- D. 防止继发感染
- E. 保持呼吸道通畅

11. 上消化道大出血伴休克时的首要护理措施是”

- A. 安定患者情绪
- B. 准备急救用品
- C. 建立静脉输液途径
- D. 迅速配血
- E. 按医嘱采取止血措施

12. 下列哪项不符合癫痫药物治疗原则

- A. 大剂量开始
- B. 单一用药无效者可联合用药
- C. 达疗效后继续正规用药

D. 连续 3 年无发作后可缓慢减量

E. 以小剂量维持后停药

13. 下列哪项是缺铁性贫血表现 A.

牙龈出血

B. 发热伴大量出汗 C.

骨骼疏松

D. 毛发无光泽及“反甲水肿 E.

皮肤紫癜

14. 肾病性肾功能正常者错误的护理是 A.

低蛋白饮食

B. 限制钠盐摄入 C.

保持皮肤清洁

D. 静脉输液需控制滴速和总量 E.

病室定期清洁、消毒

15. 慢性肾功能衰竭后期病人，一旦出现下列哪种情况提示病情严重

A. 少尿、高血钾

B. 中度贫血

C. 乏力、食欲减退

D. 水肿、低钠血症

E. 呼气有尿臭味

16. 肠鸣音减弱或消失见于 A.

急性肠炎

B. 肠麻痹

C. 中等量腹水

D. 腹膜增厚

E. 消化道出血

17. 急性心肌梗塞患者病后第一周护理，错误的是

A. 日常生活均由护理人员帮助照料 B.

半量清淡流质或半流质饮食

C. 限制亲友探望

D. 鼓励在床上做伸展四肢活动 E.

避免不必要翻身

18. 对轻症中暑者应给予

A. 静脉注射生理盐水

B. 物理降温

C. 药物降温

D. 阴凉通风处休息，饮清凉饮料 E.

吸氧 3~5l/min

19. 肺结核咯血病人宜取患侧卧位是为了 A.
放松身心

B. 减轻胸痛

C. 有利引流

D. 防止病灶向对侧扩散 E.

避免窒息

20. 风湿性心脏病心房颤动病人突然抽搐、偏瘫，首先考虑

A. 心力衰竭加重 B.

洋地黄中毒 C. 低

钾血症

D. 脑栓塞

E. 蛛网膜下腔出血

21. 下列标本采集法错误的是

A. 尿蛋白定量测定留取 24h 尿液

B. 尿酮体检查随时留尿

C. 内生肌酐清除率测定前摄低蛋白饮食 3d D. 血尿

素氮测定取静脉血置抗凝管内

E. 血钾测定取静脉血置抗凝管内

22. 诱发肺心病心功能失代偿的最常见原因是 A. 过度劳累

B. 补液过快 C.

呼吸道感染

D. 摄盐过多

E. 心律失常

23. 尿毒症最早出现的症状是 A.

厌食、恶心、呕吐

B. 嗜睡、定向力障碍 C.

咳嗽、胸痛

D. 皮肤黏膜出血 E.

血压升高

24. 支气管肺癌常见的早期症状是 A.

声音嘶哑

B. 胸痛

C. 气促

D. 呛咳

E. 发热

25. 高温环境劳动的工人, 为预防中暑宜饮 A.

矿泉水

B. 含糖饮料 C.

含咖啡饮料 D.

含盐饮料 E. 含

酒精饮料

26. 空腹或餐后 8h 上腹部仍有振水音, 应考虑 A. 急性胃肠炎

B. 胃溃疡出血 C.

幽门梗阻 D. 肠

梗阻

E. 大量腹水

27. 系统性红斑狼疮病人脱发护理不正确的是 A. 说明脱发不是永久的

B. 避免染发、烫发、卷发

C. 用温水洗头每日二次

D. 梅花针针刺头皮

E. 用假发改善形象

28. 双气囊三腔管插人多长时间应开始间断放气

A. 6h

B. 12h

C. 24h

D. 36h

E. 48h

29. 急性胰腺炎患者禁食、胃肠减压主要目的是 A. 防止感染蔓延

B. 减少胃酸分泌 C.

减少胰液分泌 D.

避免胃扩张 E. 减

轻腹痛

30. 脑血栓形成护理评估不正确的是

A. 安静状态下发病

B. 晨起出现半身瘫痪

C. 有动脉粥样硬化病史

D. 可有发声障碍

E. 有严重意识障碍

31. 严重呕血病人饮食护理正确的是

A. 暂禁食

B. 温热的流食

C. 温凉的流食

D. 软食

E. 普食

32. 化疗病人的护理, 不恰当的是

A. 治疗前向病人说明化疗可能产生的不良反应

B. 用药前可酌情给镇静剂或镇吐剂

C. 用药过程中适当补充饮料

D. 治疗后 1h 内进食

E. 治疗后出现口干应做好口腔护理

33. 作大便隐血试验前 3d 内可摄取

A. 牛奶

B. 瘦肉

C. 大量绿叶蔬菜

D. 动物血

E. 动物肝脏

34. 血标本溶血对哪项检验的准确性影响最大

A. 钾

B. 肌酐

C. 尿素氮

D. 葡萄糖

E. 淀粉酶

35. 心脏病病人脉搏呈一强一弱交替出现而节律正常, 应安排他

A. 卧床休息

B. 正常作息, 但限制剧烈活动

C. 参与日常生活活动

D. 作康复期锻炼

E. 恢复半天轻工作

36. 预防阵发性夜间呼吸困难发作, 最主要的护理措施是

A. 保持安静, 减少声、光刺激

B. 夜间继续吸氧

C. 夜间睡眠应保持半卧位

D. 睡前给小量镇静剂

E. 注意保暖

37. 急性类风湿关节炎护理措施不正确的是

- A. 理疗、热敷
- B. 卧床休息
- C. 遵医嘱用药
- D. 同情理解病人
- E. 避免“晨僵”关节活动

38. 有可能导致危及生命的心律失常是

- A. 心房颤动
- B. 阵发性室上性心动过速
- C. 窦性心动过缓。
- D. 阵发性室性心动过速
- E. 频发单源性室性早搏

39. 提示病情危急的呼吸改变是 A.

- 间停呼吸
- B. 呼吸减慢 C.
- 深大呼吸
- D. 潮式呼吸
- E. 呼吸增快

40. 诱发癫痫的因素不包括

- A. 高热
- B. 睡眠不足 C.
- 大量饮水 D.
- 体育活动 E.
- 精神刺激

41. 咯血护理措施不正确的是

- A. 静卧休息，尽量少翻动
- B. 大咯血时，应取平卧位，头偏向一侧
- C. 咯血不止时，嘱患者屏气以利止血
- D. 保持大便通畅
- E. 若为肺结核咯血则应卧向患侧

42. 配制混合胰岛素时，必须先抽吸正规胰岛素，是为了防止

- A. 不良反应增多
- B. 正规胰岛素速效特性丧失
- C. 药效降低
- D. 胰岛素降解加速
- E. 中和反应发生

43. 阻塞性肺气肿最突出的表现是

- A. 咳嗽、咳痰
- B. 肺部啰音
- C. 呼吸音粗糙
- D. 心音减弱
- E. 呼吸困难

44. 胸导联 v2 探查电极放于 A.

- 胸骨右缘第三肋间
- B. 胸骨右缘第四肋间 C.
- 胸骨左缘第四肋间 D. 左锁
- 骨中线第五肋间
- E. 左腋前线与 v4 同一水平

45. 急性心肌梗塞患者出现阵发性室性心动过速，预示即将发生

- A. 心房颤动
- B. 心室颤动
- C. 心室停顿
- D. 不完全性房室传导阻滞
- E. 完全性房室传导阻滞

46. 呼气带有烂苹果气味见于哪一患者 A.

- 尿毒症
- B. 有机磷农药中毒 C.
- 肺脓肿
- D. 糖尿病酮症酸中毒 E.
- 肝性脑病

47. 慢性胃炎患者应避免口服

- A. 链霉素
- B. 庆大霉素
- C. 泼尼松
- D. 吗丁林
- E. 胃复安

48. 支气管哮喘的主要临床表现是 A.

- 吸气性呼吸困难伴“三凹征” B. 发作
- 性呼吸困难伴窒息感
- C. 反复发作带哮鸣音的呼气性呼吸困难
- D. 带哮鸣音的混合性呼吸困难
- E. 呼吸困难伴喘鸣音

49. 体温降低见于 A.

- 无菌性炎症

- D. 恶性肿瘤
- E. 免疫反应

50. 急性再生障碍性贫血病人一般不出现 A. 进行性贫血
B. 感染
C. 出血
D. 全血细胞减少
E. 肝、脾淋巴结肿大

51. 氯磷定切忌与碳酸氢钠混合静脉滴注，是由于可引起
A. 药液沉淀 B. 药液变色 C. 氯磷定失效 D. 碳酸氢钠失效 E. 氧化物形成

52. 二尖瓣狭窄患者的面容特征是
A. 两颊部蝶形红斑
B. 两颊部紫红，口唇轻度紫绀
C. 两颊黄褐斑
D. 午后两颊潮红
E. 面部毛细血管扩张

53. 有关静脉注射化疗药物的护理，哪项错误 A. 注射化疗药物前先以无药液体建立静脉通路
B. 确定静脉通畅后，由输液管注入化疗药物
C. 注毕继续以无药液体冲滴
D. 药液外漏应立即停输，迅速用普鲁卡因局封
E. 药液外漏部位热敷

54. 下列哪种心律失常应视为危急情况 A. 心房颤动
B. 窦性心动过速
C. 室性早搏，“r”落在“t”上
D. 室性早搏，2~4次/min E. 窦性心律不齐

55. 脑血栓的错误护理措施是
A. 平卧位
B. 避免激动

- E. 注意保暖

56. 心绞痛的错误护理是 A. 发作时就地休息
B. 注意保暖，室温不宜过低 C. 高热量、高糖饮食
D. 少食多餐，不宜过饱
E. 戒绝吸烟

57. 为防止哮喘病人痰液粘稠不易咳出，应采取 A. 体位引流
B. 低盐饮食 C. 多饮水 D. 持续吸氧 E. 翻身、拍背

58. 内科护理健康教育的主要目的是
A. 指导饮食增进食欲
B. 树立健康意识消除危险因素
C. 指导体育锻炼增强体质
D. 树立信心配合治疗
E. 合理用药防止复发

59. 系统性红斑狼疮皮肤损害常见于
A. 胸部
B. 背部
C. 腹部
D. 下肢
E. 暴露部位

60. 哮喘持续状态的错误处理是 A. 去除诱因
B. 保持呼吸道通畅 C. 高流量吸氧
D. 纠正脱水
E. 控制感染

61. 以下 x 线检查前准备，哪项不正确
A. 透视检查者，需除去透视部位的厚层衣物
B. 腹部摄片者应先清洁肠道
C. 心血管造影前穿刺部位需备皮
D. 胃肠钡餐检查者应先做碘过敏试验

A. 直径 3~5mm B. 压之不褪色 C. 稍高出皮面 D. 表面光亮 E. 周围有辐射小血管网

63. 纤维胃镜检查的正确护理是

- A. 术前向病人说明如感恶心应屏气
- B. 术前常规抽尽胃内容物
- C. 术前排空大小便
- D. 术中协助病人保持头稍前倾
- E. 术后即可进温凉流质

64. 瘫痪病人的错误护理措施是 A.

- A. 预防褥疮和肺炎
- B. 预防泌尿道感染
- C. 瘫痪肢体保持功能性
- D. 避免瘫痪肢体活动
- E. 鼓励多饮水

65. 腹腔穿刺放腹水后束以多头腹带的目的是为了防

- A. 腹压骤降, 引起休克 B. 腹水再增生
- C. 腹压下降, 引起心脏移位 D. 腹腔内脏下垂
- E. 腹壁皮肤松弛

66. 原发性肝癌患者突然出现腹部剧痛及腹膜刺激征, 首先考虑

- A. 肝癌腹膜转移 B. 肝癌结节破裂 C. 急性胃穿孔 D. 急性胆囊炎 E. 急性胰腺炎

67. 符合右心衰竭的临床表现是

- A. 夜间阵发性呼吸困难
- B. 咳大量泡沫痰
- C. 交替脉
- D. 两肺湿啰音

插管后, 先向胃气囊充气

B. 经常抽吸胃内容物 C. 唾液、痰液不宜下咽

D. 置管 48~72h 后, 如无出血即可拔管 E. 拔管前宜吞服适量石蜡油

69. 下列哪项不是类风湿关节炎表现的特征 A. 以小关节为主

B. 呈对称性

C. 晨僵明显

D. 急性期关节明显肿胀 E. 后期关节无畸形

70. 有关铁剂治疗缺铁性贫血的叙述, 下列哪项不正确

A. 症状纠正后继续服药 3~6 个月

B. 网织红细胞数增加是治疗有效的指标 C. 于饭后服用

D. 服药后可出现黑粪

E. 可防止缺铁性贫血的复发

71. 急性心肌梗塞病人吸氧的目的是 A.

改善心肌缺氧, 减轻疼痛

B. 预防心源性休克 C. 减少心律失常 D. 防止心力衰竭

E. 促进坏死组织吸收

72. 通常最早提示慢性肾功能衰竭的临床表现是 A. 血压升高

B. 头痛头晕

C. 恶心呕吐

D. 皮肤瘙痒

E. 呼吸深快

73. 肺炎球菌肺炎病人出现哪种表现提示有并发症发生

A. 咳铁锈色痰

B. 胸痛

C. 寒战、高热

D. 体温退后复升

E. 口唇疱疹

74. 慢性肾功能衰竭尿毒症期的错误护理措施是 A. 高

80. 急性病期患者对疾病缺乏思想准备易产生哪种情绪

腔糜烂用龙胆紫涂抹 D. 用肥皂水擦洗皮肤
E. 睡前饮水 1~2 次

C. 沮丧
D. 消极
E. 悲观

75. 应特别强调术中不能咳嗽的诊疗检查是

- A. 纤维胃镜检查术
- B. 胸腔穿刺术
- C. 腹腔穿刺术
- D. 骨髓穿刺术
- E. 腰椎穿刺术

81. 询问护理病史时下列哪一用语不妥

- A. 慢性咳嗽
- B. 心跳、气急
- C. 头痛、发热
- D. 黄疸
- E. 小便出血

76. 肝性脑病前驱期的主要表现是 A. 性格和行为改变

- B. 扑翼样震颤
- C. 电解质及酸碱平衡失调
- D. 血氨增高
- E. 脑电图异常

82. 易引起周围神经炎的抗结核药物为 A. 异烟肼

- B. 利福平
- C. 链霉素
- D. 对氨基水杨酸 E. 乙胺丁醇

77. 胸腔穿刺术后出现胸痛、呼吸困难、干咳，考虑哪种可能性最大

- A. 胸膜炎
- B. 自发性气胸 C. 肺气肿
- D. 肋间神经炎
- E. 肺炎

83. 两侧瞳孔大小不等，提示 A.

- 阿托品中毒
- B. 视神经萎缩
- C. 有机磷农药中毒 D. 颅内病变
- E. 深昏迷

78. 纤维支气管镜检查的正确护理是

- A. 检查前 2h 开始禁食
- B. 检查时取侧卧位
- C. 检查后立即用朵贝尔溶液漱口
- D. 检查后即可进食
- E. 检查后鼓励轻咳

84. 观察中毒性肺炎的病情变化，最重要的是 A. 意识状态

- B. 体温、热型 C. 脉搏、血压
- D. 呼吸频率及深度 E. 痰的性状

79. 尿毒症病人饮食护理正确的是

- A. 忌盐
- B. 限水
- C. 限钾
- D. 低热量
- E. 补钙

85. 下列哪一种脉搏提示心肌损害

- A. 水冲脉
- B. 交替脉
- C. 奇脉
- D. 不整脉
- E. 脉搏短绌

专业资料整理

86. 有关老年患者护理，不恰当的是

- A. 避免长期卧床，鼓励适当活动
- B. 摄易消化、有营养、清淡饮食
- C. 勤洗澡以保持皮肤清洁

92. 纤维支气管镜检查的错误护理是

- A. 检查前 4h 开始禁食
- B. 检查时取平卧位
- C. 检查前半小时注射阿托品

87. 急性心肌梗塞 24h 内主要死亡原因为

- A. 心脏破裂
- B. 心律失常
- C. 心力衰竭
- D. 心源性休克
- E. 室壁瘤

88. 鼓励急性心肌梗塞病人, 自第二周开始在床上作四肢轻微活动是为了

- A. 预防褥疮
- B. 增加消化功能
- C. 避免肌肉萎缩
- D. 防止血栓形成
- E. 促进心功能恢复

89. 病人评估资料的主要来源是 A.

- 病人本身
- B. 病人家属 C.
- 保健人员 D.
- 医疗记录
- E. 各种检查报告

90. 应用胰岛素的注意事项中, 下列哪项错误 A. 胰岛素宜冰冻保存

- B. 抽吸药液时避免振荡 C. 皮下注射部位经常更换
- D. 混合注射时先抽吸正规胰岛素 E.
- 应用时注意药物有效期

91. 高血压、动脉粥样硬化老年患者的饮食不须限制

- A. 高胆固醇食物
- B. 高动物脂肪食物
- C. 高糖食物
- D. 高钠食物
- E. 高钙食物

93. 首次应用下列哪种药物需防止病人出现体位性低血压

- A. 硝苯地平
- B. 氢氯噻嗪
- C. 哌唑嗪
- D. 阿替洛尔
- E. 卡托普利

94. 胸廓前后径短于左右横径一半见于 A.

- 肺气肿患者
- B. 老年人
- C. 慢性消耗性疾病者
- D. 佝偻病患者
- E. 矮胖体型者

95. 下列慢性胃炎保健指导中, 不妥的是 A.

- 养成细嚼慢咽的进食习惯
- B. 戒烟忌酒
- C. 腹痛时口服阿司匹林
- D. 上腹饱胀、返酸时口服吗丁林 E.
- 避免使用泼尼松及利血平

96. 尿毒症病人纠正酸中毒后发生抽搐的主要原因是

- A. 血浆白蛋白降低 B.
- 血磷增高
- C. 血游离钙降低 D.
- 血结合钙降低 E. 血
- 非蛋白氮增高

97. 脑疝前驱症状不包括

- A. 体温升高
- B. 频繁呕吐
- C. 烦躁不安
- D. 脉搏渐慢
- E. 呼吸慢而深

98. 紫绀是由于

- A. 毛细血管扩张充血
- B. 红细胞量增多
- C. 红细胞量减少
- D. 血液中还原血红蛋白增多
- E. 毛细血管血流加速

是

- A. 洗胃后需禁食 24h
- B. 开始进食前口服氢氧化铝凝胶
- C. 从流质过渡为普食
- D. 给予高蛋白, 高糖, 高脂饮食
- E. 重度中毒者, 清醒后 24h 暂停饮水

99. 支气管扩张患者在施行体位引流时, 错误的

护理是

- A. 引流在晚间睡前进行
- B. 根据病变部位选择体位
- C. 引流时鼓励患者深呼吸
- D. 引流时间每次 30min 以上
- E. 引流完毕后给予漱口

100. 柏油样大便见于

- A. 十二指肠溃疡出血
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 痢疾
- D. 结肠癌
- E. 胃穿孔

101. 幽门梗阻患者洗胃宜用

- A. 清水
- B. 3% 盐水
- C. 0.95 氯化钠溶液
- D. 1: 5000 高锰酸钾溶液
- E. 2%~4% 鞣酸溶液

102. 观察脑出血患者时, 发现哪种情况常提示出血已止

- A. 瞳孔先缩小后散大
- B. 意识障碍变浅
- C. 血压继续升高
- D. 呼吸不规则
- E. 脉搏变慢

103. 急性胰腺炎病人采取哪种体位可减轻腹痛

- A. 坐位
- B. 半卧位
- C. 屈膝侧卧位
- D. 俯卧位
- E. 仰卧位

104. 有关口服有机磷农药中毒的饮食护理措施, 错误的

- A. 禁食
- B. 禁饮
- C. 禁食辛辣、油腻食物
- D. 禁食产气食物
- E. 禁食含粗纤维食物

有效的处理是

- A. 卧床吸氧
- B. 建立静脉通路
- C. 准备纤维胃镜检查
- D. 准备双气囊三腔管待用
- E. 禁食、胃肠减压

106. 类风湿关节炎活动期的关节护理, 错误的是

- A. 注意姿势, 减轻疼痛
- B. 预防褥疮
- C. 保持关节功能位
- D. 禁忌病变关节活动
- E. 使用支架, 避免关节畸形

107. 误输异型血可使尿液呈

- A. 淡黄色
- B. 深黄色
- C. 淡红色
- D. 鲜红色
- E. 酱油色

108. 类风湿关节炎缓解期护理最重要的是

- A. 预防感染
- B. 避免疲劳
- C. 避免精神刺激
- D. 避免寒冷、潮湿
- E. 指导医疗体育锻炼

109. 最常见的洋地黄中毒表现是

- A. 头晕、头痛
- B. 黄视
- C. 恶心呕吐
- D. 原来规则心律变为不规则
- E. 原来不规则心律变为规则

110. 最常引起急性肺水肿的风湿性心瓣膜病类型是

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 三尖瓣狭窄

专业资料整理

A. 二尖瓣狭窄

B. 二尖瓣关闭不全

C. 主动脉瓣狭窄

D. 主动脉瓣关闭不全

E. 三尖瓣狭窄

B. 松解领扣、腰带

C. 不可喂水

D. 牙垫塞入上、下门齿之间

E. 不能强力按压肢体

117. 二尖瓣听诊区位于

A. 心尖部

111. 慢性阻塞性肺气肿病人出现下列哪种表现提示肺性

- A. 瞳孔不等大
- B. 心率加快，血压上升
- C. 呼吸深而快
- D. 神志与精神改变
- E. 尿量减少

112. 提示锥体束受损的重要体征是

- A. 颈项强直
- B. 腹壁反射消失
- C. 膝腱反射亢进
- D. 巴彬斯基征阳性
- E. 克匿格征阳性

113. 肺结核患者痰结核菌阳性转阴，提示

- A. 不需高热量、高蛋白饮食
- B. 不需隔离
- C. 可增加体力活动
- D. 需接种卡介苗
- E. 抗结核药物可减量

114. 抢救敌敌畏口服中毒禁用

- A. 大量盐水催吐
- B. 2%碳酸氢钠溶液反复洗胃
- C. 对服毒超过 6h 者仍应洗胃
- D. 洗胃后由胃管灌入液体石蜡导泻
- E. 肥皂水灌肠

115. 下列除哪项外均可出现中性粒细胞减少

- A. 病毒感染
- B. 伤寒
- C. 再生障碍性贫血
- D.
- E. 缺铁性贫血

- C. 胸骨右缘第二肋间
- D. 胸骨左缘第三肋间
- E. 胸骨左缘第三~四肋间

118. 高热量、高蛋白、高维生素、适量脂肪、低盐饮食适用于

- A. 急性心肌梗塞患者
- B. 糖尿病患者
- C. 肾功能不全氮质血症期患者
- D. 肝硬化腹水患者
- E. 结核病患者

119. 区分急性白血病和再生障碍性贫血的临床表现是

- A. 发热
- B. 贫血
- C. 皮肤出血
- D. 颅内出血
- E. 胸骨压痛

120. 甲状腺功能亢进症病人具有特征性的表现是

- A. 食欲亢进体重锐减
- B. 低热多汗皮肤温暖
- C. 注意力不集中
- D. 焦虑、失眠、多梦
- E. 心悸、气促

121. 慢性肺源性心脏病的症状加重主要由于

- A. 呼吸道感染
- B. 过度劳累
- C. 摄入钠盐过多
- D. 心律失常
- E.

122. 护理支气管扩张病人最重要的措施为

116. 癫痫大发作时，错误的护理措施是

- A. 使病人躺下，侧卧位

- A. 促进排痰
- B. 增进营养

C. 增强体质

D. 预防窒息

E. 保持口腔卫生

123. 治疗糖尿病最基本的措施为

A. 口服降糖药物

B. 控制饮食

C. 适当运动

D. 心理支持

E. 禁用口表测试体温

129. 消化性溃疡患者服用制酸剂宜在

A. 饭前 1~2h

B. 饭后 1~2h

C. 两餐之
间

D. 每日清晨一次

E. 进餐时与食物同服

124. 为清除肝硬化病人肠内积血，灌肠首选哪种液体

- A. 温开水
- B. 生理盐水
- C. 稀醋溶液
- D. 碳酸氢钠溶液
- E. 肥皂水

125. 角膜反射检查的正确描述是

- A. 用棉签细毛轻触角膜中央部位
- B. 正常反射是两侧眼睑迅速闭合
- C. 是深反射的一种
- D. 浅昏迷时角膜反射消失
- E. 角膜反射消失的临床意义同巴彬斯基征阳性

126. 急性心肌梗塞患者应绝对卧床休息至少达

- A. 24h
- B. 48h
- C. 1周
- D. 2周
- E. 3~5周

127. 肾盂。肾炎最常见的感染途径为

- A. 血源性
- B. 上行性
- C. 淋巴道
- D. 直接蔓延
- E. 损伤性

128.

- A. 避免外伤
- B. 不可强力按压肢体
- C. 保持呼吸道通畅

B. 急性肺部感染

- C. 支气管扩张
- D. 自发性气胸
- E. 呼吸衰竭

131. 预防风湿热的关键是

- A. 防治链球菌感染
- B. 手术摘除感染的扁桃体
- C. 注射长效青霉素
- D. 磺胺类药物预防性治疗
- E. 长期口服小剂量阿司匹林

132. 护理急性白血病患者错误的是

- A. 高热量、高蛋白饮食
- B. 控制饮水量
- C. 避免口腔黏膜损伤
- D. 保持病室清洁
- E. 限制探视

133. 插置双气囊三腔管适用于哪种疾病出血

- A. 胃溃疡
- B. 十二指肠溃疡
- C. 慢性胃炎
- D. 胃癌
- E. 食管一胃底静脉曲张破裂

134. 癔症患者痉挛发作时，首先采取的护理措施是

- A. 将患者平卧，用牙垫塞入上下磨牙之间
- B.
- C. 置患者侧卧位，准备吸痰器
- D. 将患者移至安静处，制止他人围观
- E. 建立静脉通路，准备安定注射液

D. 严密观察意识和瞳孔的变化

135. 最能提示慢支并发阻塞性肺气肿的临床表现是

- A. 咳嗽咳痰加剧
- B. 胸痛不透明显
- C. 呼吸困难逐渐加重
- D. 焦虑烦躁不安
- E. 厌食恶心呕吐

136. 尿常规检查的标本采集法不正确的是

- A. 盛尿的容器清洁
- B. 留取尿量以 100~200ml 为宜
- C. 查肾脏疾病以留取晨尿最佳
- D. 女病人避免白带混入尿内
- E. 尿常规检查应留取晨尿

A. 慢性上腹痛

- B. 餐后半小时出现上腹痛
- C. 周期性上腹痛
- D. 餐后 3h 出现上腹痛
- E. 伴呕血、黑便

142. 高血压病第三期临床表现为

- A. 舒张压持续在 13.3kpa(100mmhg) 以上
- B. 心电图示左心室肥大
- C. 眼底动脉狭窄
- D. 脑出血
- E. 蛋白尿

137. 慢性肾功能衰竭病人需严格记录出入量是因为病人有
- A. 脱水
 - B. 失水或水过多
 - C. 低钾血症
 - D. 水肿
 - E. 低钙血症

138. 面颊潮红，呼吸急促，烦躁不安，痛苦呻吟，为
- A. 病危面容
 - B. 慢性病容
 - C. 急性病容
 - D. 甲亢面容
 - E. 二尖瓣面容

139. 肝性脑病病人暂停蛋白质饮食是为了
- A. 减少氨的形成
 - B. 减少氨的吸收
 - C. 促使氨的转化
 - D. 降低血尿素氮
 - E. 降低肠道内 pH 值

140. 有关胃肠钡餐检查前准备，下列哪项不正确
- A. 忌服含铋、镁、钙等重金属药物 3d
 - B. 停用一切影响胃肠蠕动药物 3d
 - C. 检查前一天作碘过敏试验
 - D. 检查前晚 10h 后禁食至检查毕
 - E. 有幽门梗阻者于检查前先抽尽胃内潴留液

141. 符合十二指肠溃疡疼痛特点的是

- A. 低盐、高糖
- B. 低盐、高蛋白
- C. 低盐、低蛋白
- D. 低蛋白、高糖
- E. 高热量、高蛋白

148. 对瘫痪患者的护理哪项是错误的
- A. 观察呼吸肌有无麻痹
 - B. 预防泌尿道感染
 - C. 鼓励咳嗽排痰
 - D. 勿搬动瘫痪肢体
 - E. 鼓励多饮水

149. 为防止急性白血病患者继发感染，错误的护理措施

- 止
- A. 穿刺部位出血
- B. 穿刺部位感染
- C. 低压性头痛
- D. 颅内感染
- E. 脑脊液外漏

144. 较早反映肾小球滤过功能减退的检查项目是
- A. 血尿素氮测定
 - B. 血肌酐测定
 - C. 内生肌酐清除率
 - D. 酚红排泄试验
 - E. 尿胆红素定性

145. 心绞痛胸痛特点不包括
- A. 疼痛位于胸骨后
 - B. 一般持续数分钟
 - C. 常有明显诱因
 - D. 呈针刺样疼痛
 - E. 休息后可缓解

146. 颈静脉怒张见于
- A. 胸腔积液
 - B. 高血压
 - C. 右心功能不全
 - D. 主动脉瓣关闭不全
 - E. 甲状腺功能亢进症

147. 慢性肾炎患者水肿明显，尿蛋白(++++)，肾功能检查正常，其饮食宜

- B. 术前嘱病人排大小便
- C. 术前做普鲁卡因皮试
- D. 术中病人取侧卧位
- E. 术后密切观察生命体征

154. 以下心电图波段中，由心室激动产生的是
- A. p 波
 - B. qrs 波
 - C. st 段
 - D. t 波
 - E. u 波

155. 肺炎球菌肺炎剧烈胸痛者宜取
- A. 平卧位

- A. 做好口腔护理，经常漱口
- B. 保持皮肤清洁，防止破损
- C. 保持大便通畅，以防肛裂
- D. 限制探视
- E. 使用药物尽量采用肌肉注射

150. 呼吸衰竭最早出现的症状是

- A. 紫绀
- B. 呼吸困难
- C. 精神反常
- D. 心率减慢
- E. 消化道出血

151. 护理老年病人，哪项错误

- A. 鼓励参加力所能及的活动
- B. 进食不宜过快
- C. 洗澡不宜过勤
- D. 大小便宜用坐式便器
- E. 改变早睡早起的习惯

152. 大咯血窒息处理首先

- A. 加压吸氧
- B. 输血
- C. 注射止血剂
- D.
- E. 进行人工呼吸

153. 有关腰椎穿刺不正确的是

- A. 术后去枕平卧

- C. 坐位
- D. 患侧卧位
- E. 健侧卧位

156. 慢性呼吸衰竭缺氧最早的表现

- A. 呼吸困难
- B. 头痛、烦躁
- C. 口唇、肢端发绀
- D. 皮肤潮红、多汗
- E. 昼睡夜醒

157. 急性肾盂肾炎患者的正确护理是

- A. 安置于光线较暗的病室
- B. 高生物效价低蛋白饮食
- C. 限制钠盐摄入
- D. 鼓励多饮水
- E. 导尿留取尿培养标本

158. 消化系统疾病对症护理，错误的是

- A. 呕吐停止后给予漱口
- B. 上消化道大量出血者去枕平卧位
- C. 严重呕血者暂禁食
- D. 急性腹泻者给予少纤维素饮食
- E. 阻塞性黄疸者给予高脂肪饮食

159. 洋地黄类药物中毒常出现

- A. 体温升高
- B. 呼吸减慢
- 2h

专业资料整理

C
·
心
律
失
常

- D. 血压升高
- E. 心脏杂音

160. 提示上消化道出血停止的临床表现是

- A. 肠鸣音亢进
- B. 黑粪次数增加
- C. 脉压差变小
- D. 肢端转红、温暖
- E. 脉搏细速

161. 对肝性脑病患者，错误的护理措施是

- A. 低热量饮食
- B. 暂停蛋白质摄入
- C. 清除肠内积血
- D. 米醋加生理盐水灌肠
- E. 口服 50%硫酸镁溶液导泻

166. 肺部正常叩诊音为

- A. 鼓音
- B. 清音
- C. 过清音
- D. 浊音
- E. 实音

167. 缺铁性贫血治疗最重要的是

- A. 补充铁剂
- B. 病因治疗
- C. 脾切除
- D. 少量输血
- E. 肌肉注射维生素 b12

168. 哪种心律失常不需紧急处理

- A. I 度房室传导阻滞

- A. 三餐前
- B. 三餐后
- C. 三餐后及临睡前
- D. 早晨空腹顿服
- E. 临睡前一次

163. 对发热病人的询问，正确的是

- A. “发热前有寒战吗？”
- B. “您发热时还有哪些不适？”
- C. “您体温上升都在下午吗？”
- D. “体温是弛张热型吗？”
- E. “您发热时有无头痛？”

164. 正确的主诉记录是

- A. 上腹部节律性疼痛
- B. 右上腹疼痛伴畏寒发热
- C. 3d 前开始咳嗽，今日发热
- D. 活动后心悸，气短 2 年，全身水肿 3d
- E. 巩膜黄染两周，血转氨酶升高 1 个月

165. 下列血常规检查部分中哪项异常

- A. 红细胞计数 $5 \times 10^{12}/l$ (500 万/ μl)
- B. 血红蛋白量 $130g/l$ ($13g/dl$)
- C. 白细胞计数 $6 \times 10^9/l$ ($6000/\mu l$)
- D. 白细胞分类计数：中性粒细 70%

- C. 室性早搏呈联律出现
- D. 短阵室性心动过速
- E. 心室颤动

169. 系统性红斑狼疮的皮肤护理，不妥的是

- A. 常用清水清洗
- B. 每日用 $10^{\circ}C$ 的冷水局部湿敷
- C. 忌用碱性肥皂
- D. 忌用化妆品
- E. 避免阳光曝晒

170. 采集血液标本正确的方法是

- A. 从输液针头采血
- B. 止血带压迫时间过长
- C. 采血后去掉穿刺针头将血液沿试管壁徐徐注入
- D. 所有采血前均禁食 12h
- E. 挤压局部促使血液流出

171. 符合甲状腺功能亢进症代谢率增高的表现是

- A. 神经过敏、失眠
- B. 心动过速、收缩压增高
- C. 肠蠕动增快、腹泻
- D. 甲状腺弥漫性肿大
- E. 怕热、多汗、食欲亢进

专业资料整理

胞

- E. 白细胞分类计数：淋巴细胞 10%

172. 有关护理措施实施的叙述，哪项不确切

- A. 由护士直接提供
- B. 可由护士和其他工作人员共同完成
- C. 一项护理措施实现一个护理目标
- D. 家属可以参加一定的护理活动
- E. 应事先为病人所认可并接受

173. 反映造血功能的血液检查是

- A. 血红蛋白测定
- B. 白细胞计数及分类
- C. 红细胞沉降率
- D. 网织红细胞计数
- E. 出血时间测定

174. 鼓励长期卧床的心力衰竭患者在床上作下肢活动，其目的主要是

- A. 减少回心血量
- B. 预防褥疮
- C. 防止肌肉萎缩
- D. 防止下肢静脉血栓形成
- E. 及早恢复体力

- B. 胆红素尿振荡后泡沫亦呈黄色
- C. 新鲜尿液有氨味
- D. 正常人尿比重固定
- E. 正常人尿糖定性呈阳性反应

179. 系统性红斑狼疮的对症护理，错误的是

- A. 经常用清水洗脸
- B. 用 30~c 左右温水湿敷红斑处
- C. 面部红斑处涂油膏保护
- D. 脱发者用温水洗头
- E. 口腔溃疡涂碘甘油

180. 停用抗甲状腺药物的指征是

- A. 甲状腺肿大加重
- B. 突眼加剧
- C. 牙龈肿胀
- D. 血粒细胞缺乏
- E. 出现胃肠道症状

181. 为减少化疗引起的呕吐，不可采取

173. 昏迷病人呕吐时将头偏向一侧是为了防止
- A. 呕吐加剧
 - B. 昏迷加重
 - C. 血压下降
 - D. 窒息
 - E. 污染衣物

176. 作清洁中段尿细菌培养, 正确的是

- A. 宜取在膀胱内有 6~8h 停留的尿液
- B. 宜在停用抗菌药物 48h 后收集尿液
- C. 留取尿液前用消毒剂清洗外阴部
- D. 尿液留置于清洁容器内
- E. 尿标本如不能立即送检, 应加适量防腐剂

177. 对口服中毒抢救是否成功, 关键在于

- A. 呼吸道是否通畅
- B. 洗胃是否彻底
- C. 导泻是否及时
- D. 休克纠正与否
- E. 解毒药剂量大小

178. 判断尿液检查结果正确的是

- A. 肝脏病人可有血红蛋白尿

- B. 饮食少量多餐
- C. 给予无刺激性食物
- D. 餐后立即给药
- E. 必要时于给药前使用镇吐剂

182. 对大咯血病人应重点观察

- A. 体温变化
- B. 瞳孔变化
- C. 血压变化
- D. 窒息先兆
- E. 意识状态

183. 对甲状腺功能亢进症重度浸润性突眼的护理不应

- A. 抬高头部
- B. 鼓励多饮水
- C. 外出时用眼罩
- D. 生理盐水纱布局部湿敷
- E. 抗生素眼膏涂眼

184. 观察使用洋地黄类药物的患者, 哪种情况可继续用药

- A. 恶心、呕吐
- B. 视力模糊

专业资料整理

- C. 心 70 次/min 率
- D. 室性早搏呈二联律
- E. 原心房颤动转为规则心律

185. 肺性脑病早期的精神神经症状为

- A. 注意力不集中
- B. 神志恍惚
- C. 昼睡夜醒
- D. 昏睡
- E. 肌群抽搐

186. 下列咳嗽、咳痰护理措施中, 错误的是

- A. 保持室内空气新鲜、清洁
- B. 咳脓痰者注意口腔护理
- C. 痰稠不易咳出时应多饮水
- D. 协助痰多的卧床病人翻身
- E. 痰多体弱无力咳嗽者施行体位引流

187. 老年患者不出现下列哪一心理特点

- A. 远期记忆力显著减退

- E. 多吃新鲜蔬菜

191. 急性白血病患者出现头痛、恶心、呕吐、颈项强直等症常提示

- A. 颅内出血
- B. 败血症
- C. 脑膜白血病
- D. 上消化道出血
- E. 脑栓塞

192. 心室颤动的脉搏特征是

- A. 快而规则
- B. 慢而规则
- C. 快而不规则
- D. 慢而不规则
- E. 测不到

193. 评估急性肾盂肾炎最有意义的检查是

- A. 尿红细胞计数
- B. 中段尿培养

- D. 自卑固执
- E. 自我中心

188. 以下哪项不属于营养状态良好

- A. 体重超标
- B. 皮肤有光泽
- C. 皮下脂肪丰满
- D. 肌肉结实
- E. 毛发、指甲润泽

189. 消化性溃疡患者饮食宜少量多餐，其意义是

- A. 减少对胃刺激
- B. 中和胃酸
- C. 减轻腹痛
- D. 减少胃酸分泌
- E. 促进消化

190.

- A. 总热量随年龄增加而酌减
- B. 选用优质蛋白食物
- C. 摄低脂、低胆固醇食物

E. 血尿素氮

194. 尿毒症少尿期患者忌输库存血，主要是为防止引起

- A. 出血倾向
- B. 输血反应
- C. 血尿素氮升高
- D. 血钙降低
- E. 血钾升高

195. 慢性心功能不全最常见的诱因是

- A. 呼吸道感染
- B. 快速心律失常
- C. 过度体力劳动
- D. 摄钠及补液过多
- E. 贫血或大出血

196. 慢性肾炎的错误保健指导是

- A.
- B. 不宜妊娠
- C. 防止受凉

专业资料整理

- D. 避免过度疲劳
- D. 少盐多糖

E. 避免应用对肾脏有害的药物

	111~120: DDBDE	DADEA
197. 口服中毒病人有哪种情况时不宜采用吸引器洗胃	121~130: ADBCB	CACBA
A. 昏迷	131~140: ABEDC	EBCAC
B. 妊娠	141~150: DCCCD	CADEB
C. 伴有器质性心脏病	151~160: EDABD	ADECD
D. 体质衰弱	161~170: ADBDE	BBABC
E. 腐蚀剂中毒	171~180: ECDDD	ABBCD
	181~190: DDBCC	EAADD
198. “板状腹” 常见于	191~200: CEBEA	AEEAE
A. 结核性腹膜炎		
B. 腹部肿瘤		
C. 肝脓肿		
D. 胃肠胀气		
E. 急性胃穿孔		
199. 胆囊超声检查前需		
A. 禁食 12h		
B. 做造影剂过敏试验		
C. 清洁灌肠		
D. 饮水 500~1000ml		
E. 禁服重金属药物		
200. 缺铁性贫血多见于		
A. 铁需要量增加		
B. 铁吸收不良		

D. 胃酸缺乏
E. 慢性失血

参考答案

1~10: CDBDE	EDEEE
11~20: CADAA	BDDDD
21~30: ECADD	CCCCE
31~40: AAAAA	CEDAD
41~50: CBECB	DCCBE
51~60: EBECC	CCBEC
61~70: DBCDA	BEDEE
71~80: ACDDB	ABEEB
81~90: DADCB	CBDA A
91~100: EDCCC	CADDA
101~110: BBCDB	DEECA

专业资料整理

前行的路上，有风，也有雨，有荆棘，也有坎坷；

抹去脸上的雨水，还有泪水，甩开脚步，接着向前。

我们不要呈现最好的自己给世界，需要许，请慢些脚步，我们一杯不加糖的苦咖啡，皱一皱眉头，也要饮下。

人生是一场释然，风景，能选择什么样的，都在手我选择。

如果我们选择面朝大海，春暖花开的方向，请迈开脚步，小桥流水，在静谧恬淡的日子里种篱修菊，我们的世界必会收获一隅宁静。

选择临风起舞，我们就是岁月的勇者；选择临阵脱逃，我们就是生活的懦夫。

没有淌不过的河，就看我们如何摆渡。没有爬不过

德国哲学家尼采说：“每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负。”我们不要抱怨，是命运不徐不疾，都活出自己的精彩。少年时，

时间会荒芜，岁月只是我们苍老的颜色，出发，不要忘记意想不到的惊喜。

唐孟浩然《春晓》：“春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。”
没有一声声响，没有一刻停留，仿佛眨眼的功夫，半生已过。

人生在世，就像一场梦，醒来时，一切都已过去。我们都不得不向生命挥手作别。

我们该怎样过好这一生，把平凡的日子过得精彩，把短暂的生命活出意义。

生命如此短暂，岂容随意挥霍！只有在辛勤的耕耘中，才能在收获的季节里，看到希望的田野。

就算是烟花划过夜空，也要留下绚烂的印记。人生短暂，总该留下点什么！

人生忽如寄，生活多苦辛。

短暂的生命旅程，

别辜负时光，别辜负自己。

愿我们每一个人自律、阳光、勤奋，

活成自己喜欢的模样，

活成一束光，

生活是柴米油盐的平淡，也是行色匆匆的奔波。一粥一饭来之不易，一丝一缕物力维艰。

专业资料整理
