

主管护师(外科护理)儿科护理学 1 真题

(总分: 100.00, 做题时间: 120 分钟)

一、不定项选择(总题数: 55, 分数: 52.96)

1. 患儿女, 9 个月, 突然发生四肢的抽动, 持续 2 分钟, 人工喂养, 未加辅食, 查: 体温 37.2℃, 颈软, 前囟 2cm×2cm, 枕部按压有乒乓感, 神经系统检查未见异常。该患儿的初步诊断为

- A. 化脓性脑膜炎
- B. 癫痫
- C. 高热惊厥
- D. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症 ✓
- E. 低血糖

解析: 该患儿喂养史中有未能按时添加辅食, 并且存在颅骨软化的表现, 因此初步判断可能为维生素 D 缺乏性手足搐搦症。选 D。

2. 患儿 10 个月, 发热 2 天伴声音嘶哑, 犬吠样咳嗽, 吸气性喉鸣及吸气性呼吸困难, 烦躁不安、口周发绀。患儿最可能是患有

- A. 上呼吸道感染
- B. 急性感染性喉炎 ✓
- C. 喘息性支气管炎
- D. 支气管肺炎
- E. 支气管哮喘

解析: 发热、声音嘶哑、犬吠样咳嗽、吸气性喉鸣、吸气性呼吸困难等是急性感染性喉炎的临床表现。选 B。

3. 患儿, 女, 10 个月, 因面色苍白 2 个月来医院就诊。患儿生后单纯母乳喂养, 未添加辅食。查体: 精神萎靡, 营养发育较差, 反应迟钝, 皮肤黏膜和甲床苍白, 头发枯黄, 前囟 2cm×3cm, 心、肺无异常, 肝肋下 2cm, 脾肋下 1.5cm。血红蛋白 70g/L, 血涂片见红细胞体积小、含色素低。应采取的措施是

- A. 输血治疗
- B. 口服铁剂 ✓
- C. 口服叶酸
- D. 口服维生素 C
- E. 肌内注射维生素 B₁₂

解析:

4. 3 岁小儿, 因生长发育迟缓来院就诊, 表现为身材矮小、智力落后。经检查诊断为先天性甲状腺功能减退症。在入院评估中发现该患儿精神、食欲差, 嗜睡、少哭少动, 根据该患儿所患疾病, 护士还可能发现的问题是

- A. 体温过高
- B. 心动过速
- C. 腹胀, 便秘 ✓
- D. 喂养过度
- E. 神经兴奋性增加

解析:

5. 2岁女童，因持续发热1周伴皮疹来院就诊，入院后检查发现四肢末端实性肿胀、双眼结膜充血、口唇干燥潮红、咽部黏膜弥漫性发红及颈部淋巴结肿大。护士除监测皮肤黏膜受损情况外还应当密切监测

- A. 心血管系统症状 ✓
- B. 呼吸系统症状
- C. 消化系统症状
- D. 泌尿系统症状
- E. 骨骼关节症状

解析：川崎病的心血管系统受累虽然不常见，但其是主要致死原因，故需要密切监测。选A。

6. 患儿男，7岁，因1个月来持续低热、消瘦、食欲不振、疲乏来院就诊。该患儿经检查确诊为原发型肺结核，使用异烟肼、利福平和乙胺丁醇治疗，疗程12个月。此时护士除了需要监测患儿视力、视野及辨色能力还应当监测

- A. 听力
- B. 肝功能 ✓
- C. 血尿酸
- D. 前庭功能
- E. 血尿素氮

解析：

7. 足月新生儿，第一胎，男，生后第3天，母乳喂养，生后24小时出现黄疸，皮肤黄染逐渐加重，查：Hb110g/L，母血型O，子血型B。该患儿最有可能的诊断是

- A. 胆管闭锁
- B. 新生儿生理性黄疸
- C. Rh溶血症
- D. ABO血型不合溶血症 ✓
- E. 新生儿败血症

解析：该患儿出现贫血、病理性黄疸，且母子ABO血型不合，应考虑ABO血型不合引起的溶血症。选D。

8. 患儿女，9个月，突然发生四肢的抽动，持续2分钟，人工喂养，未加辅食，查：体温37.2℃，颈软，前囟2cm×2cm，枕部按压有乒乓感，神经系统检查未见异常。首选的处理方法为

- A. 静脉输入10%葡萄糖溶液
- B. 立即用10%葡萄糖酸钙5~10ml加10%葡萄糖溶液稀释后缓慢静注
- C. 立即静注地西洋，再用10%葡萄糖酸钙5~10ml加10%葡萄糖溶液稀释后缓慢静注 ✓
- D. 立即肌注维生素D320万单位
- E. 给予20%甘露醇降颅压

解析：首先需要为患儿止惊，地西洋为首选药物。其次应为患儿补充钙剂，用10%葡萄糖酸钙5~10ml加10%葡萄糖溶液稀释后缓慢静注。选C。

9. 患儿10个月，发热2天伴声音嘶哑，犬吠样咳嗽，吸气性喉鸣及吸气性呼吸困难，烦躁不安、口周发绀。该患儿不适宜的护理措施是

- A. 减少活动，避免哭闹
- B. 保持呼吸道通畅
- C. 抬高床头
- D. 持续高流量吸氧 ✓

E. 超声雾化吸入

解析：该患儿的缺氧是由于喉头水肿造成的呼吸道不畅通，持续高流量吸氧没有作用。选 D。

10. 患儿，女，10 个月，因面色苍白 2 个月来医院就诊。患儿生后单纯母乳喂养，未添加辅食。查体：精神萎靡，营养发育较差，反应迟钝，皮肤黏膜和甲床苍白，头发枯黄，前囟 2cm×3cm，心、肺无异常，肝肋下 2cm，脾肋下 1.5cm。血红蛋白 70g/L，血涂片见红细胞体积小、含色素低。用药后的表现为

- A. 3~4 天网织红细胞上升 ✓
- B. 3~4 周后网织红细胞上升
- C. 3~4 天血红蛋白逐渐上升
- D. 2~3 天网织红细胞逐渐上升
- E. 血红蛋白与网织红细胞同时增加

解析：

11. 3 岁小儿，因生长发育迟缓来院就诊，表现为身材矮小、智力落后。经检查诊断为先天性甲状腺功能减退症。对于此类疾病，为预防神经系统功能损害应当及时开始治疗，正确的时间是

- A. 生后 1~2 个月内 ✓
- B. 生后 3~4 个月内
- C. 生后 5~6 个月内
- D. 生后 7~8 个月内
- E. 生后 9~10 个月内

解析：

12. 2 岁小儿，7 天前出现咳嗽、低热、流涕等上呼吸道感染症状。3 天前热退，但咳嗽日益严重，尤其以夜间为甚，经检查以百日咳收入院。目前该患儿呈现典型痉咳状态，常突发数十声急促的咳嗽，终末长吸气体伴高调鸡鸣样吼声。此时最主要的护理诊断为

- A. 潜在并发症：肺不张
- B. 低效型呼吸形态
- C. 自主呼吸受损
- D. 有窒息的危险 ✓
- E. 活动无耐力

解析：

13. 患儿，1 岁半，半天来打喷嚏、发热，1 小时前突然抽搐持续 2 分钟。去医院途中抽搐停止，神志清。查体：发育正常，体温 38.5℃，前囟已闭，咽充血，心、肺无异常，颈无抵抗。该患儿最可能是

- A. 中枢神经系统感染
- B. 败血症
- C. 癫痫发作
- D. 上呼吸道感染，热性惊厥 ✓
- E. 婴儿手足搐搦症

解析：

14. 足月新生儿，第一胎，男，生后第 3 天，母乳喂养，生后 24 小时出现黄疸，皮肤黄染逐渐加重，查：Hb110g/L，母血型 O，子血型 B。该患儿护理措施不包括

- A. 给予光照疗法
- B. 输血浆

- C. 保暖
- D. 停止母乳喂养 ✓
- E. 预防感染

解析：母乳喂养不会加重溶血的症状，可以继续母乳喂养。故选 D。

15. 女，8 个月。因进食过量发生腹泻，6~10 次/日，体温 37.9℃，精神弱，前囟略凹，尿量稍减少。大便镜检：少量脂肪球，血清钠 140mmol/L。该患儿的脱水程度及性质

- A. 轻度等渗脱水 ✓
- B. 中度等渗脱水
- C. 轻度低渗脱水
- D. 中度低渗脱水
- E. 轻度高渗脱水

解析：

16. 患儿，女，1 岁，生后 3 个月起青紫渐加重，活动后气急，查体：生长发育明显落后，口唇、鼻尖、耳垂、指（趾）青紫明显，伴杵状指（趾），胸骨左缘闻及Ⅲ级收缩期杂音，肺动脉瓣第二音减弱。诊断为法洛四联症收入院。患儿第二天晨起吃奶时出现阵发性呼吸困难、烦躁和青紫加重，出现昏厥，其原因是

- A. 脑膜炎
- B. 脑栓塞
- C. 脑脓肿
- D. 心力衰竭
- E. 肺动脉漏斗部肌肉痉挛 ✓

解析：

17. 患儿，男，4 岁，面部及双下水肿 2 周收入院。查体：精神可，眼睑颜面水肿，心肺腹无异常，阴囊中度水肿，下肢可凹性水肿。实验室检查：尿蛋白（++++），血浆总蛋白及白蛋白明显减少，血胆固醇明显升高，补体 C₃ 正常。该患儿正确的诊断是

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 先天性肾病
- C. 单纯性肾病 ✓
- D. 肾炎性肾病
- E. 泌尿系感染

解析：

18. 10 岁男孩，体重 40kg，因酮症酸中毒急诊入院，经抢救病情稳定，诊断为 1 型糖尿病。该患儿每日所需热卡为

- A. 1000~1200kcal
- B. 1400~1600kcal
- C. 1800~2000kcal ✓
- D. 2200~2400kcal
- E. 2600~2800kcal

解析：

19. 2 岁小儿，7 天前出现咳嗽、低热、流涕等上呼吸道感染症状。3 天前热退，但咳嗽日益严重，尤其以夜间为甚，经检查以百日咳收入院。针对患儿的痉挛性咳嗽，正确的护理措施是

- B. 进食后活动以防止呕吐
- C. 伴窒息者需专人监护 ✓
- D. 严禁服用镇静剂
- E. 痉咳前进食

解析:

20. 患儿，1岁半，半天来打喷嚏、发热，1小时前突然抽搐持续2分钟。去医院途中抽搐停止，神志清。查体：发育正常，体温38.5℃，前囟已闭，咽充血，心、肺无异常，颈无抵抗。此患儿抗惊厥首选的药物是

- A. 苯巴比妥钠
- B. 苯妥英钠
- C. 地西泮 ✓
- D. 水合氯醛
- E. 复方氯丙嗪

解析:

21. 足月新生儿，第一胎，男，生后第3天，母乳喂养，生后24小时出现黄疸，皮肤黄染逐渐加重，查：Hb110g/L，母血型O，子血型B。遵医嘱给予该患儿光照治疗，光疗前的准备工作不包括

- A. 为患儿剪指甲
- B. 为患儿清洁皮肤
- C. 为患儿涂护肤油 ✓
- D. 为患儿戴眼罩
- E. 保护患儿会阴部

解析：光疗时皮肤上不可涂抹油类，以防灼伤皮肤。选C。

22. 女，8个月。因进食过量发生腹泻，6~10次/日，体温37.9℃，精神弱，前囟略凹，尿量稍减少。大便镜检：少量脂肪球，血清钠140mmol/L。患儿首先应考虑护理问题是

- A. 腹泻
- B. 有体液不足的危险 ✓
- C. 体温过高
- D. 有皮肤完整性受损的危险
- E. 营养不足

解析:

23. 患儿，女，1岁，生后3个月起青紫渐加重，活动后气急，查体：生长发育明显落后，口唇、鼻尖、耳垂、指（趾）青紫明显，伴杵状指（趾），胸骨左缘闻及Ⅲ级收缩期杂音，肺动脉瓣第二音减弱。诊断为法洛四联症收入院。该患儿应该采取的体位是

- A. 平卧位
- B. 右侧卧位
- C. 左侧卧位
- D. 俯卧位
- E. 膝胸位 ✓

解析:

24. 患儿，男，4岁，面部及双下水肿2周收入院。查体：精神可，眼睑颜面水肿，心肺腹无异常，阴囊中

- A. 每日 1g/kg
- B. 每日 2g/kg ✓
- C. 每日 3g/kg
- D. 每日 4g/kg
- E. 每日 5g/kg

解析:

25. 10 岁男孩, 体重 40kg, 因酮症酸中毒急诊入院, 经抢救病情稳定, 诊断为 1 型糖尿病。为防止胰岛素注射过量引起的危险, 护士应当指导患儿做到

- A. 合理控制饮食
- B. 积极锻炼身体
- C. 固定注射部位
- D. 随身携带糖块 ✓
- E. 保持皮肤清洁

解析:

26. 2 岁小儿, 7 天前出现咳嗽、低热、流涕等上呼吸道感染症状。3 天前热退, 但咳嗽日益严重, 尤其以夜间为甚, 经检查以百日咳收入院。对该患儿的隔离应当持续到

- A. 起病后 2 周
- B. 起病后 3 周
- C. 起病后 4 周
- D. 痊愈后 2 周
- E. 痊愈后 4 周 ✓

解析:

27. 患儿, 1 岁半, 半天来打喷嚏、发热, 1 小时前突然抽搐持续 2 分钟。去医院途中抽搐停止, 神志清。查体: 发育正常, 体温 38.5℃, 前囟已闭, 咽充血, 心、肺无异常, 颈无抵抗。高热惊厥的护理目标是

- A. 体温降至正常
- B. 发作时不发生自伤和窒息 ✓
- C. 不发生尿失禁
- D. 无意识丧失可能
- E. 不发生智力障碍

解析:

28. 患儿男, 8 个月, 因夜间睡眠不安、多汗、易激惹就诊。查体可见方颅、肋膈沟, 手镯征、足镯征。该患儿最可能的诊断是

- A. 营养不良
- B. 骨软化病
- C. 佝偻病初期
- D. 佝偻病激期 ✓
- E. 佝偻病后遗症期

解析: 本组题考查的是维生素 D 缺乏性佝偻病的相关知识。维生素 D 缺乏性佝偻病临床上可分为四期: 初期、激期、恢复期和后遗症期。其中处于激期的患儿可有以下骨骼改变: ①头部: 随年龄增长可依次出现

29. 女, 8 个月。因进食过量发生腹泻, 6~10 次/日, 体温 37.9℃, 精神弱, 前囟略凹, 尿量稍减少。大便镜检: 少量脂肪球, 血清钠 140mmol/L。该患儿首选的护理措施是

- A. 暂禁食 8 小时
- B. 按医嘱用抗生素
- C. 停辅食继续母乳喂养 ✓
- D. 停辅食改豆制品
- E. 静脉补液

解析:

30. 男婴, 7 个月, 近两个月来肤色苍白, 食欲减退入院。生后一直人工喂养, 未加辅食。查体: 营养差, 皮肤、黏膜苍白, 心前区有 II 级收缩期杂音, 肝肋下 3cm, 脾肋下 1cm。化验: 血红蛋白及红细胞均低于正常, 白细胞、血小板及网织红细胞均正常。患儿最可能的诊断是

- A. 生理性贫血
- B. 婴儿感染性贫血
- C. 营养性缺铁性贫血 ✓
- D. 营养性巨幼细胞贫血
- E. 营养性混合性贫血

解析:

31. 患儿, 男, 4 岁, 面部及双下水肿 2 周收入院。查体: 精神可, 眼睑颜面水肿, 心肺腹无异常, 阴囊中度水肿, 下肢可凹性水肿。实验室检查: 尿蛋白(++++), 血浆总蛋白及白蛋白明显减少, 血胆固醇明显升高, 补体 C₃ 正常。治疗该患儿首选的药物是

- A. 肾上腺皮质激素 ✓
- B. 青霉素
- C. 利尿剂
- D. 白蛋白
- E. 钙剂

解析:

32. 男, 6 个月。吐奶拒食, 嗜睡 2 天。查体: 面色青灰, 前囟紧张, 脐部少许脓性分泌物。该患儿最可能的诊断是

- A. 病毒性脑炎
- B. 化脓性脑膜炎 ✓
- C. 脑脓肿
- D. 颅内出血
- E. 脐炎

解析: 本题考查化脓性脑膜炎相关考点。根据患儿的体征和检查, 可以判断患儿是由于脐部感染引起的化脓性脑膜炎。选 B。

33. 某患儿, 3 岁, 因结核性脑膜炎入院治疗。目前该患儿表现为精神呆滞、睡眠不安、双目凝视、喜哭。该患儿目前处于

- A. 脑膜刺激征期
- B. 昏迷期

D. 中期

E. 晚期

解析：本组题考查结核性脑膜炎相关考点。结核性脑膜炎前驱期主要症状为小儿性格改变，可有精神呆滞、睡眠不安、双目凝视、喜哭等表现。选 C。

34. 女，12 岁，来院时意识模糊，恶心呕吐 2 次，呕吐物为胃内容物，带大蒜臭味。查体：体温 37℃，呼吸 28 次/分，血压 13.3/8kPa (100/60mmHg)，呼之不应，面色苍白，手足抽动，皮肤及四肢湿冷，流涎，瞳孔针尖大小，等圆。最可能的诊断是

- A. 阿托品中毒
- B. 有机磷中毒 ✓
- C. 亚硝酸中毒
- D. 安眠药中毒
- E. 洋地黄中毒

解析：

35. 患儿男，8 个月，因夜间睡眠不安、多汗、易激惹就诊。查体可见方颅、肋膈沟，手镯征、足镯征。该患儿口服维生素 D 治疗的剂量和疗程为

- A. 500~1000IU/d 治疗 1 个月
- B. 1000~2000IU/d 治疗 1 个月
- C. 2000~4000IU/d 治疗 1 个月 ✓
- D. 5000~6000IU/d 治疗 3 个月
- E. 10000~20000IU/d 治疗 1 个月

解析：维生素 D 治疗：口服维生素 D 每日 50~100 μg (2000~4000IU)，或 1, 25-(OH)₂D₃ 0.5~2.0 μg，1 个月后改为预防量 400IU/d。故选 C。

36. 女，8 个月。因发热，咳嗽咳痰 2 天，气急伴发绀 2 小时入院。体检：体温 38.9℃，呼吸 80 次/分，双肺闻及细湿啰音，心率 180 次/分，心音低钝，肝肋下 4cm。该患儿的临床诊断可能是

- A. 毛细支气管炎
- B. 腺病毒肺炎
- C. 肺炎支原体肺炎
- D. 支气管肺炎合并心力衰竭 ✓
- E. 肺炎合并中毒性脑炎

解析：

37. 男婴，7 个月，近两个月来肤色苍白，食欲减退入院。生后一直人工喂养，未加辅食。查体：营养差，皮肤、黏膜苍白，心前区有 II 级收缩期杂音，肝肋下 3cm，脾肋下 1cm。化验：血红蛋白及红细胞均低于正常，白细胞、血小板及网织红细胞均正常。此患儿发病的主要原因是

- A. 喂养不当 ✓
- B. 丢失过多

- C. 营养物质吸收障碍
- D. 生长发育过快
- E. 慢性感染

解析：

38. 患儿，男 8 岁，眼睑水肿 4 天伴尿少，近 2 日尿呈浓茶色，患儿无尿频、尿急、尿痛。患儿 3 周前曾患

育性发育迟缓性呆滞，心肺()，腹软，肝、脾肿大及。该患儿正确的诊断是

- A. 先天性肾病
- B. 单纯性肾病
- C. 肾炎性肾病
- D. 急性肾小球肾炎 ✓
- E. 泌尿系感染

解析：

39. 男，6个月。吐奶拒食，嗜睡2天。查体：面色青灰，前囟紧张，脐部少许脓性分泌物。为确诊最重要的检查是

- A. 血常规
- B. 尿常规
- C. 脑脊液检查 ✓
- D. 脑CT
- E. 脐分泌物培养

解析：脑脊液检查是判断化脓性脑膜炎的主要指标。选C。

40. 某患儿，3岁，因结核性脑膜炎入院治疗。目前该患儿表现为精神呆滞、睡眠不安、双目凝视、喜哭。该患儿目前适宜的护理诊断是

- A. 有皮肤完整性受损的危险
- B. 潜在并发症：颅内高压 ✓
- C. 有窒息的危险
- D. 有受伤的危险
- E. 活动无耐力

解析：颅内高压与脑实质炎性肿胀、脑脊液分泌增加和回流受阻有关。故选B。

41. 女，12岁，来院时意识模糊，恶心呕吐2次，呕吐物为胃内容物，带大蒜臭味。查体：体温37℃，呼吸28次/分，血压13.3/8kPa(100/60mmHg)，呼之不应，面色苍白，手足抽动，皮肤及四肢湿冷，流涎，瞳孔针尖大小，等圆。洗胃时间最好不要超过服毒后

- A. 2~4小时
- B. 4~6小时 ✓
- C. 6~8小时
- D. 8~10小时
- E. 10~12小时

解析：

42. 患儿男，8个月，因夜间睡眠不安、多汗、易激惹就诊。查体可见方颅、肋膈沟，手镯征、足镯征。该患儿在口服维生素D时，以下用法错误的是

- A. 1个月后改为预防量
- B. 选用单纯的维生素D制剂
- C. 口服维生素D前后加服钙剂
- D. 口服维生素D加入奶瓶中与牛奶同服 ✓
- E. 维生素D滴剂直接滴在患儿的口内

解析：小儿口服维生素D前后加服牛奶是可以的，能帮助钙的更好吸收。但是口服维生素D不能加入奶瓶

43. 女, 8 个月。因发热, 咳嗽咳痰 2 天, 气急伴发绀 2 小时入院。体检: 体温 38.9℃, 呼吸 80 次/分, 双肺闻及细湿啰音, 心率 180 次/分, 心音低钝, 肝肋下 4cm。患儿最主要的护理问题是

- A. 活动无耐力
- B. 心排出量减少 ✓
- C. 低效性呼吸型态
- D. 体温过高
- E. 有体液不足的危险

解析:

44. 男婴, 7 个月, 近两个月来肤色苍白, 食欲减退入院。生后一直人工喂养, 未加辅食。查体: 营养差, 皮肤、黏膜苍白, 心前区有 II 级收缩期杂音, 肝肋下 3cm, 脾肋下 1cm。化验: 血红蛋白及红细胞均低于正常, 白细胞、血小板及网织红细胞均正常。最适宜的治疗方案是

- A. 注意饮食调节即可
- B. 口服铁剂
- C. 给予铁剂及维生素 ✓
- D. 铁剂肌内注射
- E. 少量输注浓缩红细胞

解析:

45. 患儿, 男 8 岁, 眼睑水肿 4 天伴尿少, 近 2 日尿呈浓茶色, 患儿无尿频、尿急、尿痛。患儿 3 周前曾患上呼吸道感染。查体: T36.2℃, R26 次/分, P100 次/分, BP130/90mmHg, 神清, 双眼睑及颜面水肿, 双足背轻度非凹陷性水肿, 心肺(一), 腹软, 肝、脾肋下未及。患儿入院第 3 天出现频繁咳嗽、气急、咳泡沫痰, 尿量减少为 200ml/d。查体: 心率增快, 双肺布满湿啰音, 肝明显增大, 该患儿可能并发了

- A. 支气管肺炎
- B. 心力衰竭
- C. 严重循环充血 ✓
- D. 急性肾衰竭
- E. 高血压脑病

解析:

46. 男, 6 个月。吐奶拒食, 嗜睡 2 天。查体: 面色青灰, 前囟紧张, 脐部少许脓性分泌物。关于该患儿的护理措施, 错误的是

- A. 术后 2 小时可抱起喂奶 ✓
- B. 密切观察生命体征
- C. 去枕平卧 6 小时

- D. 观察局部有无出血现象
- E. 如颅压高可按医嘱使用脱水剂

解析: 腰椎穿刺术后应去枕平卧 6 小时, 不应抱起患儿。选 A。

47. 某患儿, 3 岁, 因结核性脑膜炎入院治疗。目前该患儿表现为精神呆滞、睡眠不安、双目凝视、喜哭。该患儿目前适宜的护理措施是

- A. 绝对卧床 ✓
- B. 鼻饲饮食
- C. 约束肢体

E. 油纱布覆盖眼睛

解析：重症患儿应绝对卧床休息，并观察生命体征的变化。选 A。

48. 女，12 岁，来院时意识模糊，恶心呕吐 2 次，呕吐物为胃内容物，带大蒜臭味。查体：体温 37℃，呼吸 28 次/分，血压 13.3/8kPa (100/60mmHg)，呼之不应，面色苍白，手足抽动，皮肤及四肢湿冷，流涎，瞳孔针尖大小，等圆。有机磷中毒出现呼吸循环衰竭的首要治疗措施是

- A. 吸氧
- B. 呼吸中枢兴奋剂静脉注射
- C. 强心剂静脉注射
- D. 阿托品静脉注射 ✓
- E. 胆碱酯酶复能剂静脉注射

解析：

49. 早产儿，生后 16 小时，第二产程延长，吸引器助产，出生时窒息 2 分钟，复苏后嗜睡，查体：体温 36℃，口周略青，前囟饱满，心肺（一）。该患儿的临床诊断为

- A. 新生儿化脓性脑膜炎
- B. 新生儿破伤风
- C. 新生儿脐炎
- D. 新生儿颅内出血 ✓
- E. 新生儿败血症

解析：

50. 患儿男，8 个月，因夜间睡眠不安、多汗、易激惹就诊。查体可见方颅、肋膈沟，手镯征、足镯征。该患儿首优护理诊断是

- A. 营养不足
- B. 生长发育改变
- C. 有感染的危险
- D. 有受伤的危险
- E. 潜在并发症，低钙惊厥 ✓

解析：首优护理问题是指会威胁生命，需要立即解决的问题。如：清理呼吸道异物、有暴力行为的危险、体液严重不足等。以上各选项中，低钙惊厥虽然属于潜在危险性问题，但是一旦发生，病情严重，故应当视为首优护理问题。故选 E。

51. 女，8 个月。因发热，咳嗽咳痰 2 天，气急伴发绀 2 小时入院。体检：体温 38.9℃，呼吸 80 次/分，双肺闻及细湿啰音，心率 180 次/分，心音低钝，肝肋下 4cm。给予患儿下列哪种体位

- A. 端坐位
- B. 平卧位
- C. 半卧位 ✓
- D. 侧卧位
- E. 头低足高位

解析：

52. 患儿，女，10 个月，因面色苍白 2 个月来医院就诊。患儿生后单纯母乳喂养，未添加辅食。查体：精神萎靡，营养发育较差，反应迟钝，皮肤黏膜和甲床苍白，头发枯黄，前囟 2cm×3cm，心、肺无异常，肝肋下 2cm，脾肋下 1.5cm。血红蛋白 70g/L，血涂片见红细胞体积小、含色素低。该患儿的贫血属于

- D. 轻度
- C. 中度 ✓
- D. 重度
- E. 极重度

解析:

53. 患儿, 男 8 岁, 眼睑水肿 4 天伴尿少, 近 2 日尿呈浓茶色, 患儿无尿频、尿急、尿痛。患儿 3 周前曾患上呼吸道感染。查体: T36.2℃, R26 次/分, P100 次/分, BP130/90mmHg, 神清, 双眼睑及颜面水肿, 双足背轻度非凹陷性水肿, 心肺(一), 腹软, 肝、脾肋下未及。目前患儿的尿量每日 300ml, 此时应

- A. 限制水和钠盐摄入 ✓
- B. 限制钾盐摄入
- C. 限制蛋白质的摄入
- D. 限制糖的摄入
- E. 正常饮食

解析:

54. 2 岁女童, 因持续发热 1 周伴皮疹来院就诊, 入院后检查发现四肢末端实性肿胀、双眼结膜充血、口唇干燥潮红、咽部黏膜弥漫性发红及颈部淋巴结肿大。对于该患儿双眼症状, 适宜的护理措施是

- A. 佩戴防护目镜
- B. 减少用眼时间
- C. 每日做眼保健操
- D. 使用抗生素眼药水
- E. 每日用生理盐水擦洗双眼 ✓

解析: 该患儿表现符合川崎病特征。其眼部症状是全身小血管炎的局部表现, 每日以生理盐水擦洗可以缓解不适, 无需特殊处理。选 E。

55. 患儿男, 7 岁, 因 1 个月来持续低热、消瘦、食欲不振、疲乏来院就诊。对该患儿行 PPD 试验检查, 其结果为结节红硬, 直径 23mm 判定为

- A. 阴性
- B. 弱阳性
- C. 中等阳性
- D. 强阳性 ✓
- E. 极强阳性

解析:

二、A1/A2 题型(总题数: 16, 分数: 15.36)

56. 男, 2 岁, 1 个月前患麻疹, 近 2 周来有发热, T39℃, 咳嗽、气促、双肺呼吸音粗, 肝肋下 3cm, 脾肋下 2cm, 结核菌素试验阴性。X 线胸片: 见双肺均匀分布大小一致的点状阴影。可能诊断是

- A. 原发型肺结核
- B. 粟粒型肺结核 ✓
- C. 支气管肺炎
- D. 麻疹肺炎
- E. 金黄色葡萄球菌肺炎

解析: 患儿患麻疹后, 免疫功能下降, 易感染结核, 且易发生血行播散, 引起粟粒型肺结核, 此患儿全身

57. 现场抢救心跳呼吸骤停的正确复苏程序是

- A. 人工呼吸、开放气道、心脏按压
- B. 开放气道、人工呼吸、心脏按压
- C. 心脏按压、开放气道、人工呼吸 ✓
- D. 人工呼吸、心脏按压、心室除颤
- E. 人工呼吸、心脏按压、应用复苏药物

解析:

58. 对结核杆菌正确的消灭方法是

- A. 5%苯酚浸泡 12h
- B. 5%漂白粉浸泡 24h
- C. 干热 80℃20min
- D. 湿热 68℃20min ✓
- E. 冰冻 4 周

解析: 结核菌对湿热敏感, 68℃20min 即可灭活。

59. 禁用催吐方法的中毒患儿是

- A. 毒物食入在 2~4 小时内
- B. 毒物食入在 4~6 小时内
- C. 婴幼儿
- D. 学龄前儿童
- E. 神志不清和腐蚀性中毒者 ✓

解析:

60. 8 岁小儿, 结核菌素试验结果硬结直径 5mm, 无结核病临床症状, 其结果正确的解释是

- A. 阴性, 可能未受感染
- B. 强阳性, 提示活动病灶
- C. 弱阳性, 提示曾经感染 ✓
- D. 中度阳性, 提示有新感染灶
- E. 阴性, 可能处于结核变态反应初期

解析: 8 岁小儿无结核病临床症状, 结核菌素试验弱阳性, 提示曾经感染过结核或接种过卡介苗。

61. 使用甘露醇降低颅内压时需要注意

- A. 保持药物低温输入
- B. 药物外渗后使用冷湿敷
- C. 甘露醇需要在 1 小时内注入 ✓
- D. 药物外渗后使用硫酸镁湿敷
- E. 甘露醇两次使用需要间隔 12 小时

解析:

62. 结核预防性服药的指征不包括

- A. 3 岁以下小儿未接种过卡介苗, 有结核接触史 PPD 试验 (+)
- B. 与开放式结核密切接触史的小儿
- C. PPD 试验近期由阴性转为阳性
- D. 胸片发现原发综合征 ✓

解析：

63. 某患儿因急性颅内高压入院治疗，目前该患儿出现瞳孔大小不等，正确的体位是

- A. 俯卧位
- B. 平卧位 ✓
- C. 头低脚高位
- D. 头肩抬高 25°
- E. 平卧、头偏向一侧

解析：

64. 某患儿因蛔虫病入院治疗，其表现为不安、易惊、磨牙、异食癖。血嗜酸粒细胞显著增高。造成这些临床表现的原因可能是

- A. 幼虫移行发育
- B. 幼虫钻孔
- C. 成虫游走
- D. 成虫钻入胆道
- E. 成虫代谢物被吸收 ✓

解析：

65. 某 8 个月患儿因感染性休克入院治疗，目前确诊为轻症休克，护士应当在该患儿观察到

- A. 脉搏微弱
- B. 四肢湿冷 ✓
- C. 呼吸深长
- D. 全天尿量不少于 200ml
- E. 脉压差小于 20mmHg

解析：

66. 常用驱虫药不包括

- A. 哌嗪
- B. 噻嘧啶
- C. 奥美拉唑 ✓

D. 左旋咪唑

E. 甲苯咪唑

解析：

67. 某患儿于半小时前误服强酸，可以使用的抢救方法是

- A. 洗胃
- B. 催吐
- C. 导泻
- D. 喝碳酸氢钠
- E. 喝氢氧化铝凝胶 ✓

解析：

68. 小儿惊厥首要的治疗原则是

- A. 钙剂治疗
- B. 控制惊厥 ✓

D. 对症治疗

E. 针刺疗法

解析：小儿惊厥的治疗要点是维持生命体征，控制惊厥发作，治疗惊厥病因，预防惊厥复发。故选 B。

69. 以下情况中可以使用呼吸兴奋剂的是

A. 呼吸道梗阻者

B. 分泌物黏稠有潴留者

C. 严重广泛肺部病变者

D. 呼吸表浅不规则者 ✓

E. 神经肌肉疾病者

解析：

70. 患儿女，4岁，低热3周，乏力，盗汗，精神萎靡，阵发性干咳，用青霉素治疗无效，今来就诊。出生时已接种卡介苗行 X 线检查肺部示“哑铃状”阴影。最可能的诊断是

A. 支气管肺炎

B. 肺炎支原体肺炎

C. 腺病毒性肺炎

D. 粟粒性肺结核

E. 原发型肺结核 ✓

解析：原发型肺结核为结核杆菌初次侵入肺部后发生的原发感染，是儿童肺结核的主要类型。典型的原发复合征呈“双极”病变，X 线胸片呈典型的哑铃状双极阴影。根据低热、盗汗等肺结核典型症状及 X 线检查可诊断为原发型肺结核。

71. 患儿男，3岁，既往有3次热性惊厥史，2小时前出现发热，在家中突然惊厥发作，发作时，家长应采取的措施是

A. 保暖

B. 口服退热药

C. 冰袋物理降温

D. 口服苯巴比妥

E. 松解衣领，头偏向一侧 ✓

解析：热性惊厥是儿童时期最常见的惊厥性疾病，多呈全身强直一痉挛发作。因此在惊厥发作时，家长应立即就地抢救，解开衣领，松解衣物，清除患儿口鼻腔分泌物，呕吐物等使气道通畅，头偏向一侧，避免误吸。故选 E。

三、B1 题型(总题数：33，分数：31.68)

72. 小儿腹围和胸围大约相等的年龄是

A. 1岁

B. 2岁 ✓

C. 4岁

D. 6岁

E. 8岁

解析：小儿平脐（小婴儿以剑突与脐之间的中点）水平绕腹一周长度为腹围，2岁前腹围与胸围约相等，2岁后则腹围较小。腹围测量不易准确，且影响因素较多，故意义不大。故选 B。

73. 婴儿每日需要脂肪量应占总需能量的

- C. 45% ✓
- D. 30%
- E. 15%

解析:

74. 动脉导管未闭会出现

- A. 肺动脉高压时可出现下半身青紫 ✓
- B. 肺动脉瓣第 2 心音固定分裂
- C. 易出现心律失常
- D. 胸片显示肺血少, 心影呈靴形
- E. 可发生艾森曼格综合征

解析: 动脉导管未闭分流量大者, 长期高压冲击造成肺动脉压力增高可致右心室肥大和衰竭, 当肺动脉压力超过主动脉时, 即产生右向左分流, 造成下半身青紫。选 A。

75. 智力正常的是

- A. 猫叫综合征
- B. 甲状腺功能低下
- C. 糖原累积症 ✓
- D. 苯丙酮尿症
- E. 21-三体综合征

解析: 糖原累积症患儿身体比例和智力均正常。选 C。

76. 已有时间概念的年龄是

- A. 3~4 个月
- B. 4~5 个月
- C. 1~2 岁
- D. 2~3 岁

- E. 4~5 岁 ✓

解析: 时间概念属于知觉的发育范畴, 发育较晚, 4~5 岁小儿才开始有时间概念。选 E。

77. 年长儿每日由碳水化合物所提供能量应占总需能量的

- A. 70%~75%
- B. 50%~60% ✓
- C. 45%
- D. 30%
- E. 15%

解析:

78. 法洛四联症会出现

- A. 肺动脉高压时可出现下半身青紫
- B. 肺动脉瓣第 2 心音固定分裂
- C. 易出现心律失常
- D. 胸片显示肺血少, 心影呈靴形 ✓
- E. 可发生艾森曼格综合征

解析: 法洛四联症由于右心室肥大使心尖上翘和漏斗部狭窄使心腰凹陷胸片显示心影呈靴形。由于肺动脉

度增加。选 D。

79. 早期饮食控制可避免智力低下的是

- A. 猫叫综合征
- B. 甲状腺功能低下
- C. 糖原累积症
- D. 苯丙酮尿症 ✓
- E. 21-三体综合征

解析：苯丙酮尿症患者确诊后应尽早开始进行治疗，3 个月内开始可避免智力的损害，超过 1 岁治疗者智力低下不可避免。选 D。

80. 小儿通过皮肤与手眼活动区分物体的大小、软硬等的年龄是

- A. 3~4 个月
- B. 4~5 个月
- C. 1~2 岁
- D. 2~3 岁 ✓
- E. 4~5 岁

解析：2~3 岁时，小儿通过接触能区分物体的软、硬、冷、热等属性。选 D。

81. 可影响小儿生长发育的药物是

- A. 氨茶碱
- B. 氯霉素
- C. 维生素 K
- D. 庆大霉素
- E. 肾上腺皮质激素 ✓

解析：

82. 为预防巨幼细胞贫血应避免

- A. 长期羊奶喂养 ✓
- B. 动物血、黄豆、肉类
- C. 过硬、油炸等刺激性食物
- D. 新鲜瓜果、蔬菜
- E. 长期用未煮沸的牛奶

解析：

83. 通常有通贯手的是

- A. 猫叫综合征
- B. 甲状腺功能低下
- C. 糖原累积症
- D. 苯丙酮尿症
- E. 21-三体综合征 ✓

解析：21-三体综合征患儿表现为眼距宽，眼裂小，外眼角上斜，鼻根低平，通贯手，身材矮小，头围小于正常，智力低下等。选 E。

84. 已出现“乱语”的年龄是

- A. 3~4 个月

- C. 1~2岁 ✓
- D. 2~3岁
- E. 4~5岁

解析：1~2岁的小儿，很想用语言表达自己的需求，但由于词汇有限，常常说出一些成人听不懂的话语，即乱语。选C。

85. 会造成“灰婴综合征”的药物是

- A. 氨茶碱
- B. 氯霉素 ✓
- C. 维生素K
- D. 庆大霉素
- E. 肾上腺皮质激素

解析：

86. 原发性血小板减少性紫癜患儿应避免吃

- A. 长期羊奶喂养
- B. 动物血、黄豆、肉类
- C. 过硬、油炸等刺激性食物 ✓
- D. 新鲜瓜果、蔬菜
- E. 长期用未煮沸的牛奶

解析：

87. 发热、皮疹伴杨梅舌及扁桃体炎的是

- A. 幼儿急疹
- B. 麻疹

- C. 风疹
- D. 水痘
- E. 猩红热 ✓

解析：

88. 对食物口味的变化很敏感的年龄是

- A. 3~4个月
- B. 4~5个月 ✓
- C. 1~2岁
- D. 2~3岁
- E. 4~5岁

解析：新生儿出生时味觉发育已经成熟，4~5个月时对事物口味的微小改变很敏感，这时应适时添加各类辅食，使婴儿适应各种口味。选B。本考点提示：考生应牢记身高、体重计算公式。体重公式：①1~6月龄体重=出生体重(kg)+月龄×0.7(kg)。②7~12月龄体重=6(kg)+月龄×0.25(kg)。③2~12岁体重=实足年龄×2(kg)+8(kg)。1周岁小儿体重约为出生体重3倍；2周岁约为出生体重4倍。身高公式：2~12岁身高=年龄×7+70cm。1岁身高75cm，2岁身高85cm。

89. 有耳毒性的药物是

- A. 氨茶碱
- B. 氯霉素

E. 肾上腺皮质激素

解析:

90. 为预防缺铁性贫血小儿应常吃

- A. 长期羊奶喂养
- B. 动物血、黄豆、肉类 ✓
- C. 过硬、油炸等刺激性食物
- D. 新鲜瓜果、蔬菜
- E. 长期用未煮沸的牛奶

解析:

91. 发热 3~4 天出疹，疹间皮肤正常，出疹期发热更高的是

- A. 幼儿急疹
- B. 麻疹 ✓
- C. 风疹
- D. 水痘
- E. 猩红热

解析:

92. 腹泻患儿严禁使用

- A. 卡介苗
- B. 麻疹疫苗
- C. 乙肝疫苗

D. 甲肝疫苗

E. 脊髓灰质炎疫苗 ✓

解析:

93. 佝偻病活动期维生素 D 口服用量为

- A. 400~800IU/d
- B. 1000~2000IU/d
- C. 2000~4000IU/d ✓
- D. 10000~20000IU/d
- E. 20000~30000IU/d

解析: 本组题考查的是佝偻病的相关知识。佝偻病即维生素 D 缺乏性佝偻病，是由于婴幼儿、儿童、青少年体内维生素 D 不足，引起钙、磷代谢紊乱，产生的一种以骨骼病变为特征的全身、慢性、营养性疾病。维生素 D 治疗的目的在于控制活动期，防止骨骼畸形。治疗的原则应以口服维生素 D 为主，一般剂量为每日 2000IU~4000IU，故选 C。

94. 会导致关节畸形的是

- A. 风湿热
- B. 儿童类风湿病 ✓
- C. 过敏性紫癜
- D. 先天性胸腺发育不全
- E. 皮肤黏膜淋巴结综合征

解析: 儿童类风湿病的临床表现有发热、皮疹和关节症状，后者发作时关节可发生畸形和强直。长期不愈

95. 可引起第Ⅷ对脑神经损害、肾损害的是

- A. 异烟肼
- B. 链霉素 ✓
- C. 吡嗪酰胺
- D. 乙胺丁醇
- E. 乙硫异烟胺

解析：

96. 初种年龄为 1 岁以上的疫苗是

- A. 卡介苗
- B. 麻疹疫苗
- C. 乙肝疫苗
- D. 甲肝疫苗 ✓
- E. 脊髓灰质炎疫苗

解析：

97. 佝偻病恢复期维生素 D 用量范围为

- A. 400~800IU/d ✓
- B. 1000~2000IU/d
- C. 2000~4000IU/d
- D. 10000~20000IU/d

- E. 20000~30000IU/d

解析：维生素 D 治疗一月后改预防量 400~800IU/d。故选 A。

98. 容易引起肾损害的是

- A. 风湿热
- B. 儿童类风湿病
- C. 过敏性紫癜 ✓
- D. 先天性胸腺发育不全
- E. 皮肤黏膜淋巴结综合征

解析：过敏性紫癜的临床表现是皮肤紫癜、胃肠道症状（腹痛、恶心、血便等）、关节肿痛和肾受累等。选 C。

99. 可引起精神兴奋、周围神经炎、肝功受损的是

- A. 异烟肼 ✓
- B. 链霉素
- C. 吡嗪酰胺
- D. 乙胺丁醇
- E. 乙硫异烟胺

解析：

100. 小儿头围和胸围相等的年龄是

- A. 1 岁 ✓
- B. 2 岁
- C. 4 岁

E. 8岁

解析：本组题考查的是小儿体格生长规律的相关知识。出生时胸围比头围小1~2cm，平均为32.4cm，1岁时头围约等于胸围，出现头围，胸围生长曲线交叉，1岁以后胸围超过头围。故选A。

101. 婴儿基础代谢所需的能量占总需能量的

- A. 70%~75%
- B. 50%~60% ✓
- C. 45%
- D. 30%
- E. 15%

解析：

102. 房间隔缺损出现

- A. 肺动脉高压时可出现下半身青紫
- B. 肺动脉瓣第2心音固定分裂 ✓
- C. 易出现心律失常
- D. 胸片显示肺血少，心影呈靴形
- E. 可发生艾森曼格综合征

解析：出生后随着肺循环血量的增加，左心房压力>右心房压力，分流自左向右，分流造成右心房和右心室负荷过重而产生右心房和右心室增大，由于右心室扩张，收缩时喷射血流时间延长，肺动脉瓣关闭落后于

主动脉瓣（第2心音由肺动脉瓣和主动脉瓣关闭引起），故房间隔缺损可出现肺动脉瓣第2心音固定分裂。选B。

103. 容易引起冠状动脉炎的是

- A. 风湿热
- B. 儿童类风湿病
- C. 过敏性紫癜
- D. 先天性胸腺发育不全
- E. 皮肤黏膜淋巴结综合征 ✓

解析：皮肤黏膜淋巴结综合征最严重的临床表现就是冠状动脉炎。选E。

104. 可引起球后视神经炎的是

- A. 异烟肼
- B. 链霉素
- C. 吡嗪酰胺
- D. 乙胺丁醇 ✓
- E. 乙硫异烟胺

解析：

