

# 主管护师(内科护理)妇科护理学二真题

(总分: 150.00, 做题时间: 120 分钟)

## 一、A1/A2 题型(总题数: 49, 分数: 47.18)

1. 下列有关腹部手术病人术后引流管的护理内容应除外

- A. 随时观察引流液的性质和量
- B. 保持引流管通畅
- C. 引流瓶应隔日更换 ✓
- D. 引流管需要每日更换
- E. 每日测体温 3 次, 以及早发现感染征兆

解析: 为防止感染, 妇科腹部手术后病人的引流管及引流瓶应每日更换并要严格无菌操作。

2. 下列描述不符合子宫脱垂的是

- A. 阴道口外见子宫颈, 即可诊断为子宫脱垂
- B. 子宫脱垂常引起月经失调 ✓
- C. 重度子宫脱垂, 必须与子宫内翻鉴别
- D. 子宫脱垂常发生于产后过早参加重体力劳动的妇女
- E. 子宫脱垂常伴发阴道前后壁膨出

解析: 本题考查子宫脱垂相关考点。子宫脱垂的中年妇女, 由于盆腔充血, 可能引起经期不适的症状, 但月经失调不是子宫脱垂者的典型症状。发生子宫脱垂的原因与支持子宫维持正常位置的韧带、盆底组织损伤以及长期腹压增加有关。在正常情况下, 妊娠子宫增大不会导致正常位置的子宫脱垂。子宫脱垂 I 度轻型者, 宫颈外口距离处女膜缘 4cm, 但未达处女膜缘; I 度重型者, 为宫颈外口已达处女膜缘, 检查时在阴道口可见宫颈。子宫脱垂 II 度轻型者, 宫颈已脱出阴道口外, 但宫体仍在阴道内; 重型者为宫颈及部分宫体已脱出阴道口外。子宫脱垂 III 度者, 宫颈及宫体全部脱出至阴道口外。

3. 患者女, 29 岁, 结婚 3 年未孕。近 2 年月经量明显减少, 周期正常, 伴下腹坠痛, 曾有咳嗽史。妇科检查: 子宫正常大小, 活动略差, 双附件未及包块。为明确诊断, 首选的检查是

- A. 腹腔镜检查
- B. 血沉检查
- C. 子宫内膜检查 ✓
- D. 痰培养
- E. 胸部 X 线片

解析: 该患者月经量明显减少, 周期正常, 伴下腹坠痛, 有不孕表现, 且子宫检查未见明显异常, 应考虑为子宫内膜粘连, 所以应行子宫内膜检查。

4. 李女士行负压吸宫流产术, 为其提供的术后护理措施中不正确的是

- A. 术后 1 个月内禁止盆浴
- B. 保持外阴清洁
- C. 术后 6 个月内禁止性生活 ✓
- D. 术后休息 1~2 小时, 无异常即可离院
- E. 若有明显腹痛持续 10 天以上, 应随时到医院就诊

解析:

5. 诊断性刮宫的适应证不包括

- A. 不孕症
- B. 阴道排液
- C. 子宫性闭经
- D. 急性宫颈炎 ✓
- E. 子宫异常出血

解析：诊断性刮宫术的适应证如下：①子宫异常出血或阴道排液，需证实或排除子宫内膜癌或其他病变，B、E 正确。②无排卵性功血或怀疑子宫性闭经，C 正确。③女性不孕症，需了解有无排卵或子宫内膜病变，A 正确。急性宫颈炎、急性阴道炎等是诊断性刮宫术的禁忌证。

6. 患者女，42 岁，诊断为子宫肌瘤，住院评估发现病人及其丈夫对子宫切除顾虑重重，担心会影响夫妻生活，针对此病人，护士除进行常规住院教育外，还应重点做好的教育指导是

- A. 子宫肌瘤发病原因
- B. 子宫切除术前准备配合要点
- C. 并发症的预防
- D. 女性生殖器官解剖特点
- E. 术后性生活注意事项 ✓

解析：

7. 某患者接触性出血半年，宫颈活检后确诊为宫颈癌 1 期，首选治疗方法是

- A. 放疗+激素治疗
- B. 放疗
- C. 化疗
- D. 手术治疗 ✓
- E. 激素治疗

解析：

8. 下列病因与子宫脱垂无关的是

- A. 子宫增大以致压力增加 ✓
- B. 盆底组织损伤
- C. 卵巢功能减退
- D. 子宫支持结构先天发育异常
- E. 腹腔压力增加

解析：

9. 女方生殖器官不孕病因的检查中，下列最有诊断价值的项目是

- A. 超声检查
- B. 内分泌检查 ✓
- C. 子宫输卵管碘油造影
- D. 宫腔镜腹腔镜联合检查
- E. 腹腔镜检查

解析：通常采用内分泌检查。

10. 可以选择吸宫术终止妊娠的情况是

- A. 妊娠 14 周
- B. 急性阴道炎

C. 术前 2 次体温超过 37.5℃

D. 妊娠 8 周并呕吐 ✓

E. 妊娠剧吐

解析:

11. 患者女, 28 岁, 闭经。疑为结核性子宫内膜炎, 进行诊断性刮宫。下列叙述正确的是

A. 选择时间应在排卵后

B. 术前当天肌内注射链霉素

C. 术中注意刮取两侧子宫角部组织 ✓

D. 宫腔小而硬, 无组织刮出者可排除生殖器结核

E. 内膜病检未找到病理结果可排除生殖器结核

解析: 诊断性刮宫可了解子宫内膜对卵巢激素的反应, 还可以确定子宫内膜结核的诊断。根据目的可以选择刮宫时间, 于月经前 1 周或月经来潮 6 小时 (不超过 12 小时) 内刮宫。术前 3 天及术后 4 天应每日肌内注射链霉素 0.75g 及口服异烟肼 0.3g, 以预防刮宫引起结核病灶扩散。刮宫时, 刮匙由内向外沿宫腔四壁、宫底及两侧角有次序地将内膜刮出并注意宫腔有无变形、高低不平等。在病理切片上找到典型结核结节, 诊断即可成立, 但阴性结果并不能排除结核的可能。遇有宫腔小而坚硬, 无组织物刮出, 结合临床病史及症状, 也应考虑为子宫内膜结核, 并作进一步检查。故本题选 C。

12. 患者女, 26 岁, 发现右侧卵巢肿物 2 年, 1 小时前突感右下腹剧痛伴恶心、呕吐。妇科检查: 子宫 (一), 右附件有拳头大囊性肿物, 边界清, 活动差, 左附件 (一), 其诊断是

A. 肿瘤破裂

B. 肿瘤感染

C. 右附件肿瘤蒂扭转 ✓

D. 肿瘤恶变

E. 左附件炎性包块

解析: 卵巢肿瘤并发蒂扭转常发生于中大小的肿瘤, 肿瘤由于偏向于身体一侧而发生蒂扭转, 引起静脉回流受阻, 瘤内血容量剧增或血管破裂, 瘤内充血液后致使动脉血流受阻, 发生坏死、破裂或感染, 表现为一侧下腹腹痛加剧, 或一侧下腹痛伴恶心、呕吐甚至休克, 是妇科常见急症。

13. 李女士, 35 岁, 已婚, 结婚 4 年未孕。妇科检查: 子宫后位, 正常大小, 子宫骶骨韧带处扪及数个小硬结节, 双侧附件无明显异常。临床初步诊断为子宫内膜异位症。下列不属于子宫内膜异位症临床表现的是

A. 不孕症

B. 性交痛

C. 月经失调

D. 原发性痛经 ✓

E. 盆腔扪及结节

解析:

14. 患者女, 诊断为尿瘘, 为明确瘘孔部位, 应做的检查不包括

A. 亚甲蓝 (美蓝) 试验

B. 靛胭脂试验

C. 膀胱镜检查

D. 宫腔镜检查 ✓

E. 肾盂输尿管静脉造影术

解析：备选答案 A、B、C、E 是一般尿痿病人需要进行的辅助检查项目，而宫腔镜检查与明确痿孔部位的目的无关。

15. 放置宫内节育器后常见的并发症不包括

- A. 闭经 ✓
- B. 感染
- C. 子宫穿孔
- D. 节育器异位
- E. 节育器嵌顿

解析：放置宫内节育器后常见并发症主要有：①节育器脱落；②带器妊娠；③感染；④节育器嵌顿或断裂；⑤节育器异位导致的子宫穿孔。故本题选 A。

16. 有关口服避孕药的错误指导是

- A. 哺乳期妇女不宜服用
- B. 月经稀少者禁用
- C. 年龄大于 35 岁的吸烟妇女，不宜长期服用
- D. 不要放在儿童易接触的地方
- E. 为避免对胎儿的致畸作用，应在停药 3 个月后再受孕 ✓

解析：口服避孕药的妇女，为避免药物对胎儿的影响，须停药 6 个月后再受孕为宜。

17. 下列有关剖宫产术后病人的护理，不正确的是

- A. 产妇取半卧位
- B. 一般留置导尿管 24 小时
- C. 遵医嘱给予抗生素
- D. 指导产妇至少应避孕半年 ✓
- E. 鼓励产妇尽早下床活动

解析：

18. 宫颈癌根治术后留置导尿管的时间是术后

- A. 1~2 天
- B. 3~4 天
- C. 6~8 天
- D. 10~14 天 ✓
- E. 15~18 天

解析：

19. 有关子宫内膜异位症的描述，下列错误的是

- A. 指子宫内膜异位到子宫以外的部位 ✓
- B. 指有活动功能的子宫内膜组织出现于子宫腔内壁以外的部位
- C. 近年来子宫内膜异位症的发病率明显上升
- D. 此病多见于生育年龄妇女
- E. 是近年常见的妇科疾病之一

解析：当具有生长功能的子宫内膜组织出现在子宫腔被覆黏膜以外的身体其他部位时，称为子宫内膜异位症。侵入子宫肌层也是其表现之一。

- A. 自觉外阴有块状物脱出
- B. 尿潴留，常伴有张力性尿失禁
- C. 腰骶部酸痛和下坠感
- D. 常伴有月经失调 ✓
- E. 不影响受孕，可经阴道分娩

解析：备选答案 A、B、C 均是子宫脱垂病人的临床特点。但是，子宫脱垂病人很少引起月经失调。子宫若能还纳者通常不影响受孕，受孕后随妊娠进展，子宫可逐渐上升至腹腔不再脱垂，多数能经阴道分娩。

21. 人工流产负压吸引术适用于

- A. 孕 7 周内
- B. 孕 10 周内 ✓
- C. 孕 11 周内
- D. 孕 13 周内
- E. 孕 14 周内

解析：避孕失败后妊娠早期的补救措施有药物流产和手术流产两种终止妊娠的方法，统称为人工流产。其中人工流产负压吸引术适用于妊娠 10 周以内者，根据孕周选择吸管及负压的大小，所用负压不宜超过 500mmHg。故选 B。

22. 32 岁女性，1-0-0-1。去外地丈夫处探亲 2 周，拟用探亲避孕药 1 号，正确的服法是

- A. 月经来潮第 5 天起每晚服 1 片，连服 22 天
- B. 探亲前 1 天或当天中午服 1 片，以后每晚服 1 片至探亲结束 ✓
- C. 月经来潮第 5 天开始每晚服 1 片，连服 12 天
- D. 性交后即刻服 1 片，次早加服 1 片，以后每次性交后即服 1 片
- E. 性交后即刻服 1 片，以后每晚服 1 片至探亲结束

解析：探亲避孕药适用于探亲夫妇，其特点是服药时间不受月经周期限制。探亲片 1 号的正确用法：性生活前 8 小时服 1 片，当晚再服 1 片，以后每晚 1 片，直到探亲结束次晨加服 1 片。

23. 下列有关诊断性刮宫病人的术后护理措施，不正确的是

- A. 术后静卧 30 分钟，观察病人一般情况
- B. 术后少量流血可以持续 10 天 ✓
- C. 保持外阴清洁
- D. 避免性生活和盆浴 2 周
- E. 遵医嘱服用抗生素

解析：

24. 关于宫颈癌的早期发现与预防，下列措施错误的是

- A. 提倡晚婚少育
- B. 积极治疗宫颈慢性疾病
- C. 每 3~5 年普查一次宫颈涂片 ✓
- D. 绝经后出血者应及早就医
- E. 重视接触性出血者的进一步追踪

解析：

25. 关于卵巢肿瘤，下列描述不正确的是

- A. 是女性生殖器常见肿瘤之一

D. 与消化道恶性肿瘤无关 ✓

E. 实质性者恶性居多

解析：卵巢肿瘤中有 5%~10% 为卵巢转移性肿瘤，由原发于卵巢外的恶性肿瘤播散至卵巢所致。来自胃肠道、乳腺和子宫的转移癌最多见，在来自胃肠道的转移癌中以胃癌多见。

26. 为预防子宫脱垂，在卫生宣教内容方面错误的是

A. 产后尽早参加体力劳动，以促进机体康复过程 ✓

B. 执行劳动妇女五期保健制度

C. 加强营养，增强体质

D. 积极开展计划生育

E. 积极治疗增加腹压的疾病，如长期慢性咳嗽等

解析：分娩后，支持子宫正常位置的筋膜、韧带一般需要 42 天后才能恢复，如果产妇于产后过早参加体力劳动，尤其是重体力劳动，致使腹压增加，而未复旧的子宫轴与阴道轴相一致，过高的腹压使子宫下移，则发生脱垂。

27. 患者女，27 岁，身体健康，已育有一个 10 个月龄的孩子，最适合该妇女的避孕方法是

A. 口服避孕药

B. 安全期避孕

C. 使用阴茎套 ✓

D. 放置节育器

E. 阴道隔膜

解析：哺乳期妇女宜选用阴茎套，禁用避孕药物。阴茎套具有透明、不引起过敏等优点，避孕成功率达 93%~59%，C 正确。题干未提及该妇女近期是否有怀孕计划，故宫内节育器不作为首选。阴道隔膜在使用前，首先要经医生做妇科检查，选择适当型号试行放入，然后在医生指导下学会放入和取出的方法，方便程度不如阴茎套。安全期避孕失败率高，通常不使用该方法。

28. 某 33 岁健康女性，1-0-1-1，现妊娠 20 周需终止妊娠。B 型超声检查：BPD5.3cm，胎头、脊柱完整连续，胎心、胎动良好，胎盘位于子宫后壁 I 级，羊水平段最深处 4.5cm。应采用的终止妊娠方法是

A. 钳刮术

B. 负压吸引术

C. 药物流产

D. 小剂量催产素静脉滴注

E. 利凡诺引产 ✓

解析：

29. 下列为腹腔镜检查术前病人进行的准备内容，错误的是

A. 了解病人的心理状态，提供心理支持

B. 清洁病人的腹部皮肤

C. 术前 1 天清洁灌肠 ✓

D. 行血、尿常规检查

E. 导尿排空膀胱

解析：

30. 筛查早期宫颈癌最常用的方法是

- C. 宫腔镜检查
- D. 宫颈刮片细胞学检查 ✓
- E. 宫颈活体组织检查

解析：

31. 卵巢肿瘤最常见的并发症是

- A. 肿瘤破裂
- B. 盆腔感染
- C. 蒂扭转 ✓
- D. 肿瘤恶变
- E. 腹腔积液

解析：卵巢肿瘤并发蒂扭转常见于中等大小的肿瘤，当病人突然转身或连续旋转时，肿瘤由于偏向于身体一侧而发生蒂扭转，是卵巢肿瘤最常见的并发症。

32. 预防子宫脱垂最主要的措施是

- A. 积极开展计划生育
- B. 加强营养，增强体质
- C. 防治慢性气管炎及便秘
- D. 对老年人适当补充雌激素
- E. 科学接生，加强产褥期的保健 ✓

解析：子宫脱垂的最重要的病因为分娩损伤，为预防子宫脱垂应科学接生，加强产褥期的保健，如进行产后体操锻炼，帮助机体恢复；产后避免重体力劳动，以免影响盆底支持组织的恢复；盆底肌肉组织的锻炼等。故选 E。

33. 下列有关会阴部手术病人的护理内容，正确的是

- A. 手术后 24h 拔除留置的导尿管
- B. 每天冲洗外阴及导尿管 2 次
- C. 阴道内填塞的纱布宜在术后 48h 内取出
- D. 行直肠修补手术的病人，术后第 3 天给液状石蜡 ✓
- E. 外阴癌根治术病人，腹股沟处伤口需压沙袋 48h

解析：行直肠修补手术的病人，为防止大便对切口的污染及解便时对切口的牵拉，以控制术后 5 天大便为宜。为此，病人术后第 3 天开始可服液状石蜡 30ml，每晚 1 次，使大便软化，避免排便困难。

34. 患者女，28 岁，停经 9 周，尿 HCG 阳性，准备终止妊娠。最适宜的处理措施是

- A. 人工流产钳刮术
- B. 人工流产负压吸引术 ✓
- C. 药物引产
- D. 水囊引产
- E. 利凡诺引产

解析：早期妊娠终止的方法主要有药物流产和手术流产两种方法，统称为人工流产。其中负压吸引术适用于妊娠 6~10 周以内者，根据孕周选择吸管及负压大小，所用负压不宜超过 500mmHg。

35. 有关会阴擦洗的错误做法是

- A. 留置导尿管者应注意保持导尿管通畅

- C. 先擦洗有伤口感染者 ✓
- D. 每次擦洗后，护理人员应洗净双手
- E. 取屈膝仰卧位暴露外阴

解析：

36. 输卵管通畅试验的禁忌证是

- A. 无阴道炎，白带常规检查无异常
- B. 诊刮的病理报告无结核及子宫内膜炎症
- C. 妇科查体，宫旁无压痛及增厚
- D. 月经干净后 3~7 天内
- E. 术前 2 天曾经有性生活 ✓

解析：

37. 以下不属于子宫肌瘤患者术前一日的准备工作的是

- A. 备皮
- B. 灌肠
- C. 药敏试验
- D. 遵医嘱给予镇静剂
- E. 导尿 ✓

解析：子宫肌瘤患者一般在手术当天早上给予导尿。

38. 有关腹部手术病人术后护理的内容正确的是

- A. 告诉病人术后疼痛是正常的情况，不要轻易用药
- B. 术后当天每 6h 观察并记录生命体征一次
- C. 全麻病人尚未清醒期间要有护士专人看护 ✓
- D. 硬膜外麻醉者术后平卧 12h
- E. 蛛网膜下隙麻醉者应去枕平卧 18h

解析：病人术后返回病室后，全麻病人取去枕平卧位，头偏向一侧，清醒前要有护士专人看护。

39. 患者女，65 岁，自诉阴道脱出一物 3 年。妇科检查：宫颈已脱出阴道外，宫体仍在阴道内，双附件无异常，诊断子宫脱垂。其程度应为

- A. III 度
- B. II 度重
- C. II 度轻 ✓
- D. I 度重
- E. I 度轻

解析：子宫脱垂 II 度是指子宫颈已脱出阴道口之外，而子宫体或部分子宫体仍在阴道内。可分轻、重两型：

① II 度轻型，子宫颈脱出阴道口外，宫体仍在阴道内。② II 度重型，宫颈与部分宫体以及阴道前壁大部或全部均脱出阴道口外。

40. 有关会阴部手术病人的护理内容，正确的是

- A. 病人应于术前 3 天进流质饮食
- B. 术前 1 天冲洗阴道后不涂甲紫 ✓
- C. 每天用肥皂水清洁灌肠 1 次
- D. 病人去手术室前安置保留尿管



解析：

41. V型宫内节育器（V型环）带铜后的作用是

- A. 提高避孕效果 ✓
- B. 减少出血
- C. 降低脱落率
- D. 防止宫内节育器嵌顿
- E. 防止感染

解析：宫内节育器是一种安全、有效、简便、经济的节育器具，其中带铜宫内节育器在子宫内持续释放具有生物活性的铜离子，增强抗生育作用。此外，其还具有妊娠率及脱落率低、能长期放置等优点，而脱落率低与铜本身无关，因此排除C。B、D、E也与铜的生物活性无关，故选A。

42. 行阴道冲洗时，患者的最佳体位是

- A. 膀胱截石位 ✓
- B. 头高脚低位
- C. 屈膝仰卧位
- D. 自由体位
- E. 半卧位

解析：

43. 女性，24岁，已婚，月经周期正常，近三个月经期延长，持续10天左右，无腹痛。妇科检查无异常发现，拟行诊断性刮宫术，手术日期应选择为

- A. 月经前2~3天
- B. 月经来潮12小时内
- C. 月经来潮第3天
- D. 月经来潮第5天 ✓
- E. 随时可进行

解析：

44. 浆膜下肌瘤最常见的症状为

- A. 阴道排液
- B. 白带增多
- C. 下腹坠痛
- D. 下腹包块 ✓
- E. 不孕

解析：浆膜下肌瘤向子宫浆膜面生长，突出于子宫表面。因此常见症状表现为下腹包块。

45. 下述不符合子宫内膜癌疾病特点的是

- A. 生长缓慢

- B. 转移较早 ✓
- C. 绝经后妇女多见
- D. 以腺癌为主
- E. 早期症状不明显

解析：

46. 外阴恶性肿瘤中最常见的是

- C. 外阴基底细胞癌
- D. 前庭大腺癌
- E. 外阴鲍文病

解析：外阴癌是女性外阴恶性肿瘤中最常见的一种，约占 90%；占女性生殖系统肿瘤的 3%~5%，常见于 60 岁以上的妇女，以外阴鳞状细胞癌为主。

47. 下列有关子宫托的使用，不正确的是

- A. 护理人员应协助选择合适的型号
- B. 指导病人放置子宫托前洗净双手
- C. 子宫托必须由专业人员放置 ✓
- D. 每天睡前应取出子宫托清洗消毒后备用
- E. 上托后定期到医院检查

解析：使用子宫托的病人需注意选择合适的型号，认真学会自行放置的方法、保持子宫托及阴道的清洁。另外，子宫托应每天早上放入阴道，睡前取出消毒后备用。上托后，分别于第 1、3、6 个月时到医院检查 1 次，以后每 3~6 个月到医院检查 1 次。考生还应关注使用子宫托的目的。

48. 下列不宜放置宫内节育器的情况是

- A. 人工流产术后，宫腔深 8cm
- B. 哺乳期妇女，月经未复潮 ✓
- C. 自然分娩 8 周月经复潮者
- D. 月经干净后 3~5 天无性交者
- E. 剖宫产术后半年

解析：适合放置宫内节育器的时间为：①月经干净后 3~7 日无性交者；②产后 42 天恶露已净，会阴伤口已愈合，子宫恢复正常者；③人工流产术后可立即放置，但术后宫腔深度应小于 10cm 者；④哺乳期放置应先排除早孕，剖宫产术后半年放置。故选 B。

49. 下列有关阴道或宫颈上药患者的护理要点，错误的是

- A. 行经期妇女应停止阴道上药
- B. 子宫出血者须停止阴道上药
- C. 用药期间应禁止性生活
- D. 未婚妇女禁止阴道上药 ✓
- E. 叮嘱患者按时取出阴道内的棉球

解析：

二、B1 题型(总题数：44，分数：42.68)

50. 月经的第 1—4 天，称为

- A. 月经期 ✓
- B. 增生期
- C. 分泌期
- D. 月经前期
- E. 月经周期

解析：

51. 胎儿先露部的指示点与母体骨盆前、后、左、右、横的关系，称为

- A. 胎方位 ✓

- C. 胎势
- D. 胎先露
- E. 横产式

解析:

52. 胎心监护发现子宫收缩后胎心率增加, 这种情况表明

- A. 胎儿情况良好 ✓
- B. 胎儿宫内缺氧、酸中毒
- C. 胎头受压
- D. 脐带受压
- E. 镇静药物影响

解析:

53. 治疗育龄期功血妇女月经周期过短应

- A. 用大量雌激素止血后人工周期治疗 3 个月
- B. 孕、雌激素合并疗法减少月经量并调整月经周期
- C. 自排卵后开始每日肌内注射黄体酮 10mg, 共 10~14 日 ✓
- D. 孕激素长期应用
- E. 于月经期前 10~14 天, 肌内注射黄体酮 10~20mg 共 5 天

解析: 育龄期月经周期过短的功血病人, 多因黄体功能不足引起, 可以采用黄体功能替代疗法, 选 C。

54. 宫颈及部分宫体脱出阴道口属于

- A. 子宫脱垂 I 度轻型
- B. 子宫脱垂 I 度重型
- C. 子宫脱垂 II 度轻型
- D. 子宫脱垂 II 度重型 ✓
- E. 子宫脱垂 III 度

解析:

55. 人工流产术后 2 周仍有阴道流血, 量较多, 应考虑

- A. 吸宫不全 ✓
- B. 子宫穿孔
- C. 人工流产综合征
- D. 术后感染
- E. 羊水栓塞

解析:

56. 月经的第 5—14 天, 称为

- A. 月经期
- B. 增生期 ✓
- C. 分泌期
- D. 月经前期
- E. 月经周期

解析:

57. 胎儿纵轴与母体纵轴垂直称为

- D. 胎产式
- C. 胎势
- D. 胎先露
- E. 横产式 ✓

解析:

58. 足月临产, 胎膜破裂排出棕黄色羊水, 胎儿监护时可能出现

- A. 早发性胎心减速
- B. 晚期减速 ✓
- C. 变异减速
- D. NST 有反应
- E. NST 无反应

解析: 棕黄色羊水表示羊水中混有胎粪, 可能会导致胎儿窒息, 使胎儿缺氧加重, 胎儿监护时可能出现胎心率晚期减速。选 B。

59. 治疗绝经过渡期功血应用

- A. 用大量雌激素止血后人工周期治疗 3 个月
- B. 孕、雌激素合并疗法减少月经量并调整月经周期 ✓
- C. 自排卵后开始每日肌内注射黄体酮 10mg, 共 10~14 日
- D. 孕激素长期应用
- E. 于月经期前 10~14 天, 肌内注射黄体酮 10~20mg 共 5 天

解析: 绝经过渡期功血者的治疗原则在于止血后, 调整周期、减少经量, 防止子宫内膜病变, 选 B。

60. 宫颈及宫体全部脱出阴道口属于

- A. 子宫脱垂 I 度轻型
- B. 子宫脱垂 I 度重型
- C. 子宫脱垂 II 度轻型
- D. 子宫脱垂 II 度重型
- E. 子宫脱垂 III 度 ✓

解析:

61. 月经的第 15—24 天, 称为

- A. 月经期
- B. 增生期

- C. 分泌期 ✓
- D. 月经前期
- E. 月经后期

解析:

62. 脐带脱落的时间为婴儿出生后

- A. 2~3 天
- B. 3~7 天 ✓
- C. 7~10 天
- D. 10~14 天
- E. 2~3 周

- A. 早发性胎心减速
- B. 晚期减速
- C. 变异减速 ✓
- D. NST 有反应
- E. NST 无反应

解析：由于子宫收缩时，脐带受压兴奋迷走神经，导致胎心率变异，形态不规则。与子宫收缩几乎同时开始，减速最低点在宫缩的高峰，下降幅度小于 50bpm，持续时间短，恢复快，一般认为第一产程后期，宫缩时胎头受压引起。选 C。

64. 治疗育龄期妇女经期延长应

- A. 用大量雌激素止血后人工周期治疗 3 个月
- B. 孕、雌激素合并疗法减少月经量并调整月经周期
- C. 自排卵后开始每日肌内注射黄体酮 10mg，共 10~14 日
- D. 孕激素长期应用
- E. 于月经期前 10~14 天，肌内注射黄体酮 10~20mg 共 5 天 ✓

解析：育龄期经期延长者提示黄体萎缩不全，可以采用孕激素通过调节下丘脑—垂体—卵巢轴的反馈功能，使黄体及时萎缩，内膜按时完整脱落。选 E。

65. 适用于两地分居夫妇的是

- A. 宫内节育器
- B. 短效口服避孕药
- C. 输卵管结扎术
- D. 探亲避孕药 ✓
- E. 皮下埋植剂

解析：

66. 骨盆出口横径是

- A. 耻骨联合上缘中点至骶岬上缘中点间的距离
- B. 耻骨联合下缘至骶岬上缘中点间的距离
- C. 两侧坐骨棘间的距离
- D. 骶骨尖端至坐骨结节间径中点间的距离

- E. 两侧坐骨结节间的距离 ✓

解析：骨盆出口横径也称坐骨结节间径，是两坐骨结节内缘的距离，平均长 9cm。此径线是骨盆出口平面的重要径线。选 E。

67. 生理性黄疸开始出现的时间为婴儿出生后

- A. 2~3 天 ✓
- B. 3~7 天
- C. 7~10 天
- D. 10~14 天
- E. 2~3 周

解析：

68. 胎儿宫内缺氧，酸中毒时，胎儿监护可能出现

- A. 早发性胎心减速

- C. 变异减速
- D. NST 有反应
- E. NST 无反应

解析：减速是指随宫缩出现的短暂胎心率减慢，晚期减速多在宫缩高峰后开始出现，下降缓慢，下降幅度小于 50bpm，持续时间长，恢复亦缓慢，一般认为是胎盘功能不良，胎儿缺氧的表现。选 B。

69. 葡萄胎镜下病理表现是

- A. 滋养细胞不同程度增生，绒毛间质水肿成水泡样 ✓
- B. 滋养细胞极度不规则增生，绒毛结构消失
- C. 滋养细胞显著增生，有明显出血及坏死，可见变性或完好的绒毛结构
- D. 滋养细胞没有发现，内膜呈增生期变化
- E. 滋养细胞侵入子宫内层，间质没有发现水肿

解析：

70. 适用于哺乳期妇女的是

- A. 宫内节育器
- B. 短效口服避孕药
- C. 输卵管结扎术
- D. 探亲避孕片
- E. 皮下埋植剂 ✓

解析：

71. 中骨盆横径是

- A. 耻骨联合上缘中点至骶岬上缘中点间的距离
- B. 耻骨联合下缘至骶岬上缘中点间的距离
- C. 两侧坐骨棘间的距离 ✓
- D. 骶骨尖端至坐骨结节间径中点间的距离
- E. 两侧坐骨结节间的距离

解析：中骨盆横径也称坐骨棘间径，是两坐骨棘之间的距离，平均长约 10cm。选 C。

72. 生理性黄疸消退的时间为婴儿出生后

- A. 2~3 天
- B. 3~7 天
- C. 7~10 天 ✓
- D. 10~14 天
- E. 2~3 周

解析：正常新生儿，一般脐带在出生后 7 天左右自然脱落；新生儿出生后 48~72 小时出现黄疸，称为生理性黄疸；新生儿体内胆红素值在 5 天后快速下降，生理性黄疸逐渐消退。

73. 胎心监护显示 20 分钟内有 4 次胎动伴胎心率加速大于 10 次/分，该结果为

- A. 早发性胎心减速
- B. 晚期减速
- C. 变异减速
- D. NST 有反应 ✓
- E. NST 无反应

上并随胎心率加速的胎动则为 NST 有反应。选 D。

74. 侵蚀性葡萄胎镜下病理表现是

- A. 滋养细胞不同程度增生，绒毛间质水肿成水泡样
- B. 滋养细胞极度不规则增生，绒毛结构消失
- C. 滋养细胞显著增生，有明显出血及坏死，可见变性或完好的绒毛结构 ✓
- D. 滋养细胞没有发现，内膜呈增生期变化
- E. 滋养细胞侵入子宫内层，间质没有发现水肿

解析：

75. 适用于不再有生育要求妇女的是

- A. 宫内节育器
- B. 短效口服避孕药
- C. 输卵管结扎术 ✓
- D. 探亲避孕片
- E. 皮下埋植剂

解析：

76. 可促进阴道上皮增生和角化的是

- A. 雌激素 ✓
- B. 孕激素
- C. 雄激素
- D. LH
- E. FSH

解析：

77. 出口后矢状径是

- A. 耻骨联合上缘中点至骶岬上缘中点间的距离
- B. 耻骨联合下缘至骶岬上缘中点间的距离
- C. 两侧坐骨棘间的距离

- D. 骶骨尖端至坐骨结节间径中点间的距离 ✓
- E. 两侧坐骨结节间的距离

解析：出口后矢状径是自骶尾关节到坐骨结节间径中点间的垂直距离，平均长约 9cm。选 D。

78. 胎心监护发现胎心减慢开始于宫缩高峰后，下降缓慢，持续时间长，恢复亦缓慢，表示

- A. 胎儿情况良好
- B. 胎儿宫内缺氧、酸中毒 ✓
- C. 胎头受压
- D. 脐带受压
- E. 镇静药物影响

解析：

79. 滴虫生长的最佳 pH 是

- A. 4.5~4.7
- B. 4.0~4.7
- C. 5.2~6.6 ✓

解析：

80. 绒毛膜癌镜下病理表现是

- A. 滋养细胞不同程度增生，绒毛间质水肿成水泡样
- B. 滋养细胞极度不规则增生，绒毛结构消失 ✓
- C. 滋养细胞显著增生，有明显出血及坏死，可见变性或完好的绒毛结构
- D. 滋养细胞没有发现，内膜呈增生期变化
- E. 滋养细胞侵入子宫内层，间质没有发现水肿

解析：

81. 适用于长期避孕妇女的是

- A. 宫内节育器 ✓
- B. 短效口服避孕药
- C. 输卵管结扎术
- D. 探亲避孕片
- E. 皮下埋植剂

解析：

82. 可兴奋下丘脑体温调节中枢的是

- A. 雌激素
- B. 孕激素 ✓
- C. 雄激素
- D. LH
- E. FSH

解析：

83. 胎体纵轴与母体纵轴的关系称为

- A. 胎方位

- B. 胎产式 ✓
- C. 胎势
- D. 胎先露
- E. 横产式

解析：

84. 胎心监护发现胎心率减速与宫缩关系不恒定，持续时间长短不一，出现时下降迅速，幅度大，恢复也迅速，表示

- A. 胎儿情况良好
- B. 胎儿宫内缺氧、酸中毒
- C. 胎头受压
- D. 脐带受压 ✓
- E. 镇静药物影响

解析：

85. 单纯白色假丝酵母感染 pH 是

- A. 4.5~4.7
- B. 4.0~4.7



D. 6.0~7.7

E. 4.5 ✓

解析:

86. 正常妊娠表现是

- A. 滋养细胞不同程度增生, 绒毛间质水肿成水泡样
- B. 滋养细胞极度不规则增生, 绒毛结构消失
- C. 滋养细胞显著增生, 有明显出血及坏死, 可见变性或完好的绒毛结构
- D. 滋养细胞没有发现, 内膜呈增生期变化
- E. 滋养细胞侵入子宫内层, 间质没有发现水肿 ✓

解析:

87. 人工流产术中受术者感到下腹部撕裂样疼痛, 术者探测宫腔有“无底”感觉, 应考虑

- A. 吸宫不全
- B. 子宫穿孔 ✓
- C. 人工流产综合征
- D. 术后感染
- E. 羊水栓塞

解析:

88. 两次月经第一天的间隔时间为

- A. 月经期
- B. 增生期
- C. 分泌期
- D. 月经前期
- E. 月经周期 ✓

解析:

89. 最先进入骨盆入口的胎儿部分称

- A. 胎方位
- B. 胎产式
- C. 胎势
- D. 胎先露 ✓
- E. 横产式

解析:

90. 胎心监护发现胎心率减速, 与子宫收缩几乎同时开始, 子宫收缩后即恢复正常, 表示可能是

- A. 胎儿情况良好
- B. 胎儿宫内缺氧、酸中毒
- C. 胎头受压 ✓
- D. 脐带受压
- E. 镇静药物影响

解析:

91. 治疗青春期功血应

- A. 用大量雌激素止血后人工周期治疗 3 个月 ✓

- C. 自排卵后开始每日肌内注射黄体酮 10mg，共 10~14 日  
D. 孕激素长期应用  
E. 于月经期前 10~14 天，肌内注射黄体酮 10~20mg 共 5 天

解析：青春期功血者通常内源性雌激素水平较低，选 A。

92. 宫颈达处女膜缘，但未超出该缘属于

- A. 子宫脱垂 I 度轻型 ✓  
B. 子宫脱垂 I 度重型  
C. 子宫脱垂 II 度轻型  
D. 子宫脱垂 II 度重型  
E. 子宫脱垂 III 度

解析：

93. 人工流产术中，受术者出现面色苍白、出汗、心率缓慢，应考虑

- A. 吸宫不全  
B. 子宫穿孔  
C. 人工流产综合征 ✓  
D. 术后感染  
E. 羊水栓塞

解析：

三、A3/A4 型题(总题数：62，分数：60.14)

94. 王某，28 岁，未产妇，述说平素月经规律，每 28 天一次，每次持续 3~4 天。其末次月经是 2 月 11 日，距今已有 8 周，现病人感觉疲乏，乳房触痛明显。化验报告提示尿妊娠反应(+)，此化验的原理是查体内的

- A. 催产素水平  
B. 黄体酮水平  
C. 雌激素水平  
D. 绒毛膜促性腺激素水平 ✓  
E. 黄体生成素水平

解析：妊娠后，滋养细胞分泌绒毛膜促性腺激素，可从孕妇的血清及尿中测出以协助诊断早期妊娠。选 D。

95. 某产妇，于今日早晨经阴道顺产一女婴，进展顺利。该产妇在产后 4 天，有下列主诉，哪项提示为异常产褥现象

- A. 出汗多  
B. 阴道分泌物颜色淡红  
C. 乳房胀痛  
D. 腹部疼痛，伴呕吐 ✓  
E. 低热

解析：腹部疼痛，伴呕吐的症状不应该是正常产妇在产后 4 天出现的，属于异常产褥现象。选 D。

96. 李女士，怀孕 36 周，第一胎。昨晚突然阴道出血，出血量约 400ml，无腹痛。检查：血压 100/60mmHg，宫底高度与孕月相符，腹软无压痛，胎位清楚，胎心音 110 次/分。患者确诊方法是

- A. 内诊  
B. B 型超声显像 ✓

E. 催产素激惹试验

解析:

97. 某初产妇, 35 岁, 对其进行 B 超测量骨盆结果是: 入口平面前后径 11cm, 横径 13cm; 中骨盆横径 9.5cm, 前后径 11.5cm; 出口横径 7.0cm, 后矢状径 8.5cm。根据检查结果, 该产妇的骨盆形态是

- A. 均小骨盆
- B. 扁平骨盆
- C. 漏斗骨盆 ✓
- D. 畸形骨盆
- E. 正常骨盆

解析:

98. 患者女, 45 岁, 已婚, 有糖尿病史, 近日发现外阴痒, 白带多。检查: 白带黏稠, 典型豆腐渣样, 阴道壁充血, 宫颈光滑。为确定诊断, 进一步应检查

- A. 双合诊
- B. 尿常规
- C. 阴道窥器检查
- D. 阴道分泌物悬滴检查 ✓
- E. 宫颈黏液检查

解析: 白色稠厚豆腐渣样白带是外阴阴道假丝酵母菌病(又称霉菌性阴道炎)的典型症状; 另外, 此病人有“糖尿病”病史, 也是外阴阴道假丝酵母菌病的好发人群。孕妇、糖尿病患者、大量雌激素治疗者、长期应用抗生素者、服用皮质类固醇激素或免疫缺陷综合征者易发此症。阴道分泌物悬滴检查是在玻片滴 10%

氢氧化钾与少许阴道分泌物混合, 在光镜下检查, 见到白色假丝酵母菌芽孢和菌丝即可确诊霉菌性阴道炎。故选 D。

99. 患者女, 44 岁, 因侵蚀性葡萄胎收入院治疗。检查: BP100/60mmHg, R18 次/分, P98 次/分, 双合诊检查提示子宫丰满、质软, 血 HCG 明显高于正常值。应用化疗第 3 天, 病人出现恶心、呕吐反应, 正确的处理措施是

- A. 嘱病人禁食
- B. 停用化疗药物
- C. 提供病人喜欢的可口饮食 ✓
- D. 可选择流食
- E. 减少化疗药用量

解析: 化疗的主要毒副反应为骨髓抑制, 其次为消化道反应、肝肾功能损害等。多数病人在用药后 2~3 天开始出现恶心、呕吐反应, 5~6 天后达高峰, 停药后逐渐好转, 一般不影响继续治疗。此时可以为病人提供其喜爱的可口饮食、合理安排用药时间、创造良好的进餐环境, 对严重呕吐者应补充液体, 以防止水电解质紊乱。故选 C。

100. 患者女, 56 岁, 绝经后 8 年出现阴道不规则流血。妇检: 宫颈光滑, 阴道黏膜菲薄, 官体稍大、软, 活动良, 附件(一)。为进一步确诊, 首选的检查项目是

- A. 细致的双合诊
- B. 三合诊
- C. 分段诊刮 ✓
- D. 宫颈刮片

解析:

101. 孙女士, 30岁, 第二性征发育良好, 婚后2年未孕, 经检查基础体温双相, 子宫内膜病理为分泌期改变。男方精液检查常规为正常。若上述检查未发现异常, 建议继续进行的检查项目是

- A. 宫腔镜检查
- B. 性交后精子穿透力试验
- C. 阴道脱落细胞涂片检查
- D. 宫颈刮片
- E. 子宫输卵管碘油造影 ✓

解析: 检查输卵管是否通畅的方法有输卵管通液术, 但其准确性差, 而子宫输卵管碘油造影能明确输卵管阻塞的部位和程度。选E。

102. 王某, 28岁, 未产妇, 述说平素月经规律, 每28天一次, 每次持续3~4天。其末次月经是2月11日, 距今已有8周, 现病人感觉疲乏, 乳房触痛明显。为了进一步确诊其是否怀孕, 下列可以提供确诊依据的检查是

- A. 听筒听胎心
- B. 胎动
- C. 放射检查胎儿脊柱轮廓
- D. B超显示胎心搏动 ✓
- E. 检查血中激素水平

解析: 选项除E外均可以确诊怀孕, 但是只有D选项是在早期即可出现, A、B在中期妊娠时可以提供确诊依据, C目前一般不用, 因对胎儿的伤害太大。选D。

103. 某产妇, 于今日早晨经阴道顺产一女婴, 进展顺利。对该产妇进行腹部检查时, 触摸不到宫底的时间大概在产后的

- A. 第2天
- B. 第4天
- C. 第6天
- D. 第8天
- E. 第10天 ✓

解析: 正常产妇, 产后当日宫底脐平或脐下一横指, 产后第一天, 由于宫颈外口升至坐骨棘水平, 使宫底上升至平脐, 以后每日下降1~2cm(一横指), 至产后10日降入盆腔内, 在耻骨联合上方扪不到宫底。选E。

104. 李女士, 怀孕36周, 第一胎。昨晚突然阴道出血, 出血量约400ml, 无腹痛。检查: 血压100/60mmHg, 宫底高度与孕月相符, 腹软无压痛, 胎位清楚, 胎心音110次/分。对该患者护理中哪项不妥

- A. 嘱患者卧床休息
- B. 做好床边生活护理
- C. 保证充足睡眠
- D. 按时肛查, 了解胎先露下降情况 ✓
- E. 监测生命体征

解析:

105. 某初产妇, 35岁, 对其进行B超测量骨盆结果是: 入口平面前后径11cm, 横径13cm; 中骨盆横径9.5cm,

- A. 不可试产 ✓
- B. 可试产 1 小时
- C. 可试产 1.5 小时
- D. 可试产 2 小时
- E. 可试产 4 小时

解析：

106. 患者女，45 岁，已婚，有糖尿病史，近日发现外阴痒，白带多。检查：白带黏稠，典型豆腐渣样，阴道壁充血，宫颈光滑。如镜检有假菌丝，首选药物是

- A. 广谱抗生素
- B. 制霉菌素 ✓
- C. 甲硝唑
- D. 安宫黄体酮
- E. 己烯雌酚

解析：制霉菌素是治疗霉菌性阴道炎的首选药物。选 B。

107. 患者女，44 岁，因侵蚀性葡萄胎收入院治疗。检查：BP100/60mmHg，R18 次/分，P98 次/分，双合诊检查提示子宫丰满、质软，血 HCG 明显高于正常值。病人用药第 5 天后出现口腔溃疡，以下做法不正确的是

- A. 进食清凉、质软饮食

- B. 进餐前用地卡因溶液局部镇痛
- C. 进餐前局部涂冰硼散 ✓
- D. 选择软毛牙刷刷牙
- E. 生理盐水漱口

解析：当病人出现口腔溃疡时，需要保持口腔清洁包括用生理盐水漱口、选择软毛牙刷刷牙、进餐前 15 分钟用地卡因溶液局部镇痛；进餐后漱口完毕，口腔溃疡局部可涂冰硼散等，而不是进餐前。故选 C。

108. 患者女，56 岁，绝经后 8 年出现阴道不规则流血。妇检：宫颈光滑，阴道黏膜菲薄，宫体稍大、软，活动良，附件（一）。若该病人的疾病已经发生转移，其最常见的转移途径是

- A. 淋巴转移 ✓
- B. 血行转移
- C. 腹腔种植
- D. 直接蔓延
- E. 医源性操作转移

解析：

109. 章女士，54 岁，放置宫内节育器 18 年，现绝经 1 年，到门诊要求取出节育器。妇科检查：外阴发育正常，已婚已产型；阴道通畅，黏膜略平滑，分泌物无色、量少；宫颈光滑，大小正常；宫体前倾前屈位，正常大小，活动良好；双附件未触及异常。该妇女在取器前应进行的必要检查是

- A. 血常规检查
- B. 心电图检查
- C. 阴道涂片检查
- D. 腹部 CT 检查
- E. 妇科 B 超检查 ✓

距今已有8周，现病人感觉疲乏，乳房触痛明显。该孕妇的预产期是

- A. 10月18日
- B. 11月5日
- C. 11月18日 ✓
- D. 12月5日
- E. 12月18日

解析：预产期的计算方法是末次月经第一口起，月份减3或加9，日期加7，因此该孕妇的预产期是11月18日。选C。

111. 某孕妇，25岁，结婚3年，未避孕，从未怀孕过，平素月经周期规律，现停经44天，在抬重物劳动时突感右下腹剧烈疼痛伴阴道点滴出血半天。体检：BP100/50mmHg，白细胞总数 $9.0 \times 10^9/L$ 。妇科检查见阴道内有少许暗红色血，宫颈举痛明显，后穹窿饱满。该孕妇最可能的诊断是

- A. 先兆流产
- B. 稽留流产
- C. 异位妊娠破裂 ✓
- D. 复发性流产
- E. 急性阑尾炎

解析：

112. 李女士，怀孕36周，第一胎。昨晚突然阴道出血，出血量约400ml，无腹痛。检查：血压100/60mmHg，子宫底高度与孕月相符，腹软无压痛，胎位清楚，胎心音110次/分。对该患者正确处理是

- A. 期待疗法
- B. 严密观察出血情况
- C. 给镇静剂、补血药
- D. 行剖宫产术 ✓
- E. 人工破膜

解析：

113. 某患者，27岁，已婚，宫内孕34周，血压21.3/12.7kPa(160/95mmHg)，脉搏110次/分，尿蛋白(+)，轻度水肿，无头痛表现。既往身体健康，月经正常。查体：痛苦面容，脸色苍白。此患者的诊断可能是

- A. 一过性血压增高
- B. 急性胎盘早剥
- C. 轻度妊娠期高血压疾病
- D. 中度妊娠期高血压疾病 ✓
- E. 重度妊娠期高血压疾病

解析：

114. 患者女，45岁，已婚，有糖尿病史，近日发现外阴痒，白带多。检查：白带黏稠，典型豆腐渣样，阴道壁充血，宫颈光滑。局部用哪种溶液冲洗最好

- A. 1%乳酸
- B. 2%~4%碳酸氢钠 ✓
- C. 0.2%新洁尔灭
- D. 1:5000高锰酸钾
- E. 生理盐水

115. 患者女，43岁，因患子宫颈癌行根治术。护士术前1日为她做的术前准备内容，不包括

- A. 阴道冲洗
- B. 皮肤准备
- C. 灌肠
- D. 安置导尿管 ✓
- E. 术前指导

解析：

116. 64岁女性患者，近2年来发现外阴左侧有一肿块，疼痛，2个月前破溃，且有血性分泌物，查体见左侧大阴唇中段有一硬结约3cm×2cm×2cm，基底宽，不活动，腹股沟淋巴结未触及。该病人的初步诊断是

- A. 鳞状上皮原位癌
- B. 外阴癌Ⅰ期
- C. 外阴癌Ⅱ期 ✓
- D. 外阴癌Ⅲ期
- E. 外阴癌Ⅳ期

解析：按国际妇产科联盟分期标准，外阴癌Ⅱ期是指肿瘤限于外阴或外阴和会阴，肿瘤直径>2cm者。选C。

117. 章女士，54岁，放置宫内节育器18年，现绝经1年，到门诊要求取出节育器。妇科检查：外阴发育正常，已婚已产型；阴道通畅，黏膜略平滑，分泌物无色、量少；宫颈光滑，大小正常；宫体前倾前屈位，正常大小，活动良好；双附件未触及异常。做该项检查的主要目的是

- A. 确定子宫位置
- B. 确定子宫大小
- C. 确定宫腔内的节育器及其类型 ✓
- D. 了解卵巢功能
- E. 测定血小板数量

解析：

118. 李某，32岁，初孕妇，宫内孕39周，于昨天晚上感觉腹部一阵阵发紧，每半个小时一次，每次持续3~5秒，今天早上孕妇感觉腹部疼痛，每5~6分钟一次，每次持续45秒左右。请问昨天晚上孕妇的情况是

- A. 出现规律宫缩
- B. 属于孕妇紧张造成的宫缩，尚未临产
- C. 属于临产先兆 ✓
- D. 进入第一产程
- E. 进入第二产程

解析：孕妇在分娩发动前，常会出现临产先兆，其特点为：宫缩持续时间短且不恒定，间歇时间长而不规则；宫缩的强度不加强；不伴随出现宫颈管消失和宫颈口扩张；所以，该妇女昨天晚上的情况应该属于先兆临产的征兆。选C。

119. 某孕妇，25岁，结婚3年，未避孕，从未怀孕过，平素月经周期规律，现停经44天，在抬重物劳动时突感右下腹剧烈疼痛伴阴道点滴出血半天。体检：BP100/50mmHg，白细胞总数 $9.0 \times 10^9/L$ 。妇科检查见阴道内有少许暗红色血，宫颈举痛明显，后穹窿饱满。下列检查方法，对该患者可以确诊的是

- A. 尿HCG检查
- B. 腹部检查
- C. 宫颈黏液检查

E. 后穹窿穿刺 ✓

解析:

120. 女, 25 岁, 先天性心脏病, 心功能 II 级, 现妊娠足月入院待产。在护理中, 错误的是

- A. 缩短第二产程
- B. 胎儿娩出后立即腹部压沙袋
- C. 防止便秘
- D. 产后观察 1 小时后送休养室 ✓
- E. 产褥期注意休息

解析: 产褥早期尤其是产后 72 小时内仍应密切观察产妇的生命体征及心功能变化的情况, 防止心力衰竭的发生。

121. 某患者, 27 岁, 已婚, 宫内孕 34 周, 血压 21.3/12.7kPa (160/95mmHg), 脉搏 110 次/分, 尿蛋白 (+), 轻度水肿, 无头痛表现。既往身体健康, 月经正常。查体: 痛苦面容, 脸色苍白。对该妇女进行治疗, 首选治疗方法是

- A. MgSO 浅肌内注射

- B. MgSO 深肌内注射 ✓

C. 扩充血容量

D. 利尿治疗

E. 使用降压药物

解析:

122. 患者女, 47 岁, 孕 3 产 1, 近 2 年来月经周期混乱, 经量时多时少, 最近闭经 3 个月后阴道淋漓出血半月多来医院就诊。该病人最可能的诊断是

- A. 不全流产
- B. 流产合并感染
- C. 妊娠
- D. 无排卵型功血 ✓
- E. 子宫内膜癌

解析: 根据该女士的年龄及临床表现, 首先考虑是处于围绝经期的妇女, 故选 D。

123. 患者女, 43 岁, 因患子宫颈癌行根治术。该病人术后拔除导尿管的时间是

- A. 24 小时
- B. 48 小时
- C. 1~2 天
- D. 3~5 天
- E. 10~14 天 ✓

解析: 一般在手术当天早上安置导尿管。25 题选 D。由于手术涉及盆底, 尿管留置时间较长, 一般 10~14 天。选 E。

124. 64 岁女性患者, 近 2 年来发现外阴左侧有一肿块, 疼痛, 2 个月前破溃, 且有血性分泌物, 查体见左侧大阴唇中段有一硬结约 3cm×2cm×2cm, 基底宽, 不活动, 腹股沟淋巴结未触及。该病人应选择的治疗方案为

- A. 单纯外阴切除
- B. 外阴广泛切除及双侧腹股沟、盆腔淋巴结清扫术 ✓



E. 化疗

解析：该病人的病灶位于侧边，宜行外阴根治术及腹股沟淋巴结清扫术，如果有腹股沟淋巴结转移，术后应放疗，也可以加用化疗。选B。

125. 章女士，54岁，放置宫内节育器18年，现绝经1年，到门诊要求取出节育器。妇科检查：外阴发育正常，已婚已产型；阴道通畅，黏膜略平滑，分泌物无色、量少；宫颈光滑，大小正常；宫体前倾前屈位，正常大小，活动良好；双附件未触及异常。若取器过程中发现节育器嵌顿，分析其发生的可能原因是

- A. 放置时间过长 ✓
- B. 绝经后取器过晚
- C. 子宫壁太薄
- D. 节育器的质量不良
- E. 宫腔内感染

解析：

126. 李某，32岁，初孕妇，宫内孕39周，于昨天晚上感觉腹部一阵阵发紧，每半个小时一次，每次持续3~5秒，今天早上孕妇感觉腹部疼痛，每5~6分钟一次，每次持续45秒左右。请问今天早上孕妇的情况属于

- A. 出现规律宫缩 ✓
- B. 属于孕妇紧张造成的宫缩，尚未临产
- C. 属于临产先兆
- D. 进入第二产程
- E. 进入第三产程

解析：一旦出现有规律而逐渐增强的子宫收缩，持续30秒或以上，间歇5—6分钟左右，伴有进行性子宫颈管消失，宫颈扩张和胎先露下降，表示已进入临产状态。这与今天早上该孕妇的情况相符合，因此该妇女已经进入临产状态。选A。

127. 某孕妇，25岁，结婚3年，未避孕，从未怀孕过，平素月经周期规律，现停经44天，在抬重物劳动时突感右下腹剧烈疼痛伴阴道点滴出血半天。体检：BP100/50mmHg，白细胞总数 $9.0 \times 10^9/L$ 。妇科检查见阴道内有少许暗红色血，宫颈举痛明显，后穹窿饱满。对该病人提供的护理措施中，错误的是

- A. 严密观察生命体征变化
- B. 病人立即取半卧位
- C. 监测神志变化
- D. 立即开通静脉做好输血准备
- E. 立即行灌肠等术前准备 ✓

解析：

128. 女，25岁，先天性心脏病，心功能II级，现妊娠足月入院待产。该病人在整个妊娠分娩过程中心脏负担最重的时期是

- A. 孕12周内
- B. 孕13~28周
- C. 孕36周后
- D. 第二产程 ✓
- E. 产后72小时后的每次哺乳时

129. 某患者, 27 岁, 已婚, 宫内孕 34 周, 血压 21. 3/12. 7kPa (160/95mmHg), 脉搏 110 次/分, 尿蛋白 (+), 轻度水肿, 无头痛表现。既往身体健康, 月经正常。查体: 痛苦面容, 脸色苍白。该患者发生抽搐时, 首要的护理措施是

- A. 立即通知医生
- B. 观察病情并详细记录
- C. 保持呼吸道通畅 ✓
- D. 加床档防止受伤
- E. 将病人安排在单人暗室

解析:

130. 患者女, 47 岁, 孕 3 产 1, 近 2 年来月经周期混乱, 经量时多时少, 最近闭经 3 个月后阴道淋漓出血半月多来医院就诊。在以下检查结果中, 可以帮助诊断无排卵性功血, 但除外

- A. 子宫正常大小, 双附件压痛、增厚
- B. 子宫口松软, 有活动出血
- C. B 超显示子宫内膜厚
- D. 尿 HCG 阴性
- E. 诊刮为分泌期子宫内膜 ✓

解析: 无排卵性功血者, 体内缺乏孕激素作用, 子宫内膜不会出现分泌期的变化特点。故选 E。

131. 患者女, 43 岁, 因患子宫癌行根治术。为该病人提供的护理措施, 应除外

- A. 保持床单位清洁、舒适
- B. 术后每 0. 5~1 小时观察并记录生命体征, 平稳后改为每 4 小时 1 次
- C. 保持导尿管、腹腔引流管通畅
- D. 常规阴道灌洗每日 2 次, 保持外阴部清洁 ✓
- E. 拔尿管前, 定时间段放尿以训练膀胱功能

解析: 为避免灌洗液逆行感染, 术后一般行外阴擦洗, 而不做阴道灌洗。选 D。

132. 64 岁女性患者, 近 2 年来发现外阴左侧有一肿块, 疼痛, 2 个月前破溃, 且有血性分泌物, 查体见左侧大阴唇中段有一硬结约 3cm×2cm×2cm, 基底宽, 不活动, 腹股沟淋巴结未触及。与该病人预后无关的因素是

- A. 治疗措施的合理性
- B. 有无淋巴结转移
- C. 是否出现外阴瘙痒 ✓
- D. 病灶大小
- E. 细胞分化程度

解析: 病人的预后与病灶大小、部位、细胞分化程度、有无淋巴结转移、治疗措施等有关。选 C。

133. 章女士, 54 岁, 放置宫内节育器 18 年, 现绝经 1 年, 到门诊要求取出节育器。妇科检查: 外阴发育正常, 已婚已产型; 阴道通畅, 黏膜略平滑, 分泌物无色、量少; 宫颈光滑, 大小正常; 宫体前倾前屈位, 正常大小, 活动良好; 双附件未触及异常。向她提供的健康指导内容, 正确的是

- A. 提醒病人手术前注意憋尿
- B. 手术前病人需要进行 X 线常规检查
- C. 手术后禁止性生活 2 周 ✓
- D. 取出节育器后卧床休息 3 天

解析:

134. 李某, 32岁, 初孕妇, 宫内孕39周, 于昨天晚上感觉腹部一阵阵发紧, 每半个小时一次, 每次持续3~5秒, 今天早上孕妇感觉腹部疼痛, 每5~6分钟一次, 每次持续45秒左右。请问临产后, 该产妇如果出现以下情况不宜灌肠的是

- A. 初产妇宫口开大2cm
- B. 胎膜未破
- C. 无阴道出血
- D. 中度妊娠期高血压疾病 ✓
- E. 心功能I级

解析: 第一产程期间可以给待产妇进行灌肠, 灌肠禁忌证参见本考点第3题解析。选D。

135. 某孕妇, 孕36周, 在乘坐的公共汽车急刹车后感剧烈腹痛难忍。血压140/100mmHg。检查: 阴道无流血, 子宫似足月妊娠大小, 硬如板状, 压痛明显, 胎位不清, 胎心约90次/分。该孕妇最可能的诊断是

- A. 早产临产
- B. 前置胎盘
- C. 妊娠期高血压疾病
- D. 胎盘早期剥离 ✓
- E. 不完全性子宫破裂

解析: 胎盘早剥以突然发生的腹部持续性疼痛为特点, 伴或不伴有阴道出血。重度胎盘早剥贫血程度与外出血不相符, 子宫硬如板状, 有压痛。选D。

136. 女, 25岁, 先天性心脏病, 心功能II级, 现妊娠足月入院待产。对她进行的分娩期和产褥期护理措施, 错误的是

- A. 第一产程注意镇静
- B. 第二产程手术助产
- C. 第三产程沙袋压迫腹部
- D. 避免母乳喂养 ✓
- E. 分娩住院时间可适当延长

解析: 心功能I~II级的产妇可以哺乳, 但应避免劳累。

137. 某产妇, 29岁, GP足月妊娠, 自然分娩后第三天, 体温38℃, 下腹部胀痛, 排尿困难, 有尿急、尿痛、尿烧灼感, 中段尿培养细菌数 $\geq 10^4$ /ml。此患者最可能的诊断是

- A. 肾盂肾炎
- B. 膀胱炎 ✓
- C. 急性阴道炎
- D. 急性子宫内膜炎
- E. 急性外阴炎

解析: 本组题考查产褥感染相关内容。通过患者的临床表现(排尿困难, 有尿急、尿痛、尿烧灼感)可以判断为膀胱炎, 而肾盂肾炎的全身症状比较明显。选B。

138. 患者女, 47岁, 孕3产1, 近2年来月经周期紊乱, 经量时多时少, 最近闭经3个月后阴道淋漓出血半月多来医院就诊。该病人的最佳处理方案是

- A. 大量雌激素止血
- B. 大量止血药物

E. 抗生素治疗

解析：在治疗前，为了明确诊断，应该进行诊断性刮宫。故选 C。

139. 患者女，60 岁，绝经 11 年，近 3 个月阴道不规则流血 2 次。妇科检查：外阴阴道无萎缩，阴毛较多，宫颈光滑，子宫前倾，大小质地正常，右侧附件区扪及如新生儿头大小肿块，质中，活动良好。为排除子宫内膜癌，需行哪项检查

- A. 宫颈刮片细胞学检查
- B. 阴道镜
- C. 宫颈活体组织检查

D. 宫颈分泌物涂片找癌细胞

E. 分段诊断性刮宫 ✓

解析：子宫内膜癌病变发生在子宫内膜，分段诊断性刮宫是目前早期诊断子宫内膜癌最常用的方法。首先环刮宫颈管，后探宫腔，再搔刮宫腔内膜，标本分瓶做好标记，送病理检查。此检查简单经济，其结果是确诊子宫内膜癌的依据。选 E。

140. 64 岁女性患者，近 2 年来发现外阴左侧有一肿块，疼痛，2 个月前破溃，且有血性分泌物，查体见左侧大阴唇中段有一硬结约 3cm×2cm×2cm，基底宽，不活动，腹股沟淋巴结未触及。该病人治疗后应进行随访，第一年的正确做法是

- A. 每 1 个月一次
- B. 每 2 个月一次
- C. 每 3 个月一次
- D. 前半年每月一次 ✓
- E. 前半年每 2 个月一次

解析：治疗后的病人应该进行随访：第一年 1—6 个月每月一次；7~12 个月每 2 个月一次；第二年，每 3 个月一次；第 3~4 年每半年一次；第 5 年及以后每年一次。选 D。

141. 李某，32 岁，初孕妇，宫内孕 39 周，于昨天晚上感觉腹部一阵阵发紧，每半个小时一次，每次持续 3~5 秒，今天早上孕妇感觉腹部疼痛，每 5~6 分钟一次，每次持续 45 秒左右。请问下午 3 时，该妇女经阴道分娩出一正常男婴，胎儿娩出后正确的处理应

- A. 娩出后立即擦去胎脂
- B. 娩出后立即清理呼吸道 ✓
- C. 娩出半小时后进行吸吮
- D. 清洗后，打足印于新生儿病历上
- E. 立即进行维生素 K 肌注

解析：新生儿娩出后首先应立即清理呼吸道，保持新生儿呼吸通畅，然后才能进行其他的操作。选 B。

142. 某孕妇，孕 36 周，在乘坐的公共汽车急刹车后感剧烈腹痛难忍。血压 140/100mmHg。检查：阴道无流血，子宫似足月妊娠大小，硬如板状，压痛明显，胎位不清，胎心约 90 次/分。对该孕妇的正确处理是

- A. 及时终止妊娠 ✓
- B. 期待疗法
- C. 积极降压治疗
- D. 及时抑制宫缩
- E. 积极补充血容量

护理和健康指导。下列分娩时的护理措施，错误的是

- A. 鼓励产妇屏气用力缩短第二产程
- B. 宫口开全后立即注射催产素
- C. 建议患者积极母乳喂养 ✓
- D. 及时遵医嘱静脉输液
- E. 每 5 分钟测量一次胎心率

解析：HBsAg 阳性的产妇，可以母乳喂养，而 HBeAg 阳性产妇所生的新生儿不宜母乳喂养，因其血中有大量 HBV 存在，传染性较强，胎儿大多数受感染。选 C。

144. 某产妇，29 岁，GP 足月妊娠，自然分娩后第三天，体温 38℃，下腹部胀痛，排尿困难，有尿急、尿痛、尿烧灼感，中段尿培养细菌数  $\geq 10/m1$ 。对此病人实施的护理措施，错误的是

- A. 卧床休息
- B. 选用有效的抗生素
- C. 鼓励产妇摄取营养丰富的饮食
- D. 每天需饮水 1000~2000ml ✓
- E. 保持尿液通畅，每天尿量  $\geq 2000ml$

解析：鼓励产妇多喝水，每天需饮水 3000~4000ml，达到冲洗膀胱的目的。故选 D。

145. 患者女，47 岁，孕 3 产 1，近 2 年来月经周期混乱，经量时多时少，最近闭经 3 个月后阴道淋漓出血半月多来医院就诊。该病人可使用下列方法调整周期，但不包括

- A. 雌、孕激素序贯疗法
- B. 孕激素后半周期疗法
- C. 孕、雌激素合并治疗
- D. 避孕药
- E. 尿促性腺激素 ✓

解析：备选答案 E 的治疗目的在于促使恢复排卵功能，这不是围绝经期的妇女的治疗目的。选 E。

146. 患者女，60 岁，绝经 11 年，近 3 个月阴道不规则流血 2 次。妇科检查：外阴阴道无萎缩，阴毛较多，宫颈光滑，子宫前倾，大小质地正常，右侧附件区扪及如新生儿头大小肿块，质中，活动良好。此病人最可能的诊断是

- A. 卵巢颗粒细胞瘤 ✓
- B. 卵巢浆液性囊腺癌
- C. 卵巢库肯勃瘤
- D. 卵巢无性细胞瘤
- E. 卵巢畸胎瘤

解析：根据题干可知此病人体内雌激素水平异常增高，而颗粒细胞瘤是最常见的卵巢功能性肿瘤，能分泌雌激素。选 A。

147. 孙女士，30 岁，第二性征发育良好，婚后 2 年未孕，经检查基础体温双相，子宫内膜病理为分泌期改变。男方精液检查常规为正常。该病人需要做的进一步检查是

- A. 阴道镜检查
- B. 女性激素测定
- C. 输卵管通畅检查 ✓

#### E. B超监测卵泡发育

解析：导致女性不孕的原因包括输卵管、卵巢、子宫等因素，其中输卵管因素是不孕症最常见的因素，而无排卵是导致不孕的最严重的原因。通常采用内分泌检查。该女士的子宫具有排卵功能，由于输卵管因素是导致不孕的主要原因，所以需要进一步检查输卵管的畅通情况。选 C。

148. 王某，28岁，未产妇，述说平素月经规律，每28天一次，每次持续3~4天。其末次月经是2月11日，距今已有8周，现病人感觉疲乏，乳房触痛明显。除以上体征外，护士若考虑该妇女怀孕，其另外的可能表现是

- A. 妊娠纹
- B. 胎动感
- C. 恶心 ✓
- D. 妊娠斑
- E. 听到胎心音

解析：从题意可知假如该妇女确诊怀孕，目前应该为妊娠8周左右，应属于早期妊娠，所以另外的体征也应该是早期妊娠时的表现，而备选答案中只有恶心属于早期妊娠的表现。选 C。

149. 某产妇，于今日早晨经阴道顺产一女婴，进展顺利。该产妇于产后第4天出现双乳房胀痛，乳汁排流不畅，最常见的原因是

- A. 进食少
- B. 卧床时间长，活动少
- C. 未及早按摩、热敷乳房
- D. 未给新生儿早吸吮、多吸吮 ✓
- E. 乳头凹陷

解析：导致产后第4天，产妇的双乳房胀痛，乳汁排流不畅的最常见原因是未给新生儿早吸吮、多吸吮。因为新生儿吸吮力强，有利于吸通乳腺管，可以预防发生乳房胀痛、乳汁排流不畅及乳腺炎等。选 D。

150. 李女士，怀孕36周，第一胎。昨晚突然阴道出血，出血量约400ml，无腹痛。检查：血压100/60mmHg，宫底高度与孕月相符，腹软无压痛，胎位清楚，胎心音110次/分。患者诊断可能性最大是

- A. 先兆早产
- B. 正常临产
- C. 前置胎盘 ✓
- D. 胎盘早剥
- E. 流产

解析：

151. 某产妇，30岁，产前检查被诊断为慢性乙型肝炎大三阳。4小时前自然临产，护士对她进行了分娩期护理和健康指导。为了防止新生儿感染乙肝，指导和护理措施中，错误的是

- A. 尽早进行母婴同室管理 ✓
- B. 新生儿应隔离4周
- C. 产后不要采用避孕药避孕
- D. 积极给新生儿免疫接种乙肝疫苗
- E. 注意不得使用雌激素回奶

道壁充血，宫颈光滑。可能诊断为

- A. 滴虫性阴道炎
- B. 霉菌性阴道炎 ✓
- C. 老年性阴道炎

- D. 宫颈糜烂
- E. 非特异性阴道炎

解析：

153. 患者女，44岁，因侵蚀性葡萄胎收入院治疗。检查：BP100/60mmHg，R18次/分，P98次/分，双合诊检查提示子宫丰满、质软，血HCG明显高于正常值。该病例首选的治疗方案是

- A. 子宫切除术
- B. 放疗
- C. 化疗 ✓
- D. 同位素治疗
- E. 清宫术

解析：

154. 患者女，56岁，绝经后8年出现阴道不规则流血。妇检：宫颈光滑，阴道黏膜菲薄，宫体稍大、软，活动良，附件（-）。初步诊断宫体癌，最支持该诊断的体征是

- A. 56岁
- B. 阴道不规则流血
- C. 宫体大、软 ✓
- D. 阴道黏膜菲薄
- E. 宫颈光滑

解析：

155. 孙女士，30岁，第二性征发育良好，婚后2年未孕，经检查基础体温双相，子宫内膜病理为分泌期改变。男方精液检查常规为正常。上述检查发现有异常，应采用的治疗方案是

- A. 异常部位活检送病理
- B. 氯米芬促排卵
- C. 抗炎治疗
- D. 输卵管通液治疗 ✓
- E. 服己烯雌酚

解析：在输卵管检查中发现异常时，可以进行输卵管通液治疗，既可以消炎，又可以达到疏通输卵管的治疗作用。选D。





