

2022 整形外科主治医师题库（最新版）

1. 瘢痕疙瘩最好发于()。

- A. 胸骨区
- B. 肩部
- C. 面部
- D. 颈部
- E. 耳部

【答案】A

资料来源文得学习网,更多医学类考试资料,上文得学习网查看。

2. 瘢痕疙瘩的治疗下列方法中不对的是()。

- A. 放射治疗
- B. 糖皮质激素皮损内注射
- C. 手术切除
- D. 外用糖皮质激素
- E. 外用维 A 酸霜

【答案】D

3. 头皮扩张器埋置深度为()。

- A. 表皮下
- B. 真皮下
- C. 帽状腱膜表面
- D. 帽状腱膜深面

E. 表皮下或真皮下

【答案】D

4. 较少发生恶变的疾病是()。

A. 恶性黑色素瘤

B. 基底细胞癌

C. 十二指肠溃疡

D. 胃溃疡

E. 溃疡性结肠炎

【答案】C

5. 恶性黑色素瘤的诊断()。

A. Lillie 亚铁染色法

B. Schiff 阿尔辛蓝地衣红染色法

C. 磷钨酸苏木精(PTAH)染色法

D. PAS 染色

E. Gomori 银染色法

【答案】A

6. 引起腹膜炎的细菌最多见的是()。

A. 大肠杆菌

B. 绿脓杆菌

C. 金黄色葡萄球菌

D. 产气杆菌

E. 变形杆菌

【答案】A

7. 男，38岁，右下胸撞伤6小时，伤后感上腹部疼痛，头晕。查：BP90/70mmHg，P110次/分，面色苍白，右腹部压痛、反跳痛、肌紧张较明显。X线透视示肝阴影扩大、右膈抬高。首先应考虑的诊断是()。

- A. 外伤性血气胸
- B. 肝破裂
- C. 右肾破裂
- D. 结肠肝区破裂
- E. 胃十二指肠穿孔

【答案】B

8. 引起机械性肠梗阻最常见的原因是()。

- A. 腹膜后巨大血肿
- B. 肠壁肿瘤
- C. 肠蛔虫症
- D. 腹内手术或炎症后形成的粘连
- E. 先天性肠道闭锁

【答案】D

9. 关于甲状腺手术治疗的适应症不正确的是()。

- A. 高功能腺瘤
- B. 中度以上原发性甲亢
- C. 甲状腺肿大有压迫症状

D. 抗甲状腺药物或放射性 ^{131}I 治疗无效者

E. 少年儿童患者

【答案】E

10. 嵌顿性疝与绞窄性疝的区别是()。

A. 疝囊有无压痛

B. 疝内容物能不能回纳

C. 疝内容物有无血运障碍

D. 是否有休克

E. 是否有机械性肠梗阻的表现

【答案】C

11. 伤口愈合过程中病理生理最后一期是()。

A. 炎症期

B. 塑形期

C. 增生期

D. 瘢痕形成期

E. 炎性渗出期

【答案】B

12. 在面颊部应当做椭圆形切除，在淋巴结引流方向应多切除一些组织的疾病是()。

A. 皮肤鳞状细胞癌

B. 基底细胞癌

C. 恶性黑色素瘤

E. 以上全不是

【答案】C

13. Z 瓣成形术中，三角瓣的角度一般在()。

A. $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$

B. $20^{\circ} \sim 35^{\circ}$

C. $30^{\circ} \sim 45^{\circ}$

D. $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$

E. $70^{\circ} \sim 90^{\circ}$

【答案】D

14. 作为肌皮瓣的背阔肌的血供模式为()。

A. 单一血管蒂

B. 主要血管加次要血管蒂

C. 双主要血管蒂

D. 节段性血管蒂

E. 主要血管加节段性血管蒂

【答案】E

15. 关于半侧颜面萎缩的治疗方法中，不可采取的是()。

A. 真皮脂肪游离移植

B. 带血管蒂颞筋膜瓣移植

C. 异体骨移植

D. 背阔肌肌皮瓣移植

【答案】C

16. 下列各种化疗药的作用机理错误的是()。

- A. 5-氟尿嘧啶-抗代谢类
- B. 尼莫司汀-烷化剂
- C. 环磷酰胺-烷化剂
- D. 顺铂-抗代谢类
- E. 他莫昔芬-抗肿瘤代谢类

【答案】D

17. 患者男，70岁，乙状结肠癌根治术后2天，剧烈咳嗽后切口全层裂开，最佳处理为()。

- A. 立即回纳内脏，以后择期修复
- B. 麻醉下逐层缝合切口
- C. 麻醉下用不锈钢丝全层缝合切口
- D. 用干净治疗巾覆盖内脏，伤口情况稳定后再择期修复
- E. 用抗生素覆盖创面

【答案】C

18. 挤压综合征主要是指伤后出现()。

- A. 呼吸困难
- B. 休克
- C. 昏迷
- D. 肾衰竭

E. 心力衰竭

19. 化脓性海绵状静脉窦炎的临床表现中，下列哪项是错误的?()

- A. 患侧眼球及周围进行性红肿和硬结
- B. 局部疼痛、压痛
- C. 寒战、高热
- D. 头痛或昏迷
- E. 对侧肢体瘫痪

【答案】E

20. 腰麻术后最常见的并发症是()。

- A. 恶心呕吐
- B. 背痛
- C. 脑脊髓膜炎
- D. 脑神经麻痹
- E. 头痛

【答案】C

21. 休克时，5~10 分钟快速静滴等渗盐水 250mL 后，如血压升高而中心静脉压不变则提示()。

- A. 心功能不全
- B. 血容量过多
- C. 容量血管过度收缩

- D. 血容量不足
- E. 肾功能不全

22. 阿托品作为麻醉前用药的主要作用是()。

- A. 抑制呼吸道分泌
- B. 镇静
- C. 记忆丧失
- D. 降低基础代谢率
- E. 增加心率

【答案】A

23. 急性硬膜外血肿最常见于什么血管损伤?()

- A. 脑膜中动脉
- B. 脑膜中静脉
- C. 窦静脉
- D. 板障静脉
- E. 脑膜前动脉

【答案】A

24. 直肠癌手术保留距肛管多远不影响正常排便?()

- A. 5cm
- B. 7cm
- C. 2cm
- D. 10cm

E. 12cm

【答案】A

25. 一般手术区皮肤的准备(备皮), 一般是提前几天?()

A. 2 天

C. 3 天

D. 4 天

E. 5 天

【答案】A

26. 骨关节结核最常见的发生部位是()。

A. 肌肉最不发达的腕关节

B. 全身滑膜面积最大的膝关节

C. 负重最大的踝关节

D. 脊柱椎体

E. 活动最多的髋关节

【答案】D

27. 骨折的早期并发症是()。

A. 骨筋膜室综合征

B. 关节僵硬

C. 骨化性肌炎

D. 创伤性关节炎

E. 缺血性骨坏死

【答案】A

28. 骨软骨瘤的临床表现为()。

A. 生长较快，伴明显疼痛

E. 肿块明显，表面皮肤有静脉曲张

C. X线可见骨膜反应

D. 本身无症状，但可压迫周围组织，影响功能

E. 肿物与周围界限不清

【答案】D

29. X线检查对骨折的意义主要是()。

A. 了解受伤机制

B. 明确诊断

C. 判断骨折预后

D. 了解伤情

E. 了解骨质密度

【答案】D

30. 影响骨折愈合最重要的因素是()。

A. 外伤所致的骨折类型

B. 骨折部位的血液供应情况

C. 病人的年龄

D. 病人是否有代谢性疾病

E. 全身营养状态

【答案】B

31. 一期愈合的特点时()。

A. 组织缺损少、创缘整齐、无感染、对合严密的伤口

B. 组织缺损较大，创缘不整齐、错开、无法整齐对合或伴有感

染的伤口

D. 成纤维细胞和新生毛细血管

E. 胶原纤维和纤维细胞

【答案】 A

32. 以下对皮片成活没有影响的是()。

A. 皮片下血肿

B. 局部未用抗生素

C. 包扎固定不当

D. 在裸露的骨皮质上植皮

E. 贫血

【答案】 B

33. 按照转移方式划分，V-Y 皮瓣属何种皮瓣?()

A. 旋转皮瓣

B. 推进皮瓣

C. 易位皮瓣

D. 翻转皮瓣

E. 交叉皮瓣

【答案】 B

34. 乳房假体破裂的最佳检查方法为()。

A. B 超

B. X 线

C. CT

D. MRI

【答案】 A

35. 皮肤癌常见的病因为()。

- A. 黄曲霉毒素
- B. 吸烟
- C. EB 病毒
- D. 紫外线照射
- E. 人类乳头瘤病毒

【答案】 D

36. 腹股沟深环的体表投影位于()。

- A. 腹股沟中点上方 1cm
- B. 腹股沟中点上方 2cm
- C. 腹股沟中点
- D. 腹股沟中点下方 1cm
- E. 腹股沟中点下方 2cm

【答案】 B

37. 溃疡病行胃大部切除的绝对手术适应症是()。

- A. 单纯穿孔
- B. 第一次出血
- C. 瘢痕性幽门梗阻
- D. 医源性溃疡
- E. 反复门诊治疗无效的溃疡

【答案】 C

38. 腹膜刺激征的临床表现是()。
- A. 压痛、反跳痛、肌紧张
 - B. 压痛、反跳痛
 - C. 反跳痛、肌紧张
 - D. 压痛、反跳痛、墨菲征
 - E. 压痛、肌紧张、移动浊音阳性

【答案】A

39. 急性梗阻性化脓性胆管炎的典型临床表现是()。

- A. 右上腹阵发性绞痛
- B. 胆囊肿大压痛
- C. 墨菲征阳性
- D. 雷诺五联征阳性
- E. 夏柯三联症阳性

【答案】D

40. 腹部闭合性损伤并发腹内脏器损伤时的表现, 不包括()。

- A. 早期出现休克征象

- B. 持续性剧烈腹痛
- C. 有明显的腹膜刺激症状
- D. 有昏迷-清醒-再昏迷
- E. 有移动性浊音

【答案】D

41. 一住院病人, 臀部皮肤出现暗红, 渐趋紫暗, 渐成黑色,

渐液化溃烂，诊断为()。

- A. 破伤风
- B. 漆疮
- C. 冻伤
- D. 褥疮
- E. 坏疽

【答案】D

42. 皮肤基底细胞癌，正确的是()。

- A. 恶性程度较高
- B. 能迅速侵入深部组织
- C. 生长较迅速
- D. 易发生淋巴结转移
- E. 以上都不是

【答案】E

43. 基底细胞癌的临床分型不包括()。

- A. 结节溃疡型
- B. 色素型
- C. 硬斑病样或纤维化型
- D. 隆起型
- E. 浅表型

【答案】C

44. 下颌角骨折的症状为()。

- B. 张口受限
- C. 下唇麻木
- D. 舌后坠
- E. 颞部裂伤伴前牙开牙合后牙早接触

【答案】 B

45. 下列皮片移植成活后性能最好的是()。

- A. 表层皮片
- B. 中厚皮片
- C. 全厚皮片
- D. 点状皮片
- E. 以上都不是

【答案】 A

31. 头皮共分几层?()。

- A. 1层

B. 2层

C. 3层

D. 4层

E. 5层

【答案】 E

资料来源文得学习网,更多医学类考试资料,上文得学习网查看。

32. 常规皮瓣的安全断蒂最短时限为()。

- A. 1周

C. 3 周

D. 4 周

E. 5 周

【答案】C

33. 人 MHC 抗原包括()。

A. HLA

B. ABO、HLA

C. ABO

D. CEA

E. ABO、CEA

【答案】A

34. 超急性免疫反应是()。

A. 体液性免疫反应

B. 细胞性免疫反应

C. 细胞免疫+体液免疫

D. 固有免疫反应

E. 以上都不是

【答案】A

35. 患者男，16 岁，双侧上睑中度下垂，肌力 8mm，欲采用上睑提肌缩短术上提 3mm，估计术中需要缩短上睑提肌的长度是()。

A. 8mm

- B. 12mm
- C. 18mm
- D. 20mm
- E. 24mm

【答案】B

51. 高渗性缺水的早期主要症状是()。

- A. 幻觉
- B. 谵妄
- C. 恶心
- D. 口渴
- E. 心悸

【答案】D

52. 手术病人一般在术前 6~12 小时开始禁食是因为()。

- A. 利于病人休息
- B. 减少胃肠道手术的污染
- C. 避免术后腹胀
- D. 防止麻醉或术中发生呕吐
- E. 有利胃肠道手术时的显露

【答案】D

53. 关于结肠和直肠术前准备,叙述错误的是()。

- A. 手术前 5~7 日进低渣饮食
- B. 术前 2 日进全流食

D. 术前 1 天服用泻药、灌肠

E. 术晨灌肠

【答案】 C

54. 实施清创术的最佳时机应该是()。

A. 伤后 2 小时内进行

B. 伤后 4 小时内进行

C. 伤后 8 小时内进行

D. 伤后 12 小时内进行

E. 伤后 24 小时内进行

【答案】 C

55. 休克治疗的主要目的是()。

A. 升高血压

B. 恢复血容量

C. 纠正酸中毒

D. 恢复心排出量

E. 恢复组织的血流灌注

【答案】 E

56. 输血传播疾病，最常见的疾病是()。

A. 疟疾

B. 梅毒

C. 回归热

D. 乙型肝炎

【答案】D

57. 可引起感染性休克的是()。

- A. 骨盆骨折
- B. 青霉素过敏
- C. 张力性气胸
- D. 绞窄性肠梗阻
- E. 脾破裂

【答案】D

58. 关于 G+球菌脓毒血症，下列哪项是错误的?()

- A. 继发于疔，急性蜂窝织炎等
- B. 致病菌为金葡菌或溶血链球菌

- C. 休克发生早
- D. 少尿或无尿不明显
- E. 转移性脓肿多见

【答案】C

59. 急性化脓性阑尾炎术后，7 天拆线，切口无红肿、无渗液、无压痛，记录为()。

- A. II 甲
- B. II 乙
- C. III 甲
- D. III 乙
- E. 以上均不是

60. 下列哪一项不是低渗性脱水的临床表现?()

- A. 尿量正常、稍多或减少
- B. 尿比重低
- C. 皮肤弹性差
- D. 神经系统表现
- E. 恶心、呕吐

【答案】 C

资料来源文得学习网,更多医学类考试资料,上文得学习网查看。

