

整形外科主治医师考试历年真题

1. 纤维胃镜用于下列哪项疾病的检查是被禁忌的?()

- A. 上消化道大出血
- B. 食管狭窄
- C. 幽门梗阻
- D. 轻度心肺功能不全
- E. 胃内异物

【答案】 B

资料来源: 文得学习网, 更多医学考试资料, 上文得学习网查看。

2. 男, 35 岁, 查体发现阴囊有一肿块, 质地坚硬, 托起和掂量有沉重感, 透光试验阴性, 诊断为()。

- A. 睾丸鞘膜积液
- B. 附睾炎
- C. 精液囊肿
- D. 睾丸肿瘤
- E. 完全性腹股沟斜疝

【答案】 D

3. 阑尾切除术后最常见的并发症是()。

- A. 切口感染
- B. 切口出血
- C. 阑尾残端瘘

- D. 盆腔脓肿
- E. 肠梗阻

【答案】A

4. 诊断急性阑尾炎最重要的体征是()。
- A. 右下腹有肌紧张
 - B. 右下腹有反跳痛
 - C. 右下腹有明显固定压痛点
 - D. 闭孔内肌试验阳性
 - E. 结肠充气试验阳性

【答案】C

5. 患者男，78岁，1天前因右腹股沟疝嵌顿手法回纳后，即感腹痛。现因腹痛加剧、腹胀、气促、呕吐而来就诊。体检：神志淡漠，四肢厥冷。脉细速140次/min，血压60/40mmHg，腹胀，全腹压痛，反跳痛和肌紧张，以脐右最为明显，诊断肠坏死穿孔，弥漫性腹膜炎、中毒性休克，应选择的处理方案是()。

- A. 立即手术
- B. 非手术治疗
- C. 先观察视发展再决定治疗方案
- D. 积极抗休克治疗，并进行手术治疗
- E. 以上均不对

【答案】D

6. 慢性骨髓炎死骨摘除术的指征是()。

- A. 发热，局部红肿，有死骨及死腔
- B. 开放性骨折感染，骨折尚未愈合，有大块死骨
- C. 有死骨、死腔、包壳形成薄弱
- D. 死骨分界不清，有死腔与窦道
- E. 骨包壳充分形成，有死骨、死腔

【答案】E

7. 男性青年，因车祸致胫腓骨中上 $1/3$ 处开放性粉碎性骨折，行彻底清创术，摘除所有的粉碎的骨折片，术后行牵引治疗 8 个月后，骨折仍未愈合，其最可能的原因是()。

- A. 骨折处血液供应差
- B. 伤肢固定不确切
- C. 清创时摘除了过多的碎骨片
- D. 功能锻炼不够
- E. 未做内固定

【答案】C

8. 髋关节脱位发生率最高的是()。

- A. 前脱位
- B. 后脱位
- C. 中心性脱位
- D. 合并股骨头骨折的脱位
- E. 合并髌臼骨折的脱位

【答案】B

9. 腰间盘突出症与椎管内肿瘤最有鉴别意义的辅助检查方法是()。

- A. X线片
- B. MRI
- C. CT
- D. 肌电图
- E. 超声波

【答案】B

10. 慢性血源性骨髓炎有效的治疗方法是()。

- A. 增强营养
- B. 局部制动
- C. 应用抗生素
- D. 局部彻底换药
- E. 手术

【答案】E

11. 腹部最易损伤的空腔脏器是()。

- A. 结肠
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 直肠
- E. 十二指肠

【答案】C

行性加重，有体重减轻，全身明显黄染，肝未触及，深吸气时可触及肿大的胆来源囊底部，无触痛。化验：血胆红素 15mg/dL，尿检：胆红素阳性。最可能是()。

- A. 肝炎
- B. 胆石症
- C. 胰头癌
- D. 慢性胰腺炎
- E. 肝癌

【答案】C

13. 患者男，20岁，因阑尾炎穿孔行阑尾切除术后1周，体温仍在 38~39℃，腹胀腹痛，尿频，大便次数多。首先考虑()。

- A. 膈下脓肿
- B. 肠间脓肿
- C. 盆腔脓肿
- D. 脾破裂
- E. 胃十二指肠穿孔

【答案】C

14. 在急性肠梗阻的保守治疗过程中，关键性的措施是()。

- A. 胃肠减压
- B. 纠正水、电解质酸碱平衡失调
- C. 缓解肠痉挛性疼痛

E. 抗生素应用

【答案】B

15. 急性腹膜炎最主要的临床表现是()。

- A. 腹痛、腹胀
- B. 腹膜刺激征
- C. 叩出移动性浊音
- D. 肠鸣音消失
- E. 高热、脉快、疲乏

【答案】B

16. 关于股疝的叙述不正确的是()。

- A. 腹腔内脏经股环、股管，从卵圆窝突出
- B. 多见于中年以上的妇女
- C. 透光试验不透光
- D. 易发生嵌顿和绞窄
- E. 发生嵌顿则应不宜紧急手术

【答案】E

17. 关于加用碘剂对甲状腺大部切除术患者手术前用药的叙述不正确的是()。

- A. 碘剂的作用是减少术中出血，便于手术操作
- B. 常用制剂为复方碘溶液(卢戈液)
- C. 每日3次，每次3~5滴，以后逐日每次增加1滴，至每次15

E. 凡不准备施行手术治疗的患者，一律不要服用碘剂

【答案】D

18. 关于胰腺炎诊断中血、尿淀粉酶检测的叙述正确的是()。

A. 血清淀粉酶值在发病后 3~12 小时开始升高，24~48 小时达到高峰，7 天内恢复正常

B. 尿淀粉酶升高稍迟但持续时间比血淀粉酶长

C. 淀粉酶值的高低与病情的轻重不一定成正比

D. 严重的坏死性胰腺炎，血、尿淀粉酶值反而不升高

E. 以上叙述都对

【答案】E

19. 内痔的早期临床表现为()。

A. 黏液血便

B. 便后脱垂

C. 无痛性、间歇性便后出血

D. 肛门疼痛

E. 肛门抓痒

【答案】C

20. 女，27 岁，已婚，急性腹膜炎后 7 天，体温升至 38.9℃，自觉全身不适，食欲差，大便次数增多并有里急后重感，今天出现膀胱刺激征，最简便的检查手段是()。

A. 腹部 B 超检查

B. 肛门镜检查

- D. 后穹隆穿刺
- E. 直肠前壁穿刺

【答案】D

21. 休克时，5~10 分钟快速静滴等渗盐水 250mL 后，如血压升高而中心静脉压不变则提示()。

- A. 心功能不全
- B. 血容量过多
- C. 容量血管过度收缩
- D. 血容量不足
- E. 肾功能不全

【答案】C

22. 阿托品作为麻醉前用药的主要作用是()。

- A. 抑制呼吸道分泌
- B. 镇静
- C. 记忆丧失
- D. 降低基础代谢率
- E. 增加心率

【答案】A

23. 急性硬膜外血肿最常见于什么血管损伤?()

- A. 脑膜中动脉
- B. 脑膜中静脉
- C. 窦静脉

D. 颈内静脉
E. 脑膜前动脉

【答案】A

24. 直肠癌手术保留距肛管多远不影响正常排便?()

A. 5cm

B. 7cm

C. 2cm

D. 10cm

E. 12cm

【答案】A

25. 一般手术区皮肤的准备(备皮), 一般是提前几天?()

A. 1天

B. 2天

C. 3天

D. 4天

E. 5天

【答案】A

26. 筛查原发性肝癌主要靠()。

A. 有慢性肝炎或肝硬化病史

B. 有脂肪肝病史

C. 肝功能检查

D. 甲胎蛋白升高+B超检查

E. 肝脏肿大伴压痛

【答案】D

27. 腹外疝发病原因中最重要的是()。

- A. 腹壁强度降低
- B. 慢性便秘
- C. 慢性咳嗽
- D. 排尿困难
- E. 腹水

【答案】A

28. 胆固醇结石好发生于()。

- A. 总胆管
- B. 左肝管
- C. 右肝管
- D. 胆囊内
- E. 以上都不是

【答案】D

29. 夏柯三联征包括()。

- A. 疼痛、发热、黄疸
- B. 寒战、发热、黄疸

- C. 疼痛、发热、抽搐
- D. 疼痛、贫血、黄疸
- E. 发热、黄疸、休克

【答案】A

部牵涉痛。为明确诊断，应首选哪一项检查?()

- A. 口服胆囊造影剂造影
- B. 静脉胆道造影术
- C. B 超检查
- D. PTC
- E. ERCP

【答案】C

31. 头皮共分几层?()。

- A. 1 层
- B. 2 层
- C. 3 层
- D. 4 层
- E. 5 层

【答案】E

资料来源：文得学习网，更多医学考试资料，上文得学习网查看。

32. 常规皮瓣的安全断蒂最短时限为()。

- A. 1 周

B. 2 周

C. 3 周

D. 4 周

E. 5 周

【答案】C

- A. HLA
- B. ABO、HLA
- C. ABO
- D. CEA
- E. ABO、CEA

【答案】A

34. 超急性免疫反应是()。

- A. 体液性免疫反应
- B. 细胞性免疫反应
- C. 细胞免疫+体液免疫
- D. 固有免疫反应
- E. 以上都不是

【答案】A

35. 患者男，16岁，双侧上睑中度下垂，肌力8mm，欲采用上睑提肌缩短术上提3mm，估计术中需要缩短上睑提肌的长度是()。

- A. 8mm
- B. 12mm
- C. 18mm
- D. 20mm
- E. 24mm

【答案】B

36. 腹股沟淋巴结的体表投影位于()。
- A. 腹股沟中点上方 1cm
 - B. 腹股沟中点上方 2cm
 - C. 腹股沟中点
 - D. 腹股沟中点下方 1cm
 - E. 腹股沟中点下方 2cm

【答案】B

37. 溃疡病行胃大部切除的绝对手术适应症是()。
- A. 单纯穿孔
 - B. 第一次出血
 - C. 瘢痕性幽门梗阻
 - D. 医源性溃疡
 - E. 反复门诊治疗无效的溃疡

【答案】C

38. 腹膜刺激征的临床表现是()。
- A. 压痛、反跳痛、肌紧张

- B. 压痛、反跳痛
- C. 反跳痛、肌紧张
- D. 压痛、反跳痛、墨菲征
- E. 压痛、肌紧张、移动浊音阳性

【答案】A

39. 急性梗阻性化脓性胆管炎的典型临床表现是()。

- B. 胆囊肿大压痛
- C. 墨菲征阳性
- D. 雷诺五联征阳性
- E. 夏柯三联症阳性

【答案】D

40. 腹部闭合性损伤并发腹内脏器损伤时的表现, 不包括()。
- A. 早期出现休克征象
 - B. 持续性剧烈腹痛
 - C. 有明显的腹膜刺激症状
 - D. 有昏迷-清醒-再昏迷
 - E. 有移动性浊音

【答案】D

41. 复苏的任务和步骤可归纳为 ABC, 其含义是()。
- A. 触大动脉确诊-进行人工呼吸-建立人工循环
 - B. 保持呼吸道通畅-进行人工呼吸-建立人工循环

- C. 保持呼吸道通畅-建立人工循环-进行人工呼吸
- D. 心肺复苏-药物治疗-脑复苏
- E. 低温-脱水-糖皮质激素治疗

【答案】B

42. 年过 70 岁老年人, 胃切除术后 1~3 天, 输液量过大, 点滴速度过快, 易发生()。
- A. 切口感染

C. 肺不张或肺内感

D. 急性肺水肿

E. 深静脉血栓形成

【答案】 D

43. 休克微循环扩张期的病理生理改变主要是()。

A. 微动脉及毛细血管前括约肌舒张，毛细血管后的小静脉处在收缩期

B. 细胞内的溶酶体膜破裂，造成细胞自溶

C. 肾上腺髓质和交感神经节后纤维释放大量儿茶酚胺

D. 细胞能量来源主要是糖酵解

E. 毛细血管内有微细血栓形成

【答案】 A

44. 术后腹胀的处理不包括哪一项?()

A. 肛管排气

B. 胃肠减压

C. 局部热敷

D. 新斯的明 0.5mg 肌注

E. 发生后即采取手术处理

【答案】 E

45. 大面积烧伤早期最重要的治疗是()。

A. 补液

B. 防治感染

- D. 植皮
- E. 应用破伤风抗毒素

【答案】A

31. 关于胸外按压，下列叙述正确的是()。

- A. 抢救者双手掌根部相叠，两臂伸直
- B. 按压病人胸骨中、下 $1/3$ 交界处
- C. 使胸骨下陷 5~6cm
- D. 按压频率为 100~120 次/分
- E. 以上都正确

【答案】E

32. 关于疖的叙述下列哪一项不正确?()

- A. 是邻近多个毛囊及所属皮脂腺、汗腺的急性化脓性感染
- B. 可由单个疖扩展或多个疖融合而成

- C. 金葡菌为主要致病菌
- D. 好发于上下嘴唇等质地柔软部位
- E. 在糖尿病等免疫力低下的成年病人中较为多见

【答案】D

33. 被动免疫预防破伤风杆菌感染的叙述不正确的是()。

- A. 伤后 24 小时内可注射
- B. 注药前必须常规做过敏试验
- C. 作用快，而且持久
- D. 适用于小、深、脏的创口，严重的开放伤

E. 过敏后立即深部肌肉注射肾上腺素抢救

【答案】C

34. 关于清创缝合错误的是()。

- A. 清除伤口污物和异物，切除失去活力的组织
- B. 清创术最好在伤后 6~8 小时以内实施
- C. 面部头颈部的伤口超过 14 小时，清创后应尽可能缝合
- D. 关节、大血管或神经暴露的伤口清创后不缝合
- E. 污染严重的伤口，清创后不缝合

【答案】D

35. 术后常见的并发症及症状是()。

- A. 发热
- B. 出血
- C. 切口感染和裂开

D. 肺部感染

E. 以上都对

【答案】E

51. 关于胰腺癌的叙述不正确的是()。

- A. 好发年龄在 20~30 岁之间
- B. 多为胰头癌
- C. 按组织类型，以导管细胞癌最多
- D. 广泛浸润周围组织、器官，并较早经淋巴转移
- E. 该病早期诊断困难，手术切除率低，预后差

52. 最常见的腹外疝是()。

- A. 脐疝
- B. 股疝
- C. 切口疝
- D. 腹股沟斜疝
- E. 腹股沟直疝

【答案】D

53. 怀疑肛管直肠肿瘤，最简单而重要的检查是()。

- A. 直肠指诊
- B. 乙状结肠镜检查
- C. 直肠镜检查
- D. X线气钡灌肠

E. B型超声检查

【答案】A

54. 治疗门静脉高压症食管静脉曲张出血，最有效的常用方法是()。

- A. 应用止血药
- B. 立即输血
- C. 静脉点滴垂体后叶素
- D. 用三腔两囊管压迫
- E. 局部注射硬化剂

【答案】D

入阴囊，不透光，主要考虑为()。

- A. 鞘膜积液
- B. 隐睾
- C. 股疝
- D. 斜疝
- E. 直疝

【答案】E

56. 同种异体移植术前评估供、受者间相关的免疫学检查不包括()。

- A. 供、受者血型是否相符
- B. HLA 配型相容程度

- C. 淋巴细胞毒交叉配合试验
- D. 肝炎病毒、HIC 等相关指标
- E. PRA 检测结果

【答案】D

57. 下列不是乳房再造来源组织的是()。

- A. 腹部
- B. 臀部
- C. 背部
- D. 股部
- E. 上臂

【答案】E

选治疗为()。

- A. 无需处理
- B. 直接缝合
- C. 切除植皮
- D. 皮瓣移植
- E. 以上都不是

【答案】 B

59. 手拇指外展功能丧失，提示()。

- A. 正中神经损伤
- B. 尺神经损伤

- C. 桡神经损伤
- D. 腋神经损伤
- E. 肌皮神经损伤

【答案】 C

60. 阴道成型带模具的时间是()。

- A. 3个月
- B. 1~2年
- C. 6个月
- D. 8个月
- E. 1年

【答案】 C

