

2022 整形外科主治医师考题

1. 鼻半侧缺损如已超过中线或鼻尖也已缺损时，则应考虑行()。

- A. 鼻尖再造
- B. 半鼻再造
- C. 全鼻再造
- D. 局部皮瓣修复
- E. 鼻唇沟皮瓣修复

【答案】C

2. 一头皮撕脱伤的患者，头皮撕脱面积较大，颅骨外露，最佳治疗方案应为()。

- A. 游离皮瓣移植
- B. 皮管移植
- C. 扩张器法修复
- D. 游离皮片移植
- E. 颅骨外板钻孔换药，择期手术

【答案】E

3. 大隐静脉曲张合并小腿溃疡。首选治疗方式为()。

- A. 口服抗生素
- B. 局部换药，等溃疡愈合后再手术
- C. 大隐静脉高位结扎，曲张静脉剥出，溃疡切除植皮术

- D. 大隐静脉高位结扎，曲张静脉剥出
- E. 弹力绷带或弹力袜，抬高患肢，改善循环

【答案】C

4. 男，7个月。右侧小耳畸形，左耳正常。下列哪种处理最为适宜?()

- A. 立即行耳再造
- B. 1岁置入骨传导听力辅助装置
- C. 4岁时植入硅橡胶耳支架
- D. 4岁时行外耳道成形
- E. 6岁时行自体肋软骨支架耳再造术，打通中外耳道

【答案】E

5. 糖尿病病人，足背皮肤破溃缺损，首先检查的动脉是()。

- A. 股动脉
- B. 胫前动脉
- C. 足背动脉
- D. 胫后动脉
- E. 足底动脉

【答案】C

6. 慢性骨髓炎死骨摘除术的指征是()。

- A. 发热，局部红肿，有死骨及死腔
- B. 开放性骨折感染，骨折尚未愈合，有大块死骨
- C. 有死骨、死腔、包壳形成薄弱

- D. 死骨分界不清，有死腔与窦道
- E. 骨包壳充分形成，有死骨、死腔

【答案】E

7. 男性青年，因车祸致胫腓骨中上 $1/3$ 处开放性粉碎性骨折，行彻底清创术，摘除所有的粉碎的骨折片，术后行牵引治疗 8 个月后，骨折仍未愈合，其最可能的原因是()。

- A. 骨折处血液供应差
- B. 伤肢固定不确切
- C. 清创时摘除了过多的碎骨片
- D. 功能锻炼不够
- E. 未做内固定

【答案】C

8. 髋关节脱位发生率最高的是()。

- A. 前脱位
- B. 后脱位
- C. 中心性脱位
- D. 合并股骨头骨折的脱位
- E. 合并髌臼骨折的脱位

资料来源文得学习网，更多医学类考试资料，上文得学习网查看。

【答案】B

9. 腰间盘突出症与椎管内肿瘤最有鉴别意义的辅助检查方法是()。

- A. X 线片
- B. MRI
- C. CT
- D. 肌电图
- E. 超声波

【答案】 B

10. 慢性血源性骨髓炎有效的治疗方法是()。

- A. 增强营养
- B. 局部制动
- C. 应用抗生素
- D. 局部彻底换药
- E. 手术

【答案】 E

11. 骨折血肿机化演进期大约需要()。

- A. 3 天
- B. 5 天
- C. 1 周
- D. 2 周
- E. 3 周

【答案】 D

12. 骨折愈合的第三期是()。

- A. 血肿机化演进期

- C. 骨痂改造塑形期
- D. 膜内化骨吸收期
- E. 软骨化骨吸收期

【答案】C

13. 关于骨肉瘤的叙述正确的是()。

- A. 高度恶性的骨肿瘤
- B. 多发生在年轻人
- C. 起源于原始分化不良的细胞，即原始间充质细胞
- D. 多见于骨髓生长最活跃的部位，如股骨远端，胫骨、腓骨和肱骨近端
- E. 以上叙述都对

【答案】E

14. 一女性病人，28岁。妊娠后期出现进行性背痛，下肢乏力，食欲减退。查体见第7胸椎轻度后突，有叩痛，X线片示第6、7胸椎间隙变窄，椎旁软组织阴影膨隆，血沉60mm/h，最可能的诊断是()。

- A. 胸椎转移癌
- B. 胸椎结核
- C. 胸椎血管瘤
- D. 化脓性脊椎炎
- E. 胸椎间盘脱出

【答案】D

15. 关于胫腓骨骨折的描述不正确的是()。

- A. 胫骨上 $1/3$ 骨折可造成小腿下段的缺血坏死
- B. 胫腓骨中 $1/3$ 骨折有发生骨筋膜室综合征的可能
- C. 腓骨中段骨折可引起足下垂
- D. 胫骨中下 $1/3$ 骨折可发生延迟愈合或不愈合
- E. 腓骨颈骨折容易伤及腓总神经

【答案】C

16. 股骨颈内收型骨折是指 Pauwels 角?()

- A. 大于 50°
- B. 小于 50°
- C. 小于 40°
- D. 小于 30°
- E. 等于 30°

【答案】A

17. 50 岁女性，右肩痛，右上肢上举、外展受限 8 个月，无肩周红、肿、热等表现，疼痛可向颈、耳、前臂及手放射。最可能的诊断是()。

- A. 肩关节骨关节炎
- B. 肩周炎
- C. 肩关节结核
- D. 颈椎病

E. 类风湿性关节炎

18. 对慢性骨髓炎诊断依据的描述，错误的是()。

- A. 反复发作
- B. 患肢较健肢短缩
- C. 有长期不愈合的窦道
- D. 从窦道有死骨排出
- E. 患肢皮肤菲薄，色泽暗

【答案】B

19. 属于稳定骨折的是()。

- A. 粉碎骨折
- B. 嵌入骨折
- C. 斜形骨折
- D. 螺旋骨折
- E. 椎体 1/3 骨折

【答案】B

20. 16岁男性患者，洗浴时无意中触及右大腿下端内侧硬性突起，无疼痛，膝关节运动良。最可能的诊断是()。

- A. 软骨瘤
- B. 骨软骨瘤
- C. 骨巨细胞瘤
- D. 骨囊肿

E. 骨化性肌炎

【答案】B

升高而中心静脉压不变则提示()。

- A. 心功能不全
- B. 血容量过多
- C. 容量血管过度收缩
- D. 血容量不足
- E. 肾功能不全

【答案】C

22. 阿托品作为麻醉前用药的主要作用是()。

- A. 抑制呼吸道分泌
- B. 镇静
- C. 记忆丧失
- D. 降低基础代谢率
- E. 增加心率

【答案】A

23. 急性硬膜外血肿最常见于什么血管损伤?()

- A. 脑膜中动脉
- B. 脑膜中静脉
- C. 窦静脉
- D. 板障静脉

- E. 脑膜前动脉

【答案】A

24. 直肠癌手术保留距肛管多远不影响正常排便?()

- A. 5cm
- B. 7cm
- C. 2cm
- D. 10cm
- E. 12cm

【答案】A

25. 一般手术区皮肤的准备(备皮)，一般是提前几天?()

- A. 1天
- B. 2天
- C. 3天
- D. 4天
- E. 5天

【答案】A

26. 骨关节结核最常见的发生部位是()。

- A. 肌肉最不发达的腕关节
- B. 全身滑膜面积最大的膝关节
- C. 负重最大的踝关节
- D. 脊柱椎体
- E. 活动最多的髋关节

【答案】D

27. 骨折的早期并发症是()。

- A. 骨筋膜室综合征
- B. 脂肪栓塞

- C. 骨化性肌炎
- D. 创伤性关节炎
- E. 缺血性骨坏死

【答案】A

28. 骨软骨瘤的临床表现为()。

- A. 生长较快，伴明显疼痛
- B. 肿块明显，表面皮肤有静脉怒张
- C. X线可见骨膜反应
- D. 本身无症状，但可压迫周围组织，影响功能
- E. 肿物与周围界限不清

【答案】D

29. X线检查对骨折的意义主要是()。

- A. 了解受伤机制
- B. 明确诊断
- C. 判断骨折预后
- D. 了解伤情
- E. 了解骨质密度

【答案】D

30. 影响骨折愈合最重要的因素是()。

- A. 外伤所致的骨折类型
- B. 骨折部位的血液供应情况
- C. 病人的年龄

E. 全身营养状态

【答案】B

31. 为预防甲亢术后出现甲状腺危象，最关键的措施是()。

A. 术后用冬眠合剂镇静

B. 吸氧

C. 术后给予氢化可的松

D. 术后补钙

E. 术前使基础代谢率降至正常范围

【答案】E

32. 上消化道出血时对病因诊断最有帮助的检查方法是()。

A. 选择性腹腔动脉造影

B. 内窥镜检查

C. X线钡餐检查

D. 胃黏膜活检

E. 核素检查

【答案】B

33. 关于腹股沟直疝的叙述不正确的是()。

A. 疝囊从腹壁下动脉内侧腹股沟三角区突出

B. 多见于老年男性，常双侧

C. 透光试验不透光

D. 绝大多数为后天性

E. 容易嵌顿

34. 诊断溃疡病急性穿孔最有意义的是()。

- A. 溃疡病史
- B. 突起脐周剧痛，转移至右下腹
- C. 腹痛剧烈
- D. 膈下游离气体
- E. 腹部剧痛数小时后缓解，提示病情好转

【答案】D

35. 患者女，62岁，持续性右上腹胀痛6小时，伴寒战、高热，黄疸。既往有类似发作历史。查体：体温39.2℃，血压70/50mmHg，心率120次/分，神志淡漠，巩膜和皮肤黄染，右上腹肌紧张，压痛阳性。白细胞 $24 \times 10^9/L$ ，最大可能的诊断是()。

- A. 急性胃穿孔
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性胆囊炎
- D. 急性梗阻性化脓性胆管炎
- E. 以上都不是

【答案】D

36. Smith骨折桡侧骨远端移位畸形是()。

- A. 向尺侧及背侧移位
- B. 向桡侧及背侧移位
- C. 向尺侧及掌侧移位
- D. 向桡侧及掌侧移位

【答案】D

37. 臂丛神经的组成()。

- A. 由 C4~8 脊神经前支组成
- B. 由 C5~8 脊神经前支组成
- C. 由 C1~8 及 T1 脊神经的前支组成
- D. 主要由 C5~8 和 T1 脊神经的前支组成
- E. 主要由 C1~4 脊神经前支组成

【答案】D

38. 桡骨远端骨折，骨折线经关节面，远端骨折片向背侧移位，该骨折诊断为()。

- A. Colles 骨折
- B. Smith 骨折
- C. Barton 骨折
- D. Monteggia 骨折
- E. Galeazzi 骨折

【答案】C

39. 胫骨平台及腓骨上端骨折，出现足背伸外翻无力，小腿外侧感觉消失。提示哪个神经受损?()

- A. 胫神经
- B. 腓肠神经
- C. 股神经

E. 腓总神经

【答案】 E

40. 股骨颈骨折最常见的并发症是()。

- A. 损伤性骨化
- B. 股骨头缺血性坏死
- C. 腓动脉损伤
- D. 坐骨神经损伤
- E. 创伤性关节炎

【答案】 B

41. 扩张器最成熟的应用部位是()。

- A. 躯干和四肢
- B. 耳后
- C. 头皮部
- D. 额部
- E. 面颊

【答案】 C

42. 女孩,10岁,颈部三度烧伤,疤痕10cm×12cm,修复用()。

- A. 刃厚皮片
- B. 全厚或中厚皮片植皮
- C. 皮瓣移植
- D. 皮肤扩张法
- E. 以上都可以

43. 颈部瘢痕挛缩畸形松解术后，最重要的处理措施是()。

- A. 加强抗感染
- B. 卧床休息
- C. 局部应用抗瘢痕药物
- D. 戴颈托外固定保持伸直位
- E. 口服激素

【答案】D

44. 耳再造支架的材料首选()。

- A. 硅橡胶
- B. 高密度聚乙烯
- C. 膨体聚四氟乙烯
- D. 透明质酸
- E. 自体软骨

【答案】E

45. 淋巴水肿常见于()。

- A. 下肢
- B. 面部
- C. 颈部
- D. 生殖器
- E. 躯干

【答案】A

31. 属于骨折全身表现的是()。

- B. 肿胀
- C. 疼痛
- D. 畸形
- E. 瘀斑

【答案】A

32. 肩关节脱位的表现中不正确的是()。

- A. 肩部外伤史
- B. 方肩畸形
- C. 关节盂空虚
- D. Thomas 征(+)
- E. Dugas 征(+)

【答案】D

33. 骨折的治疗最正确原则是()。

- A. 复位、固定和功能锻炼
- B. 一般要求解剖复位
- C. 坚持固定与活动相结合
- D. 骨与软组织并重
- E. 局部与全身治疗兼顾

【答案】A

34. 下列骨折中, 最不稳定的是()。

- A. L2 椎体 1/4 压缩骨折
- B. 股骨干螺旋形骨折

C. 肱骨上端横形骨折

D. 胫骨上端横形骨折

E. 肩胛骨裂缝骨折

【答案】B

35. L4-5 椎间盘突出，最常受累的神经根是()。

A. L2

B. L3

C. L4

D. L5

E. S1

【答案】D

51. 关于胰腺癌的叙述不正确的是()。

A. 好发年龄在 20~30 岁之间

B. 多为胰头癌

C. 按组织类型，以导管细胞癌最多

D. 广泛浸润周围组织、器官，并较早经淋巴转移

E. 该病早期诊断困难，手术切除率低，预后差

【答案】A

52. 最常见的腹外疝是()。

A. 脐疝

B. 股疝

C. 切口疝

E. 腹股沟直疝

【答案】D

53. 怀疑肛管直肠肿瘤，最简单而重要的检查是()。

A. 直肠指诊

B. 乙状结肠镜检查

C. 直肠镜检查

D. X线气钡灌肠

E. B型超声检查

【答案】A

54. 治疗门静脉高压症食管静脉曲张出血，最有效的常用方法是()。

A. 应用止血药

B. 立即输血

C. 静脉点滴垂体后叶素

D. 用三腔两囊管压迫

E. 局部注射硬化剂

【答案】D

55. 患者男，70岁，腹股沟三角突出半球形包块，易还纳，未进入阴囊，不透光，主要考虑为()。

A. 鞘膜积液

B. 隐睾

C. 股疝

E. 直疝

【答案】E

56. 同种异体移植术前评估供、受者间相关的免疫学检查不包括()。

A. 供、受者血型是否相符

B. HLA 配型相容程度

C. 淋巴细胞毒交叉配合试验

D. 肝炎病毒、HIC 等相关指标

E. PRA 检测结果

【答案】D

57. 下列不是乳房再造来源组织的是()。

A. 腹部

B. 臀部

C. 背部

D. 股部

E. 上臂

【答案】E

58. 患者诊断为睑黄瘤，上睑内眦处约 $0.4\text{cm} \times 0.5\text{cm}$ 大小，首选治疗为()。

A. 无需处理

B. 直接缝合

C. 切除植皮

E. 以上都不是

【答案】 B

59. 手拇指外展功能丧失，提示()。

A. 正中神经损伤

B. 尺神经损伤

C. 桡神经损伤

D. 腋神经损伤

E. 肌皮神经损伤

【答案】 C

60. 阴道成型带模具的时间是()。

A. 3 个月

B. 1~2 年

C. 6 个月

D. 8 个月

E. 1 年

【答案】 C

