

2022 年整形外科主治医师考试真题

1. 鼻半侧缺损如已超过中线或鼻尖也已缺损时，则应考虑行()。资料来源文得学习网，更多医学类考试资料，上文得学习网查看。

- A. 鼻尖再造
- B. 半鼻再造
- C. 全鼻再造
- D. 局部皮瓣修复
- E. 鼻唇沟皮瓣修复

【答案】C

2. 一头皮撕脱伤的患者，头皮撕脱面积较大，颅骨外露，最佳治疗方案应为()。

- A. 游离皮瓣移植
- B. 皮管移植
- C. 扩张器法修复
- D. 游离皮片移植
- E. 颅骨外板钻孔换药，择期手术

【答案】E

3. 大隐静脉曲张合并小腿溃疡。首选治疗方式为()。

- A. 口服抗生素
- B. 局部换药，等溃疡愈合后再手术

- C. 大隐静脉高位结扎，曲张静脉剥出，溃疡切除植皮术
- D. 大隐静脉高位结扎，曲张静脉剥出
- E. 弹力绷带或弹力袜，抬高患肢，改善循环

【答案】C

资料来源文得学习网,更多医学类考试资料,上文得学习网查看。

4. 男, 7 个月。右侧小耳畸形, 左耳正常。下列哪种处理最为适宜?()

- A. 立即行耳再造
- B. 1 岁置入骨传导听力辅助装置
- C. 4 岁时植入硅橡胶耳支架
- D. 4 岁时行外耳道成形
- E. 6 岁时行自体肋软骨支架耳再造术, 打通中外耳道

【答案】E

5. 糖尿病病人, 足背皮肤破溃缺损, 首先检查的动脉是()。

- A. 股动脉
- B. 胫前动脉
- C. 足背动脉
- D. 胫后动脉
- E. 足底动脉

【答案】C

6. 呈现浸润性生长方式的毛细血管瘤的是()。

- A. 葡萄状毛细血管瘤

- B. 草莓状毛细血管瘤
- C. 肝毛细血管瘤
- D. 海绵状毛细血管瘤
- E. 蔓状血管瘤

【答案】C

7. 上睑下垂的治疗，错误的是()。
- A. 先天性上睑下垂以手术治疗为主
 - B. 先天性上睑下垂手术不宜过早
 - C. 提上睑肌肌力大于 5mm，可选择提上睑肌缩短术
 - D. 提上睑肌肌力小于 3mm，可选择额肌悬吊术
 - E. 后天性上睑下垂主要针对病因治疗

【答案】B

8. 招风耳手术描述正确的是()。
- A. 年幼的儿童局麻
 - B. 多在 4 岁以下进行
 - C. 成年人不可局麻
 - D. 将突出的耳朵贴近头颅
 - E. 切口在耳前

【答案】D

9. 下列头皮撕脱伤的伤情特点及处理，正确的是()。
- A. 常伴有颅骨骨折或脑损伤
 - B. 伤后 12 小时，头皮瓣完整行头皮瓣复位再植

- C. 伤后 12 小时，创面轻度污染行清创自体植皮
- D. 伤后 2 小时，头皮瓣完整，无明显污染行头皮，瓣复位再植
- E. 由于头皮完整撕脱，一般出血量不大

【答案】D

10. 头皮撕脱伤后，急诊处理最重要的是()。

- A. 保护撕脱的头皮组织
- B. 头部清创
- C. 补充血容量，防止低血容量性休克
- D. 抗感染
- E. 颅骨多处钻孔

【答案】C

11. 骨折血肿机化演进期大约需要()。

- A. 3 天
- B. 5 天
- C. 1 周
- D. 2 周
- E. 3 周

【答案】D

12. 骨折愈合的第三期是()。

- A. 血肿机化演进期
- B. 原始骨痂形成期
- C. 骨痂改造塑形期

E. 软骨化骨吸收期

【答案】C

13. 关于骨肉瘤的叙述正确的是()。

A. 高度恶性的骨肿瘤

B. 多发生在年轻人

C. 起源于原始分化不良的细胞，即原始间充质细胞

D. 多见于骨髓生长最活跃的部位，如股骨远端，胫骨、腓骨和肱骨近端

E. 以上叙述都对

【答案】E

14. 一女性病人，28岁。妊娠后期出现进行性背痛，下肢乏力，食欲减退。查体见第7胸椎轻度后突，有叩痛，X线片示第6、7胸椎间隙变窄，椎旁软组织阴影膨隆，血沉60mm/h，最可能的诊断是()。

A. 胸椎转移癌

B. 胸椎结核

C. 胸椎血管瘤

D. 化脓性脊椎炎

E. 胸椎间盘脱出

【答案】B

15. 关于胫腓骨骨折的描述不正确的是()。

- B. 胫腓骨中 $1/3$ 骨折有发生骨筋膜室综合征的可能
- C. 腓骨中段骨折可引起足下垂
- D. 胫骨中下 $1/3$ 骨折可发生延迟愈合或不愈合
- E. 腓骨颈骨折容易伤及腓总神经

【答案】C

16. 关于股疝的叙述不正确的是()。
- A. 腹腔内脏经股环、股管，从卵圆窝突出
 - B. 多见于中年以上的妇女
 - C. 透光试验不透光
 - D. 易发生嵌顿和绞窄
 - E. 发生嵌顿则应不宜紧急手术

【答案】E

17. 关于加用碘剂对甲状腺大部切除术患者手术前用药的叙述不正确的是()。

- A. 碘剂的作用是减少术中出血，便于手术操作
- B. 常用制剂为复方碘溶液(卢戈液)
- C. 每日 3 次，每次 3~5 滴，以后逐日每次增加 1 滴，至每次 15 滴
- D. 一般约 4 周(不宜超过 8 周)
- E. 凡不准备施行手术治疗的患者，一律不要服用碘剂

【答案】D

18. 关于胰腺炎诊断中血、尿淀粉酶检测的叙述正确的是()。

到高峰，7 天内恢复正常

- B. 尿淀粉酶升高稍迟但持续时间比血淀粉酶长
- C. 淀粉酶值的高低与病情的轻重不一定成正比
- D. 严重的坏死性胰腺炎，血、尿淀粉酶值反而不升高
- E. 以上叙述都对

【答案】E

19. 内痔的早期临床表现为()。

- A. 黏液血便
- B. 便后脱垂
- C. 无痛性、间歇性便后出血
- D. 肛门疼痛
- E. 肛门抓痒

【答案】C

20. 女，27 岁，已婚，急性腹膜炎后 7 天，体温升至 38.9℃，自觉全身不适，食欲差，大便次数增多并有里急后重感，今天出现膀胱刺激征，最简便的检查手段是()。

- A. 腹部 B 超检查
- B. 肛门镜检查
- C. 腹腔穿刺
- D. 后穹隆穿刺

- E. 直肠前壁穿刺

【答案】D

升高而中心静脉压不变则提示()。

- A. 心功能不全
- B. 血容量过多
- C. 容量血管过度收缩
- D. 血容量不足
- E. 肾功能不全

【答案】C

22. 阿托品作为麻醉前用药的主要作用是()。

- A. 抑制呼吸道分泌
- B. 镇静
- C. 记忆丧失
- D. 降低基础代谢率
- E. 增加心率

【答案】A

23. 急性硬膜外血肿最常见于什么血管损伤?()

- A. 脑膜中动脉
- B. 脑膜中静脉
- C. 窦静脉
- D. 板障静脉

- E. 脑膜前动脉

【答案】A

24. 直肠癌手术保留距肛管多远不影响正常排便?()

- B. 7cm
- C. 2cm
- D. 10cm
- E. 12cm

【答案】 A

25. 一般手术区皮肤的准备(备皮)，一般是提前几天?()

- A. 1 天
- B. 2 天
- C. 3 天
- D. 4 天
- E. 5 天

【答案】 A

26. 最能够反映血浆渗透压的临床指标是()。

- A. 口渴
- B. 尿少
- C. 尿比重增高
- D. 皮肤弹性差
- E. 以上都不是

【答案】 A

27. 心跳呼吸骤停的诊断最准确的是()。

- A. 神志突然丧失

C. 颈动脉搏动消失

D. 瞳孔散大

E. 以上都对

【答案】C

28. 不能引起全身化脓性感染的细菌是()。

A. 金黄色葡萄球菌

B. 溶血性链球菌

C. 破伤风梭菌

D. 大肠杆菌

E. 类杆菌

【答案】C

29. 休克的根本病因是()。

A. 血压下降

B. 中心静脉压下降

C. 心排出量下降

D. 有效循环血量下降

E. 微循环障碍

【答案】D

30. 丹毒是指()。

A. 多个毛囊同时感染

B. 皮肤管状淋巴管的急性炎症

C. 扩散到皮下组织的毛囊感染

E. 有全身症状的毛囊及其所属皮脂腺的感染

【答案】D

31. 关于胸外按压，下列叙述正确的是()。

A. 抢救者双手掌根部相叠，两臂伸直

B. 按压病人胸骨中、下 $1/3$ 交界处

C. 使胸骨下陷 5~6cm

D. 按压频率为 100~120 次/分

E. 以上都正确

【答案】E

32. 关于疖的叙述下列哪一项不正确?()

A. 是邻近多个毛囊及所属皮脂腺、汗腺的急性化脓性感染

B. 可由单个疖扩展或多个疖融合而成

C. 金葡菌为主要致病菌

D. 好发于上下嘴唇等质地柔软部位

E. 在糖尿病等免疫力低下的成年病人中较为多见

【答案】D

33. 被动免疫预防破伤风杆菌感染的叙述不正确的是()。

A. 伤后 24 小时内可注射

B. 注药前必须常规做过敏试验

C. 作用快，而且持久

D. 适用于小、深、脏的创口，严重的开放伤

E. 过敏后立即深部肌肉注射肾上腺素抢救

34. 关于清创缝合错误的是()。

- A. 清除伤口污物和异物，切除失去活力的组织
- B. 清创术最好在伤后 6~8 小时以内实施
- C. 面部头颈部的伤口超过 14 小时，清创后应尽可能缝合
- D. 关节、大血管或神经暴露的伤口清创后不缝合
- E. 污染严重的伤口，清创后不缝合

【答案】D

35. 术后常见的并发症及症状是()。

- A. 发热
- B. 出血
- C. 切口感染和裂开
- D. 肺部感染
- E. 以上都对

【答案】E

36. 腹股沟深环的体表投影位于()。

- A. 腹股沟中点上方 1cm

- B. 腹股沟中点上方 2cm

- C. 腹股沟中点

- D. 腹股沟中点下方 1cm

- E. 腹股沟中点下方 2cm

【答案】B

37. 溃疡病行胃大部切除的绝对手术适应症是()。

- A. 第一次出血
- B. 第一次出血
- C. 瘢痕性幽门梗阻
- D. 医源性溃疡
- E. 反复门诊治疗无效的溃疡

【答案】C

38. 腹膜刺激征的临床表现是()。

- A. 压痛、反跳痛、肌紧张
- B. 压痛、反跳痛
- C. 反跳痛、肌紧张
- D. 压痛、反跳痛、墨菲征
- E. 压痛、肌紧张、移动浊音阳性

【答案】A

39. 急性梗阻性化脓性胆管炎的典型临床表现是()。

- A. 右上腹阵发性绞痛
- B. 胆囊肿大压痛

- C. 墨菲征阳性
- D. 雷诺五联征阳性
- E. 夏柯三联症阳性

【答案】D

40. 腹部闭合性损伤并发腹内脏器损伤时的表现, 不包括()。

- A. 早期出现休克征象

C. 有明显的腹膜刺激症状

D. 有昏迷-清醒-再昏迷

E. 有移动性浊音

【答案】D

41. 扩张器最成熟的应用部位是()。

A. 躯干和四肢

B. 耳后

C. 头皮部

D. 额部

E. 面颊

【答案】C

42. 女孩,10岁,颈部三度烧伤,疤痕 $10\text{cm} \times 12\text{cm}$,修复用()。

A. 刃厚皮片

B. 全厚或中厚皮片植皮

C. 皮瓣移植

D. 皮肤扩张法

E. 以上都可以

【答案】B

资料来源文得学习网,更多医学类考试资料,上文得学习网查看。

43. 颈部瘢痕挛缩畸形松解术后,最重要的处理措施是()。

A. 加强抗感染

B. 卧床休息

D. 戴颈托外固定保持伸直位

E. 口服激素

【答案】D

44. 耳再造支架的材料首选()。

A. 硅橡胶

B. 高密度聚乙烯

C. 膨体聚四氟乙烯

D. 透明质酸

E. 自体软骨

【答案】E

45. 淋巴水肿常见于()。

A. 下肢

B. 面部

C. 颈部

D. 生殖器

E. 躯干

【答案】A

31. 头皮共分几层?()。

A. 1层

B. 2层

C. 3层

D. 4层

【答案】 E

32. 常规皮瓣的安全断蒂最短时限为()。

A. 1 周

B. 2 周

C. 3 周

D. 4 周

E. 5 周

【答案】 C

33. 人 MHC 抗原包括()。

A. HLA

B. ABO、HLA

C. ABO

D. CEA

E. ABO、CEA

【答案】 A

34. 超急性免疫反应是()。

A. 体液性免疫反应

B. 细胞性免疫反应

C. 细胞免疫+体液免疫

D. 固有免疫反应

E. 以上都不是

【答案】 A

50. 患者男，18岁，双侧上睑平度下垂，肌力8mm，欲采用上睑提肌缩短术上提3mm，估计术中需要缩短上睑提肌的长度是()。

- A. 8mm
- B. 12mm
- C. 18mm
- D. 20mm
- E. 24mm

【答案】B

51. 男，57岁，因上睑瘢痕切除造成上睑全层缺损，左上睑缺损 $0.6 \times 0.4\text{cm}$ ，用下列哪种手术方法修复?()

- A. 睑缘直接拉拢缝合
- B. 用下睑全层复合组织滑移转修复

- C. 用耳郭复合组织游离移植修复
- D. 单纯用局部皮瓣修复
- E. 鼻中隔黏膜膜软骨复合组织游离移植加皮肤游离移植术

【答案】A

52. 下列关于面瘫的叙述错误的是()。

- A. 中枢性面瘫发生部位在面神经核以上
- B. 周围性面瘫又称为核下面瘫
- C. 可伴有舌前 $2/3$ 味觉丧失
- D. 可能伴有泪腺功能障碍

【答案】E

53. 游离皮片移植适用于()。

- A. 严重感染创面
- B. 有骨、肌腱、神经暴露的创面
- C. 放射治疗后的创面
- D. 陈旧性肉芽创面
- E. 手背瘢痕切除后创面

【答案】E

54. 拇指离断，血耐受最差的是()。

- A. 肌肉
- B. 神经
- C. 骨骼

D. 韧带

E. 皮肤

【答案】B

55. 神经纤维瘤好发部位是()。

- A. 皮肤
- B. 神经
- C. 骨骼
- D. 脂肪
- E. 眼部

【答案】A

- A. 局麻下闭合复位，不需固定，立即开始肩关节功能锻炼
- B. 局麻下闭合复位，三角巾悬吊固定 3 周，固定期间活动患手及腕关节
- C. 臂丛麻醉下闭合复位，石膏外固定 3 周，固定期间活动患手及腕关节
- D. 全麻下切开复位，修复关节囊，术后立即开始肩关节功能锻炼
- E. 臂丛麻醉下切开复位，修复关节囊，术后三角巾外固定 3 周

【答案】B

57. 儿童化脓性骨髓炎的脓肿不易进入关节腔的原因是()。

A. 儿童的关节对化脓性炎症的抵抗力强

B. 关节囊对关节腔具有保护作用

C. 脓脓肿容易局限和吸收

D. 脓肿容易向软组织溃破

E. 干骺端的骺板起屏障作用

【答案】E

58. 骨关节结核病人需要手术病灶清除时，应()。

A. 立即手术

B. 术前至少抗结核治疗 2~4 周

C. 术前 5 天开始抗结核治疗

D. 先做手术，然后立即开始抗结核治疗

E. 死骨形成后再手术

59. 成人椎体结核和椎体肿瘤在 X 线上的主要鉴别点是()。

- A. 椎体破坏的程度
- B. 椎体破坏的数目
- C. 椎旁软组织阴影的状态
- D. 椎间隙是否变狭窄或消失
- E. 椎体骨质疏松的程度

【答案】D

60. 患儿，10 岁。胫骨中上段慢性骨髓炎，一般情况好，体温不高，局部有流脓窦道，X 线片有 4cm 长整段死骨，周围有不连续包壳。当前的主要治疗是()。

- A. 手术摘除死骨，肌瓣填塞消灭无效腔
- B. 手术摘除死骨，填入庆大霉素链，三周后取出，松质骨植入
- C. 手术摘除死骨，植入细塑料管，每日经管滴入抗生素
- D. 患肢长腿石膏管型固定，开窗换药
- E. 局部换药，保持引流通畅

【答案】D

