

2022 年妇产科主治医师试题及答案组卷

1、[题干]关于女性性激素的合成与分泌，正确的是()。

- A. 孕烯醇酮激素是雌激素和雄激素的前体物质
- B. 雌酮是雌二醇的前身
- C. 雄激素主要来源于卵巢间质
- D. 排卵后黄体只分泌孕激素。E, 排卵前卵泡内膜细胞分泌雌激素和少量孕激素

【答案】A

【解析】雄烯二酮是雌二醇和雌酮的前体物质，而雌酮和雌二醇可相互转化；女性的雄激素主要来自肾上腺；排卵后黄体能同时分泌雌激素和孕激素；排卵前卵泡内膜细胞除分泌雌激素外，还分泌少量雄激素，不分泌孕激素，但成熟卵泡的颗粒细胞在 LH 峰的作用下开始分泌少量孕酮。

2、[单选]妊娠合并早期心力衰竭见于()。

- A. 孕 34 周心悸，气短，自幼即发绀，从未能参加体力劳动，能平卧，肺无啰音
- B. 孕 34 周气急，发绀，不能平卧，肺底部持续湿啰音，颈静脉充盈
- C. 孕 34 周心悸，气促，心界稍扩大，心尖区可闻及 II 级柔和收缩期杂音

音。E, 孕 34 周, 轻微活动即有胸闷, 气急, 静息心率 114 次/分, 呼吸 22 次/分

【答案】E

【解析】轻微活动即有胸闷, 气急, 静息心率 114 次/分, 呼吸 22 次/分为妊娠期早期心力衰竭表现。

3、[题干]功能失调性子宫出血行激素止血要求明显见效, 止血的时间分别为

- A. 8 小时、24~48 小时
- B. 6 小时、72 小时
- C. 12 小时、48~96 小时
- D. 12 小时、72 小时。E, 24 小时、48~96 小时

【答案】A

【解析】对大量出血者, 要求性激素治疗 8 小时内减小, 24~48 小时内出血基本停止。

4、[A1/A2 型题]关于子宫未发育或发育异常, 错误的是()。

- A. 两侧副中肾管完全未融合
- B. 两侧副中肾管中段和尾段未发生融合
- C. 尿生殖窦上皮未能贯穿前庭
- D. 两侧副中肾管会合后不久即停止发育。E, 一侧副中肾管发育正常, 另一侧发育不全

【答案】C

疗6个月”就诊。平素月经周期不规则，2~6月，闭经6个月，用黄体酮后才“来潮”。既往未患任何疾病，家族中无不孕病史，母亲有高血压史5年。体检：身高156cm，体重65kg，呈腹部肥胖体征(腰围/臀围>0.85)，面部少量痤疮。右乳晕周围有两根长而黑的毛发，下腹正中、腋窝、四肢、外阴部毛发浓密。妇科检查，子宫略小，余未见异常。该患者最可能的诊断是()。

- A. PCOS
- B. 下丘脑闭经
- C. 垂体闭经
- D. Turner综合征。E. 肾上腺皮质增生症

【答案】A

6、[题干]26岁已婚妇女，停经75日，阴道中等量流血5日伴发热。昨日阴道排出一块肉样组织，今晨突然大量阴道流血。查血压80/60mmHg，体温38.4°C，脉搏118次/分。妇检子宫妊娠2个月大小，有压痛，宫口通过一指松，阴道分泌物明显臭味。血白细胞计数为 $18 \times 10^9/L$ 。自然流产最常见的原因可能是

- A. 免疫因素
- B. 孕妇甲状腺功能低下
- C. 孕妇接触放射性物质
- D. 母儿血型不合。E. 胚胎因素

【答案】E

7、[题干]经孕妇，25岁，G2P0，孕24周时，B超显示胎盘位于子宫前壁下段，部分覆盖宫颈内口，产科检查正常。根据B超及结合临床检查此时哪种考虑最合适

- A. 目前不做前置胎盘诊断
- B. 部分性前置胎盘
- C. 中央性前置胎盘
- D. 边缘性前置胎盘。E, 正常胎盘位置

【答案】A

【解析】孕28周后若胎盘附着在子宫下段，甚至胎盘下缘达到或覆盖宫颈内口处，胎盘位置低于胎儿先露部称前置胎盘。妊娠中期B型超声检查发现胎盘前置者，不宜诊断为前置胎盘，而应称为胎盘前置状态。

8、[题干]女性，15岁，14岁初潮。近1年来月经周期20~40天1次，经期2~5天，经量不多，BBT单相，此例患者的最佳处理方案是()。

- A. 给予止血药物治疗
- B. 月经期子宫内膜活检
- C. 暂观察，不必给予特殊处理
- D. 给予促排卵药物治疗。E, 给予雌-孕激素序贯治疗

【答案】C

未成熟，大脑中枢对雌激素的正反馈作用存在缺陷，FSH 持续高水平，无促排卵性 LH 高峰形成，导致卵巢不能排卵，故对该患者先予观察。

9、[题干]属于卵巢甾体激素的项目，错误的是

- A. 为类固醇激素
- B. 雌激素、孕激素、雄激素、糖皮质激素均属甾体激素
- C. 雌激素是由 18 个碳原子组成
- D. 孕烯醇酮是合成所有甾体激素的前体物质。E, 肝脏降解，经肾脏排泄

【答案】B

【解析】题目中问的是卵巢的甾体激素，糖皮质激素不属于卵巢的甾体激素。糖皮质激素(glucocorticoid)是由肾上腺皮质中束状带分泌的一类甾体激素，主要为皮质醇(cortisol)，具有调节糖、脂肪、和蛋白质的生物合成和代谢的作用，还具有抑制免疫应答、抗炎、抗毒、抗休克作用。称其为“糖皮质激素”是因为其调节糖类代谢的活性最早为人们所认识。该激素分泌受 ATCH 调节。

10、[题干]初产妇，26 岁，妊娠 38 周，日常体力劳动时自觉疲劳，心悸、气短。检查：血压 120/80mmHg，脉搏 90 次/分，呼吸 18 次/分。叩诊心浊音界稍向左扩大，心尖部闻及 II 级柔和吹风样收缩期杂音，右肺部听及湿啰音，咳嗽后消失，踝部轻度水肿。本例最可能的诊断是()。

- A. 正常妊娠改变
- B. 风湿性心脏病合并妊娠

D. 妊娠期高血压心脏病。E, 围生期心肌病

【答案】A

【解析】正常妊娠的妇女可以出现一些心悸、气短、踝部水肿、乏力、心动过速，心脏检查可以有轻度扩大、心脏杂音等，均属妊娠期的生理性变化。

11、[题干]不属于异位妊娠的项目为

- A. 宫颈妊娠
- B. 输卵管妊娠
- C. 卵巢妊娠
- D. 腹腔妊娠。E, 子宫残角妊娠

【答案】E

【解析】异位妊娠包括输卵管妊娠、宫颈妊娠、卵巢妊娠、腹腔妊娠。其中以输卵管妊娠最为常见，占 95%~98%。故选 E

12、[题干]以下不属于规范行医范畴的是()。

- A. 因病施治，合理医疗
- B. 不隐瞒、误导或夸大病情
- C. 使用适宜诊疗技术和药物
- D. 大处方、大检查、过度医疗。E, 严格遵循临床诊疗和技术规范

【答案】D

首选的降压药是

- A. 降压灵
- B. 利血平
- C. 复方降压片

- D. 甲基多巴。E, 肼苯哒嗪

【答案】E

14、[题干]女性，40岁，自觉外阴痒3年，曾查一次白带常规念珠菌阳性，一直按念珠菌性阴道病治疗，效果差。检查发现双小阴唇萎缩，阴道口缩小，会阴肛周色素减退，阴道分泌物较少，最可能的诊断是()。

- A. 难治性念珠菌性阴道病
- B. 非特异性外阴炎
- C. 外阴慢性单纯性苔藓
- D. 外阴神经性皮炎。E, 外阴硬化性苔藓

【答案】E

15、[题干]患者女，18岁。2小时前突然左下腹剧烈疼痛。恶心、呕吐2次，体温37.4℃。肛查：子宫左侧可及9cm×7cm大小的包块，活动度欠佳、触痛明显。最可能的诊断是()。

- A. 盆腔炎症性包块
- B. 输卵管结核
- C. 子宫内膜异位囊肿破裂

【答案】E

16、[题干]决定分娩的四因素不包括

- A. 产道
- B. 胎儿
- C. 精神心理因素
- D. 医疗环境。E, 产力

【答案】D

【解析】决定分娩的四因素为产力、产道、胎儿、精神心理因素。

17、[题干]属于难免流产的项目，错误的是

- A. 宫口扩张
- B. 部分可能继续妊娠
- C. 子宫大小可与停经周数相符
- D. 一旦确诊应尽早使胚胎及胎盘组织排出。E, 由先兆流产发展而来

【答案】B

【解析】难免流产指流产不可避免。在先兆流产的基础上，阴道流血量增多，阵发性下腹痛加剧，或出现阴道流液(胎膜破裂)。妇科检查宫颈口已扩张，有时可见胚胎组织或胎囊堵塞于宫颈内口，子宫大小与停经周数基本相符或略小。

18、[题干]临产后触诊，检查先露部下降程度、应以哪项作为标记

- A. 坐骨结节
- B. 骶尾关节
- C. 骶岬
- D. 耻骨联合下缘。E, 坐骨棘

【答案】E

19、[题干]硫酸镁中毒首先表现为

- A. 膝反射消息
- B. 肱二头肌反射消失
- C. 肱三头肌反射消失
- D. 跟腱反射消失。E, 角膜反射消失

【答案】A

【解析】 硫酸镁中毒首先表现为膝反射消失。

20、[题干]关于功血的病理生理，以下哪项不正确()。

- A. 青春期无排卵功血，FSH 呈持续低水平，无 LH 高峰形成
- B. 围绝经期(更年期)无排卵功血，FSH 和 LH 同样升高
- C. 雌激素突 破性出血是因为雌激素水平过高而无孕激素对抗
- D. 雌激素撤退性出血与外源性雌激素撤药后引起的出血类似。E, 青春期功血与更年期功血的发病机制类似

【答案】E

21、[题干]影响宫颈柱状上皮向外移位的激素为

- A. 孕激素
- B. 雄激素
- C. 肾上腺皮质激素
- D. 甲状腺激素。E, 雌激素

【答案】E

【解析】宫颈柱状上皮异位是宫颈糜烂的同义词，宫颈糜烂发生机制主要是因为卵巢分泌的雌激素作用于宫颈使鳞、柱交界异位。柱状上皮细胞，就像立柱一样，立在宫颈表面显的发红。因为受雌激素的影响，颈管的柱状上皮增生，从宫颈口向外移覆盖了鳞状上皮，使该部位的组织呈细颗粒状的红色区。

22、[题干]属于长效口服避孕药特点的项目，错误的是

- A. 长效雌激素储存于脂肪组织内缓慢释放
- B. 服药 1 次可以避孕 1 个月
- C. 停用长效避孕药时，不需服用短效避孕药过渡
- D. 副反应及临床表现与短效口服避孕药类似。E, 避孕效果与用药方法有关

【答案】B

【解析】长效避孕药不可突然停药，必须改服短效避孕药三个月后再停药，使体内激素水平缓慢下降，避免大出血。

- A. 类早孕反应系孕激素刺激胃黏膜所致
- B. 服药期间出现阴道流血，多发生在漏服药物之后
- C. 能使经血量多，不适用于经量多的妇女
- D. 白带增多系孕激素作用的结果。E. 体重减轻系因进食少、恶心所致

【答案】B

【解析】不良反应及处理 1. 类早孕反应 服药初期出现食欲不振、恶心、呕吐、乏力，头晕等类似妊娠早期的反应，不需特殊处理，服药数周期后副反应自然消失。症状严重考虑更换制剂或停药改用其他措施。2. 阴道不规则流血 多数发生在漏服避孕药后，少数未漏服避孕药也能发生。轻者点滴出血，不需处理，服药时间延长逐渐减少停止。流血偏多每晚加服雌激素直至停药。流血似月经量或流血时间已近月经期，停止服药作为一次月经来潮。于出血第5日再开始服下一周期的药，或更换避孕药。3. 闭经 常发生于月经不规则妇女。停药后月经不来潮，需除外妊娠，停药7日后可继续服药，若连续停经3个月，需停药观察。4. 体重增加 雌激素使体内水钠储留引起。5. 皮肤问题面部出现淡褐色色素沉着，停药后多能恢复。第三代口服避孕药能改善原有的皮肤痤疮。个别妇女服药后出现头痛、复视、乳房胀痛等，对症处理，必要时停药作进一步检查。

24、[题干]宫颈扩张活跃期是指

- A. 宫口扩张3cm到宫口开全
- B. 宫口扩张4cm到宫口开全

D. 宫口扩张 2cm 到宫口开全。E, 宫口扩张 4cm 到宫口近开全

【答案】A

25、[题干]对预防 FGR 的措施，哪项不正确

- A. 加强宣教，避免接触有毒物质
- B. 禁烟酒
- C. 孕 16 周行 B 超检查
- D. 阿司匹林预防，150mg，1/日。E, 建立健全三级围生期保健网

【答案】D

【解析】D 错，应该是小剂量阿司匹林，50mg，1/日，孕 28-30 周开始，持续 6-8 周。

26、[题干]临床检查宫颈黏液的意义，下列哪项是不恰当的()。

- A. 有助于预测排卵期
- B. 有助于诊断妊娠
- C. 有助于诊断功能失调性子宫出血
- D. 有助于诊断闭经原因。E, 有助于了解子宫内膜状态

【答案】E

【解析】宫颈黏液的拉丝长度和结晶类型可帮助了解卵巢功能、是否排卵和诊断妊娠及月经失调。

27、[题干]妊娠早期卵巢变化的特征是

A. 妊娠黄体功能在孕 10 周后由胎盘取代

- B. 卵巢滤泡囊肿维持
- C. 双侧卵巢黄体囊肿存在
- D. 妊娠期卵巢可以有排卵和新的卵泡发育。E, 卵巢不断增大，黄体持续发育

【答案】A

【解析】妊娠期略增大，停止排卵。一侧卵巢可见妊娠黄体。妊娠黄体于妊娠 10 周前产生雌激素及孕激素，以维持妊娠的继续。黄体功能于妊娠 10 周后由胎盘取代，黄体开始萎缩。

28、[题干]以下可能引起产褥病的原因不包括

- A. 产褥感染
- B. 顺产
- C. 上呼吸道感染
- D. 泌尿系感染。E, 血栓性静脉炎

【答案】B

【解析】产褥病常由产褥感染引起，也可由生殖以外的感染引起，如急性乳腺炎、上呼吸道感染、泌尿系统感染、血栓性静脉炎等。

29、[题干]关于晚期流产，下列哪项是正确的()。

- A. 常见于宫颈内口松弛
- B. 胚胎多数先死亡，随后发生底蜕膜出血
- C. 晚期流产易发生感染

常有关

【答案】A

30、[题干]下列症状不属于中暑先兆的是()。

- A. 多汗
- B. 口渴
- C. 多尿
- D. 心悸。E, 恶心

【答案】C

【解析】多尿不属于中暑先兆

31、[题干]经产妇，28岁，人工流产术后8个月，术后不断有阴道流血，量不多。阴茎套避孕。现尿妊娠试验阳性，胸部X线摄片见两肺中下叶散在浅淡半透明圆形阴影及棉花团影。本例最可能的诊断为

- A. 葡萄胎
- B. 侵蚀性葡萄胎
- C. 绒毛膜癌
- D. 吸宫不全。E, 先兆流产

【答案】C

【解析】侵蚀性葡萄胎是指葡萄胎侵入子宫肌层引起组织破坏，或转移至子宫以外部位，具有恶性肿瘤行为，多发生于葡萄胎术后6个月内；而1年以上者多为绒癌；半年至一年者，侵蚀性葡萄胎和绒癌均有可能。转移妊娠滋养细胞肿瘤多为绒癌。【该题针对“滋养细胞疾

32、[A1/A2型题]相传张仲景在50岁左右的时候，曾担任过湖南长沙的太守。在这个时期内，他始终没有忘记自己是一个医生，仍然积极地为百姓诊治疾病。按照当时封建制度的规定，太守是不允许进入民间屋舍的，更不能私下随便给病人看病。为了能及时抢救病人，他想出了个主意，每逢初一和十五两天，便大开衙门，不问政事，让有

病的群众进来，他坐在公堂上给病人治病。时间长了，形成了惯例，每逢初一、十五的日子，各方病人都聚集在衙门前候诊，始被人称为“坐堂大夫”。以后中药铺皆以“堂”为名，原因据说就在这里。张仲景去世后，长沙百姓在迎盘街修建了张公四祠，以表达人们对他的爱戴和怀念。这个案例反映的医德思想是()。

- A. 为民请命
- B. 不畏权贵
- C. 精益求精
- D. 忠于医业。E, 勇于创新

【答案】D

33、[题干]常规对女性不孕症进行卵巢功能检查不必要项目为

- A. 阴道细胞学检查
- B. 宫颈黏液涂片检查
- C. 基础体温测定
- D. 经前刮宫病理学检查。E, 腹腔镜检查

【答案】E

抹阴道上段及宫颈阴道部的阴道上皮脱落细胞也可能推测卵巢排卵功能，角化细胞随雌激素轻、中、重度影响分别占 20%、20%~60% 及 60% 以上。3) 宫颈黏液 4) 子宫内膜组织学检查 5) 女性激素检查

34、[题干] 属于晚期产后出血的项目，正确的是

- A. 分娩后 2 小时内发生的子宫出血
- B. 分娩后 2~24 小时发生的子宫出血
- C. 产后 24 小时至产后 1 周发生的子宫出血
- D. 分娩 24 小时以后，在产褥期内发生的子宫大量出血。E, 分娩 2 小时以后，在产褥期内发生的子宫大量出血

【答案】D

35、[题干] 28 岁经产妇，足月产后第 2 天，患者诉阵发性下腹痛，阴道流血量不多，无恶心、呕吐，无腹泻及便秘，检查宫底脐下 2 指，无压痛，腹部不胀。可能的诊断为

- A. 急性腹膜炎
- B. 肠梗阻
- C. 产后宫缩痛
- D. 肠痉挛。E, 盆腔炎

【答案】C

【解析】产褥早期因宫缩引起的下腹阵发性疼痛称为产后宫缩痛，哺乳时反射性催产素分泌增多使疼痛加重。产后宫缩痛多于产后1~2天出现，2~3天自然缓解，多见于经产妇。

36、[题干]判断近亲结婚对遗传性疾病的影响程度，正确的是

- A. 表兄妹为三级亲属
- B. 兄妹的亲缘系数为 $1/4$
- C. 表兄妹为四代旁系血缘
- D. 父子的亲缘系数为1。E, 表兄妹的为五级亲属

【答案】A

【解析】表兄妹亲缘系数为三级亲属。

37、[题干]衣原体感染生殖道的临床特征，哪项错误

- A. 常向深层侵犯
- B. 感染与不孕有关
- C. 孕妇感染可引起流产，胎膜早破
- D. 新生儿经阴道分娩，可引起沙眼衣原体眼结膜炎、肺炎。E, 可应用酶免法检测衣原体抗原

【答案】A

【解析】1. 孕妇沙眼衣原体感染者可出现胎膜早破、早产、低体重儿等。2. 新生儿主要通过沙眼衣原体感染的产道而被感染。最常侵犯眼结膜，并可扩展到鼻咽部，主要表现为眼结膜炎与肺炎。

38、[题干]人工流产综合反应的发生原因主要为

- A. 长时间仰卧截石位
- B. 精神过度紧张
- C. 迷走神经虚脱
- D. 疼痛刺激。E, 吸宫时负压过大

【答案】C

【解析】人工流产综合征反应发生的主要原因是术中对宫颈和子宫的刺激引起迷走神经反射所致，导致心动过缓、血压下降、面色苍白、出冷汗、昏厥等。

39、[题干]不出现周期性变化且不受性激素影响的项目为

- A. 宫颈黏液
- B. 子宫内膜
- C. 输卵管黏膜
- D. 阴道上皮细胞。E, 卵巢生发上皮

【答案】E

【解析】

体温 37.5°C。肛查：宫颈触及活动良好、触痛明显、于掌大肝物。

本例最可能的诊断是()。

- A. 盆腔炎性包块
- B. 输卵管结核
- C. 卵巢子宫内膜异位囊肿破裂
- D. 子宫浆膜下肌瘤扭转。E, 卵巢肿瘤蒂扭转

【答案】E

【解析】卵巢肿瘤的并发症包括蒂扭转，它是常见的妇科急腹症。多发生于中等大、瘤蒂长、活动度大的囊肿。其典型症状为一侧下腹剧痛，常伴恶心、呕吐。妇科检查肿块张力较大，有压痛。

41、[题干]胎膜早破对母儿的影响不包括

- A. 宫内感染几率
- B. 影响产程进展
- C. 增加产褥感染
- D. 容易发生脐带脱垂。E, 诱发早产

【答案】B

【解析】胎膜早破一般不影响产程进展。其他的选项都很明显会影响。

42、[问题]活跃期停滞

- A. 初产妇宫口开全 2 小时尚未分娩

- C. 8 小时前宫口扩张 3cm，现宫口尚未开全
- D. 宫口开全已 1 小时，胎头下降无进展。E, 从规律宫缩开始，经 16 小时宫口扩张至 2cm

【答案】B

【解析】活跃期停滞：进入活跃期后，宫口不再扩张达 2 小时以上，称活跃期停滞。

43、[题干]放置宫内节育器应注意事项不包括

- A. 术后休息 3 日
- B. 术后 2 周禁性交及盆浴
- C. 术后月经来潮注意节育器有无脱落
- D. 术后未见尾丝应行超声检查。E, 带铜节育器可放置 5 年

【答案】E

【解析】E 选项是说法不严谨，时间表述也不正确带铜 T 形宫内节育器 (TCu-IUD)：是目前临床常用的宫内节育器，一般为 5~7 年。含铜套 IUD 放置时间可达 10~15 年。带铜 V 型宫内节育器 (VCu-IUD)，一般放置年限 5~7 年；母体乐 (MLCu375)，可放置 5~8 年；宫铜 IUD 可放置 5~8 年；含铜无支架 IUD 可放置 5~8 年。

44、[题干]宫颈黏液呈典型羊齿状结晶. 对正常月经周期的妇女，在多少天时出现

- A. 第 18~20 天

C. 第 13~14 天

D. 第 6~7 天。E, 第 8~9 天

【答案】C

45、[题干]下列诊断输卵管妊娠的辅助检查方法中，最少用的是

A. 腹腔镜检查

B. 血 β -HCG

C. 阴道后穹隆穿刺

D. 宫腔镜检查。E, B 超检查

【答案】D

46、[题干]子宫内膜结核最可靠的诊断方法为

A. 子宫输卵管碘油造影

B. 腹腔镜检查

C. 阴道镜检查

D. 子宫内膜病理检查。E, 盆腔 x 线摄片

【答案】D

【解析】子宫内膜病理检查：于经前一周或月经来潮 12 小时内作刮宫术。注意刮取子宫两角部内膜送病检，如找到典型结核结节即可确诊。未找到结核结节却不能除外。

47、[题干]人工流产术后 12 日仍有较多量阴道流血，应首先考虑的是()。

- B. 子宫复旧不良
- C. 吸宫不全
- D. 子宫内膜炎。E, 子宫绒毛膜癌

【答案】C

【解析】吸宫不全是人工流产常见的并发症，临床表现为手术后流产时间长。

48、[题干]侵蚀性葡萄胎最好的治疗方法是()。

D. 尿频、尿急、尿痛。E. 外阴瘙痒、灼痛感

【答案】C

【解析】外阴阴道假丝酵母菌性阴道病可有外阴瘙痒、灼痛、尿痛及性交痛。白带增多，典型的白带呈白色稠厚豆渣样。检查时间小阴唇内侧及阴道黏膜上附件有白色膜状物，擦后露出红肿黏膜面。严重者见皮肤皲裂、表皮脱落。

51、[题干]患者女，35岁。婚后8年未孕，痛经逐年加重5年。检查：子宫后位，后壁可及多个触痛结节，右侧附件可及一 $6\text{cm} \times 5\text{cm}$ 大小的包块，活动差，囊实性。首选确诊的方法是()。

A. B超

B. 诊断性刮宫

C. 腹腔镜+组织病检

D. CA125。E. 宫腔镜

【答案】C

52、[题干]关于压力性尿失禁不正确的表述是

A. 咳嗽尿液会不自主地从尿道口漏出

- C. 在压力情况下有溢尿
- D. 正常状态下无遗尿。E, 腹压突然增高时尿液自动流出

【答案】B

【解析】女性压力性尿失禁是中老年妇女的常见疾患，国际控尿学会(ICS)将其定义为：构成社会和卫生问题，且客观上能被证实的不自主的尿液流出。

53、[题干]二十三岁未婚少女，因肥胖多毛及闭经，初步诊断为多囊卵巢综合征。对本例进行内分泌激素测定，最可能的改变应是()。

- A. LH 呈持续高水平
- B. FSH 呈持续高水平
- C. LH/FSH 比值 <2
- D. 雄激素增多主要是脱氢表雄酮硫酸盐增加。E, 雌酮低于正常值

【答案】A

【解析】患者血清 FSH 偏低，LH 升高，LH/FSH 比值 $\geq 2\sim 3$ ，睾酮水平通常不超过正常范围上限 2 倍。

54、[题干]过期妊娠时，错误的是

- A. 过期妊娠应以预防为主，定期进行产前检查
- B. 胎儿为小样儿时，对胎儿危害小
- C. 胎儿可继续生长成为巨大儿
- D. 可伴羊水过少。E, 是影响围生儿发育与生存的病理妊娠

【答案】B

【解析】胎儿成熟障碍、胎盘老化可致胎儿窘迫或胎盘正常致胎儿巨大造成难产，均使围生儿死亡率及新生儿窒息率增高，产妇手术产几率增加。

55、[题干]2000年6月，美、英、日、法、德、中六国公布：人类基因组序列图的“工作框架图”绘出。2001年2月12日，六国又联合公布了经过整理、分类和排序后更加准确、清晰、完整的人类基因组图谱。这一成就将为解释人类疾病的本原、新药的设计、新治疗方法的产生提供重要依据，它奠定了21世纪医学生物学和其他相关科学飞速发展的基础。同时人们也担心，这项成果如果用于危害人类研究，其后果也是不可设想的。上述情况表达的最主要思想是()。

- A. 科学技术进步的力量是无穷的
- B. 道德在科学技术进步面前是无能为力的
- C. 现代医学科学发展需要医学道德把关
- D. 医学道德制约了医学科学的发展。E, 基因科学的发展是解决人类全部健康问题的根本

【答案】C

56、[A1/A2型题]与子宫脱垂发生无关的结构是()。

- A. 子宫颈周围
- B. 肛提肌

- C. 主韧带
- D. 阔韧带。E, 宫骶韧带

【答案】A

57、[题干]有关复方短效口服避孕药不良反应正确的是()。

- A. 类早孕反应系孕激素刺激胃黏膜所致
- B. 服药期间出现阴道流血，多发生在漏服药物之后
- C. 能使经血量多，不适用于经量多的妇女
- D. 白带增多系孕激素作用的结果。E, 体重减轻系因进食少，恶心所致

【答案】B

【解析】类早孕反应系雌激素刺激胃黏膜所致;能使经量减少，不适用于经量少的妇女;白带增多系雌激素的作用;体重增加系孕激素作用的结果。

58、[题干]能促进子宫复旧的因素是()。

- A. 授乳
- B. 初产妇
- C. 子宫炎症
- D. 胎盘功能不良。E, 长时间卧床

【答案】A

【解析】手术及术后注意事项：预防子宫内膜炎，术后感染影响子宫的复旧。

59、[题干]为预防感染，诊断性刮宫患者至少应在术后几周禁性生活及盆浴()。

- A. 1 周
- B. 2 周
- C. 3 周
- D. 4 周。E, 5 周

【答案】B

【解析】诊断性刮宫在术后两周进行性生活

60、[题干]女性，30岁，痛经10年，原发不孕3年，月经规律，经量中等，痛经显著，需服止痛药，查体：宫骶韧带触痛结节，子宫后位，大小正常，活动差，左附件区触及直径6cm囊肿，活动好。基础体温双相，HSG宫腔大小形态正常，双侧输卵管通畅，CA12545U/L，男方精液检查正常。如药物治疗首选()。

- A. GnRH-a
- B. 甲羟孕酮
- C. 孕三烯酮
- D. 达那唑。E, 米非司酮

【答案】A

61、[题干]女，30岁，月经周期规律，为28日，基础体温呈双相型，若于月经周期第12日刮宫，镜检子宫内膜应为()。

- A. 增殖期中期
- B. 增殖期晚期
- C. 分泌期早期
- D. 分泌期中期。E, 分泌期晚期

【答案】B

【解析】月经周期 28 日，则其排卵期为第 14 日，因此，月经周期第 12 日刮宫应为增殖期晚期。

- 62、[题干]重度子癥前期的孕妇，治疗时首选药物是
- A. 降低顿内压药
 - B. 降压药
 - C. 镇静药
 - D. 利尿药。E, 解痉药

【答案】E

- 63、[题干]导致尖锐湿疣的病原体是()。

- A. HIV
- B. HPV
- C. HSV
- D. HBV。E, VIN

【答案】B

【解析】尖锐湿疣的病原体是 HPV

- A. 12 小时胎动次数 \geqslant 36 次
- B. B 超羊水池最大直径 \geqslant 3cm
- C. 血清胎盘生乳素 \geqslant 4 μ g/L
- D. NST 试验有反应型。E, OCT 试验胎心出现连续晚期减速

【答案】E

65、[题干]始基子宫又称()。

- A. 无子宫
- B. 无宫腔子宫
- C. 子宫较正常小
- D. 幼稚子宫。E, 痕迹子宫

【答案】E

66、[B 型题]二十五岁初产妇，10 日前在家分娩，产后出现持续血性恶露，无异味，1 日前出现阴道流血量增多，约 500ml，无寒战高热，查体子宫如妊娠 4 个月大，质软，压痛明显，宫口容 2 指。不恰当的处理是()。

- A. 广谱抗生素预防感染
- B. 加用缩宫素
- C. 积极准备下行清宫术
- D. 子宫切除术。E, 支持治疗

【答案】D

67、[题干]属于葡萄胎处理的项目，错误的是

- A. 40岁以上的妇女可行子宫切除术
- B. 一经确诊，应尽快清宫
- C. 1周后均应行第二次刮宫
- D. 刮出物应常规送病理检查。E. 术后严密随访

【答案】C

【解析】清除宫腔内容物：确诊后应及时清宫，多采用吸刮术，有经验医生完成。术前应注意全身检查，作好各种准备应急工作，术中注意出血及子宫穿孔，子宫小于12周可以一次刮净，子宫大于12周

或术中一次刮净有困难时，可在1周后作第二次刮宫，刮出物必须送组织学检查，注意选择近宫壁部位新鲜无坏死组织送检。为减少出血和预防子宫穿孔，可使用缩宫素，但注意应用时机。

68、[题干]关于盆腔子宫内膜异位症错误的是()。

- A. 痛经呈渐进性加剧
- B. 痛经程度与病灶大小成正比
- C. 周期性痛不一定与月经同步
- D. 病变累及直肠陷凹及骶骨韧带时可有性交痛。E. 40%患者不孕

【答案】B

【解析】内异症的痛经程度与病灶大小不一定成正比。

69、[题干]协调性子宫收缩乏力，宫口开大5cm，无头盆不称，最佳处理应选择

- B. 人工破膜后静脉滴注催产素
- C. 剖宫产术
- D. 等待产程自然进展。E, 镇静剂

【答案】B

70、[题干]患有高血压的妇女，选择以下哪种避孕方法最好()。

- A. 安全期避孕
- B. 阴茎套
- C. 皮下埋植剂
- D. 复方短效口服避孕药。E, 长效避孕针

【答案】B

【解析】患高血压妇女不宜选用甾体激素避孕法避孕，安全期避孕效果差。

