

2022 年妇产科主治医师试题及答案组卷

1、[题干]羊水栓塞引起的病变最不恰当的一项是

- A. 过敏性休克
- B. 肺动脉高压
- C. 急性肾衰竭
- D. DIC。E, 急性肝衰竭

【答案】E

【解析】羊水中含的物质可形成栓子引起肺动脉高压，其中有成分可成为强致敏源引起过敏性休克，羊水中含有的促凝物质可引起 DIC，由于休克和 DIC，肾脏急性缺血导致肾功能障碍。

2、[题干]孕妇感染梅毒首选的药物治疗()。

- A. 阿奇霉素
- B. 头孢菌素
- C. 青霉素
- D. 红霉素。E, 乙酰螺旋霉素

【答案】C

【解析】治疗梅毒首选青霉素，可同时治疗孕妇和新生儿。

其胎方位为()。

- A. LOA
- B. ROA
- C. ROT
- D. LOP。 E, ROP

【答案】 C

【解析】 无

4、[题干]慢性盆腔炎患者在下列哪种情况下可考虑手术治疗()。

- A. 月经过多
- B. 两侧输卵管增粗
- C. 不孕
- D. 炎性包块，久治无效。 E, 痛经

【答案】 D

5、[题干]29岁，初产妇。孕35周，水肿4周，血压增高3天伴有尿蛋白(+)，ALT和AKP轻度增高，无胃肠道症状。首先应考虑的诊断
为

- A. 妊娠期胆汁淤积症

- B. 妊娠期急性脂肪肝

- C. 妊高征肝损害

- D. 药物性肝炎。 E, 急性肝炎

【答案】C

【解析】妊高征肝损害是在高血压、蛋白尿、水肿和肾功能受损的基础上合并的肝损害。ALT 轻度升高，但胃肠道症状不明显。

6、[题干]妊娠合并心脏病心功能 II 级的诊断依据是()。

- A. 能从事强体力劳动
- B. 一般体力活动不受限
- C. 一般体力活动显著受限
- D. 一般体力活动稍受限。E, 休息时即有心功能不全症状

【答案】D

【解析】II 级是指：一般体力活动轻度受限制，活动后心悸、轻度气短，休息时无症状。

7、[题干]与妊娠期高血压疾病严重程度成正比的是

- A. 少尿
- B. 肝功能异常
- C. 无尿

D. 转氨酶。E, 蛋白尿

【答案】E

【解析】肾小球血管壁通透性增加—蛋白尿—与疾病的严重程度成正比。

8、[题干]关于子宫内膜异位症正确的是()。

A 异位内膜随卵巢激素变化而发生周期性出血

B. 该病具有远处转移和种植能力，故为癌前病变

C. 卵巢子宫内膜异位症较少见

D. 卵巢巧克力囊肿直径最大不超过 8cm。E, 直接累及输卵管多见

【答案】 A

【解析】 异位内膜随卵巢激素变化而发生周期性出血是内异症的基本病理特点。

9、[题干] 以下哪种不孕病因治疗，不适合使用 IVF-ET()。

A. 男性因素

B. 输卵管不通

C. 子宫内膜因素

D. 无排卵。E, 免疫因素

【答案】 C

10、[A3/A4 型题] 女，39 岁。婚后 8 年未避孕未怀孕，月经规律，痛经重，月经来潮 12 小时子宫内膜活检为分泌期宫内膜，B 超下通液输卵管通而不畅，男方精液化验精子数 6200 万/ml，活力 60%。为明确诊断，最准确的检查为()。

A. HSG

B. 腹腔镜检查

C. CT 检查

D. MIR 检查。E, X 线检查

【答案】 B

11、[题干] 20岁已婚妇女，停经15日，阴道中等量流血5日伴发热。昨日阴道排出一块肉样组织，今晨突然大量阴道流血。查血压80/60mmHg，体温38.4℃，脉搏118次/分。妇检子宫妊娠2个月大小，有压痛，宫口通过一指松，阴道分泌物明显臭味。血白细胞计数为 $18 \times 10^9/L$ 。该患者除抗休克外，还需进行的紧急处理是

- A. 抗生素大剂量静滴
- B. 大量输液、输血
- C. 注射宫缩剂
- D. 钳夹出宫腔内妊娠物。E, 立即进行彻底清宫

【答案】D

【解析】流产合并感染应用卵圆钳将宫腔残留组织夹出，减少出血，忌用刮匙全面搔刮宫腔，避免感染扩散。

12、[题干] 下列哪项不是巨细胞病毒的传播途径()。

- A. 接吻
- B. 哺乳
- C. 性交
- D. 呼吸道。E, 输血

【答案】D

【解析】巨细胞病毒的传播途径接吻

13、[题干] 关于骨盆入口平面狭窄对母儿的影响，错误的叙述是

- A. 易发生胎位异常

C. 可引起继发性宫缩乏力

D. 可引起产程延长。E, 影响胎先露部的衔接

【答案】 B

【解析】 中骨盆平面狭窄影响胎头内旋转。

14、[题干]镜下确诊子宫内膜异位病灶必须见到()。

A. 红细胞

B. 粘连

C. 纤维增生

D. 内膜间质细胞。E, 含铁血黄素的巨噬细胞

【答案】 D

【解析】 病理确诊子宫内膜异位病灶必须包括有内膜间质细胞。

15、[题干]单臀先露的两下肢姿势为

A. 髋关节屈曲，膝关节屈曲

B. 髋关节直伸，膝关节直伸

C. 髋关节直伸，膝关节屈曲

D. 髋关节屈曲，膝关节直伸。E, 以上都不是

【答案】 D

【解析】 单臀先露或腿直臀先露：胎儿双髋关节屈曲，双膝关节伸直，以胎臀为先露。最多见。**【该题针对“异常分娩”知识点进行考核】**

16、[题干]与不全流产或过期流产临床表现相似，容易误诊的是()。

- A. 完全性葡萄胎
- B. 部分性葡萄胎
- C. 侵蚀性葡萄胎

D. 绒癌。E, 胎盘部位滋养细胞肿瘤

【答案】 B

【解析】 部分性葡萄胎与不全流产或过期流产不仅临床表现相似，在病理检查时也因绒毛水肿、滋养细胞增生不明显等造成鉴别困难。

17、[题干]属于排卵的项目，错误的是

- A. 排卵前出现 FSH 高峰，是即将排卵的可靠指标
- B. 排卵时卵泡液中前列腺素达高峰
- C. 前列腺素可促进卵泡壁释放蛋白溶酶，有助于排卵
- D. 卵细胞及其周围的卵丘颗粒细胞一起被排出的过程称为排卵。E, 排卵前，初级卵母细胞完成第一次减数分裂，成为次级卵母细胞

【答案】 A

【解析】 排卵前，会出现 LH、FSH 高峰，LH 高峰是排卵的可靠的指标。

18、[题干]妊娠早期黑加(Hegar)征是指

- A. 子宫增大变软
- B. 子宫前后径变宽，略饱满呈球形
- C. 双合诊检查子宫峡部极软，感觉宫颈和宫体似不相连

D. 双合诊感觉子宫半侧较另半侧隆起。E, 双合诊时子宫呈前屈或后屈位

【答案】 C

【解析】 妊娠早期黑加(Hegar)征是指双合诊检查子宫峡部极软, 感觉宫颈和宫颈似不相连, 此为记忆性知识点

19、[题干]胎头矢状缝在骨盆入口左斜径上, 大囟门在骨盆的右前方, 其胎方位为()。

A. LOA

B. ROA

C. ROT

D. LOP。 E, ROP

【答案】 D

【解析】 枕先露以枕骨为指示点, 枕骨位于盆骨的左后方, 故胎位为LOP

20、[题干]已婚妇女, 34岁, 妊娠39周, 规律宫缩10小时, 破膜3小时入院。检查宫缩持续20~25秒, 间隙7~8分钟, 宫口开大8cm, 胎心率160次/分, 阴道检查坐骨棘稍突, 测量坐骨结节间径7.5cm, S-1。复查子宫长度33cm, 腹围96cm, 胎心170次/分, 此时不恰当处

置为

A. 吸氧

- B. 剖宫产
- C. 静滴广谱抗生素
- D. 行无应激试验。E, 静滴 5%碳酸氢钠

【答案】D

【解析】无应激试验：连续监护 20 分钟胎心率，若胎儿在睡眠中，可延长监测时间为 40 分钟或催醒胎儿。20 分钟有 3 次以上胎动伴胎心率加速 $>15\text{bpm}$ ，持续时间 >15 秒为正常称反应型，一周后再复查；若胎动数与胎心率加速数少于前述情况或胎动时无胎心率加速，称无反应型。本试验方法简单、安全，可在门诊进行，可作为缩宫素激惹试验前的筛选试验。

21、[题干]患者 14 岁，体格及智力发育与同龄人相似，已出现第二性征 3 年，一直无月经来潮。近 1 年常感下腹胀痛，每一至两月发作一次，每次持续 3~4 天，可自然缓解，近来偶于腹痛时伴有腰骶部胀痛及肛门坠胀，亦可自然缓解。2 月前无意间发现下腹部有一包块。查体：身高 160cm，体重 50kg，乳房发育好，女性体态，其他系统查体未发现异常。该患者诊断首先可考虑什么（）。

- A. 子宫内膜异位症
- B. 盆腔炎
- C. 先天性处女膜闭锁

D. 卵巢肿瘤。E, 先天性无阴道 F 子宫肌瘤 G 原发性闭经 H 继发性闭经

【答案】 CEG

22、[题干]羊水栓塞引起的病变最不恰当的一项是

- A. 过敏性休克
- B. 肺动脉高压
- C. 急性肾衰竭
- D. DIC。E, 急性肝衰竭

【答案】 E

【解析】羊水中含的物质可形成栓子引起肺动脉高压，其中有成分可成为强致敏源引起过敏性休克，羊水中含有的促凝物质可引起 DIC，由于休克和 DIC，肾脏急性缺血导致肾功能障碍。

23、[题干]宫颈肌瘤导致分娩受阻，脐平出现一环形凹陷，并逐渐上升()。

- A. 协调性宫缩乏力
- B. 不协调性宫缩乏力
- C. 协调性宫缩过强
- D. 子宫痉挛性狭窄环。E, 病理性缩复环

【答案】 E

【解析】分娩受阻，子宫收缩加强，子宫体部肌肉增厚变短，下段

24、[问题]胎先露通过骨盆出口的径线

- A. 出口后矢状径
- B. 入口横径
- C. 中骨盆前后径
- D. 真结合径。E, 坐骨结节间径

【答案】 E

25、[题干]孕妇体内代谢改变正确的是()。

- A. 蛋白质代谢呈负氮平衡状态
- B. 基础代谢率于妊娠晚期增高 15%~20%
- C. 胰腺分泌胰岛素不足
- D. 妊娠胎儿骨骼钙的储存主要在妊娠头 3 个月内积累。E, 血脂降低

【答案】 B

【解析】 基础代谢率于妊娠晚期增加 15%~20%

26、[题干]产褥期母体变化最大的是

- A. 乳房
- B. 循环系统
- C. 消化系统
- D. 腹壁。E, 子宫

【答案】 E

【解析】 产褥期子宫变化最大。

27、[A1/A2 型题]阴道形态学的特征正确的是()。

- A. 阴道下端比阴道上端宽
- B. 阴道下端开口于阴道前庭前部
- C. 阴道纤维组织膜与肌层紧密粘贴
- D. 黏膜层覆以单层鳞状上皮。E, 阴道有腺体

【答案】 C

28、[题干]子宫颈原位癌累及腺体是指

- A. 子宫颈表面和腺体先后发生了原位癌，并侵及腺体周围间质
- B. 子宫颈腺体充满癌细胞
- C. 子宫颈原位癌突破基底膜侵及腺体
- D. 子宫颈原位癌沿基底膜伸入腺体内，致腺管上皮为癌细胞所取代，腺体基底膜完整。E, 子宫颈表面发生的原位癌影响腺体分泌排出

【答案】 D

29、[题干]女，23岁，第1胎，妊娠31周，外伤后突然剧烈腹痛，阴道未见流血，急诊送入院，查血压10.0/8.0kPa，(75/60mmHg，脉搏120次/分)，面色苍白，大汗淋漓，下肢水肿，宫底剑突下三横指，胎位不清，胎心听不到，宫体左前侧壁轻压痛。若病情未达到控制，进一步发展，可导致

- A. 胎盘隐性剥离
- B. 胎盘混合性剥离
- C. 子宫胎盘卒中

【答案】 C

【解析】 胎盘早剥尤其是隐性剥离时，胎盘后血肿增大及压力增加，血液浸入子宫肌层，导致肌纤维分离、断裂及变性，当血液渗透至子宫浆膜层时，子宫表面呈现紫蓝色淤斑，称为子宫胎盘卒中。

30、[题干]初产妇，36岁，臀位，合并中度妊娠期高血压疾病。因臀位行外倒转术后突然腹痛，伴少量阴道流血，并出现子宫底升高，胎心 165~170 次/分。最可能的诊断为

- A. 子宫破裂
- B. 临产
- C. 胎盘早剥
- D. 前置胎盘。E, 先兆子痫

【答案】 C

31、[题干]输卵管妊娠典型的临床症状除停经外，应为

- A. 腹痛、阴道流血、晕厥、休克
- B. 腹痛、白带增多
- C. 腹痛、阴道流血、恶心、呕吐
- D. 痛经、白带增多。E, 腹痛、阴道流血、发热

【答案】 A

32、[题干]妊娠中晚期合并急性阑尾炎的鉴别诊断不包括()。

- A. 右侧输尿管结石
- B. 右侧输卵管妊娠

D. 急性脂肪肝。E, 胎盘早剥

【答案】 B

【解析】 早期妊娠时，妊娠合并阑尾炎应与右侧输卵管妊娠相鉴别。

33、[题干]羊水过少的处理错误的是()。

A. 孕中晚期羊水过少可行羊膜腔灌注法

B. 若妊娠足月，应尽早破膜

C. 剖宫产可降低围生儿病死率

D. 羊水过少确诊后，一律剖宫产。E, 多次羊膜腔输液可致绒毛膜羊膜炎

【答案】 D

【解析】 羊合并胎盘功能不良、胎儿窘迫，或破膜时羊水少且胎粪严重污染者，估计短时间不能结束分娩的，应采用剖宫产术终止妊娠。

34、[问题]胎儿在子宫内的姿势称为

A. 胎先露

B. 胎产式

C. 骨盆轴

D. 胎姿势。E, 胎方位

【答案】 D

【解析】 胎姿势指胎儿在子宫内的姿势。

A. NST 有反应型

B. OCT 阴性

C. 尿 E/C 比值为 16

D. 12 小时内胎动 12 次。E, B 型超声显示羊水暗区 2cm

【答案】 E

【解析】 产前处理：已确诊过期妊娠，若有下列情况之一应立即终止妊娠：①宫颈条件成熟；②胎儿 $\geq 4000\text{g}$ 或 IUGR；③12 小时内胎动累计数 < 10 次或 NST 为无反应型，CST 阳性或可疑时；④持续低 E/C 比值；⑤羊水过少（羊水暗区 $< 3\text{cm}$ ）或羊水粪染；⑥并发中度或重度妊高征。终止妊娠的方法应酌情而定。宫颈条件成熟者应人工破膜，破膜时羊水多而清，可在严密监护下经阴道分娩；宫颈条件未成熟者可用促宫颈成熟药物，如普拉睾酮 200mg，每日静注一次，连用 3 日，也可用缩宫素、前列腺素制剂引产；出现胎盘功能不良或胎儿窘迫征象，不论宫颈条件成熟与否，均应行剖宫产尽快结束分娩。

36、[题干]宫颈息肉的病理变化为

A. 宫颈管局部黏膜被鳞状上皮覆盖

B. 宫颈组织充血水肿，腺体和间质增生

C. 宫颈管局部黏膜增生，向宫颈外口突出

D. 宫颈管黏膜及黏膜下组织充血、水肿，结缔组织增生。E, 宫颈鳞状上皮化生

【答案】 C

【解析】 宫颈息肉。宫颈管黏膜增生形成的局部突起病灶称为宫颈

37、[题干]诊断葡萄胎最有价值的项目为

- A. 血 β -HCG 呈高值
- B. 子宫大于妊娠周数
- C. 停经及不规则阴道流血
- D. 妇科检查于附件区触及囊性肿物。E, B 型超声检查见宫腔内充满落雪状或蜂窝状回声

【答案】 E

【解析】 B 超检查：是诊断葡萄胎的重要辅助检查方法。完全性葡萄胎表现为：子宫增大，宫腔充满弥漫分布的光点和小囊样回声区，无孕囊，或无胎体及胎心。部分性葡萄胎有时可见胎儿或羊膜腔，胎儿多合并畸形。

38、[题干]下列关于月经和月经期临床表现的叙述中哪个不正确()。

- A. 月经是卵巢内卵泡成熟、排卵和黄体形成. 同时子宫内膜从增生到分泌变化的结果
- B. 月经周期从出血的第一日算起
- C. 正常月经周期是 21~35 天，平均 28 天
- D. 经血一般不凝是由于其中缺乏某种凝血因子。E, 经血中含有子宫内膜碎片、宫颈黏液及脱落的阴道上皮细胞

【答案】 D

【解析】月经血中含有来自子宫内膜的大量纤溶酶，它对纤维蛋白有溶解作用，故月经血不凝。

39、[题干]妇女定期进行疾病普查是针对下列哪项()。

- A. 以防职业病为主
- B. 以防癌为主
- C. 以性传播疾病为主
- D. 以保健为主。E, 以妇女常见疾病为主

【答案】B

40、[题干]一中年女性，自觉外阴发痒3年余。检查发现双大阴唇正常，双小阴唇萎缩；阴蒂包皮粘连，阴道口缩小，会阴肛周色素减退，黏膜变薄，最可能的诊断为()。

- A. 外阴白化病
- B. 外阴白斑
- C. 外阴神经性皮炎
- D. 外阴湿疹。E, 外阴硬化萎缩性苔藓

【答案】E

41、[题干]对HELLP综合征实验室检查错误的是

- A. 外周血涂片可见异形红细胞

B. 血小板计数 $<100 \times 10^9/L$

C. 肝功能异常

D. 血红蛋白有不同程度的降低。E, 血清总胆红素 $\geq 18 \mu\text{mol}/L$

【答案】E

【解析】HELLP 综合征——全名为溶血、肝酶升高、血小板减少综合征。重度子痫前期，特别是子痫患者易发生。化验检查：血红蛋白有不同程度的降低，外周血涂片可见破碎红细胞和球形红细胞，血小板计数 $<100 \times 10^9/L$ ，肝功能异常，血清总胆红素 $\geq 20.5 \mu\text{mol}/L$ ，血清结合珠蛋白 $<250\text{mg}/L$ 。

42、[题干]属于妊娠期高血压疾病性心脏病的项目，正确的是

A. 心电图显示心脏损害

B. 心脏不同程度扩大，脉搏细数

C. 在妊娠期间发病

D. 发病与贫血及营养情况无关。E, 治疗宜用甘露醇等利尿药

【答案】C

【解析】孕妇既往没有心脏病史，在妊娠期高血压疾病的基础上突然出现以心肌损害为特征的心力衰竭症候群，称为妊娠期高血压疾病性心脏病。约占妊娠合并心脏病的 4.0%~5.7%，重度子痫前期中约有 4% 发生此病。因发病隐匿，病情危重，是妊娠期高血压疾病患者及胎儿死亡的主要原因之一，早期诊断、及时处理极为重要。该题目的意思

就是备选答案中对妊娠期高血压性心脏病的描述正确的选项，属于基础知识的考核，从上述文字可以明确本题目应选答案 C。

- 43、[题干]可以诊断子宫性闭经的检查项目是()。
- A. 雌激素试验阳性
 - B. 孕激素试验阳性
 - C. 垂体兴奋试验阴性
 - D. 雌孕激素序贯试验阴性。E, 孕激素试验阴性

【答案】 D

【解析】 雌孕激素序贯试验仍无阴道流血，提示子宫内膜有缺陷或被破坏，可诊断为子宫性闭经。

44、[题干]下列哪项组合是错误的

- A. 子宫内膜异位症——假孕疗法
- B. 子宫内膜癌晚期——孕酮治疗
- C. 卵巢黄素囊肿——手术切除
- D. 子宫内膜萎缩型功血——雌激素治疗。E, 青春期无排卵功血——雌孕激素序贯疗法

【答案】 C

【解析】 黄素囊肿一般不需处理，而应严密随诊观察，多半可自行消失。所以 C 答案手术切除的说法是错误的。黄素囊肿破裂出血时才需要进行手术治疗。

45、[单选]妊娠 8 月末阑尾的位置() ()。

- A. 髂嵴下两横指

B. 髂嵴上两横指

C. 髂嵴水平

D. 右髂前上棘至脐连线中外 1/3 处。E, 髂嵴下三横指

【答案】 B

【解析】 妊娠期子宫增大，使盲肠向外、向上、向后移位，阑尾相对位置较深，并将壁层腹膜撑开，使阑尾炎症不易局限而致穿孔、腹膜炎。妊娠 3 月末位于髂嵴下 2 横指，妊娠 5 月末达髂嵴水平，妊娠 8 月末上升至髂嵴上 2 横指，妊娠足月可达胆囊区。产后 10~12 日恢复至非孕水平。

46、[题干]以下不属于规范行医范畴的是() ()。

A. 因病施治，合理医疗

B. 不隐瞒、误导或夸大病情

C. 使用适宜诊疗技术和药物

D. 大处方、大检查、过度医疗。E, 严格遵循临床诊疗和技术规范

【答案】 D

47、[题干]初产妇，孕 38 周，临产 15 小时，以 0.9%氯化钠注射液 500ml 加缩宫素 5U，40~50 滴/min 静脉点滴。4 小时后产妇述腹痛，呕吐、烦躁，阴道少量出血。查体：全腹部压痛明显，子宫轮廓不清，胎心消失，宫口开大 9cm，先露-3。下列最可能的诊断是()。

A. 妊娠合并急性胰腺炎

B. 胎盘早剥

C. 先兆子宫破裂

D. 子宫破裂。E, 前置胎盘

【答案】D

【解析】根据题干的临床表现及体征：全腹部压痛明显，子宫轮廓不清，胎心消失，先露高浮，考虑子宫破裂。

48、[A3/A4 型题]女性，24 岁，已婚，停经 6 周，尿妊娠试验阳性，孕期曾发高热 1 周，服多种药物，要求人工流产。人工流产时出现恶心呕吐、出汗，面色苍白。查体：血压 80/60mmHg，心率 46 次/分。本例正确处理应是()。

- A. 间断吸氧
- B. 止吐剂肌内注射
- C. 阿托品静注

D. 抗生素静脉滴注。E, 快速输液

【答案】C

49、[题干]女性骨盆()。

- A. 入口略呈三角形，骶坐切迹窄呈高弓形
- B. 入口横径较前后径稍长，骶坐切迹呈圆形
- C. 入口横径较前后径短，骶坐切迹较宽
- D. 入口横径较前后径长，骶坐切迹较窄。E, 入口横径较前后径短，骶坐切迹较窄

【答案】B

【解析】女性骨盆入口呈横椭圆形，髂骨翼窝面浅，入口横径较前

常骨盆。在我国妇女骨盆类型中占 52%~58.9%。

50、[题干]妊娠期母体循环系统变化错误的是()。

- A. 心电图可出现轻度电轴左偏
- B. 妊娠早期、中期血压偏低
- C. 心排出量至妊娠 32~34 周达高峰
- D. 侧卧位能避免低血压。E, 心尖区闻及 I~II 级收缩期杂音, 提示孕妇有心脏病

【答案】E

51、[题干]对于子宫内膜异位症与不孕的关系, 以下哪项不恰当()。

- A. 影响卵巢局部的激素调节
- B. 引起盆腔粘连, 干扰输卵管蠕动和受精卵运输
- C. 部分发生未破裂卵泡黄素化综合征
- D. 对生殖过程的免疫因素发生影响。E, 微小的内膜异位病灶不会引起不孕

【答案】E

52、[题干]产后子宫完全复旧的时间为()。

- A. 产后 6 周
- B. 产后 8 周
- C. 产后 10 周

【答案】 A

【解析】 子宫于产后 6 周恢复到妊娠前大小，正确答案为 A

53、[题干]胎儿窘迫，胎儿轻度缺氧，血氧降低，首先出现的为

A. 呼吸性酸中毒

B. 代谢性酸中毒

C. 混合性酸中毒

D. 呼吸性碱中毒。E, 代谢性碱中毒

【答案】 A

【解析】 胎儿血氧降低、二氧化碳蓄积→呼吸性酸中毒

54、[题干]属于单卵双胎特点的项目，错误的是

A. 两个胎儿基因一致

B. 有发生双胎输血综合征的可能

C. 胎儿性别一致

D. 两胎囊间的中隔均由两层羊膜和两层绒毛膜组成。E, 发生率低于双卵双胎

【答案】 D

【解析】 单卵双胎由一个受精卵分裂而成的双胎妊娠称单卵双胎，约占双胎妊娠的 1/3。因具有相同的遗传基因，两胎儿的性别、血型及其他各种表型完全相同，容貌极相似。

55、[A3/A4 型题]女性，24 岁，已婚，停经 6 周，尿妊娠试验阳性，孕期曾发高热 1 周，服多种药物，要求人工流产，人工流产时出现平

例最可能的诊断应是()。

A. 宫腔粘连综合征

B. 人工流产综合反应

C. 子宫穿孔

D. 失血性休克。E, Turner 综合征

【答案】 B

56、[题干]妊娠 28 周末的胎儿体重，估计为

A. 600g

B. 800g

C. 1000g

D. 1200g。 E, 1400g

【答案】 C

【解析】 妊娠 12 周末，胎儿体重约 20g;16 周末，胎儿体重约 100g;20 周末，胎儿体重约 300g;24 周末，胎儿体重约 700g;28 周末，胎儿体重约 1000g;32 周末，胎儿体重约 1700g;36 周末，胎儿体重约 2500g;40 周末，胎儿体重约 3000g。

57、[题干]一侧副中肾管发育正常，另一侧发育不全，形成哪种异常子宫()。

A. 双角子宫

B. 幼稚子宫

- C. 纵隔子宫
- D. 无子宫。E, 残角子宫

【答案】 E

【解析】 残角子宫

58、[题干]黄体萎缩不全所致的功血，哪项是错误的

- A. 基础体温双相，但不典型，体温下降延迟
- B. 于月经第 5 天刮宫，见有分泌反应
- C. 生育年龄妇女居多
- D. 月经周期正常而经期延长。E, 阴道脱落细胞检查可以确诊

【答案】 E

【解析】 子宫内膜不规则脱落多见于生育年龄妇女，月经周期正常，经期延长，常达 9~10 天，失血量多。因为有排卵，所以基础体温呈双相型，但不典型。体温下降延迟，于月经第 5~6 天刮宫，见到子宫内膜具有分泌反应的腺体。阴道脱落细胞学检查作为辅助手段可以判断有无排卵，但不能确诊是子宫内膜不规则脱落所致的功血。

59、[题干]对于妊娠合并病毒性肝炎的并发症，错误的是()。

- A. 易出现早产、流产
- B. 可出现胎儿窘迫

- C. 易发生重型肝炎
- D. 易发生羊水过多。E, 子痫前期发生率增加

【答案】 D

【解析】 羊水过多不是妊娠合并病毒性肝炎的并发症。

60、[题干]生精干细胞是指下列哪项()。

- A. 精原细胞
- B. 初级精母细胞
- C. 次级精母细胞
- D. 精子。E, 精子细胞

【答案】 A

61、[题干]不属于胎盘早剥并发症的项目为

- A. 产后出血
- B. 肝功能异常
- C. 急性肾衰竭
- D. 希恩综合征。E, 凝血功能障碍

【答案】 B

62、[A3/A4 型题]三十岁妇女，结婚 7 年，性生活正常，青春期开始月经不调。近 3 年来，月经周期 35~45 日，经量少。基础体温单相。

未避孕亦未怀孕。精液常规和输卵管造影等检查均未发现异常。超声

若 B 型超声提示双侧卵巢未见优势卵泡，各见多枚小窦卵泡。主要的治疗方法是()。

- A. 输卵管造口术
- B. 卵巢楔形切除术
- C. 药物诱导排卵
- D. 子宫内膜活检术。E, 子宫肌瘤剔除术

【答案】 C

63、[题干]不属于外阴良性肿瘤的项目为

- A. 平滑肌瘤
- B. 神经纤维瘤
- C. 乳头瘤
- D. 派杰病。E, 汗腺瘤

【答案】 D

【解析】 湿疹样癌又称 Paget 病，表现类似湿疹，多发生于女性乳房。起源于乳腺导管，继而累及乳腺、结缔组织及皮肤。也可见于乳房以外，如腋窝、外生殖器、会阴及肛门周围。此时称乳房外湿疹样癌，可合并大汗腺癌。

64、[题干]妊娠期高血压病病人，血压 27/14.6kPa (204/110mmHg)，首选的降压药是

- A. 降压灵
- B. 利血平

C. 复方降压片

D. 甲基多巴。E, 肼苯哒嗪

【答案】 E

65、[题干]女性，25岁，葡萄胎清宫后5个月，门诊拟“妊娠滋养细胞肿瘤”收入院。入院时，血hCG测定1500IU/L，B型超声检查见子宫病灶直径2cm，X线胸片和胸部CT均阴性。本例正确的处理应是()。

A. MTX 单药化疗

B. 5-Fu 和 KSM 联合化疗

C. EMA-CO 联合化疗

D. 手术治疗。E, 随访观察

【答案】 A

【解析】本例诊断为低危妊娠滋养细胞肿瘤，高危FIGO/WHO评分为3分，其中距前次妊娠时间>4个月1分，hCG水平>101分，子宫病灶1个1分。应首选MTX单药化疗。

66、[题干]妊娠晚期合并急性病毒性肝炎应积极治疗的最主要原因为

A. 容易合并子痫前期及子痫

B. 容易发展为重症肝炎

C. 容易发生糖代谢障碍影响胎儿发育

D. 容易发生早产，胎儿不易存活。E, 容易发生宫缩乏力，产程延长

【解析】 妊娠使肝脏抗病能力降低及肝脏负担增加，可使病毒性肝炎病情加重，重症肝炎及肝昏迷发生率较非妊娠期高数十倍。妊娠并发症引起的肝损害，极易与急性病毒性肝炎混淆。

67、[题干]25岁初产妇，现妊娠35周，产前检查发现宫高39cm，腹围108cm，腹壁皮肤张力较大，胎位不清，胎心遥远。为明确诊断，首选哪项检查

- A. 彩色多普勒
- B. 羊膜镜
- C. B超
- D. 腹腔镜。E, 腹部X线片

【答案】 C

【解析】 B超检查如没有完整的胎儿颅骨光环的情况下才能确诊为无脑儿。

68、[题干]孕妇于妊娠期患淋病进行治疗，正确的是

- A. 肌注青霉素效果佳
- B. 多合并支原体感染，应同时给予抗支原体药物
- C. 临床症状消失为治愈
- D. 青霉素过敏可选喹诺酮类药物。E, 用药必须足量、及时

【答案】 E

【解析】 尽早彻底治疗，用药及时、足量、规则。首选头孢曲松钠

眼衣原体感染。禁用喹诺酮类药。性伴侣也应接受检查及治疗。

69、[A3/A4 型题]女性，23 岁，哺乳期，停经 44 日，B 型超声检查于宫腔内探及妊娠囊。准备行人工流产负压吸宫术，术前探宫腔 11cm 未感到底。一般情况好，阴道流血不多，无腹痛，无压痛及反跳痛，血压 100/70mmHg，心率 86 次/分。最可能的诊断应是()。

- A. 漏吸
- B. 人工流产综合反应
- C. 子宫穿孔
- D. 羊水栓塞。E, 仰卧位低血压综合征

【答案】C

70、[题干题]患者 14 岁，体格及智力发育与同龄人相似，已出现第二性征 3 年，一直无月经来潮。近 1 年常感下腹胀痛，每一至两月发作一次，每次持续 3~4 天，可自然缓解，近来偶于腹痛时伴有腰骶部胀痛及肛门坠胀，亦可自然缓解。2 月前无意间发现下腹部有一包块。查体：身高 160cm，体重 50kg，乳房发育好，女性体态，其他系统查体未发现异常。该患者妇科检查见阴阜、大小阴唇、阴蒂均发育正常，前庭内未见阴道开口，仅于相应位置见直径约 1cm 的紫蓝色组织向外膨出，直肠一腹部检查于阴道相应部位可扪及直径约 3cm 的条索状物，盆腔内可扪及直径约 10cm 类圆形包块，边界尚清晰，无压痛。双附件区均未扪及异常。该患者诊断考虑()。

- A. 外阴肿瘤
- B. 阴道肿瘤
- C. 子宫内膜异位症

D. 先天性处女膜闭锁。E, 先天性无阴道 F 网状畸形 G 卵巢肿瘤 H 子

宫肌瘤

【答案】D

