

2022 年妇产科主治医师试题及答案组卷

1、[题干]女，G1P0，孕 32 周，感头昏，乏力及食欲差，半月余，查：胎位，胎心及骨盆测量均正常，血红蛋白 80g/L，血细胞比容 25%。最可能的诊断是

- A. 缺铁性贫血
- B. 地中海贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 以上都不是。E. 巨幼红细胞性贫血

【答案】A

【解析】孕妇在孕期出现贫血多为缺铁性贫血，因消耗多摄入少而发病。以下几种情况，更容易发生贫血：孕期呕吐比较严重、频繁；前后两次怀孕间隔的时间短；怀的是双胞胎或多胞胎；日常的饮食中缺乏铁；怀孕之前的月经出血量较多。但是，大部分女性在怀孕开始时都没有储存足够的铁，来满足身体对铁需要量的增加，特别是到了孕期。当身体中没有足够的铁来制造你所需要的血红蛋白时，就会出现孕期缺铁性贫血症状。所以此题考虑为缺铁性贫血。

2、[题干]发生子宫内膜癌的高危因素不包括

- A. 糖尿病和高血压
- B. 肥胖
- C. 多生育

【答案】C

3、[单选]高催乳素血症选用()。

- A. LHRH
- B. 溴隐亭
- C. 氯米芬
- D. hCG。E, hMG

【答案】B

4、[题干]关于正常恶露，正确的是

- A. 胎盘或胎膜残留时恶露增多
- B. 浆液恶露含大量白细胞、坏死蜕膜组织等
- C. 恶露含有血液、胎盘绒毛碎片、坏死蜕膜组织等
- D. 血性恶露约持续1周。E, 白色恶露约持续1周

【答案】A

5、[题干]属于子宫内膜癌癌前病变的项目为

- A. 增生期子宫内膜
- B. 子宫内膜简单型增生
- C. 子宫内膜复杂型增生
- D. 子宫内膜不典型增生。E, 萎缩型子宫内膜

【答案】D

【解析】舌内膜脉瘤增生过长及舌内膜非典型增生过长属于癌前病变。

6、[题干]对于沙眼衣原体感染，下列哪项说法不恰当()。

- A. 沙眼衣原体不仅是沙眼的病原体，也是引起女性生殖道感染的常见病原体
- B. 泌尿生殖道沙眼衣原体感染是卫生部要求严格控制的性传播性疾病
- C. 孕妇生殖道衣原体感染不会发生垂直传播
- D. 衣原体感染新生儿最常侵犯眼结膜。E, 可用细胞培养分离衣原体

【答案】C

【解析】可用细胞培养分离衣原体

7、[题干]以下哪项是内因性均称型 FGR 的特点

- A. 脑重量轻，常有脑神经发育障碍，多伴有智力障碍
- B. 胎盘体积正常但功能下降，如梗死与钙化，加重胎儿宫内缺氧，导致新生儿脑神经受损
- C. 胎盘小，且组织异常
- D. 胎儿常有宫内缺氧，代谢不良。E, 新生儿外表呈营养不良或过熟儿状态，发育不均称，身长、头径与孕龄相符而体重偏低

【答案】A

【解析】内因性均称型 FGR 的特点是：①体重、身长、头径相称，均小于该孕龄正常值，新生儿身材矮小，外表无营养不良表现；②脑重

小，但组织无异常；④胎儿无缺氧表现，胎儿出生缺陷发生率高。围产儿病死率高，预后不良；⑤产后新生儿经常会出现脑神经发育障碍，伴小儿智力障碍。

8、[题干]脐动脉 S/D 比值在妊娠晚期的正常值为

- A. <3
- B. >2
- C. <2
- D. >3。E, <4

【答案】A

【解析】脐动脉 S/D 比值在妊娠晚期的正常值是小于 3。选 A。S/D 为胎儿脐动脉收缩压与舒张压的比值，与胎儿供血相关，当胎盘功能不良或脐带异常时此比值会出现异常，在正常妊娠情况下，随孕周增加胎儿需要增加 S 下降，D 升高，使比值下降，近足月妊娠时 S/D 小于

3. 妊娠 24 周前 S/D 约 3.5~5.5，一般不超过 5.5；24~30 周 S/D=2.5~5.0，一般不超过 5；30~36 周 S/D=2.5~4，一般不超过 4；36~40 周 S/D=1.7~3，一般不超过 3。

9、[题干]产后子宫收缩乏力大量出血时，用无菌纱条填塞宫腔止血，取出时间应为

- A. 8 小时后
- B. 16 小时后
- C. 24 小时后
- D. 36 小时后。E, 48 小时后

【解析】产后子宫收缩乏力大量出血时，用无菌纱条填塞宫腔止血，应在 24 小时后取出。【该题针对“异常分娩”知识点进行考核】

10、[题干]关于肾上腺不正确的叙述是

- A. 若雄激素分泌过多可致多囊卵巢综合征
- B. 先天性肾上腺皮质增生症会导致女性假两性畸形或女性男性化
- C. 少量雄激素为正常妇女的阴毛、腋毛、肌肉和全身发育所必需
- D. 雄激素分泌过多可致多毛、肥胖、痤疮等男性化表现。E, 肾上腺皮质分泌的雄激素为女性体内雄激素的次要来源

【答案】E

【解析】肾上腺是除卵巢外合成并分泌类固醇激素最重要的器官。它具有分泌多种激素的功能，主要包括盐皮质激素、糖皮质激素和性激素。肾上腺皮质分泌的性激素有少量雄激素及极微量雌、孕激素，其分泌的雄激素为女性体内雄激素的主要来源。少量雄激素为正常妇女的阴毛、腋毛、肌肉和全身发育所必需。若雄激素分泌过多，可抑制下丘脑分泌 GnRH，并有对抗雌激素的作用，使卵巢功能受到抑制而出现闭经，甚至多毛、肥胖、痤疮等男性化表现。临幊上常见的多囊卵巢综合征的病因之一，即是肾上腺源性的雄激素过多。先天性肾上腺皮质增生症患者由于存在 21-羟化酶缺陷，导致皮质激素合成不足，引起促肾上腺皮质激素 (ACTH) 代偿性增加，促使肾上腺皮质网状带雄激素分泌过多，临幊上导致女性假两性畸形或女性男性化表现。

11、[题干]25 岁初孕妇，34 周妊娠。近 1 周，体重增加 4kg，心悸、胸闷、咳嗽 1 天入院。检查：血压 150/110mmHg，心率 110 次/分，未闻及病理性杂音，呼吸 28 次/分，双肺底闻及细湿啰音，下肢水肿

理原则是

- A. 立即剖宫产
- B. 治疗 24 小时后剖宫产
- C. 病情控制后至妊娠 37 周终止妊娠
- D. 促胎肺成熟，观察 1 周终止妊娠。E, 等待自然临产

【答案】B

【解析】心衰控制 24~48 小时即应考虑终止妊娠。以剖宫产为宜。

12、[题干]属于生殖器官与邻近器官关系的项目，错误的是

- A. 膀胱充盈不影响盆腔检查
- B. 输尿管于宫颈内口水平外侧 2cm 向前进入膀胱
- C. 阴道前穹窿穿刺易引起膀胱损伤
- D. 阑尾炎症可波及右附件。E, 尿道长 4~5cm，邻近阴道易感染

【答案】A

13、[题干]关于子宫腺肌病正确的是()。

- A. 多数合并外在性子宫内膜异位症
- B. 多发生在初产妇
- C. 病灶中子宫内膜对卵巢激素高极为敏感
- D. 假孕疗法有效。E, 月经量增多，经期延长，继发痛经，子宫均匀增大和病灶质硬

【第 11 页】

【解析】子宫腺肌病的主要临床症状是月经量增多，经期延长，继发痛经，子宫均匀增大和病灶质硬；半数合并子宫肌瘤；多发生于30~50岁经产妇；对卵巢激素不敏感，假孕疗法和假绝经疗法对此病无效。

14、[题干]扁平骨盆()。

- A. 入口略呈三角形，骶坐切迹窄呈高弓形
- B. 入口横径较前后径稍长，骶坐切迹呈圆形
- C. 入口横径较前后径短，骶坐切迹较宽
- D. 入口横径较前后径长，骶坐切迹较窄。E, 入口横径较前后径短，骶坐切迹较窄

【答案】D

【解析】单纯扁平骨盆：骨盆入口呈横扁圆形，骶岬向前下突出，使骨盆入口前后径缩短而横径正常。

15、[题干]与子宫收缩乏力无关的项目为

- A. 膀胱充盈
- B. 高龄初产妇
- C. 过早使用腹压
- D. 水及电解质紊乱。E, 子宫平滑肌细胞内ATP酶增高

【答案】E

【解析】子宫收缩乏力的常见原因(1)头盆不称或胎位异常；(2)子宫因素；(3)精神因素；(4)内分泌失调；(5)药物影响；(6)其他

A. 小脓肿可采用非手术治疗

- B. 盆腔脓肿未形成时，应以药物为主，辅以物理疗法
- C. 已婚妇女可采用后穹隆途径排脓
- D. 脓肿较大时，须手术治疗。E, 可采用经腹腔排脓

【答案】E

17、[题干]下列概念，正确的是

- A. 妊娠 42 周之后分娩称过期产
- B. 妊娠 28 周至 37 周分娩称早产
- C. 出生时具有生命征象项者称活产
- D. 临产后证实胎儿存活，在分娩过程中胎儿死亡称死产。E, 妊娠 38 周至 42 周分娩为足月产

【答案】D

【解析】过期产为妊娠满 42 周及其后分娩，称为过期产。而 A 答案妊娠 42 周之后分娩称过期产，不包含 42 周，所以是错误的。D 项正确：临产后证实胎儿存活，在分娩过程中胎儿死亡称死产。

18、[题干]适用于下丘脑性无排卵的是()。

- A. 绒毛膜促性腺激素(hCG)
- B. 绝经期促性腺激素(hMG)
- C. 氯底酚胺

D. 溴隐亭。E, LHRH

【答案】E

【解析】黄体生成激素释放激素(LHRH):为下丘脑分泌的十肽激素。
LHRH 脉冲疗法适用于下丘脑性无排卵

19、[题干]女，28岁，于妊娠早期有早孕反应，尿HCG阳性。于妊娠17周时感有胎动。B超示单胎，头位，见心脏搏动。现为妊娠26周，近2周来自觉胎动停止，腹部不再增大，来门诊检查，宫底平脐，未闻及胎心，复查A超未见胎心搏动和胎动。最需要的实验室检查是

- A. 血糖
- B. 凝血功能检查
- C. 肝功能
- D. 肾功能。E, 白细胞计数分类

【答案】B

【解析】从题干来看，本题的诊断很可能为死胎。胎儿死亡，尚未排出，应行凝血功能检查。若纤维蛋白原小于1.5g/L，血小板小于100乘以10⁹/L，可用肝素治疗。一般用药24~48小时后，可使纤维蛋白原和血小板恢复到有效止血水平，然后再引产，并备新鲜血，注意预防产后出血和感染。

20、[题干]人工流产术出现血压下降、心率减慢、面色苍白。应考虑诊断为()。

- A. 人工流产综合征
- B. 子宫穿孔
- C. 栓塞
- D. 漏吸。E, 吸宫不全

【答案】A

【解析】本例为人工流产综合反应。

21、[题干]关于产褥期保健的说法不正确的是

- A. 适当活动
- B. 可促进产后生理功能恢复
- C. 计划生育指导
- D. 产后 8 周去医院做产后健康检查。E, 目的是防止产后出血

【答案】D

【解析】产褥期保健的目的是防止产后出血、感染等并发症的发生，促进产后生理功能恢复。产褥期保健包括适当活动及做产后健身操、计划生育指导、产后检查，包括产后访视和产后健康检查，产妇应于产后 6 周去医院做产后健康检查。故 D 选项错误。

22、[题干]属于滴虫阴道炎的项目，错误的是

- A. 滴虫能侵入尿道、尿道旁腺、膀胱及肾盂
- B. 分泌物呈灰黄、稀薄、有泡沫，阴道黏膜可见散在红色斑点
- C. 有外阴瘙痒、性交疼痛、尿频、尿痛等症状，可导致不孕

酸性液灌洗阴道后复查

【答案】E

【解析】滴虫阴道炎根据临床表现，生理盐水悬滴法在阴道分泌物中找到滴虫即可确诊。

23、[题干]节律与胎心率相一致的声音是()。

- A. 腹主动脉音
- B. 子宫血流杂音
- C. 脐带杂音
- D. 胎动音。E, 肠蠕动音

【答案】C

【解析】脐带杂音为脐带血流受阻出现的与胎心率一致的吹风样低音响。

24、[题干]妊娠期高血压疾病合并肺水肿者用()()。

- A. 硫酸镁
- B. 安定
- C. 心痛定
- D. 甘露醇。E, 速尿

【答案】E

【解析】对于利尿剂的应用一般不主张，只有在全身性水肿、急性心衰、肺水肿、血容量过多伴有隐性水肿时应用。

- A. 医学实践活动是医学伦理学产生的结果
- B. 医学实践活动是医学伦理学的尺度和方式
- C. 医学道德是医学工作者实现为人类健康服务的保障
- D. 只要技术过硬就能够实现全心全意为人民健康服务的目的。E, 在现代医学科学研究中医学道德服从医学成果

【答案】C

26、[题干]关于宫缩乏力致产程延长的后果，下列哪项是错误的()。

- A. 产后出血
- B. 生殖道瘘管
- C. 胎盘植入
- D. 产褥感染。E, 尿潴留

【答案】C

27、[题干]无排卵性功能失调性子宫出血的临床表现不包括

- A. 月经周期紊乱
- B. 出血期下腹部疼痛
- C. 出血量时多时少
- D. 停经后较大量阴道流血。E, 经期长短不一

【答案】B

【解析】青春期功血表现为少女月经紊乱;经期长短不一，经期长短不一，经量或多或少，有时甚至会大量出血。更年期功血表现为绝

因有短期闭经史，有时会被误为“流产”。

28、[题干]产前凝血功能正常，胎儿娩出后产妇有一过性呼吸困难，胎儿娩出后，产妇阴道大量涌出不凝血，血尿。应考虑发生继发性()。

- A. 羊水栓塞
- B. 子痫前期重度
- C. 产后出血
- D. 子宫破裂。E, 软产道裂伤

【答案】A

【解析】给予缩宫素引产是羊水栓塞诱发因素。在娩出一男婴后，产妇突然惊叫一声，血压迅速下降、昏迷，产妇数分钟后死亡是羊水栓塞的典型症状。

29、[单选]外用避孕药膜的避孕原理主要为()()。

- A. 对异物的组织反应而影响受精卵着床
- B. 杀精子或改变精子功能
- C. 抑制排卵
- D. 改变子宫内膜形态与功能，不利于受精卵着床。E, 阻止精子进入宫腔

【答案】B

30、[题干]女性，29岁，原发不孕2年，月经规律，周期28~30

最大卵泡 1.2cm，月经第 14 天左卵巢最大卵泡 1.8cm，月经第 18 天左卵巢卵泡 2.5cm，透声欠佳，内有网格状回声，同时测基础体温双相。认为()。

- A. 正常排卵
- B. LUFS
- C. PCOS
- D. 左卵巢良性肿瘤。E, 左卵巢巧克力囊肿

【答案】B

【解析】超声检查有卵泡发育，但是没有排卵，基础体温双相，应是黄素化未破裂卵泡综合征。

- 31、[题干]下列哪项不是卵巢瘤的并发症
- A. 蒂扭转
 - B. 囊肿破裂
 - C. 红色变性
 - D. 感染。E, 恶性变

【答案】C

【解析】红色变性是子宫肌瘤的一种变性，不是并发症。子宫肌瘤红色样变多见于妊娠期或产褥期，为肌瘤的一种特殊类型坏死，发生机制不清，可能与肌瘤内小血管退行性变引起血栓及溶血，血红蛋白渗入肌瘤内有关。患者可有剧烈腹痛伴恶心呕吐、发热、白细胞计数升高，检查发现肌瘤迅速增大、压痛。肌瘤剖面为暗红色。

左腿屈曲，测量第 5 腰椎棘突下至耻骨联合上缘中点的距离为 18cm，坐骨结节间径 7.5cm，对角径 13cm，尺桡周径 13cm。该孕妇骨盆入口前后径值约为

- A. 12.5cm
- B. 10cm
- C. 11cm
- D. 11.5cm。E, 12cm

【答案】D

【解析】骶耻外径值减去 1/2 尺桡周径或对角径值减去 1.5~2cm 即相当于骨盆入口前后径值。

33、[题干]29 岁经产妇，前次妊娠患妊娠期高血压疾病，娩出的胎儿体重 4100g，且娩出后不久死亡。现又妊娠 20 周，血压 150/90mmHg，尿糖阳性，下肢水肿。本侧应进行的辅助检查项目为

- A. 测定基础代谢率
- B. 胸部 x 线摄片
- C. 检查尿常规有无管型
- D. 检测肝功能。E, 检查空腹血糖值

【答案】E

34、[题干]未产妇女，23 岁，因性交后阴道分泌物增多伴点滴出血 2 周来诊，否认性病史及服避孕药史。查体：T37.2℃，腹部无压痛包块。妇科检查：阴道脓性分泌物，革兰染色示细胞内革兰阴性双球菌，妊娠试验阴性。月经正常。最可能的诊断是

A. 慢性宫颈炎

B. 梅毒

C. 急性盆腔炎

D. 急性淋病性子宫内膜炎。E, 急性淋病性宫颈炎

【答案】E

35、[题干题]患者 14 岁，体格及智力发育与同龄人相似，已出现第二性征 3 年，一直无月经来潮。近 1 年常感下腹胀痛，每一至两月发作一次，每次持续 3~4 天，可自然缓解，近来偶于腹痛时伴有腰骶部胀痛及肛门坠胀，亦可自然缓解。2 月前无意间发现下腹部有一包块。查体：身高 160cm，体重 50kg，乳房发育好，女性体态，其他系统查体未发现异常。该患者妇科检查见阴阜、大小阴唇、阴蒂均发育正常，前庭内未见阴道开口，仅于相应位置见直径约 1cm 的紫蓝色组织向外膨出，直肠一腹部检查于阴道相应部位可扪及直径约 3cm 的条索状物，盆腔内可扪及直径约 10cm 类圆形包块，边界尚清晰，无压痛。双附件区均未扪及异常。该患者诊断考虑()。

A. 外阴肿瘤

B. 阴道肿瘤

C. 子宫内膜异位症

D. 先天性处女膜闭锁。E, 先天性无阴道 F 两性畸形 G 卵巢肿瘤 H 子宫肌瘤

【答案】D

36、[题干]28岁妇女，主诉白带增多，检查宫颈阴道部宫口周围外观呈细颗粒状红色区，占整个宫颈面积的2/3，宫颈刮片巴氏染色Ⅱ级。本例恰当处置应是

- A. 涂硝酸银腐蚀
- B. 阴道内放置药物
- C. 物理治疗
- D. 宫颈锥形切除。E, 宫颈切除

【答案】C

37、[题干]女性，33岁，已婚，两年前生育一胎，产后放置金属环避孕，两月前因带器妊娠而行人工流产术。要求再次放环，不宜选择的宫内节育器是()。

- A. 惰性宫内节育器
- B. 母体乐
- C. 曼月乐
- D. Tcu380。E, Vcu220

【答案】A

【解析】金属环属于惰性宫内节育器，已有带器妊娠率不宜再次选用。

38、[题干]女，30岁，月经周期规律，为28日，基础体温呈双相型，若于月经周期第12日刮宫，镜检子宫内膜应为()。

- A. 增殖期中期
- B. 增殖期晚期
- C. 分泌期早期
- D. 分泌期中期。E, 分泌期晚期

【答案】B

【解析】月经周期28日，则其排卵期为第14日，因此，月经周期第12日刮宫应为增殖期晚期。

- 39、[题干]葡萄胎的随访，应除外的是()。
- A. 共随访2年
 - B. 随访期间如p-HCG降至正常后不需要再监测p-HCG
 - C. 葡萄胎随访期间应做好避孕工作。
 - D. 注意有无阴道异常流血、咳嗽、咯血等症状。E, 必要时做B超、摄胸部X线片或CT检查

【答案】B

【解析】HCG定量测定，在葡萄胎排空后每周1次直至HCG正常后3个月，以后3个月每2周1次，然后每月1次持续至少半年。如第2年未妊娠，可每半年1次，共随访2年。

- 40、[题干]有关女性生殖器结核病理，正确的是

A. 轮状管结核多为双侧性

- B. 盆腔腹膜结核多合并子宫内膜结核
- C. 卵巢结核易侵犯卵巢深层
- D. 宫颈结核较多见，呈菜花状。E, 输卵管结核常由子宫内膜结核蔓延而来

【答案】A

- 41、[题干]妊娠期及分娩期发现横位，正确处理为
- A. 足月活胎，于临产前行择期剖宫产
 - B. 临产后胎膜已破，胎心正常，可行外倒转术
 - C. 忽略性横位，胎心正常，可从阴道分娩
 - D. 忽略性横位，胎心已消失，子宫下段有压痛，行内倒转术。E, 忽略性横位阴道分娩，早产儿均可存活

【答案】A

【解析】剖宫产指征：狭窄骨盆、软产道异常、胎儿体重 $>3500g$ 、胎儿窘迫、高龄初产、有难产史、不完全臀先露等。

- 42、[题干]与妊娠期高血压疾病严重程度成正比的是

- A. 少尿
- B. 肝功能异常
- C. 无尿
- D. 转氨酶。E, 蛋白尿

【答案】E

正比。

43、[题干]30岁已婚妇女，停经48天，剧烈腹痛2天，阴道不规则流血1天，今晨从阴道排出三角形膜样组织，检查：贫血外貌，下腹部压痛、反跳痛明显。正确治疗措施应选择

- A. 静脉滴注缩宫素
- B. 止痛治疗
- C. 应用止血药
- D. 立即行刮宫术。E, 行剖腹探查术

【答案】E

【解析】根据该妇女表现：停经史、腹痛及阴道出血结合查体考虑异位妊娠有内出血，应手术。

44、[题干]子痫病人首选()。

- A. 硫酸镁
- B. 安定
- C. 心痛定
- D. 甘露醇。E, 速尿

【答案】A

45、[题干]产前凝血功能正常，胎儿娩出后产妇有一过性呼吸困难，胎儿娩出后，产妇阴道大量涌出不凝血，血尿。应考虑发生继发性()。

- A. 羊水栓塞

C. 产后出血

D. 子宫破裂。E, 软产道裂伤

【答案】A

【解析】给予缩宫素引产是羊水栓塞诱发因素。在娩出一男婴后，产妇突然惊叫一声，血压迅速下降、昏迷，产妇数分钟后死亡是羊水栓塞的典型症状。

46、[题干]患者女，38岁。上环10年，腹痛、发热1周。查体：T：38.5℃，子宫正常大，子宫左侧可及一9cm的包块，触痛明显，活动差，曾用抗生素治疗1周，症状不缓解。正确的处理是()。

A. 血培养加药物敏感试验，更换抗生素继续治疗

B. 应用抗生素的同时剖腹探查，术前取环

C. 经阴道穿刺包块，明确诊断

D. 激素退热，加大抗生素的剂量并联合用药。E, 应用抗生素的同时取环，加中药治疗降温

【答案】B

47、[题干]固定宫颈位置的主要韧带是()。

A. 圆韧带

B. 主韧带

C. 骨盆漏斗韧带

D. 阔韧带。E, 宫骶韧带

【答案】B

【解析】主韧带是固定宫颈位置保持子宫不下垂的主要结构；圆韧带有维持子宫呈前倾位置的作用；阔韧带可限制子宫向两侧倾斜；宫骶韧带间接维持子宫处于前倾位置；骨盆漏斗韧带将卵巢连于骨盆壁。

48、[题干]患者女性，32岁，妊娠31周，少量阴道流血，以往曾有3次早产史。主要处理应是

- A. 注意休息，并给以镇静剂
- B. 氧气吸入，给予止血剂
- C. 抑制宫缩，促进胎儿肺成熟

- D. 任其自然。E. 左侧卧位及吸氧

【答案】C

【解析】患者既往有多次早产，此题有少量阴道流血，要考虑先兆早产，应尽量延长孕周，待胎肺成熟。

49、[题干]29岁，初产妇。孕35周，水肿4周，血压增高3天伴有尿蛋白(+)，ALT和AKP轻度增高，无胃肠道症状。首先应考虑的诊断为

- A. 妊娠期胆汁淤积症
- B. 妊娠期急性脂肪肝
- C. 妊高征肝损害

- D. 药物性肝炎。E. 急性肝炎

【答案】C

【解析】妊高征肝损害是在高血压、蛋白尿、水肿和肾功能受损的

50、[题干]慢性宫颈炎与子宫颈癌早期肉眼难以鉴别。确诊方法应是

- A. 宫颈刮片细胞学检查
- B. 氮激光肿瘤固有荧光诊断法
- C. 宫颈及宫颈管活检
- D. 宫颈碘试验。E, 阴道镜检查

【答案】C

51、[题干]关于外阴恶性肿瘤的描述，哪项是错误的()。

- A. 外阴鳞状细胞癌是最常见的外阴恶性肿瘤，治疗原则以放疗为主
- B. 外阴基底细胞癌治疗原则是较广的病灶切除，不需行根治术及腹股沟淋巴结清扫
- C. 外阴黑色素瘤治疗原则是外阴根治术及腹股沟、盆腔淋巴结清扫
- D. 外阴鳞状细胞癌放疗的指征包括有淋巴结转移、切缘残留癌组织、病灶靠近尿道和直肠近端，癌灶范围大不可能切净或切除困难者。E, 外阴鳞状细胞癌的手术范围取决于病灶的部位和分期

【答案】A

【解析】外阴癌首选手术治疗，辅助放化疗。

52、[题干]25岁初孕妇，34周妊娠。近1周，体重增加4kg，心悸、胸闷、咳嗽1天入院。检查：血压150/110mmHg，心率110次/分，未闻及病理性杂音，呼吸28次/分，双肺底闻及细湿啰音，下肢水肿(++)，尿蛋白(++)，30分钟尿量30ml，胎心率152次/分。选择下列

A. 吗啡

B. 甘露醇

C. 呋塞米

D. 酚妥拉明。E, 毛花昔 C(西地兰)

【答案】B

【解析】心衰时应避免使用甘露醇等渗透性利尿药，以免增加血容量，加重心衰。

53、[题干]盆腔血栓性静脉炎多发生于

A. 产后 1-2 周

B. 产后 2-3 周

C. 产后 3-4 周

D. 产后 4-5 周。E, 产后即出现

【答案】A

【解析】需氧性链球菌是外源性感染的主要致病菌，其中 β 溶血性链球菌致病能力最强，与产褥感染关系密切，可引起严重感染。

54、[题干]23 岁，孕 50 天。在外院作人工流产。现术后 8 天，小腹疼痛. 阴道流血未止。量中等. 有臭味，体温 38℃，血象白细胞 $15 \times 10^9/L$ ，中性 0.9，HB100g/L。妇检：阴道内血性分泌物有臭味，宫体略大，触痛明显，附件略增厚而压痛，下列何项为该妇女的最可能诊断

A. 不全流产

- B. 流产继发感染
- C. 宫外孕继发感染
- D. 急性盆腔炎。E, 难免流产

【答案】B

【解析】患者流产后分泌物有臭味，白细胞高于正常，分泌物有臭味等体征均显示患者为流产继发感染，而流产不全只会有流血不止，但不会有感染症状。附件略增厚为人工流产术后出现的表现，仅此项即可排除为宫外孕。

55、[题干]选用外转胎位术纠正的臀先露最佳时期为

- A. 妊娠 22~24 周
- B. 妊娠 26~28 周
- C. 妊娠 30~32 周
- D. 妊娠 32~34 周。E, 妊娠 38~40 周

【答案】D

【解析】于妊娠 32~34 周行外转胎位术。【该题针对“异常分娩”知识点进行考核】

56、[题干]孕妇感染淋菌对胎儿的影响不正确的是()。

- A. 胎儿宫内生长受限

- B. 胎儿窘迫
- C. 死胎
- D. 死产。E, 黏膜炎

【答案】E

【解析】孕妇感染淋菌对胎儿的威胁为早产和宫内感染，易发生胎儿窘迫、胎儿宫内生长受限、死胎、死产等。

57、[题干]属于羊水过多的项目，正确的是

- A. 羊水过多发病率为 0.1%
- B. 急性羊水过多常发生在妊娠 28~32 周
- C. 羊水性状与正常者有差异
- D. 妊娠任何时期羊水量>2000ml。E, 妊娠 28 周后羊水量>1000mL

【答案】D

【解析】羊水过多：妊娠任何时期羊水量>2000ml。羊水过多发生率约为 0.5%~1%;急性羊水过多多发生在妊娠 20~24 周。

58、[A3/A4 型题]三十一岁妇女，下腹疼痛，经期加重已 8 年，经期长，经量无明显改变。妇科检查：阴道后穹隆处可触及几个小结节，质地硬，宫体后屈活动欠佳，较正常稍大，双侧附件区轻压痛。本例应考虑的疾病是()。

- A. 子宫肌瘤
- B. 子宫腺肌病

D. 慢性盆腔炎。E, 结核性盆腔炎

【答案】B

59、[题干]下列女性生殖器官发育异常，合并存在泌尿系统畸形可能性最大的是

- A. 单角子宫
- B. 双子宫双阴道
- C. 残角子宫
- D. 幼稚子宫。E, 无子宫无阴道

【答案】E

60、[题干]葡萄胎刮宫后半年内，妊娠试验由阴转阳，肺部有散在棉絮状阴影，范围未超过一侧肺叶的一半。子宫如孕 40 天，大而软，双侧附件无异常。进一步确诊需哪项检查()。

- A. 尿妊娠稀释试验
- B. 血 HCG 放免测定
- C. B 超检查
- D. 诊断性刮宫。E, 宫腔镜检查

【答案】C

61、[题干]孕 28 周，末次月经为 1999 年 10 月 27 日，平素月经规律，5/30 天，停经 40 天出现早孕反应，孕 4 个多月自感胎动，孕 25 周时 B 超示胎儿如孕 23 周大小。对推算预产期无帮助的是()。

- B. 平时月经周期
- C. 早孕反应开始出现时间
- D. 胎动开始时间。E, 孕 23 周的 B 超检查

【答案】E

【解析】推算预产期最可靠的依据是末次月经。

62、[A3/A4 型题] 28 岁，女，有不洁性生活史。现孕 5 个月，于大阴唇出现圆形直径 1~2cm 边界清晰的皮疹，表面略高于皮肤，可见溃烂。最可能的诊断是()。

- A. 尖锐湿疣
- B. 结核
- C. 硬下疳
- D. 淋病。E, 外阴癌

【答案】C

63、[题干] 决定分娩的四因素不包括

- A. 产道
- B. 胎儿
- C. 精神心理因素
- D. 医疗环境。E, 产力

【答案】D

64、[题干]怀疑为子宫内膜不规则脱落，理想取内膜活组织检查的时间应为

- A. 月经第 1 日
- B. 月经第 5 日
- C. 月经干净后 3 日
- D. 月经周期中间。E, 月经来潮前 12 小时

【答案】B

【解析】此时旧的子宫内膜已经脱落干净，新的子宫内膜刚刚开始生长，子宫内膜的厚度适中。这时进行操作，不至于损伤子宫内膜而引起多量出血。所以本题选 B。

65、[题干]与子宫肌瘤经血量增多关系密切的项目为

- A. 肌瘤大小
- B. 肌瘤数目
- C. 肌瘤生长部位
- D. 肌瘤与子宫肌层关系。E, 患者年龄

【答案】C

【解析】月经改变：是子宫肌瘤最常见的症状，多见于较大的肌壁间肌瘤和粘膜下肌瘤。主要表现为经量增多、经期延长，严重时可致贫血。

66、[题干]孕妇于妊娠期患急性病毒性肝炎时，口服新霉素是为了

- B. 减少游离氨及其他毒素的形成
- C. 消除体内感染灶
- D. 控制重症肝炎进展。E, 抑制厌氧菌

【答案】B

【解析】 新霉素用于结肠手术前准备、肝昏迷时作为辅助治疗。

67、[题干]属于羊水过多中最大的羊水暗区的标准，不正确的是

- A. $\geq 8\text{cm}$ 为羊水过多
- B. $>15\text{cm}$ 为重度羊水过多
- C. $8\sim 11\text{cm}$ 为轻度羊水过多
- D. $12\sim 15\text{cm}$ 为中度羊水过多。E, 英文简写为 AFI

【答案】E

【解析】 羊水最大暗区垂直深度(AFV): $\geq 8\text{cm}$ 诊断为羊水过多，其中 AFV $8\sim 11\text{cm}$ 为轻度羊水过多， $12\sim 15\text{cm}$ 为中度羊水过多， $>15\text{cm}$ 为重度羊水过多。

- 68、[题干]前置胎盘常见病因包括
- A. 子宫内膜病变与损伤
 - B. 胎盘面积过大
 - C. 胎盘异常，如副胎盘等
 - D. 受精卵滋养层发育迟缓。E, 以上均是

【答案】E

【解析】ABCD 均为前置胎盘的先兆征。

69、[题干]53岁妇女，绝经2年，阴道分泌物增多伴腰痛2个月，偶有少量阴道出血。妇科检查：宫颈结节状增大，直径5cm，质硬，触血(+)，左侧主韧带条索状增粗>1/2，右侧主骶韧带内1/2增粗，均弹性下降。临床分期为()。

- A. I b 期
- B. II a 期
- C. II b 期
- D. IIIa 期。E, IIIb 期

【答案】C

70、[题干]不能推算出预产期的项目是()。

- A. 末次月经第一天
- B. 早孕反应开始出现的日期
- C. 开始察觉胎动的日期
- D. 测量子宫长度值。E, 测量腹围值

【答案】E

【解析】测量腹围值不能计算妊娠周数

