

## 2022 年妇产科主治医师试题及答案组卷

1、[题干]输尿管解剖正确的描述是()。

- A. 在骶髂关节处跨髂外动脉起点的前方进入腹腔内
- B. 在位于宫颈阴道上部的外侧 1.5~2.0cm 处, 斜向外穿越输尿管隧道进入膀胱
- C. 输尿管全长约 20cm
- D. 内径最粗达 4mm。E, 在子宫颈部外侧约 2.0cm, 于子宫动脉下方穿过

**【答案】**E

**【解析】**输尿管全长约 30cm, 粗细不一, 内径最细 3~4mm, 最粗 7~8mm; 在骶髂关节处跨髂外动脉起点的前方进入骨盆腔(盆段); 在位于宫颈阴道上部外侧 1.5~2.0cm 处, 斜向前内穿越输尿管隧道进入膀胱。

2、[题干]经产妇, 妊娠 39 周, 5 小时前开始出现规律宫缩。现宫缩持续 45 秒, 间隔 3 分钟, 胎心 140 次/分, 枕左前位, 宫口开大 5cm, 前羊膜囊明显突出, 骨盆检查正常。此时最恰当的处理措施为

- A. 灌肠促产程进展和减少污染住院
- B. 立即住院待产
- C. 急送产室消毒接生
- D. 行人工破膜。E, 留在急诊室观察病情变化

**【解析】**临产开始时，宫缩间歇期 5~6 分钟，持续约 30 秒。随产程进展，宫缩间歇期渐短，持续时间渐长。母儿状况佳，适合立即分娩。

3、[题干]宫颈息肉的病理变化为

- A. 宫颈管局部黏膜被鳞状上皮覆盖
- B. 宫颈组织充血水肿，腺体和间质增生
- C. 宫颈管局部黏膜增生，向宫颈外口突出
- D. 宫颈管黏膜及黏膜下组织充血、水肿，结缔组织增生。E, 宫颈鳞状上皮化生

**【答案】**C

**【解析】**宫颈息肉：宫颈管黏膜增生形成的局部突起病灶称为宫颈息肉，息肉常有蒂自基底部向宫颈外口突出。

4、[题干]妊娠 10 周内的人工流产最常用的措施是

- A. 依沙吖啶羊膜腔注射
- B. 负压吸引
- C. 钳刮
- D. 天花粉肌注。E, 缩宫素静脉滴注

**【答案】**B

**【解析】**负压吸引术人工流产术是用手术终止妊娠的方法。负压吸引术适用于孕 10 周以内者，可用吸管伸入宫腔，以负压将胚胎组织吸

证者。2. 因某种疾病不宜继续妊娠者。

5、[题干]25 岁初产妇，现妊娠 35 周，产前检查发现宫高 39cm，腹围 108cm，腹壁皮肤张力较大，胎位不清，胎心遥远。人工破膜时哪项处理不当？

- A. 放羊水后腹部放置沙袋以防休克
- B. 采用低位破膜
- C. 采用高位破膜
- D. 使羊水缓慢流出。E, 破膜放羊水过程中要注意血压、脉搏和阴道流血情况

**【答案】** B

**【解析】** 低位破膜就是在胎膜下半部分破了，羊水会一下流出很多，但随着胎儿的自己挪动，有可能会把破的洞堵上，低位破膜一般用于很快就要临产的患者。

6、[题干]子宫肌瘤在妊娠期最常见()。

- A. 继发变性
- B. 脂肪变性

- C. 玻璃样变
- D. 肉瘤样变性。E, 红色变性

**【答案】** E

7、[题干]黄体功能不足的发病机制不包括

- A. LH 不足

C. 卵泡期 FSH 缺乏

D. 孕激素分泌减少。E, 卵泡期雌激素分泌减少

**【答案】** B

**【解析】**

8、[单选]妊娠合并早期心力衰竭见于()。

A. 孕 34 周心悸，气短，自幼即发绀，从未能参加体力劳动，能平卧，肺无啰音

B. 孕 34 周气急，发绀，不能平卧，肺底部持续湿啰音，颈静脉充盈

C. 孕 34 周心悸，气促，心界稍扩大，心尖区可闻及 II 级柔和收缩期杂音

D. 孕 34 周心悸，气急，心尖区可闻及 III 级收缩期杂音及舒张期杂音。E, 孕 34 周，轻微活动即有胸闷，气急，静息心率 114 次/分，呼吸 22 次/分

**【答案】** E

**【解析】**轻微活动即有胸闷，气急，静息心率 114 次/分，呼吸 22 次/分为妊娠期早期心力衰竭表现。

9、[题干]关于不协调性宫缩乏力，叙述错误的是()。

A. 多见于高龄初产妇

B. 多见于精神过度紧张者

C. 可见枕后位或头盆不称者  
D. 宫缩特点是节律不协调，伴极向倒置。E, 宫缩间歇时，子宫完全放松

**【答案】**E

**【解析】**不协调宫缩时宫缩间歇期子宫不完全放松。

10、[题干]持续性枕后位临床表现不正确的是()。

- A. 宫颈扩张缓慢，宫颈水肿
- B. 产妇过早出现肛门坠胀及排便感
- C. 产妇腹部中线两侧均可触及胎儿肢体

D. 阴道检查，胎头矢状缝位于骨盆斜径上，前囟位于骨盆侧前方，后囟位于骨盆侧后方。E, B 超检查，胎儿脊柱位于宫腔侧前方

**【答案】**E

11、[A1/A2 型题]初产妇，26 岁，妊娠 39 周，于早晨 6 时出现规则腹痛，下午 8 时宫口开大 9cm，自然破膜，阴道检查，胎头后囟在左后方，矢状缝于左斜径一致，触不到前囟，无头盆不称。最可能的诊断是()。

- A. 枕后位
- B. 无胎儿窘迫
- C. 宫缩乏力
- D. 枕前位。E, 枕横位

**【答案】**A

12、[题干]26岁风心病妇女，停经7周，尿妊娠试验阳性，B型超声检查见妊娠环。近1周自觉心悸气短，有时痰中带血丝。此患者的最佳处理应是()。

- A. 给地高辛 0.25mg，每日2次口服
- B. 间断吸氧
- C. 给予广谱抗生素预防感染

D. 严密观察经过，对症处理。E, 入院后对症治疗，必要时尽早终止妊娠

**【答案】E**

13、[题干]27岁，妇女，无职业，孕2产2，产后阴道脱出一物2年，日渐加重而来就诊，查：一般状态良好，妇查：加腹压时见宫颈及部分宫体脱出阴道口外，宫颈长4cm，阴道前后壁膨出，其处理应是

- A. 使用子宫托
- B. 行曼氏手术
- C. 阴式子宫全切+阴道前后壁修补术
- D. 行宫颈部分切除术。E, 经腹行子宫全切术

**【答案】B**

**【解析】** 首选应该是曼氏手术。曼氏手术是治疗子宫脱垂安全、有效、简单、经济的手术方法之一，其最大特点是术式较简单，不需进入腹腔，对患者影响较少。Manchester Operation 即曼氏手术，全称

脱垂 I、II 度，伴宫颈延长及阴道前后壁膨出，重度宫颈炎经电熨术治疗无效并希望保留子宫的患者。

14、[题干]目前前置胎盘围产儿死亡率为()。

A. <10%

B. 15%

C. 20%

D. 30%。 E, 50%

**【答案】** A

15、[A1/A2 型题]哪一对韧带对防止子宫脱垂最重要()。

A. 圆韧带

B. 骨盆漏斗韧带

C. 子宫卵巢韧带

D. 阔韧带。 E, 主韧带

**【答案】** E

16、[题干]与导致臀先露无关的因素是

A. 前置胎盘

B. 羊水过多

C. 原发性宫缩乏力

D. 胎头衔接受阻。 E, 羊水过少

**【答案】** C

- 17、[题干]外阴鳞状细胞癌最易转移的途径为
- A. 淋巴转移
  - B. 沿皮肤侵至阴道
  - C. 血行转移
  - D. 淋巴转移和血行转移。E, 以上都不是

**【答案】** A

**【解析】**除直接浸润外，因外阴有丰富的淋巴网，主要为淋巴转移。晚期可有血行转移。

18、[A3/A4 型题]女性，23 岁，哺乳期，停经 44 日，B 型超声检查于宫腔内探及妊娠囊。准备行人工流产负压吸宫术，术前探宫腔 11cm 未感到底。一般情况好，阴道流血不多，无腹痛，无压痛及反跳痛，血压 100/70mmHg，心率 86 次/分。不恰当的处理措施应是()。

- A. 暂停人工流产
- B. 严密观察患者的生命体征
- C. 给予静脉抗生素预防感染
- D. 肌内注射缩宫素 20U。E, 立即行剖腹探查术

**【答案】** E

19、[题干]大于 33 周，胎儿肺已成熟的 HELLP 综合征发生胎儿窘迫治疗原则为

- A. 终止妊娠



- B. 延长孕周
- C. 对症治疗
- D. 适当扩容。E, 解痉

**【答案】** A

**【解析】**  $\geq 32$  周或胎儿肺已成熟，胎儿窘迫，先兆肝破裂及病情危重者应立即终止妊娠。

20、[题干]淋病于妊娠期间治疗，正确的是

- A. 临床症状消失为治愈
- B. 青霉素过敏可选用喹诺酮类药物
- C. 多合并支原体感染，应给予抗支原体药物
- D. 用药必须足量及时。E, 肌肉注射青霉素效果佳

**【答案】** D

21、[题干]首次产前检查应在何时进行最合适

- A. 确定早期妊娠
- B. 妊娠 12 周
- C. 妊娠 20 周
- D. 妊娠 24 周。E, 妊娠 28 周以后

**【答案】** A

**【解析】** 应在确诊妊娠时进行首次产检。

22、[题干]矫正臀位最适合的时间是妊娠()。

- A. 20 周
- B. 24 周
- C. 30 周
- D. 34 周。E, 36 周

**【答案】** C

23、[题干]属于子宫肌瘤的项目，错误的是

- A. 玻璃样变为癌前病变
- B. 浆膜下肌瘤常无经量增多症状
- C. 肌壁间肌瘤占 60%~70%
- D. 多见于中年妇女。E, 红色变多发生在产褥期

**【答案】** A

**【解析】** 玻璃样(透明)变最常见。切面旋涡状结构消失，代之以均质透明状物、镜下见变性区域平滑肌细胞消失，为透明的无结构区。

24、[题干]子宫肌瘤患者与临床症状轻重关系密切的是

- A. 肌瘤大小
- B. 肌瘤数目

C. 肌瘤生长部位

D. 肌瘤与肌壁关系。E, 肌瘤有无变性

【解析】此题有纰漏。症状的出现与肌瘤部位，生长速度及肌瘤变性关系密切，不只与肌瘤生长部位关系密切。

25、[题干]属于外阴汗腺瘤特点的项目，错误的是

- A. 生长缓慢
- B. 直径为 1~2cm
- C. 与表皮粘连
- D. 极少恶变。E, 包膜完整

【答案】C

【解析】汗腺瘤约占外阴良性肿瘤的 13%，多发生于大阴唇及会阴汗腺。由于小阴唇缺乏腺体，很少发生。多见于性发育成熟妇女。肿瘤为一界限清楚，隆起周围皮肤的结节，一般直径小于 1cm。也偶可囊性变，达鸡蛋大小。瘤体可推动。结节质地软硬不一，缓慢生长，无症状。有时由于囊内的乳头状生长可突出溃破之壁外，呈少量出血，伴感染时有发痒、痛感症状。CO<sub>2</sub> 激光聚焦(输出功率 20w~25w)切割治疗。术后，外覆无菌敷料保护创口，定期检查伤口有无感染等。辅助常规抗菌消炎药及多簇维生素类制剂。

26、[题干]不能预防风心病孕妇发生心衰的是()。

- A. 吸氧
- B. 产时产后给予镇静剂
- C. 静注麦角新碱预防产后出血
- D. 胎儿娩出后在腹部放置沙袋。E, 手术缩短第二产程

【答案】C

27、[题干]以下哪项是内因性均称型 FGR 的特点

- A. 脑重量轻，常有脑神经发育障碍，多伴有智力障碍
- B. 胎盘体积正常但功能下降，如梗死与钙化，加重胎儿宫内缺氧，导致新生儿脑神经受损
- C. 胎盘小，且组织异常
- D. 胎儿常有宫内缺氧，代谢不良。E，新生儿外表呈营养不良或过熟儿状态，发育不均称，身长、头径与孕龄相符而体重偏低

【答案】A

【解析】内因性均称型 FGR 的特点是：①体重、身长、头径相称，均小于该孕龄正常值，新生儿身材矮小，外表无营养不良表现；②脑重量轻，常有脑神经发育障碍，神经元功能不全和髓鞘形成迟缓；③胎盘小，但组织无异常；④胎儿无缺氧表现，胎儿出生缺陷发生率高。围产

儿病死率高，预后不良；⑤产后新生儿经常会出现脑神经发育障碍，伴小儿智力障碍。

28、[题干]女，20岁，14岁初潮，经量少，周期3~6个月一次，末次月经于8个月前。明显消瘦，不食肉，每日进主食2两及少量蔬菜。检查：消瘦，乳房发育不良，阴毛稀少，外阴未婚型，子宫稍小，双附件正常，本例首选的处理措施为

- A. 激素周期治疗
- B. 供给足够营养

D. 补充多种维生素。E, HCG 诱发排卵

**【答案】** C

**【解析】** 考虑患者为继发性闭经。全身体质性治疗和心理学治疗在闭经治疗中有重要作用。应积极治疗全身性疾病，提高机体体质，供给足够的营养，保持标准体重。

29、[题干] 孕妇于妊娠早期患重症肝炎，正确处理应为

- A. 积极治疗重症肝炎
- B. 立即行人工流产术
- C. 肝炎好转后继续妊娠

D. 治疗肝炎同时行人工流产术。E, 治疗肝炎待病情好转行人工流产术

**【答案】** E

**【解析】** 妊娠早期：轻症应积极治疗，可以继续妊娠。慢性活动性肝炎，适当治疗后应终止妊娠。【该题针对“妊娠合并症”知识点进行考核】

30、[题干] 对于妊娠合并贫血叙述正确的是

- A. 只要有贫血就应该立即输血治疗
- B. 妊娠会使再障的患者病情减轻
- C. 妊娠期的叶酸缺乏对胎儿易造成畸形，以神经管缺陷最多见
- D. 巨幼红细胞性贫血大多是维生素 B12 缺乏。E, 诊断的标准是血红蛋白

**【答案】** C

**【解析】** 孕妇外周血血红蛋白 $<110\text{g/L}$  及血细胞比值 $<0.33$  为妊娠期贫血，其中其中血红蛋白 $\leq 60\text{g/L}$  为重度贫血。巨幼红细胞性贫血，95%是叶酸的缺乏。妊娠期的叶酸缺乏对胎儿易造成畸形，以神经管缺陷最多见，妊娠可使再障加重，易发生贫血性心脏病，甚至心衰。

31、[A1/A2 型题] 未生育成年妇女的子宫大小为()。

A.  $8\text{cm}\times 6\text{cm}\times 3\text{cm}$

B.  $7\text{cm}\times 5\text{cm}\times 3\text{cm}$

C.  $8\text{cm}\times 6\text{cm}\times 4\text{cm}$

D.  $5\text{cm}\times 4\text{cm}\times 2\text{cm}$ 。 E,  $5\text{cm}\times 3\text{cm}\times 2\text{cm}$

**【答案】** B

32、[题干]有报道一女青年接受 X 线检查时，对医生让其脱掉上衣不解，认为医生这样做是非常无礼的，甚至因此发生纠纷。此案例说明的核心伦理学问题是()。

A. 患者的思想太封建了

B. 医生没有任何可指责之处

C. 应有女护士在旁陪伴

D. 医院应该在 X 线检查室门口出示须知。 E, 医生没有完全让患者理解此举措及征得患者同意

**【答案】** E

是受到一定限制的。患者权利的自主性更重要，但也仍然受到一定限制，即不能伤害到他人、社会，甚至也包括自己的生命。

33、[A3/A4 型题]初产妇，孕 40 周，胎儿纵轴与母体纵轴相互垂直，血压正常，胎心 140/min。下列处理正确的是()。

- A. 外倒转术
- B. 卧床休息等待阴道自然分娩
- C. 内倒转术
- D. 给予镇静药。E, 即刻剖宫产

**【答案】**E

34、[题干]头盆不均倾的发生，正确的是

- A. 骨盆入口前后径狭窄者
- B. 胎头于第一产程末未能完成内旋转动作
- C. 胎头以矢状缝嵌入骨盆入口前后径
- D. 常见于均小骨盆。E, 胎头以后顶骨先嵌入，矢状缝偏前称前不均倾

**【答案】**A

35、[题干]妊娠合并尖锐湿疣剖宫产指征是()。

- A. 患者及家属要求
- B. 胎膜早破
- C. 病灶位于会阴侧切口位置附近

**【答案】** E

**【解析】** 病灶广泛易致产后出血或产道阻塞

36、[题干]有关羊水功能的描述错误的是()。

A. 羊水恒温，适宜胎儿的生长

B. 羊水过少可致胎儿肢体粘连

C. 羊水不可促进胎肺的发育

D. 羊水为弱碱性，破膜后羊水冲洗阴道，减少感染机会。E, 适量的羊水缓冲胎动对胎动对母体所致的不适感

**【答案】** C

**【解析】** 羊水可以促进胎肺发育

37、[题干]属于枕左前位分娩机制的项目，正确的是

A. 下降动作呈持续性

B. 俯屈动作完成后，胎头以枕额径通过产道

C. 胎头颅骨最低点达骨盆最大平面时出现内旋转

D. 内旋转动作完成于第一产程末期。E, 胎头进入骨盆入口时呈俯屈状态

**【答案】** D

**【解析】** 内旋转为当胎头下降到骨盆底遇到阻力时，胎头为适应骨盆纵轴枕部向前旋转  $45^\circ$  达耻骨联合后面，使其矢状缝与中骨盆及骨盆出口前后径相一致的动作为内旋转。胎头于第一产程末完成内旋转动作。引起内旋转的原因为骨盆入口横径大于前后径，而中骨盆与骨



盆出口前后径比横径大。在胎头下降的过程中进行内旋转使胎头较大的前后径与中骨盆与出口平面的前后径相一致，才有利于胎头下降。枕先露时胎头枕部最低，遇到骨盆底肛提肌阻力，肛提肌收缩将胎儿枕部推向阻力小、部位宽的前方，枕左前位的胎头向前旋转  $45^{\circ}$ ，后凶转至耻骨弓下。

38、[题干]胎儿娩出后多少分钟胎盘未娩出，伴阴道大量流血，应考虑胎盘因素()。

- A. 24 小时
- B. 12 小时
- C. 1 小时
- D. 30 分钟。E, 10 分钟

**【答案】**E

**【解析】**胎儿娩出后 10 分钟内胎盘未娩出，阴道大量流血，应考虑胎盘因素，胎盘部分剥离、嵌顿、胎盘部分粘连或植入、胎盘残留等是引起产后出血的常见原因。

39、[题干]属于排卵的项目，错误的是

- A. 排卵前出现 FSH 高峰，是即将排卵的可靠指标
- B. 排卵时卵泡液中前列腺素达高峰
- C. 前列腺素可促进卵泡壁释放蛋白溶酶，有助于排卵

D. 卵细胞及其周围的卵丘颗粒细胞一起被排出的过程称为排卵。E, 排卵前, 初级卵母细胞完成第一次减数分裂, 成为次级卵母细胞

**【答案】** A

**【解析】** 排卵前, 会出现 LH、FSH 高峰, LH 高峰是排卵的可靠的指标。

40、[题干]关于口服避孕药的避孕原理, 正确的是

A. 雌激素增加宫颈黏液黏稠度

B. 促进垂体 FSH、LH 分泌

C. 孕激素干扰雌激素效应, 子宫内膜增殖反应受抑制

D. 使受精卵移动速度与子宫内膜发育不一致。E, 雌激素量少, 子宫内膜腺体发育不良

**【答案】** C

**【解析】** 作用机制为: ①抑制排卵;②改变宫颈黏液性状;③改变子宫内膜形态与功能。

41、[题干]双胎妊娠的鉴别诊断首选

A. CT

B. 腹腔镜检查

C. 阴道检查

D. 血常规检查。E, B 超

**【答案】** E

**【解析】**首选 B 超。应与单胎合并羊水过多、巨大胎儿、妊娠合并子宫肌瘤或卵巢肿瘤相鉴别。

42、[题干]初产妇，27 岁，孕足月，1 年前有流产史。胎儿顺利娩出 4 分钟后，出现阴道暗红色间歇流血，约 100ml。首先应考虑的原因是()。

- A. 血凝障碍
- B. 正常位置胎盘剥离
- C. 颈管裂伤
- D. 胎盘嵌顿。E, 阴道静脉破裂

**【答案】** B

**【解析】**产程中胎儿顺利娩出后，出现阴道暗红色间歇流血，量不多，首先应考虑的原因是胎盘剥离征象。

43、[题干]双胎妊娠的鉴别诊断首选

- A. CT
- B. 腹腔镜检查
- C. 阴道检查
- D. 血常规检查。E, B 超

**【答案】** E

**【解析】**首选 B 超。应与单胎合并羊水过多、巨大胎儿、妊娠合并子宫肌瘤或卵巢肿瘤相鉴别。

A. 皮质醇

B. 雌激素

C. 甲状旁腺素

D. 胎盘生乳素。E, 胰岛素

**【答案】** C

**【解析】** 甲状旁腺素没有参与乳腺发育及泌乳功能

45、[题干]医师在执业活动中应履行的义务是() ()。

A. 遵守法律、法规，遵守技术规范

B. 参加专业培训，接受继续医学教育

C. 从事医学研究、学术交流，参加专业学术团体

D. 获取工资报酬和津贴，享受国家规定的福利待遇。E, 在注册的执业范围内，进行医学诊查、疾病调查、医学处置

**【答案】** A

46、[题干]符合原发性不孕诊断的项目为

A. 结婚 2 年，未避孕未孕

B. 结婚 2 年，未避孕自然流产 2 次后至今未孕

C. 结婚 3 年，安全期避孕，未孕

D. 结婚 5 年，3 年前人工流产，近 1 年未避孕未孕。E, 结婚 5 年，避孕套避孕，近 1 年未避孕未孕

**【答案】** A

不孕症。

47、[题干]女性，50岁，已婚，育有一女，健康。因“月经不规律10个月，伴烦躁、头颈部潮热、多汗1年，停经3个月”就诊。平素月经正常，周期26~28日，经期5~7日。近8个月，周期20~60日，现停经3个月。近一年常有头颈部潮热感，伴出汗，常一日数次发作。情绪不稳定，易激动，焦虑不安，有时情绪低落、流泪，性欲低下。近半年睡眠质量差，早醒，疲倦感。曾就诊于神经内科，予镇静安眠药物，病情有好转，但仍常发作。查体：体重60kg，神清，对答切题。心肺、肝脾及神经系统检查无异常发现，乳房检查未触及肿块。妇科检查：阴道黏膜皱襞较平坦，宫颈轻度糜烂样改变，子宫大小正常，附件区未触及增厚和肿块。辅助检查：子宫内膜厚6mm，子宫回声正常，双侧卵巢小于正常，未探及明显窦状卵泡回声。该患者可能的诊断是（）。

- A. 经前期紧张症
- B. 绝经综合征
- C. 继发性闭经
- D. 多囊卵巢综合征。E, 焦虑症

**【答案】**B

48、[题干]患者女，24岁。原发性闭经患者，身高1.34m，第二性征未发育，有蹼颈，肘外翻，生殖器幼稚型。最可能的诊断为（）。

- A. 先天性子宫发育不全
- B. 侏儒症
- C. 特纳综合征

D. 21 三体综合征。E, Swayer 综合征

**【答案】** C

49、[题干]不属外因性不均称型胎儿生长受限新生儿特点的项目为

- A. 外表无营养不良表现
- B. 身长、头径与孕龄相符，体重较轻
- C. 各脏器细胞数量正常，但细胞体积缩小，以肝脏为著
- D. 胎盘体积正常，功能下降。E, 出生时新生儿常有低血糖

**【答案】** A

50、[题干]胎盘早期剥离的诊断主要是依靠下列哪项()。

- A. 临床表现及检查
- B. 腹部超声
- C. 阴道超声
- D. 羊膜囊穿刺。E, 实验检查

**【答案】** A

**【解析】** 胎盘早剥依据病史、症状、体征，结合实验室检查结果做出临床诊断并不困难。

51、[题干]骨盆入口前后径的前端是()。

- A. 耻骨联合上缘
- B. 耻骨联合上缘中点
- C. 耻骨联合下缘

**【答案】** B

**【解析】** 骨盆入口前后径的前端是耻骨联合上缘中点。

52、[题干]分娩期宫颈扩张主要依靠

A. 腹压

B. 通过羊水传导的压力

C. 子宫收缩及缩复向上牵拉

D. 宫缩时前羊水回流，以利胎先露直接压迫。E, 宫腔内压

**【答案】** C

53、[题干]先天畸形中最常见的一种是() ()。

A. 脑积水

B. 无脑儿

C. 脊柱裂

D. 死胎。E, 联体儿

**【答案】** B

54、[题干]初产妇，平素月经规律，末次月经 2001 年 10 月 3 日，2002 年 7 月 28 日入院，入院时未临产。此病例诊断为

A. 正常妊娠

B. 早产

C. 异位妊娠

D. 胎膜早破。E, 过期妊娠

【解析】平时月经周期规则，妊娠达到或超过 42 周尚未分娩者称过期妊娠。

55、[题干]女，23 岁，第 1 胎，妊娠 31 周，外伤后突然剧烈腹痛，阴道未见流血，急诊送入院，查血压 10.0/8.0kPa，(75/60mmHg，脉搏 120 次/分)，面色苍白，大汗淋漓，下肢水肿，宫底剑突下三横指，胎位不清，胎心听不到，宫体左前侧壁轻压痛。若病情未达到控制，进一步发展，可导致

- A. 胎盘隐性剥离
- B. 胎盘混合性剥离
- C. 子宫胎盘卒中
- D. 底蜕膜出血。E, 胎盘显性剥离

【答案】C

【解析】胎盘早剥尤其是隐性剥离时，胎盘后血肿增大及压力增加，血液浸入子宫肌层，导致肌纤维分离、断裂及变性，当血液渗透至子宫浆膜层时，子宫表面呈现紫蓝色淤斑，称为子宫胎盘卒中。

56、[题干]妊娠期容易合并贫血的原因不包括

- A. 孕晚期饮食中铁剂仅可吸收 20%
- B. 妊娠期血浆增加多于红细胞增加，使血液稀释
- C. 孕期对铁需要量增加
- D. 孕妇肾血流量增加，肾小管回吸收减少，使叶酸排泄增多。E, 孕妇胃酸分泌减少，影响叶酸吸收



**【答案】** A

**【解析】** 每日饮食中含铁 10~15mg，吸收利用率仅为 10%，即 1~1.5mg，妊娠中晚期铁的最大吸收率可达 40%，仍不能满足需求，若不给予铁剂治疗，容易耗尽体内储存铁造成贫血。

57、[题干]引起产褥感染的病原体，不常见的有

- A. 绿脓杆菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 衣原体
- D. 支原体。E, 大肠杆菌

**【答案】** A

**【解析】** 引起产褥感染的病原体常见的有金黄色葡萄球菌、衣原体、支原体、大肠杆菌等。

58、[题干]我国提出建立医院伦理委员会的主张是哪个年代()。

- A. 20 世纪 20 年代
- B. 20 世纪 60 年代
- C. 20 世纪 80 年代
- D. 20 世纪 90 年代。E, 21 世纪初

**【答案】** C

59、[题干]怀疑为无排卵性功能失调性子宫出血，理想的取内膜活组织检查的时间应为

- A. 月经来潮 6 小时内
- B. 月经干净后 3 日
- C. 月经周期中间
- D. 月经第 5 日。E, 月经第 1 日

**【答案】** A

**【解析】**为确定卵巢排卵和黄体功能，应在经前期货月经来潮 6h 内刮宫。

60、[题干]28 岁经产妇，足月产后第 2 天，患者诉阵发性下腹痛，阴道流血量不多，无恶心、呕吐，无腹泻及便秘，检查宫底脐下 2 指，无压痛，腹部不胀。下列哪项对明确诊断有帮助

- A. 腹部 B 超声检查
- B. 哺乳时下腹痛加剧
- C. 腹部听诊肠鸣音
- D. 腹部 X 线检查。E, 血常规检查

**【答案】** B

61、[问题]两侧小阴唇的菱形区应为

- A. 阴蒂

C. 小阴唇

D. 阴道前庭。E, 阴阜

**【答案】D**

62、[A1/A2 型题]关于子宫内膜异位症多发病学说与发病因素中，错误的是()。

A. 种植学说

B. 化生学说

C. 诱导学说

D. 免疫因素。E, 连续排卵学说

**【答案】E**

63、[题干]臀位四步触诊检查时，正确的是

A. 子宫底部可触到圆而硬的胎臀

B. 子宫呈横椭圆形

C. 第三步触诊时可及浮球感

D. 胎体纵轴与母体纵轴不一致。E, 触诊不能确定诊断时，可行肛诊协助诊断

**【答案】E**

64、[A1/A2 型题]关于产前诊断哪项不对()。

A. 性染色质或核型分析可诊断胎儿性别

B. 可用染色体分析诊断 21-三体

C. 可用PCR 技术诊断 Down' s 综合征

D. 可用酶学方法诊断 18-三体。E, 可用酶学方法诊断某些代谢性疾病

**【答案】D**

65、[题干]胎位异常对母儿的影响不正确的表述是

A. 易发生软产道损伤

B. 导致产程延长

C. 不会形成生殖道瘘

D. 围生儿死亡率增高。E, 常导致继发性宫缩乏力

**【答案】C**

**【解析】**对母儿的影响(1)对母体的影响：胎位异常导致继发性宫缩乏力，导致产程延长。因常需手术助产，易发生软产道损伤，增加产后出血及产褥感染机会。胎头长时间压迫软产道可形成生殖道瘘。

(2)对胎儿的影响：第二产程延长常引起胎儿窘迫和新生儿窒息，围生儿死亡率增高。

66、[题干]能够排除完全性葡萄胎诊断的依据为

A. 停经后阴道流血

B. 子宫大于妊娠周数

C. 尿妊娠试验阳性

D. 超声多普勒闻及胎心。E, 触及卵巢黄素化囊肿

**【答案】D**

葡萄胎表现为：子宫增大，宫腔充满弥漫分布的光点和小囊样回声区，无孕囊，或无胎体及胎心。

67、[题干]女性，28岁，停经8周，2周前B型超声检查提示“宫内早孕”，阴道少量出血伴轻微下腹痛2日。半日前开始阴道大量流血，腹痛加剧，并诉在家中排出一块肉样组织物。就诊时体格检查：T36.8℃，P115次/分，BP80/50mmHg。妇科检查：子宫增大如孕2个月大小，宫颈口见组织物堵塞，并有活动性小血。以下处理错误的()。

- A. 快速静脉补液
- B. 尽快行清宫术
- C. 清宫前必须行B型超声检查
- D. 术后常规使用抗生素。E, 必要时输血

**【答案】C**

68、[题干]关于人工流产下述哪项是错误的

- A. 人工流产是指妊娠10~21周以内用人工方法中止妊娠
- B. 妊娠10周以内可用吸宫术
- C. 妊娠10~14周可用钳刮术
- D. 体温二次>37.5℃，为禁忌证。E, 急性生殖器炎症为手术禁忌

**【答案】A**

**【解析】**人工流产是指在妊娠14周以内，因疾病、防止先天性畸形儿出生、遗传病及非法妊娠等原因而采用人工终止妊娠的手术。人工流产分为早期人工流产和中期妊娠引产。凡在妊娠3个月内采用人工或药物方法终止妊娠称为早期妊娠终止。负压吸引术适用于10周内

错的不适用于 10~14 周。药物流产适用于妊娠 < 49 天。

69、[题干]关于不协调性宫缩乏力。正确的是

A. 子宫收缩极性倒置，但不影响宫口开大

B. 使用镇静药物效果不佳

C. 阻碍胎儿下降，属无效宫缩

D. 子宫肌肉不协调性收缩，致使宫腔内压力处于低张状态。E, 较少发生胎儿宫内窘迫

**【答案】**C

70、[题干]2000 年 6 月，美、英、日、法、德、中六国公布：人类基因组序列图的“工作框架图”绘出。2001 年 2 月 12 日，六国又联合公布了经过整理、分类和排序后更加准确、清晰、完整的人类基因组图谱。这一成就将为解释人类疾病的本原、新药的设计、新治疗方法的产生提供重要依据，它奠定了 21 世纪医学生物学和其他相关科学飞速发展的基础。同时人们也担心，这项成果如果用于危害人类研究，其后果也是不可设想的。上述情况表达的最主要思想是()。

A. 科学技术进步的力量是无穷的

B. 道德在科学技术进步面前是无能为力的

C. 现代医学科学发展需要医学道德把关

D. 医学道德制约了医学科学的发展。E, 基因科学的发展是解决人类全部健康问题的根本

**【答案】**C



