

2022 年妇产科主治医师试题及答案组卷

1、[题干]高催乳激素血症的血液学诊断

- A. 溴隐亭
- B. 噩唑利特
- C. 阿普唑仑
- D. 氟西汀。E, 螺内酯

【答案】A

【解析】降催乳激素治疗：目前最常用的药物为溴隐亭，对功能性或肿瘤引起的 PRL 升高均可产生抑制作用，溴隐亭治疗后能缩小肿瘤体积，使患者月经和生育能力得以恢复。使用方法为：第 1 周 1.25mg，每晚 1 次；第 2 周 1.25mg，每日 2 次；第 3 周 1.25mg，每日晨服，2.5mg，每日晚服；第 4 周 2.5mg，每日 2 次，3 个月为 1 疗程。

2、[题干]有一年轻男患者，在得知自己患了黄疸性肝炎以后，很恐惧，怕女朋友离开他，怕同车间的伙伴疏远他，所以十分恳切地请求医师替他保密。医师看他很值得同情，就决定替他保守这个秘密，但要求他抓紧治疗，不要耽误了病情。医师的正确做法是()。

- A. 完全替病人保密，把他留在医院治疗
- B. 完全替病人保密，给他开一些对症的药，让他在家治疗，以免别人知道
- C. 应该拒绝保密，拒绝给他治疗，以免被传染

【答案】E

3、[A1/A2型题]关于妊娠期沙眼衣原体感染，正确的是()。

- A. 大多数孕妇症状明显
- B. 会造成胎儿畸形
- C. 新生儿感染主要表现为结膜炎和肺炎
- D. 间接传播是其主要途径。E, 首选青霉素治疗

【答案】C

4、[题干]下列哪项不是负压吸引术的并发症()。

- A. 组织残留
- B. 漏吸
- C. 宫颈裂伤
- D. 子宫穿孔。E, 子宫卒中

【答案】E

【解析】子宫卒中是指孕期胎盘早剥引起胎盘后血肿增大及压力增加，使得血液浸入子宫肌层，引起肌纤维分离、断裂及变性，并不是负压吸引术的并发症。

5、[题干]枕前位的分娩机制正确的是()。

- A. 胎头进入骨盆入口时呈俯屈状态
- B. 下降动作贯穿在整个分娩过程中
- C. 下降动作呈连续性

D. 俯屈动作完成后，胎头以枕额径通过产道。E. 胎头颅骨最低点达骨盆最大平面时出现内旋转动作

【答案】B

【解析】下降动作贯穿在整个分娩过程中，但随宫缩间歇呈间歇性。

6、[题干]患者 28 岁，现妊娠 14 周。诊断为风湿性心脏病、二尖瓣重度狭窄，已行二尖瓣瓣膜置换术。术后口服肝素抗凝治疗。患者产后抗凝药物治疗，不正确的是

- A. 监测凝血酶原时间，调整抗凝药物剂量
- B. 华法林抗凝，可以母乳喂养
- C. 产后出血者，可以加用维生素 K
- D. 华法林恢复使用初期需要与肝素叠加使用。E. 如无异常情况，产后 12~48 小时开始抗凝治疗

【答案】B

【解析】华法林的特点是：1. 分子量小，可以透过胎盘屏障；2. 可以导致胎儿畸形，主要是面部的骨骼中线发育不良，如唇裂、腭裂、鼻梁塌陷等，发生在妊娠开始后 3 个月内，即胎儿形成的阶段。

7、[题干]女，26 岁，妊娠 33 周，触诊检查先露部宽而软，剑突下圆而硬，有浮球感，应诊断为

- A. 臀先露
- B. 枕先露
- C. 面先露
- D. 额先露。E. 肩先露

【答案】A

【解析】胎头圆而硬，有浮球感；胎背宽而平坦；胎臀宽而软，形状略不规则；胎儿肢体小且有不规律活动，该孕妇检查时先露部宽而软，说明是臀先露。

8、[题干]关于正常恶露，正确的是

- A. 胎盘或胎膜残留时恶露增多
- B. 浆液恶露含大量白细胞、坏死蜕膜组织等
- C. 恶露含有血液、胎盘绒毛碎片、坏死蜕膜组织等
- D. 血性恶露约持续 1 周。E, 白色恶露约持续 1 周

【答案】A

9、[B型题]二十六岁妇女，4日前在家分娩，手取胎盘完整娩出，阴道流血约 400ml。术后口服磺胺甲口恶唑。自昨晨起寒战后高热达

39.4°C，呈弛张热型，恶露量多且臭味明显，检查下腹压痛明显，盆腔触及边缘不整形肿块。初步判断该患者其病原体是()。

- A. 以大肠埃希菌为主
- B. 以金黄色葡萄球菌为主
- C. 以 β -溶血性链球菌为主
- D. 以沙眼衣原体为主。E, 以厌氧链球菌及大肠埃希菌为主

【答案】E

【解析】恶露量多且臭味明显，是厌氧链球菌感染的典型特点。

- A. 一次妊娠有两个胎儿
- B. 一个胎囊中有两个胎儿
- C. 一次妊娠有两个胎儿和两个胎盘
- D. 一个受精卵分裂成两个胎儿。E, 两个卵子受精形成的两个胎儿

【答案】A

【解析】一次妊娠同时有两个胎儿时称双胎妊娠。

- 11、[题干]关于子宫出血的机制，下述哪项正确()。
- A. 孕酮的撤退抑制血管内皮素(ET)的合成
 - B. 孕激素抑制子宫内膜的酸性黏蛋白多糖(AMPS)的生成和聚合
 - C. 月经前血 E、P 水平下降，从而合成 PGF2 α 下降
 - D. 月经来潮前 3~5 天，子宫内膜螺旋动脉痉挛性收缩。E, 月经来潮前 4~24 小时，螺旋动脉血流淤滞

【答案】B

【解析】子宫内膜间质在雌激素作用下，能生成一种酸性黏多糖(AMPS)，孕激素对 AMPS 的生成和聚合有抑制作用，AMPS 解聚，使间质中的基础物质推动黏稠性，血管通透性增加。

- 12、[题干]关于外阴硬化性苔藓的临床表现下列哪项是正确的()。
- A. 病变区痒，比鳞状上皮细胞增生重
 - B. 晚期皮肤增厚
 - C. 早期皮肤发白

【答案】E

【解析】幼女和绝经期妇女发病较高，外阴硬化性苔藓早期病变轻，皮肤红肿，出现粉红或象牙白色丘疹，丘疹融合成片后呈紫癜状。晚期皮肤菲薄、皱缩似卷烟纸或羊皮纸，有皮下出血，呈对称性分布，阴道口挛缩狭窄。病变对称，可累及会阴及肛周而呈蝴蝶状。

13、[题干]诊断葡萄胎最有价值的项目为

- A. B型超声见宫腔内充满落雪状回声
- B. 停经及不规则阴道流血
- C. 子宫大于妊娠周数
- D. 血 β -HCG 呈高值。E. 妇科检查于附件区触及囊性肿物

【答案】A

【解析】B超检查：是诊断葡萄胎的重要辅助检查方法。完全性葡萄胎表现为：子宫增大，宫腔充满弥漫分布的光点和小囊样回声区，无孕囊，或无胎体及胎心。部分性葡萄胎有时可见胎儿或羊膜腔，胎儿多合并畸形。

14、[题干]下列哪一项是孕激素的生理作用()。

- A. 增强子宫收缩力，增强子宫平滑肌对催产素的敏感性
- B. 使宫颈口闭合，黏液减少、变稠，拉丝度减少
- C. 使阴道上皮增生和角化
- D. 使乳腺管增生，乳头、乳晕着色。E. 加强输卵管节律性收缩的振幅

【解析】其他答案都是雌激素的生理作用。

15、[题干]患者李某，剖宫产术后 30 天，突然阴道大出血 3 小时。入院时血压 70/60mmHg，心率 130 次/分，血红蛋白 6g/L。给予患者的第 1 项处理是()。

- A. 建立有效的静脉通道，大量补液、输血
- B. 应用缩宫素
- C. 抗生素防治感染
- D. 清宫术。E, B 超

【答案】A

16、[题干]关于无排卵性功血的描述，正确的是

- A. 凝血功能障碍
- B. 有雌激素与孕激素刺激
- C. 缺乏雌激素刺激，但有孕激素刺激
- D. 缺乏雌激素及孕激素刺激。E, 单一雌激素刺激，缺乏孕激素刺激

【答案】E

【解析】无排卵性功血是由单一雌激素的作用，无孕酮对抗而引起的出血。是雌激素撤退性出血或雌激素突破性出血。后者又分为低雌激素水平和高雌激素水平突破出血两种类型。

17、[题干]患者李某，剖宫产术后 30 天，突然阴道大出血 3 小时。入院时血压 70/60mmHg，心率 130 次/分，血红蛋白 6g/L。给予患者的第 1 项处理是()。

- B. 应用缩宫素
- C. 抗生素防治感染
- D. 清宫术。E, B 超

【答案】A

18、[题干]处理不协调性子宫收缩乏力的首选措施应为

- A. 温肥皂水灌肠
- B. 行人工破膜
- C. 肌注哌替啶 100mg
- D. 静脉滴注缩宫素加强宫缩。E, 静脉补充能量

【答案】C

【解析】不协调性子宫收缩乏力：处理原则是调节宫缩，恢复期正常节律及极性。给予哌替啶 100mg，或吗啡 10~15mg 肌注，醒后多能恢复调节性宫缩。此前严禁用缩宫素。经上述处理，不协调性宫缩未能纠正，或伴胎儿窘迫现象，或伴头盆不称者，均行剖宫产。

19、[A1/A2 型题]关于先天性无阴道，下列哪项正确()。

- A. 为双侧中肾管发育异常造成
- B. 多合并卵巢缺失
- C. 诊断后应及时手术

D. 子宫发育多为正常。E, 可合并泌尿系统畸形，应行相应的检查

【答案】E

20、[题干]女性假两性畸形的发病机制叙述错误的是

- A. 糖皮质激素增多
- B. 肾上腺皮质增生以 21-羟化酶最多见
- C. 糖皮质激素增多时，ACTH 产生增多
- D. 无糖皮质激素合成时，ACTH 的抑制被解除。E, 负反馈一直垂体产生 ACTH

【答案】C

【解析】当糖皮质激素增多时，通过负反馈作用，抑制脑垂体产生 ACTH

21、[题干]女，45岁，外阴奇痒2年余，外阴皮肤增厚，纹理突出，且由于长期搔抓出现不同程度的破损、皲裂、隆起。为确诊，该患者应首选哪项检查（）。

- A. 刮片细胞学检查
- B. 分泌物细菌学检查
- C. 阴道镜检查
- D. 活组织病理检查。E, B 超检查

【答案】D

22、[题干]34岁已婚妇女，停经6周，尿妊娠试验阳性，因高热一周，曾服多种药物，要求人流。人流时出现恶心呕吐、出汗，面色苍白。查体：血压80/60mmHg，心率46次/分。本例正确处理应是()。

- A. 间断吸氧
- B. 止吐剂肌注
- C. 阿托品静脉滴注
- D. 抗生素静脉滴注。E, 快速输液

【答案】C

【解析】阿托品静脉滴注1mg效佳，症状迅即消失。

23、[题干]40岁，妇女，经量多，末次月经为2~4个月一次，经期延长，经量多，末次月经持续20天，现又有2个月未来潮，此时内膜活组织检查为

- A. 子宫内膜不规则脱落
- B. 黄体功能不足
- C. 分泌期子宫内膜
- D. 黄体功能不足。E, 以上均不是

【答案】A

【解析】子宫内膜不规则脱落：表现为月经间隔时间正常，但经期延长，且出血量多。

小时，于宫颈口开大4cm，行剖宫产，手术进行顺利，术后静脉应用特丽仙和济得预防感染3天，后改为口服先锋IV号4天，术后第7天出院。出院后第4天因发冷、发热和腹痛而再次入院，入院时体温39.5℃。下列处理不恰当的是()。

- A. 宫腔分泌物进行细菌培养和药物敏感试验
- B. 产妇采用半卧位
- C. 物理或药物降温
- D. 选用对需氧菌和厌氧菌有效的抗生素联合用药。E, 开腹探查

【答案】E

25、[题干]口服避孕药长效与短效的区分主要取决于

- A. 孕激素
- B. 雄激素
- C. 雌激素
- D. 雌激素+孕激素。E, 孕激素+雄激素

【答案】C

【解析】短效避孕药含有孕激素和少量的雌激素。

26、[A3/A4型题]高张性宫缩乏力的临床特点，下列哪项是错误的()。

- A. 失去正常的极性和对称性
- B. 子宫持续呈紧张状态，间歇期，产妇呼痛不已
- C. 胎儿窘迫出现早

【答案】D

27、[题干]属于妊娠滋养细胞疾病的项目，错误的是

- A. 胎盘部位滋养细胞肿瘤是一种特殊类型的滋养细胞肿瘤
- B. 少数绒毛膜癌可发生于异位妊娠后
- C. 侵蚀性葡萄胎可继发于流产、足月产后
- D. 绒毛膜癌可继发于流产、足月产后。E, 绒毛膜癌易发生肺转移

【答案】C

【解析】 根据葡萄胎清宫后或流产、分娩、异位妊娠后出现阴道流血和(或)转移灶及其相应症状和体征，应考虑滋养细胞肿瘤可能，结合血清 HCG 测定等辅助检查，临床诊断可以确立。继发于葡萄胎 1 年以上发病者，一般为绒癌；半年以内发病者，多为侵蚀性葡萄胎；半年至 1 年者，绒癌和侵蚀性葡萄胎均有可能，但一般来讲，间隔时间越长，绒癌可能性越大。而继发于流产、分娩、异位妊娠者则为绒癌。

28、[题干]某产妇，产程经过顺利，胎盘娩出后，阴道大量流血，查胎盘胎膜完整，软产道无损伤，子宫轮廓不清，按压宫底后见大量血块及暗红色血液流出。考虑该产妇最可能的主要诊断为()。

- A. 产程延长
- B. 贫血
- C. 产后出血
- D. 胎盘植入。E, 羊水栓塞

【答案】C

- A. 宫颈外口在坐骨棘水平以下
- B. 宫颈外口下降到距阴道口 2cm
- C. 宫颈外口位于阴道口内
- D. 宫颈及部分宫体脱出于阴道口外。E, 宫颈及宫体完全脱出于阴道口外

【答案】D

【解析】I 度：轻型为宫颈外口距离处女膜缘小于 4cm，但未达处女膜缘；重型为宫颈已达处女膜缘，但未超出该缘，检查时在阴道口见到宫颈。II 度：轻型为宫颈已脱出阴道口，但宫体仍在阴道内；重型

为宫颈及部分宫体已脱出阴道口。III 度：宫颈及宫体全部脱出至阴道口外。

30、[题干]女性不孕因素中最常见的为

- A. 卵巢功能障碍
- B. 输卵管因素
- C. 子宫内膜异位症
- D. 宫颈因素。E, 子宫因素

【答案】B

【解析】输卵管因素为不孕症最常见因素。

31、[题干]关于子宫内膜异位症的主要病理变化，错误的是()。

- B. 病变伴有周围纤维组织增生和粘连形成
- C. 病变的浆膜面可见粟粒结节
- D. 病变区出现紫褐色斑点或小泡。E, 可发展为紫蓝色包块

【答案】C

【解析】病变的浆膜面可见粟粒结节不是子宫内膜异位症的特征性表现。

- 32、[题干]有关羊水功能的描述错误的是()。

- A. 羊水恒温，适宜胎儿的生长
- B. 羊水过少可致胎儿肢体粘连
- C. 羊水不可促进胎肺的发育
- D. 羊水为弱碱性，破膜后羊水冲洗阴道，减少感染机会。E, 适量的羊水缓冲胎动对胎动对母体所致的不适感

【答案】C

【解析】羊水可以促进胎肺发育

33、[题干]女，35岁，继发不孕4年求治，发现左附件囊肿3月。腹腔镜手术见左卵巢巧克力囊肿6cm大，盆腔粘连不重，双侧输卵管通畅。腹腔镜手术剥除巧克力囊肿后最恰当的处理是()。

- A. 孕激素治疗
- B. GnRHa 治疗
- C. 达那唑治疗

【答案】E

【解析】子宫内膜异位症手术后往往回再次发生盆腔粘连、输卵管扭曲等情况，刚做完手术后解剖最接近正常状态，故应尽快促进妊娠。

34、[题干]关于骨盆内测量，下列哪项错误()。

0%

C. 麻醉下进行

D. 先刮取宫颈管组织再探宫腔。E, 刮取可疑组织应彻底刮宫

【答案】D

【解析】先刮取宫颈管组织，再探宫腔

37、[题干]关于子宫腺肌病正确的是()。

A. 多数合并外在性子宫内膜异位症

B. 多发生在初产妇

C. 病灶中子宫内膜对卵巢激素高极为敏感

D. 假孕疗法有效。E, 月经量增多，经期延长，继发痛经，子宫均匀增大和病灶质硬

【答案】E

【解析】子宫腺肌病的主要临床症状是月经量增多，经期延长，继发痛经，子宫均匀增大和病灶质硬；半数合并子宫肌瘤；多发生于30~50岁经产妇；对卵巢激素不敏感，假孕疗法和假绝经疗法对此病无效。

38、[题干]25岁初产妇，产钳助娩一3500g女婴，现产后1小时，在产房观察。该产妇产后第4日发热，双乳胀痛，检查体温38.2℃，双乳红肿，血管淋巴充盈，有硬结，此时最可能的诊断为

A. 乳腺炎

B. 会阴伤口感染

- C. 上呼吸道感染
- D. 子宫内膜炎。E, 乳汁淤积

【答案】E

【解析】产后 3~4 日出现乳房血管、淋巴管极度充盈，乳房胀大，伴 37.8~39℃发热，称为泌乳热，一般持续 4~16 小时，体温即下降，不属病态。

39、[A3/A4 型题]初产妇，孕 40 周，胎儿纵轴与母体纵轴相互垂直，血压正常，胎心 140/min。根据以上情况判断不可能的胎方位是()。

- A. 肩左后位
- B. 肩左前位
- C. 肩右后位
- D. 肩右前位。E, 骶左后位

【答案】E

40、[题干]闭经患者孕激素试验阳性下列描述哪项是正确的

- A. 每日肌注黄体酮 20mg，连续 5 日，停药 7 日未见出现撤药出血
- B. 提示病变部位在子宫内膜
- C. 提示病变部位在卵巢
- D. 提示病变部位在下丘脑。E, 子宫内膜已受一定水平雌激素影响

【答案】E

【解析】孕激素试验方法为每日肌内注射黄体酮 20mg，或口服甲羟孕酮，每日 10~20mg，连用 5 日。若停药后 3~7 日出现撤退性出血，为阳性反应，属 I 度闭经。

41、[题干]在妊娠滋养细胞肿瘤的组织学诊断时，若原发灶和转移灶诊断不一致，只要在任一组织切片中见有绒毛结构，均诊断为()。

- A. 完全性葡萄胎
- B. 部分性葡萄胎
- C. 侵蚀性葡萄胎
- D. 绒癌。E, 胎盘部位滋养细胞肿瘤

【答案】C

42、[题干]孕妇于妊娠早期患重症病毒性肝炎，正确的处理应为

- A. 立即行人工流产术
- B. 肝炎明显好转后继续妊娠
- C. 治疗肝炎同时行人工流产术
- D. 治疗肝炎，待病情好转行人工流产术。E, 积极治疗重型肝炎，病情不见好转行人工流产术

【答案】D

【解析】妊娠合并重型肝炎在短期内病情多数难以康复，临幊上应积极治疗，待病情有所稳定后选择人力充足的有利时机终止妊娠，即

右;或在治疗过程中出现以下产科情况，如胎儿窘迫、胎盘早剥或临产。

43、[题干]患者，女，30岁，月经后下腹痛伴发热2天来诊，查体：下腹部压痛反跳痛肌紧张，移动性浊音(-)，妇科检查：宫颈举痛、摇摆痛，子宫轮廓不清，压痛明显，双附件区增厚压痛明显，右侧可及压痛包块4cm×5cm×7cm。此患者的诊断首先考虑为()。

- A. 异位妊娠
- B. 急性阑尾炎
- C. 急性盆腔炎
- D. 急性腹膜炎。E, 右侧卵巢肿物扭转

【答案】C

44、[题干]HBeAg 阳性提示()。

- A. 目前感染HBV
- B. 曾经感染过HBV，已产生自动免疫
- C. HBV 感染恢复期，感染性低
- D. HBV 大量存在于血液中，传染性 强。E, HBV 复制阶段，出现于肝炎早期

【答案】D

45、[题干]初产妇，25岁，产后12小时，体温38℃，心率60次/分，呼吸14次/分，血压120/78mmHg，睡眠醒后出汗较多，自觉无明显不适，对其判断正确的是()。

B. 正常产褥期

C. 产后虚脱

D. 应该扩容。E, 应该给予抗生素

【答案】B

【解析】产妇在最初 24 小时体温略升高，一般不超过 38℃，仅持续数小时，最多不超过 12 小时，产后脉搏缓慢，60~70 次/分，于产后 1 周恢复，产后血压平稳，产褥早期皮肤排泄功能增强，以夜间睡眠和初醒时更为明显，不属病态。

46、[题干]45 岁宫颈癌患者，常规体外放疗加腔内放疗后 3 年，出现肛门下坠，大便次数增多，有黏液便，血便，为明确诊断进行检查，不宜做的检查是()。

A. 血常规

B. 大便常规

C. 大便隐血试验

D. 直肠镜检查。E, 直肠黏膜活检

【答案】E

【解析】直肠黏膜活检容易引起直肠阴道瘘，该患者诊断明确，宫颈癌放疗后，可疑宫颈癌直肠转移，涂片或镜检即可。

47、[题干]妊娠合并心脏病心功能 II 级的诊断依据是()。

A. 能从事强体力劳动

B. 一般体力活动不受限

D. 一般体力活动稍受限。E, 休息时即有心功能不全症状

【答案】D

【解析】II 级是指：一般体力活动轻度受限制，活动后心悸、轻度气短，休息时无症状。

48、[题干]产后子宫收缩乏力大量出血时，用无菌纱条填塞宫腔止血，取出时间应为

A. 8 小时后

B. 16 小时后

C. 24 小时后

D. 36 小时后。E, 48 小时后

【答案】C

【解析】产后子宫收缩乏力大量出血时，用无菌纱条填塞宫腔止血，应在 24 小时后取出。【该题针对“异常分娩”知识点进行考核】

49、[题干]患者，24 岁。人流术后 1 周，突然阴道流血增多，伴腹痛，无发热，查宫口有少量活动出血，子宫稍大稍软，压痛(±)，附件正常。为确诊简便、准确的检查是()。

A. 血 HCG

B. 宫腔镜

C. B 超

D. 腹平片。E, 子宫造影

【解析】B 超为简便、快 速、无创的确诊方法，可直接探查宫内回声情况。如果吸宫不全，宫内有残留，B 超可见宫内有不均质回声团。

50、[A1/A2 型题]下列病毒性肝炎潜伏期错误的是()。

- A. 甲型 2~7 周
- B. 乙型 6~8 周
- C. 丙型 2~26 周
- D. 丁型 4~20 周。E, 戊型 2~8 周

【答案】B

【解析】乙型肝炎的潜伏期为 6 周~6 个月(一般约 3 个月)；

51、[题干]菌血症和感染性休克最常见的病原菌是()。

- A. 消化链球菌
- B. B 溶血性链球菌
- C. 肠杆菌属
- D. 金黄色葡萄球菌。E, 类杆菌属

【答案】C

52、[题干]自然绝经是指()。

- A. 女性生命中最后一次月经
- B. 距离最后一次月经半年以上
- C. 指月经完全停止 1 年以上

【答案】D

53、[A3/A4 型题]女性，30岁，婚后3年未孕，月经规则，近2年出现进行性痛经，曾行输卵管通液检查显示通畅。妇科检查：子宫正常大小，后位，不活动，后壁有触痛性小结节，左附件可触及4cm×3cm×3cm包块，不活动，有压痛。以下处理不正确的是()。

- A. 行B型超声检查
- B. 行腹腔镜检查
- C. 试用假孕疗法
- D. 试用妇康片治疗。E, 行宫腔镜检查

【答案】E

54、[题干]有关人工流产，哪项错误

- A. 妊娠10周内可行吸宫术
- B. 妊娠14周以上不宜用钳刮术
- C. 人流术刮宫前常规肌注麦角新碱
- D. 吸引负压宜<400mmHg，不可>600mmHg。E, 人工流产术后常规检查宫内吸出物

【答案】C

【解析】麦角新碱为麦角成分中作用最强，毒性反应最小的一种，能明显增加子宫活动。小剂量时其收缩频率或强度增加，然后正常放松；剂量加大则宫缩加强并延长，静止张力提高，甚至形成持续收缩。

下段与宫体肌肉同时收缩，不利于胎儿娩出，故只能用于产后

55、[题干]影响受精卵着床的有关因素，错误的是下列哪项()。

A. 子宫发育不良

B. 子宫内膜结核

C. 子宫黏膜下肌瘤

D. 宫腔粘连。E, 宫颈肌瘤

【答案】E

56、[题干]诊断葡萄胎最有价值的项目为

A. B 型超声见宫腔内充满落雪状回声

B. 停经及不规则阴道流血

C. 子宫大于妊娠周数

D. 血 β -HCG 呈高值。E, 妇科检查于附件区触及囊性肿物

【答案】A

【解析】B 超检查：是诊断葡萄胎的重要辅助检查方法。完全性葡萄胎表现为：子宫增大，宫腔充满弥漫分布的光点和小囊样回声区，无孕囊，或无胎体及胎心。部分性葡萄胎有时可见胎儿或羊膜腔，胎儿多合并畸形。

57、[题干]妊娠合并急性阑尾炎的治疗原则是()。

A. 广谱抗生素治疗

B. 一旦确诊，予抗生素的同时立即行手术治疗

C. 退热治疗

D. 应及时终止妊娠。E. 保胎治疗

【答案】B

【解析】妊娠期急性阑尾炎不主张保守治疗。一旦确诊，应在积极抗感染治疗的同时，立即手术治疗。

58、[题干]属于胎盘部位滋养细胞肿瘤病理的项目，错误的是

- A. 病灶一般局限于子宫
- B. 晚期可转移至肺、脑、肝等部位
- C. 病灶内有大面积出血坏死
- D. 主要由中间型滋养细胞组成，无绒毛结构。E. 肿瘤细胞产生低水平 β -HCG 和 HPL

【答案】C

【解析】胎盘部位滋养细胞肿瘤临床表现 1. 多发生于育龄期，可继发于足月产、流产或葡萄胎后，偶合并妊娠。2. 症状 多表现为闭经后不规则阴道出血或月经过多，可伴有贫血少数以转移位首发症状。晚期有转移，肺转移多见，脑、肝转移少见。3. 体征 子宫均匀性或不规则增大。一旦发生转移，预后不良。

59、[题干]抽羊水细胞可做染色体检查，应在()。

- A. 孕 24 周后
- B. 孕 36 周后

C. 孕 24~36 周后

D. 孕 30 周后。E. 孕 16~20 周

【答案】E

【解析】孕 16~20 周，可将羊水细胞抽出做染色体检查，正确答案为 E

60、[题干]女方患有白化病，欲与没有血缘关系表型正常的男性婚配。婚前咨询应该建议他们()。

A. 不可结婚

B. 暂缓结婚

C. 能够结婚并生育

D. 限制生育。E. 可以结婚，但禁止生育

【答案】C

61、[题干]40 岁，妇女，经量多，末次月经为 2~4 个月一次，经期延长，经量多，末次月经持续 20 天，现又有 2 个月未来潮，此时内膜活组织检查为

A. 子宫内膜不规则脱落

B. 黄体功能不足

C. 分泌期子宫内膜

D. 黄体功能不足。E. 以上均不是

【解析】子宫内膜不规则脱落：表现为月经间隔时间正常，但经期延长，且出血量多。

62、[题干]25岁初产妇，产钳助娩一3500g女婴，现产后1小时，在产房观察。目前首选处理是()。

- A. 抗生素预防感染
- B. 宫缩药促进子宫收缩
- C. 产后42日复查
- D. 按摩子宫。E, 肌注甲硫酸新斯的明1mg

【答案】E

【解析】产后4小时即应让产妇排尿。若排尿困难，除鼓励产妇坐起排尿，解除顾虑外，可肌注甲硫酸新斯的明1mg，兴奋膀胱逼尿肌促其排尿。

63、[题干]Asherman综合征可导致()。

- A. 子宫性闭经
- B. 下丘脑性闭经
- C. 肾上腺性闭经
- D. 卵巢性闭经。E, 垂体性闭经

【答案】A

64、[A3/A4型题]三十一岁妇女，平时月经规律，停经58日，阴道少量流血10日，偶有阵发性腹痛，妇科检查：宫颈着色，宫体如妊娠

- A. 羊水过多
- B. 葡萄胎
- C. 双胎妊娠
- D. 先兆流产。E, 妊娠合并子宫肌瘤

【答案】A

65、[题干]患者 27 岁，初产妇，孕 38+6 周，胎膜早破 12 小时，先露头，S-3，宫缩 30 秒/3 分，宫口开大 1cm。如此时查骨盆，应注意骨盆的哪个平面

- A. 出口后矢状径
- B. 中骨盆横径
- C. 中骨盆前后径
- D. 骨盆入口前后径。E, 骨盆出口横径

【答案】D

【解析】胎膜早破、规律宫缩，宫口已经开大，先露高浮，未衔接，应考虑骨盆入口平面头盆不称。

66、[题干]不属于输卵管结扎术并发症的项目为

- A. 膀胱损伤
- B. 肠管损伤
- C. 感染

【答案】D

【解析】输卵管结扎术并发症出血、血肿，感染，脏器损伤，绝育失败，术后远期并发症(腹痛，腹壁伤口慢性感染的延期愈合，神经官能症)

67、[题干]人工流产负压吸宫术适用于()。

- A. 妊娠 10 周以内者
- B. 妊娠 12 周以内者
- C. 妊娠 13 周以内者
- D. 妊娠 14 周以内者。E, 妊娠 16 周以内者

【答案】A

【解析】负压吸引的适应证是孕周<10 周者。

68、[题干]外阴部检查不包括下列哪项()。

- A. 外阴发育及阴毛多少和分布情况
- B. 外阴皮肤和黏膜色泽及质地变化
- C. 尿道口、尿道旁腺
- D. 大小阴唇、阴蒂、阴道口、前庭大腺。E, 会阴体、肛门

【答案】E

【解析】外阴体检查不包括会阴体，肛门

69、[题干]产褥感染中，哪种细菌的感染最易发生感染性休克()。

- A. 厌氧性链球菌

B. 乙型溶血性链球菌

C. 金葡菌

D. 大肠埃希菌。E, 肺炎链球菌

【答案】D

70、[题干]胎儿缺氧的初期表现为

A. 胎心率>160 次/分，尤其是>180 次/分

B. 胎心率<120 次/分，尤其是<100 次/分

C. 胎心率<90 次/分

D. 胎心率>200 次/分。E, 羊水III度胎粪污染

【答案】A

【解析】胎心率变化：胎心率是了解胎儿是否正常的重要标志，是急性胎儿窘迫最明显的临床征象胎心率>160 次/分，为胎儿缺氧的初期表现。

