

临床执业医师考试题库免费下载

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、下述情形中属于医疗技术事故的为（ ）。

- A. 无法避免造成死亡
- B. 因技术不熟练，术中误伤大血管造成病员大出血死亡
- C. 由于难以预料的原因造成病员死亡
- D. 无法避免造成残废
- E. 由于难以预料的原因造成残废

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2、下列有关肾结核尿液的说法，哪项不正确？（ ）

- A. 一般呈酸性反应
- B. 有较多红细胞和白细胞
- C. 尿沉淀涂片抗酸染色有50%~70%的病例可查到结核杆菌
- D. 抗酸染色以清晨第1次尿的阳性率最高
- E. 若查到抗酸杆菌即可诊断肾结核

【正确答案】

E

【答案解析】

肾结核时，尿沉淀涂片抗酸染色约有50%~70%的病例可找到抗酸杆菌，以清晨第1次尿液检查阳性率最高，至少连续检查3次。E项，包皮垢杆菌、枯草杆菌也是抗酸杆菌，查到抗酸杆菌不可确诊肾结核。

3、下列可以参加执业医师资格考试的为（ ）。

- A. 有医学专业本科以上学历，在医疗机构中试用期满2年
- B. 有医学专业本科以上学历，在医疗机构中试用期满1年
- C. 有医学专业本科以上学历，在医疗机构中工作满1年
- D. 有医学专业专科学历，在医疗机构中工作满1年
- E. 有医学专业专科学历，在医疗机构中试用期满1年

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

4、女，45岁，甲亢，¹³¹I治疗后出现下述症状，其中不是¹³¹I治疗的并发症的是（ ）。

- A. 便秘
- B. 甲状腺肿大更加明显
- C. 浮肿
- D. 打鼾，嗜睡
- E. 突眼加重

【正确答案】

B

【答案解析】
暂无解析。

5、抗体分子的抗原结合部位是（ ）。

- A. Fc段
- B. Fab段
- C. 绞链区
- D. 轻链C末端
- E. 重链C末端

【正确答案】

B

【答案解析】
暂无解析。

6、变性蛋白质的特点是（ ）。

- A. 粘度下降
- B. 溶解度增加
- C. 颜色反应减弱
- D. 丧失原有的生物学活性
- E. 不易被胃蛋白酶水解

【正确答案】

D

【答案解析】

变性作用是蛋白质受物理或化学因素的影响，改变其分子内部结构和性质的作用。一般认为蛋白质的二级结构和三级结构有了改变或遭到破坏，都是变性的结果。变性蛋白质和天然蛋白质最明显的区别是溶解度降低，同时蛋白质的粘度增加，结晶性破坏，生物学活性丧失，易被蛋白酶分解。

7、呼气储备量等于下列哪项？（ ）

- A. 肺活量-深呼气量
- B. 补吸气量
- C. 肺活量-深吸气量
- D. 肺活量-吸气贮备量
- E. 潮气量+补吸气量

【正确答案】

C

【答案解析】
暂无解析。

8、36周男婴，出生体重1.5kg，生后3d体温不升，需要暖箱，该暖箱温度应是（ ）。

- A. 31℃
- B. 32℃
- C. 33℃
- D. 34℃
- E. 35℃

【正确答案】

E

【答案解析】

早产儿应根据体重、日龄选择适中环境温度。出生体重愈低，适中温度应愈高，如出生体重1.0kg的早产儿，适中温度随日龄应为35~36℃，维持体温36.5℃，相对湿度50%~60%。

9、女，28岁，21岁时因心慌、怕热、多汗、消瘦就诊，确诊Graves病，他巴唑规则治疗2年。25岁时甲亢复发。再次他巴唑治疗，2个月后甲状腺功能正常，继续治疗1年半停药。最近2个月甲亢的症状、体征再现，查血T₃、T₄及TSH确认为甲亢第2次复发。患者结婚5年，尚未生育，希望治疗甲亢后怀孕，现治疗拟选用（ ）。

- B. 再次他巴唑治疗，疗程延长至3~4年
- C. 用他巴唑，甲功正常后加用¹³¹I治疗
- D. 用他巴唑，甲功正常后行甲状腺大部切除手术
- E. 直接行甲状腺大部切除术

【正确答案】

D

【答案解析】

该女性病人患Graves病用他巴唑治疗有效。但停药则复发，该病人希望治疗后怀孕，所以宜继续用他巴唑，甲功正常后行甲状腺大部切除手术的治疗方案最好。而大剂量碘剂仅适用于甲状腺危象及术前准备；在甲状腺大部切除术前均需先用口服抗甲状腺药物，不能直接行甲状腺手术，否则会引起甲状腺危象；该病人想怀孕，而妊娠为¹³¹I治疗的禁忌证。

10、急性肾炎合并急性肾功能不全持续尿闭阶段，处理不妥的是（ ）。

- A. 反复应用大剂量呋塞米促进排尿
- B. 严格控制液体入量
- C. 处理高钾血症
- D. 处理低钠血症
- E. 防治氮质血症

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

11、早期胃癌是指（ ）。

- A. 只限于黏膜层
- B. 肿块直径在2cm以下
- C. 未侵袭肌层
- D. 无淋巴结转移
- E. 无远隔淋巴结转移

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

12、下列关于全胃肠外营养的适应证，不正确的是（ ）。

- A. 短肠综合征
- B. 高位肠痿
- C. 乙状结肠痿
- D. 坏死性胰腺炎
- E. 急性肾功能衰竭

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

13、关于原癌基因的叙述，下述哪一项是不正确的？（ ）

- A. 正常细胞无此基因
- B. 病毒感染可使该基因活化表达
- C. 正常细胞均有原癌基因

- D. 基因突变可激活原癌基因表达

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

14、管理本行政区域内医师工作的机构是（ ）。

- A. 县级以上人民政府卫生行政部门
- B. 县级以上人民政府工商行政部门
- C. 县级以上人民政府劳动人事部门
- D. 各级医师协会
- E. 各级人民政府

【正确答案】

A

【答案解析】

参见《执业医师法》第四条：国务院卫生行政部门主管全国的医师工作。县级以上地方人民政府卫生行政部门负责管理本行政区域内的医师工作。

15、下列各项中不属于低渗性脱水特点的是（ ）。

- A. 失钠大于失水
- B. 主要为细胞外液减少
- C. 易出现休克
- D. 粘膜干燥、烦渴、肌张力高
- E. 多见于营养不良小儿

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

16、引起急性尿潴留的病因中，属于动力性梗阻的是（ ）。

- A. 膀胱结石
- B. 膀胱肿瘤
- C. 尿道狭窄
- D. 外伤性脊柱损伤
- E. 良性前列腺增生

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

17、为了保证研究结果能够回答研究目的中提出的问题，使用的人、财、物、时间较少，结果可靠，哪项是应该做好的首要工作？（ ）

- A. 资料分析
- B. 科研设计
- C. 资料整理
- D. 结果的表达
- E. 资料搜集

【正确答案】

B

0%

- A. 胆囊癌发作
- B. 胆道蛔虫进入胆囊
- C. 胆囊结石堵塞胆囊管
- D. 胰腺炎致胰液反流
- E. 胆总管下端梗阻

【正确答案】

C

【答案解析】

急性胆囊炎是胆囊管梗阻和细菌感染引起的炎症。约95%以上的病人有胆囊结石，称为结石性胆囊炎。约5%的病人无胆囊结石，称为非结石性胆囊炎。

58、每分钟肺泡通气量等于下列哪项? ()

- A. 肺通气量的1/2
- B. 潮气量×呼吸频率
- C. (潮气量－生理无效腔)×呼吸频率

○ E. (肺通气量-生理无效腔)×呼吸频率

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

59、下列关于医德修养意义的描述，不正确的是（ ）。

- A. 是建设社会主义精神文明的需要
- B. 是国家卫生立法的需要
- C. 促使医务人员形成高尚的医德观念
- D. 促使医务人员提高医德评价的能力
- E. 是提高医务人员素质的迫切需要

【正确答案】

B

【答案解析】

医德修养的任务是通过对其原则、规范的认识和体验，使医务人员形成稳定的判断是非、善恶、真伪的内心信念。因此，医德修养应包括以下意义，医德修养是建设社会主义精神文明的需要、促使医务人员形成高尚的医德观念、促使医务人员提高医德评价的能力、是提高医务人员素质的迫切需要。故本题答案为B项。

60、处理外伤性直肠损伤选择（ ）。

- A. 乙状结肠造瘘，2~3个月后处理
- B. 完全切除
- C. 直肠切除后吻合
- D. 一期修补
- E. 生理盐水冲洗，待其自行吻合

【正确答案】

A

【答案解析】

直肠损伤的处理原则是早期彻底清创，修补直肠破损，行转流性结肠造瘘和直肠周围间隙彻底引流。直肠上段破裂，应剖腹进行修补，如属毁损性严重损伤，可切除后行端端吻合，同时行乙状结肠双腔造瘘术，2~3个月后闭合造口。直肠下段破裂时，应充分引流直肠周围间隙以防感染扩散，并应施行乙状结肠造口术，使粪便改道直至直肠伤口愈合。

二、A2型题（每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、属于迟发型超敏反应的试验是（ ）。

- A. 抗毒素血清皮试
- B. 皮肤发疱试验
- C. 青霉素皮试
- D. OT试验(结核菌素试验)
- E. 普鲁卡因皮试

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2、有一名20岁女性病人，外伤后有血性脑脊液自鼻腔溢出，应采取的处置是（ ）。

- A. 鼻腔冲洗
- B. 鼻腔填塞压迫止血
- C. 给予抗生素治疗

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

3、某地山村，不少小儿生后表现为智力低下，对声音无反应，运动障碍，有的皮肤粗糙，身材矮小，四肢粗短。为预防此病，下述措施哪一项不正确？（ ）

- A. 孕妇多食含碘食物
- B. 给育龄妇女服碘油
- C. 给村民发放碘化食盐
- D. 改善水源，饮水消毒
- E. 给孕妇多食含氟食物

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

4、TCR识别Ag后向细胞传递信息的分子是（ ）。

- A. CD4
- B. CD3
- C. CD2
- D. CD8
- E. CD28

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

5、下列不属于代偿性肥大的是哪项？（ ）

- A. 经锻炼的骨骼肌肥大
- B. 高血压引起的心肌肥大
- C. 一侧肾脏切除后，另一侧肾脏的肥大

- D. 雌激素影响下的妊娠子宫
- E. 以上均不属于代偿性肥大

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

6、内囊出血所致的对侧肢体运动障碍（偏瘫），主要是损伤了（ ）。

- A. 皮质脊髓束
- B. 皮质红核束
- C. 顶枕颞桥束
- D. 皮质核束
- E. 额桥束

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

- B. 支持作用
- C. 允许作用
- D. 营养作用
- E. 支配作用

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

8、对于乳腺癌，下列哪项是错误的（ ）。

- A. 多数来源于乳腺导管上皮细胞
- B. 多数出现于乳房外上象限
- C. 多数为腺癌
- D. 多数为实性癌
- E. 多数发生于50岁左右的妇女

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

9、患者胸部受伤，急诊入院，经吸氧，呼吸困难无好转，有发绀。查体：左胸饱满。气管向右移位，左侧可触及骨擦音，叩诊鼓音，听诊呼吸音消失，皮下气肿明显，诊断首先考虑是（ ）。

- A. 肋骨骨折
- B. 张力性气胸
- C. 肋骨骨折并张力性气胸
- D. 心包积血
- E. 闭合性气胸

【正确答案】

C

【答案解析】

本例左胸有骨擦音，为肋骨骨折表现。胸部有外伤史，呼吸困难吸氧无好转，发绀，左胸饱满叩之鼓音，听诊听不到呼吸音，气管右移，有皮下气肿，为张力性气胸典型表现。E项，闭合性气胸一般不发生皮下气肿。

10、女性，35岁，初步诊断右乳腺上方乳腺纤维腺瘤，其治疗方法是（ ）。

- A. 中医中药治疗
- B. 择期手术
- C. 限期手术
- D. 急诊手术
- E. 口服他莫昔芬（三苯氧胺）治疗

【正确答案】

B

【答案解析】

乳腺纤维腺瘤属良性肿瘤，但存在恶变可能，手术切除是唯一有效治疗方法。对于良性疾病的非快速增长状态，手术可选择择期进行。

11、男性农民，42岁，于1月初发病，头痛、发热、恶心、呕吐2天后来院门诊，此时可见颜面潮红、咽部充血、腹肌紧张、全腹压痛、皮下淤血，自昨晚起无尿，其诊断为何病更恰当（ ）。

- A. 急腹症
- B. 病毒性肝炎

E. 风湿症

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

12、对于脂肪吸收的叙述，错误的是（ ）。

- A. 脂肪消化产物只有与胆盐形成混合微胶粒后才能到达肠绒毛表面
- B. 脂肪酸、甘油一酯与胆盐一同进入肠上皮细胞内
- C. 长链脂肪酸和甘油一酯在肠上皮细胞内重新合成为甘油三酯
- D. 脂肪的吸收以淋巴途径为主
- E. 淋巴液中脂类物质以乳糜微粒形式运输

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

13、枕骨大孔疝与小脑幕切迹疝的主要鉴别点是（ ）。

- A. 剧烈头痛
- B. 频繁呕吐
- C. 早期发生呼吸骤停
- D. 烦躁不安
- E. 血压下降

【正确答案】

C

【答案解析】

枕骨大孔疝生命体征紊乱出现早，意识障碍出现晚。小脑幕切迹疝瞳孔改变、运动障碍、意识障碍，后出现生命体征紊乱。

14、黄病毒的共同特点不包括（ ）。

- A. 属于小RNA病毒科

- B. 所致疾病多较重
- C. 有包膜和血凝素
- D. 衣壳呈二十面体立体对称
- E. 蚊、蝉等为传播媒介和储存宿主

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

15、男性，60岁。近3个月来大便不通畅，常有便血，疑为痔疮，遂未予理睬。一周来便血更甚，到门诊看病，医生建议手术治疗。手术中发现距肛门8cm的直肠壁内有4cm×2cm盘状突起的肿物，中心有溃疡，肠壁组织被破坏，周围淋巴结肿大。该患者所患疾病最可能是（ ）。

- A. 溃疡性结肠炎
- B. 直肠孤立性溃疡综合征
- C. 溃疡型直肠鳞状细胞癌
- D. 溃疡型直肠腺癌
- E. 直肠混合痔

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

可能的诊断是（ ）。

- A. 动脉导管未闭
- B. 房间隔缺损
- C. 室间隔缺损
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

17、阿托品滴眼可引起（ ）。

- A. 扩瞳、升高眼内压、调节麻痹
- B. 扩瞳、升高眼内压、调节痉挛
- C. 扩瞳、降低眼内压、调节麻痹
- D. 缩瞳、降低眼内压、调节麻痹
- E. 缩瞳、降低眼内压、调节痉挛

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

18、初产妇，28岁。妊娠34周，恶心，呕吐，腹胀，黄疸轻度，乏力，诊断妊娠合并急性乙型病毒性肝炎。该患者的治疗是（ ）。

- A. 继续妊娠、保肝治疗
- B. 立即剖宫产
- C. 无需特殊处理，等至顺产
- D. 人工引产

- E. 严密监护下继续妊娠

【正确答案】

A

【答案解析】

患者目前为非重型肝炎，主要采用护肝及对症支持疗法。治疗期间严密检测肝功能、凝血功能等指标。治疗效果不好、肝功能及凝血功能指标继续恶化时，应考虑终止妊娠。

19、一名耕种水稻的农民，突然出现高热、乏力，伴有腓肠肌疼痛、眼结膜出血及淋巴结肿大。引起该患者感染的微生物感染可能是（ ）。

- A. 梅毒螺旋体
- B. 钩端螺旋体
- C. 霍乱弧菌
- D. 甲型肝炎病毒
- E. 伯氏疏螺旋体

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

20、抑制病毒核酸合成的药物不包括（ ）。

- A. 金刚烷胺
- B. 阿糖腺苷
- C. 阿糖胞苷

E. 利巴韦林

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

21、大剂量糖皮质激素突击疗法用于（ ）。

- A. 肾病综合征
- B. 湿疹
- C. 过敏性休克
- D. 慢性肾上腺皮质功能不全
- E. 红斑狼疮

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

22、下述不属于糖皮质激素所引起的不良反应是（ ）。

- A. 高血压
- B. 高血糖
- C. 高血钾
- D. 低血钙
- E. 低血磷

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

23、有机磷中毒出现毒蕈碱样症状的主要机制是（ ）。

- A. 腺体分泌减退、平滑肌痉挛
- B. 腺体分泌亢进、运动神经兴奋
- C. 腺体分泌亢进、平滑肌痉挛
- D. 腺体分泌亢进、平滑肌松弛
- E. 运动神经兴奋、平滑肌痉挛

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

24、O型血的红细胞膜上含有的抗原为（ ）。

- A. B抗原
- B. A抗原
- C. O抗原
- D. H抗原
- E. D抗原

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

25、男，26岁。间断腹泻6个月，大便3~4次/日，带黏液及脓血，无发热及体重下降。结肠镜示乙状结肠以下弥漫充血水肿，黏膜颗粒样改变，质脆，易出血，病理可见隐窝脓肿。曾连续口服环丙沙星2周，无效。该患者最适宜的治疗是（ ）。

- B. 静脉用甲泼尼龙
- C. 禁食及静脉高营养
- D. 口服蒙脱石散
- E. 口服柳氮磺吡啶

【正确答案】

E

【答案解析】

根据患者症状体征及结肠镜所见，考虑为溃疡性结肠炎，因患者大便3~4次/日，带黏液及脓血，无发热及体重下降，考虑为轻、中型，首选药物为柳氮磺吡啶。B项，甲泼尼龙为糖皮质激素，适用于急性发作期，对5-ASA疗效不佳的轻、中度患者，特别适用于重度的患者。

26、术后早期下床活动的好处，不包括（ ）。

- A. 减少肺部并发症
- B. 减少下肢静脉血栓形成
- C. 减少伤口感染
- D. 有利于肠道功能恢复，减少腹胀发生
- E. 有利于膀胱功能恢复，减少尿潴留发生

【正确答案】

C

【答案解析】

术后早期下床活动与伤口感染的发生与否无关。

27、重症肌无力属于（ ）。

- A. 遗传性疾病
- B. 神经本身病变的疾病
- C. 炎症性疾病
- D. 神经-肌肉接头传递障碍性疾病
- E. 肌肉本身病变的疾病

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

28、脑水肿多产生在肾综合征出血热哪一病期（ ）。

- A. 低血压休克期
- B. 发热期
- C. 少尿期
- D. 多尿期
- E. 恢复期

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

29、女性，18岁。低热，腹痛、腹泻伴腹胀2个月。体查：腹壁揉面感，腹部移动性浊音阳性。腹水为渗出液。为明确诊断，下列检查最有价值的是（ ）。

- A. 血培养
- B. 结核菌素试验
- C. 腹膜活检
- D. 腹水细菌培养

【正确答案】

C

【答案解析】

病例特点：①青年女性；②有不明原因的低热；⑤伴有腹痛、腹泻、腹胀，腹水征（+）、腹壁揉面感；④腹水为渗出液性质。腹壁揉面感为结核性腹膜炎的特征性体征之一。患者最有可能是结核性腹膜炎。下一步做腹腔镜检查及活检，有确诊价值。

30、慢性丙型肝炎，抗HCV（+），HCV PCR（+），ALT 120U/L，肝肋下1.0cm，脾界不大，侧卧未触及，此患根本治疗是（ ）。

- A. 应用甘利欣降酶
- B. 护肝治疗
- C. 应用促肝细胞生长因子
- D. 调节免疫治疗
- E. 抗病毒应用干扰素治疗

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

三、B1型题（以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、c、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。）

1、（共用备选答案）

- A.利多卡因
- B.奎尼丁

- C.普罗帕酮
- D.普萘洛尔
- E.胺碘酮

1. 可阻滞钠、钾、钙离子通道（ ）。

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

2. 可用于洋地黄中毒所致的室性心律失常（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

3. 可用于嗜铬细胞瘤所致的室性心律失常（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2、（共用备选答案）

- A.智力低下，特殊外貌，关节过伸，通贯手
- B.智力低下，特殊外貌，四肢粗短，躯干较长
- C.智力低下，特殊外貌，听力障碍，肝脾肿大
- D.智力低下，表情呆滞，反复抽搐，尿发霉臭味
- E.智力低下，表情呆滞，面色蜡黄，舌头震颤

1. 苯丙酮尿症（ ）。

『答案解析』
暂无解析。

2. 先天愚型（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』
暂无解析。

3、（共用备选答案）

- A.精神分析学派
- B.行为主义学派
- C.人本主义学派
- D.心理生理学理论
- E.完形学派

男，38岁。会阴部不适，双侧睾丸疼痛1年。社区医院按“前列腺炎”治疗效果不明显，近期症状加重，出现血精。查体：睾丸正常，左侧附睾尾部肿大，质地偏硬，左输精管增粗，呈“串珠状”改变。直肠指检：前列腺略大，有大小不等的结节，无压痛。

1. 最可能的诊断是（ ）。

- A. 前列腺癌
- B. 附睾、输精管炎
- C. 精囊炎
- D. 慢性前列腺炎
- E. 生殖系统结核

【正确答案】

E

【答案解析】

A项，前列腺癌晚期可出现排尿困难及尿路刺激症状，直肠指诊前列腺表面高低不平、质地坚硬，有时可触及硬结并有压痛。BCD三项，附睾、输精管炎、精囊炎、慢性前列腺炎等泌尿生殖系感染多伴发热、尿频、尿急、尿痛等症状。

2. 为协助诊断，需补充的最重要的病史是（ ）。

- A. 不洁性生活史
- B. 泌尿系感染史
- C. 附睾炎病史
- D. 睾丸炎病史
- E. 结核病史

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

4. （共用题干）

26岁已婚女性，停经6周，少量阴道流血2天，突感下腹坠痛及肛门坠胀感，伴头晕呕吐半天。查体：面色苍白，血压90/60mmHg，右下腹压痛、反跳痛、腹肌紧张。妇科检查：阴道少量血性物，宫颈举痛（+），后穹隆饱满，子宫稍大，附件区触诊不满意。

1. 最可能的诊断是（ ）。

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 卵巢囊肿蒂扭转
- D. 异位妊娠
- E. 急性阑尾炎

【正确答案】

D

【答案解析】

根据病史及检查，该患者可能是异位妊娠破裂，伴腹腔内出血。

2. 为明确诊断，首选辅助检查是（ ）。

- A. 血常规及出凝血时间
- B. 后穹窿穿刺
- C. 尿妊娠试验
- D. 诊断性刮宫
- E. B型超声检查

【正确答案】

B

【答案解析】

怀疑患者有腹腔内出血，行后穹窿穿刺，若抽出不凝血可明确诊断。阴道后穹窿穿刺是一种简单可靠的诊断方法，适用于疑有腹腔内出血的女性患者。腹腔镜检查为异位妊娠的金标准。

3. 确诊后，正确处理措施为（ ）。

- A. 纠正休克
- B. 静脉输液
- C. 输血同时手术探查
- D. 雌激素治疗
- E. 应用抗生素

【正确答案】

C

【答案解析】

患者有休克体征，需要在纠正休克的同时进行手术治疗。

35岁，女性，双胎妊娠，胎膜早破，规律宫缩15小时，子宫颈口开大2cm，行剖宫产术，术后静脉点滴抗生素预防感染。第4天出现发冷、发热和腹痛，乳房胀，体温39.5℃，持续4小时。检查子宫底平脐，压痛阳性，恶露污浊有臭味。

1. 可能考虑的诊断是（ ）。

- A. 急性乳腺炎
- B. 乳腺乳汁淤积
- C. 急性膀胱炎
- D. 急性子宫内膜炎
- E. 上呼吸道感染

【正确答案】

D

【答案解析】

患者胎膜早破、产后发热、子宫复旧不良、压痛阳性、恶露污浊有臭味，首先考虑急性子宫内膜炎的诊断。

2. 最可能造成感染的原因是（ ）。

- A. 年龄过大
- B. 双胎妊娠
- C. 胎膜早破
- D. 乳头皲裂
- E. 胎盘残留

【正确答案】

C

【答案解析】

子宫内膜炎与胎膜早破、产程长、手术产有关。

3. 下列处理哪项不正确？（ ）

- A. 宫腔分泌物细菌培养和药敏试验
- B. 产妇采用半卧位、乳房热敷
- C. 物理和药物降温
- D. 选用对需氧菌和厌氧菌有效的抗生素联合治疗
- E. 诊断性刮宫

【正确答案】

E

【答案解析】

剖宫产不可能胎盘残留，患者可能有子宫内膜炎，此时不可刮宫，易使炎症扩散导致全身败血症。

