

临床执业医师历年真题解析

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、肱骨中下1/3骨折，最易发生的并发症是（ ）。

- A. 正中神经损伤
- B. 肱动脉损伤
- C. 尺神经损伤
- D. 桡神经损伤
- E. 肱二头肌断裂伤

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2、对于人免疫缺陷病毒的特点，哪一项是不正确的？（ ）

- A. 引起人类艾滋病
- B. 只感染CD4⁺细胞
- C. 可通过性行为传播
- D. 不能经胎盘传播
- E. 可通过输血传播

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

3、右手食指指腹切削伤，有较大皮肤缺损，创底组织血液循环良好，此伤口正确的处理方法是（ ）。

- A. 拉拢缝合
- B. 切除末节指骨，缩短手指后直接缝合
- C. 中厚皮片移植
- D. 带蒂皮瓣移植
- E. 凡士林纱布覆盖包扎，定期换药

【正确答案】

C

【答案解析】

手外伤清创后，如无特殊情况，应一期闭合伤口，用凡士林纱布包扎定期换药是错误的。右手食指功能重要，切除末节缩短手指，将影响功能，不宜采用。指腹切削伤掌面皮肤有较大缺损。拉拢直接缝合不可能，故应采用中厚皮片或带蒂皮瓣移植。此例创底血运良好，可采用中厚皮片移植。

4、在任何原因引起的急性继发性化脓性腹膜炎的病例中，其最关键的治疗是（ ）。

- A. 输液、纠正水电解质和酸碱平衡
- B. 输血
- C. 应用大量广谱抗生素
- D. 禁食和胃肠减压
- E. 消除病因，充分引流，用抗生素

【正确答案】

E

【答案解析】

急性继发性化脓性腹膜炎的治疗：①非手术治疗：对病情较轻，或病程较长超过24小时，且腹部体征已减轻或有减轻趋势者，或伴有严重心肺等脏器疾病不能耐受手术者，可行非手术治疗。②手术治疗：绝大多数的继发性腹膜炎需要及时手术治疗。手术原则为处理原发灶，清理腹腔，充分引流。

5、缺O₂引起的呼吸加深加快主要是通过什么感受器引起的（ ）。

- A. 刺激中枢化学感受器转而兴奋呼吸中枢
- B. 直接刺激呼吸中枢
- C. 刺激主动脉弓、颈动脉窦压力感受器
- D. 刺激主动脉体、颈动脉体压力感受器
- E. 刺激主动脉体、颈动脉体化学感受器

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

6、关于先天性甲状腺功能减低症的治疗，以下错误的是（ ）。

- A. 甲状腺素终生治疗
- B. 临床症状改善，T₄、TSH正常
- C. 甲状腺素治疗维持至青春期即可停药
- D. 甲状腺素自小剂量开始逐渐增加剂量
- E. 生后1~2个月开始治疗，可不遗留神经系统损害

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

7、女性，22岁，患糖尿病7年，一直用胰岛素治疗。1小时前昏迷，检查皮肤湿冷，血压120/80mmHg，BUN 4.3mmol/L，CO₂CP 22.0mmol/L。最可能的诊断是（ ）。

- A. 高渗性非酮症性糖尿病昏迷
- B. 糖尿病酮症酸中毒昏迷
- C. 乳酸性酸中毒昏迷
- D. 低血糖昏迷
- E. 脑血管疾病

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

8、下列哪项是磺脲类药物的主要副作用？（ ）

- A. 肝功能损害
- B. 低血糖反应
- C. 恶心、呕吐
- D. 白细胞减少
- E. 皮肤瘙痒

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

- A. 无客观刺激时的知觉体验
- B. 对客观事物歪曲的知觉
- C. 可以纠正的一种知觉障碍
- D. 对客观事物作出相反印象的知觉障碍
- E. 以上都不对

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

10、下列对血清的叙述正确的是血液（ ）。

- A. 去除有形成分后的液体
- B. 去除有形成分和纤维蛋白原后的液体
- C. 去除红细胞、白细胞和血小板后的液体
- D. 发生血凝后的液体部分
- E. 加抗凝剂后离心所得的上清

【正确答案】

D

【答案解析】

血液由液态的血浆与混悬在其中的红细胞、白细胞和血小板组成。血液凝固后析出淡黄色透明液体，称作血清。凝血过程中，血浆中的纤维蛋白原转变成纤维蛋白析出，故血清中无纤维蛋白原。

11、哪级政府负责储备防治传染病的药品医疗器械和其他物资，以备调用？（ ）

- A. 省级人民政府
- B. 市级以上人民政府
- C. 县级以上人民政府
- D. 省级以下人民政府
- E. 中央人民政府

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

12、以下哪项是大脑中动脉皮质支闭塞引起对侧偏瘫的特点？（ ）

- A. 均等性轻偏瘫
- B. 偏瘫以下肢为重
- C. 不伴脑神经瘫
- D. 偏瘫以上肢为重
- E. 上下肢均为0级瘫

【正确答案】

D

【答案解析】

大脑中动脉皮质支闭塞表现：①上部分支卒中：包括眶额、额部、中央前回及顶前部分支，导致病灶对侧面部、手及上肢轻偏瘫和感觉缺失，下肢不受累，伴Broca失语（优势半球）和体象障碍（非优势半球），无同向性偏盲；②下部分支卒中：导致对侧同向性偏盲，下部视野受损严重；对侧皮质感觉如图形觉和实体辨别觉明显受损，病觉缺失、穿衣失用和结构性失用等，无偏瘫；优势半球受累出现Wernicke失语。

13、胫骨易发生骨折的部位是（ ）。

- A. 上端干骺端部位
- B. 中上1/3处

C. 胫骨中段

E. 踝上部位

【正确答案】

D

【答案解析】

胫骨易发生骨折的部位是中下1/3交界处，胫骨上2/3横切面呈三棱形，下1/3横切面呈四边形，两者交界处是骨折的好发部位。

14、女性青春期最早出现的是（ ）。

- A. 月经来潮
- B. 乳房发育
- C. 体格发育
- D. 骨盆变化
- E. 脂肪蓄积

【正确答案】

B

【答案解析】

乳房发育是女性第二性征的最初特征，是女性青春期发动的标志。

15、下列有关密码的叙述，错误的是（ ）。

- A. 有终止密码和起始密码
- B. 密码无标点符号
- C. 密码有简并性
- D. 密码有通用性
- E. 蛋白质中的氨基酸均有相应密码

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

16、心理医生欲对病人进行人格测定，可以选用以下哪个工具？（ ）

- A. MMPI
- B. WAIS
- C. S-B
- D. SCL-90
- E. HAMD

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

17、直接激活蛋白激酶C的化合物是（ ）。

- A. cAMP
- B. DAG
- C. IP₃
- D. PIP₂
- E. cGMP

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

- B. 病人角色强化
- C. 病人角色冲突
- D. 病人角色恐惧
- E. 病人角色减退

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

19、甲状腺功能低下者何时开始甲状腺素制剂治疗智力大多数可达到正常？（ ）

- A. <3个月
- B. 6个月
- C. 1岁
- D. 3岁
- E. 5岁

【正确答案】

A

【答案解析】

甲状腺功能低下应该早期诊断，早期治疗，以减少对脑发育的损害。如果出生后3个月内开始治疗，预后比较好，绝大多数智力可以达到正常，如果6个月后才开始治疗，虽然可以改善生长状况，但是智力仍然会受到严重损害。

20、血浆蛋白琼脂糖电泳图谱中脂蛋白迁移率从快到慢的顺序为（ ）。

- A. β 、前 β 、 β 、CM
- B. α 、 β 、前 β 、CM
- C. α 、前 β 、 β 、CM
- D. CM、 α 、前 β 、 β
- E. 前 β 、 β 、 α 、CM

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

21、不属于病毒的致病机制的是（ ）。

- A. 改变细胞膜抗原
- B. 使细胞融合
- C. 基因与细胞基因整合，导致细胞转化
- D. 在细胞内复制，造成细胞死亡
- E. 释放侵袭性酶使细胞裂解

【正确答案】

E

【答案解析】

病毒的致病机制有杀细胞效应（细胞内复制裂解细胞）、稳定状态感染（细胞融合、改变细胞表面抗原）、包涵体形成、细胞凋亡、基因整合与细胞转化；释放侵袭性酶使细胞裂解属于细菌的致病机制。

22、关于中度敌百虫中毒患者，以下哪项有误？（ ）

- A. 缓解后观察3~5天，注意病情变化

- B. 立即用2%NaHCO₃水10000ml彻底洗胃
- C. 立即静脉注射阿托品
- D. 根据病情和治疗反应调整药物剂量

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

23、动脉导管未闭，在婴幼儿期或形成肺动脉高压或合并心衰时，常见（ ）。

- A. 胸骨左缘第4肋间连续性杂音
- B. 胸骨左缘第2肋间连续性杂音
- C. 胸骨左缘第4肋间舒张期杂音
- D. 胸骨左缘第2肋间收缩期杂音
- E. 胸骨左缘第2肋间舒张期杂音

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

24、Murphy征阳性提示是（ ）。

- A. 细菌性肝脓肿
- B. 急性胆管炎
- C. 肝总管结石
- D. 左肝管结石
- E. 急性胆囊炎

【正确答案】

E

【答案解析】

检查时医师以左手掌平放于患者右胸下部，以拇指指腹勾压于右肋下胆囊点处，然后叮嘱患者缓慢深呼吸，在吸气过程中发炎的胆囊下移时碰到用力按压的拇指，即可引起疼痛，此为胆囊触痛，如因剧烈疼痛而致吸气终止称Murphy征阳性。Murphy征阳性提示急性胆囊炎。

25、下列不符合猩红热皮疹特点的是（ ）。

- A. 皮疹粗糙，砂纸样
- B. 可见口周苍白圈
- C. 在腋窝、腹股沟及皮肤皱折处皮疹稀疏
- D. 常在24小时内遍及全身
- E. 疹退后有脱皮，无色素沉着

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

26、某医师为不得罪同事，将病人严格区分为“你的”和“我的”，对其他医师所负责的病人一概不闻不问，即使同事出现严重失误，也是如此。这种做法违反下列哪条道德原则？（ ）

- A. 彼此独立、互相支持和帮助
- B. 彼此平等、互相尊重
- C. 彼此信任、互相协作和监督
- D. 彼此独立、互相协作和监督
- E. 彼此平等、互相协作和监督

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

27、10个月女婴，单纯母乳喂养，面色渐苍白2个月，烦躁，食欲不佳，不愿活动，肝肋下2cm，脾肋下可触及边

- B. 营养性缺铁性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 地中海性贫血
- E. 铁粒幼红细胞性贫血

【正确答案】

B

【答案解析】

患儿8个月婴儿，单纯母乳喂养，病程2个月，症状面色苍白、纳差、烦躁、脾大髓外造血代偿。血象Hb<110g/L，MCV<80fl，MCH<26pg，MCHC<0.31符合营养性缺铁性贫血。主要鉴别营养性巨幼细胞性贫血，临床症状有神经系统症状如智力 and 动作发育落后甚至倒退，手足不规则震颤，MCV>94fl，MCH>32pg。再生障碍性贫血脾不大。

28、有关乳房纤维腺瘤治疗说法正确的是（ ）。

- A. 手术切除是治疗的唯一有效办法
- B. 可用疏肝理气、调和冲任的中药治疗
- C. 可用雌激素补充治疗
- D. 可用雌激素拮抗剂治疗
- E. 可用孕激素补充治疗

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

29、以下哪种情况可以试产？（ ）

- A. 中骨盆横径狭窄
- B. 中骨盆和出口平面狭窄
- C. 出口横径+后矢状径<15cm
- D. 轻度入口平面狭窄
- E. 明显头盆不称

【正确答案】

D

【答案解析】

D项，根据骨盆入口平面狭窄程度，分为3级：①I级为临界性狭窄，骶耻外径18cm，对角径11.5cm，骨盆入口前后径10.0cm，绝大多数可经阴道自然分娩；②II级为相对性狭窄，骶耻外径16.5~17.5cm，对角径10.0~11.0cm，骨盆入口前后径8.5~9.5cm，需经试产后才能决定是否可以经阴道分娩；③III级为绝对狭窄，骶耻外径≤16.0cm，对角径≤9.5cm，骨盆入口前后径≤8.0cm，必须剖宫产结束分娩。I级和II级为轻度入口平面狭窄，故可试产。ABC三项，中骨盆平面狭窄主要影响胎头俯屈及内旋转，容易导致持续性枕后位或枕横位，产妇多表现活跃期及第二产程延长及停滞、继发性宫缩乏力。若宫口开全，胎头双顶径已达坐骨棘水平或以下，多能转至枕前位自然分娩，个别情况需手转胎头阴道助产。若宫口开全已1小时以上，产力良好而胎头双顶径仍在坐骨棘水平以上，或伴有胎儿窘迫征象，应行剖宫产术。而出口平面狭窄不应阴道试产，尤其是出口横径+后矢状径<15cm者，足月胎儿不宜经阴道分娩，应行剖宫产术结束分娩。E项，明显头盆不称则更不宜试产。

30、血红素生成的基本原料是（ ）。

- A. 铁、维生素B₁₂
- B. 叶酸、维生素B₁₂
- C. 蛋白质、叶酸
- D. 蛋白质、维生素B₁₂

- E. 铁、蛋白质

【正确答案】

E

【答案解析】

蛋白质和铁是合成血红蛋白的基本原料。维生素B₁₂和叶酸是红细胞合成DNA必需有的合成核苷酸的辅助因子。

31、存在于核糖分子中的碱基有几种？（ ）

- B. 3种
- C. 4种
- D. 5种
- E. 6种

【正确答案】

D

【答案解析】

核苷酸分子由碱基、核糖（脱氧核糖）和磷酸3种分子连接而成。碱基与糖通过糖苷键连成核苷，核苷与磷酸以酯键结合成核苷酸。参与核苷酸组成的主要碱基有5种：A、U、T、G、C。故本题答案为D项。

32、霍奇金病最有诊断意义的细胞是（ ）。

- A. R-S细胞
- B. 霍奇金细胞
- C. 陷窝细胞
- D. 多形性瘤细胞
- E. 嗜酸性细胞

【正确答案】

A

【答案解析】

病理组织学检查发现R-S细胞是霍奇金病的特点，具有诊断意义。

33、下列哪一项不是幼儿期的保健重点？（ ）

- A. 防止意外事故
- B. 加强早教
- C. 预防风湿热
- D. 防止营养缺乏
- E. 培养良好进食习惯

【正确答案】

C

【答案解析】

幼儿期保健重点是：①加强早教，促进幼儿语言、运动及心理发育。②培养良好的进食习惯，防止营养缺乏症。③幼儿已学会走、跑、跳，好动，智能发育快，识别危险力差，要防止意外事故发生。④幼儿期不患风湿热及相关结缔组织类疾病。

34、下列哪项是嘌呤核苷酸分解代谢的终产物？（ ）

- A. 胺
- B. 尿酸
- C. 尿素
- D. 肌酐
- E. β -丙氨酸

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

35、网状纤维主要见于肿瘤哪里才有意义？（ ）

- A. 癌细胞之间
- B. 肿瘤腺管之间
- C. 肉瘤细胞之间
- D. 癌细胞团之间
- E. 转移癌细胞之间

【正确答案】

暂无解析。

36、下列哪项是膜性肾小球肾炎的主要病理特点？（ ）

- A. 肾小球系膜细胞和内皮细胞增生
- B. 肾小球基底膜弥漫性增厚并有钉突形成
- C. 肾小球系膜细胞增生、基底膜增厚及分层
- D. 肾小球局灶性硬化
- E. 肾小球脏层上皮细胞足突消失

【正确答案】

B

【答案解析】

膜性肾小球肾炎的主要病理特点是肾小球基底膜弥漫性增厚并有钉突形成。故本题答案为B项。

37、中度脱水的临床表现哪一项是错误的？（ ）

- A. 皮肤弹性差
- B. 失水量为体重的5%~10%
- C. 眼窝、前囟明显凹陷
- D. 四肢厥冷
- E. 尿量明显减少

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

38、确诊化脓性脑膜炎的依据是（ ）。

- A. 颈项强直
- B. 全身性惊厥
- C. 婴儿前囟膨隆、呕吐
- D. 头部CT检查
- E. 脑脊液中找到致病菌

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

39、男性，40岁，长期从事办公室工作，弯腰取物时，突感腰部疼痛来诊。体格检查发现被动姿势，腰3~4右椎旁及腰3右横突压痛明显，放射到臂部、腰部，右直腿抬高试验(+)，加强试验(-)。应诊断为（ ）。

- A. 急性腰扭伤
- B. 腰肌劳损
- C. 腰椎管狭窄症
- D. 腰椎间盘突出症

- E. 腰椎滑脱

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

40、《母婴保健法》规定，主管全国母婴保健工作的是（ ）。

- A. 中华全国总工会
- B. 全国妇女联合会

E. 国务院卫生行政部门

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

41、某患者因近3日腹泻、腹痛前来就诊。自述有里急后重感，便内有脓血。试问如下一步为确诊进行微生物学检查时，应如何取材？（ ）

- A. 尿
- B. 血液
- C. 脓血便
- D. 血清
- E. 胃液

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

42、氨苯蝶啶的副作用是（ ）。

- A. 产生高血糖反应
- B. 产生高血钾症
- C. 产生低氯碱血症
- D. 具有抗醛固酮作用
- E. 产生低血钠症

『正确答案』

B

『答案解析』

氨苯蝶啶属于保钾利尿剂，长期服用可导致高血钾。

43、别构效应剂与酶结合的部位是（ ）。

- A. 活性中心的结合基团
- B. 活性中心的催化基团
- C. 活性中心外的调节部位
- D. 活性中心外的催化部位
- E. 活性中心外的任一部位

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

44、血浆胶体渗透压降低时可引起（ ）。

- A. 尿少
- B. 组织液增多
- C. 组织液减少
- D. 红细胞萎缩
- E. 红细胞膨胀和破裂

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

- B. X线摄片
- C. B型超声
- D. 核素骨扫描
- E. MRI

【正确答案】

B

【答案解析】

骨擦感为骨折的特有体征，怀疑骨折时应首选X线片以确诊。

46、长期采用全胃肠外营养，理想静脉为（ ）。

- A. 颈内或锁骨下静脉
- B. 颈外静脉
- C. 头静脉
- D. 大隐静脉
- E. 上肢静脉

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

47、呆小症与侏儒症的最大区别是（ ）。

- A. 内脏增大
- B. 身体更矮
- C. 智力低下
- D. 肌肉发育不良
- E. 身体不成比例

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

48、下列关于蛋白质结构叙述中不正确的是（ ）。

- A. 一级结构决定二、三级结构
- B. 三级结构是指蛋白质分子内所有原子的空间排列
- C. α 螺旋为二级结构的一种形式
- D. 二、三级结构决定四级结构
- E. 无规卷曲是在一级结构基础上形成的

【正确答案】

D

【答案解析】

一级结构是空间结构的基础，具有2条以上多肽链组成的蛋白质才具有四级结构。

49、不是颅内压增高的表现有（ ）。

- A. 剧烈头疼
- B. 喷射性呕吐
- C. 前囟饱满，张力增高
- D. 头围增大
- E. 两侧瞳孔不等大

【正确答案】

颅内压增高的表现有：剧烈头痛、喷射性呕吐、前囟饱满、张力增高、头围增大等；舌开脑疝时表现为呼吸不规则、天然瞳孔障碍加重、瞳孔不等大等征兆。

50、免疫应答的特点不具有（ ）。

- A. 特异性
- B. 记忆性
- C. 识别自己非己
- D. 非特异性
- E. 耐受性

【正确答案】

C

【答案解析】

免疫应答可分为固有免疫应答和适应性免疫应答。固有免疫应答的特征是：①无特异性，作用广泛；②先天具备；③初次与抗原接触即能发挥效应，但无记忆性；④可稳定遗传；⑤同一物种的正常个体间差异不大。适应性免疫应答的特征是：①特异性；②耐受性；③记忆性。

51、根据《医疗机构管理条例》的规定，下列说法中错误的是（ ）。

- A. 未取得《医疗机构执业许可证》，不得开展诊疗活动
- B. 医疗机构必须按照核准登记的诊疗科目开展诊疗活动
- C. 医疗机构不得使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作
- D. 医疗机构工作人员上岗工作，必须佩带载有本人姓名、职务或者职称的标牌
- E. 医疗机构的《医疗机构执业许可证》可以悬挂出来，也可以妥善收藏起来

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

52、晚期卵巢癌治疗，首选的方法是（ ）。

- A. 肿瘤切除术
- B. 肿瘤细胞减灭术+化学治疗
- C. 放射治疗
- D. 化学治疗
- E. 激素治疗

【正确答案】

B

【答案解析】

恶性肿瘤的治疗原则以手术和化疗为主，辅以放疗及其他综合治疗。晚期卵巢癌尽量切除癌组织及转移灶，并辅以化疗。

53、甲状腺功能亢进与下列哪种精神障碍的表现类似，容易误诊？（ ）

- A. 焦虑症
- B. 恐惧症
- C. 抑郁症
- D. 躁狂症
- E. 精神分裂症

【正确答案】

D

【答案解析】

甲状腺功能亢进是由于甲状腺素分泌过多所致。精神症状主要表现为精神运动性兴奋，包括失眠、话多、易激惹、烦躁，与心境障碍躁狂发作的临床表现有类似之处，既往有误诊者。因此在做出精神科诊断之前，必须进行相关实验室检查，以排除躯体疾病所致精神障碍。故本题答案为D项。

54、女性，55岁，髌关节骨关节炎，有明显疼痛和运动障碍，严重影响生活质量，应首选（ ）。

- A. 髌关节融合术

- C. 人工关节置换术
- D. 关节清理术
- E. 钻孔减压术

【正确答案】

C

【答案解析】

骨关节炎的病理学改变是不可逆转的，随年龄增长而有加重，因此早期用非手术治疗，缓解或解除症状，增加活动范围，增强关节稳定性，延缓病情发展。对50岁以上老年人，有明显疼痛和运动障碍，严重影响生活质量者，如没有全身的手术禁忌证，行人工关节置换术为首选，能有效地缓解疼痛，维持和增加关节的稳定性和活动度，提高生活质量。

55、急性心包炎的心电图改变为（ ）。

- A. 常规12个导联（除aVR外）皆出现ST段呈弓背向下抬高
- B. 出现病理性Q波
- C. 各导联ST段呈弓背向上抬高
- D. 于冠状动脉所支配的相应导联上出现弓背向上ST段抬高
- E. 于冠状动脉所支配的相应导联上出现ST段水平下降

【正确答案】

A

【答案解析】

急性心包炎是指心包各层的炎症，其心电图典型表现为：ST段抬高，见于除aVR导联以外的所有常规导联中，呈弓背向下型，aVR导联中ST段压低。

56、短效口服避孕药含有的成分是（ ）。

- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. 雌激素+雄性激素
- D. 孕激素+雄性激素
- E. 雌激素+孕激素

【正确答案】

E

【答案解析】

口服避孕药是女性甾体激素避孕药，激素成分是雌激素和孕激素。

57、葡萄胎患者清宫后最适宜的避孕方法是（ ）。

- A. 短效口服避孕药
- B. 长效口服避孕药

- C. 放置宫内节育器
- D. 阴茎套
- E. 避孕针

【正确答案】

D

【答案解析】

葡萄胎患者清宫后推荐的避孕方法是避孕套和口服避孕药，但最理想的应是避孕套。

58、下述溶血性贫血的检查哪组是错误的？（ ）

- A. 酸化血清溶血试验——阵发性睡眠性血红蛋白尿
- B. 抗人球蛋白试验——自身免疫性溶血性贫血
- C. 红细胞渗透性增高——遗传性球形红细胞增多症
- D. 外周血中出现大量靶形红细胞——海洋性贫血
- E. 血红蛋白电泳——蚕豆病

【答案解析】
暂无解析。

59、骨折治疗的基本原则是（ ）。

- A. 复位后固定，给予促进骨折愈合
- B. 手法复位，外固定，给予活血化瘀药物
- C. 切开复位，内固定，给予抗生素
- D. 复位后固定，并开始功能锻炼
- E. 复位后固定，待解除固定后开始功能锻炼

【正确答案】

D

【答案解析】
暂无解析。

60、怀疑胰腺炎首选的影像学检查方法是（ ）。

- A. MRI
- B. B超检查
- C. CT
- D. X线气钡双重造影
- E. 胃镜

【正确答案】

B

【答案解析】
怀疑患者存在胰腺炎时，首选B超定性检查，随后可用CT定量。

二、A2型题（每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、真核生物染色体DNA复制特点不正确的为（ ）。

- A. 复制呈半不连续性
- B. 冈崎片段较短
- C. 需DNA聚合酶 α 、 β 参与

- D. 可有多个复制起始点
- E. 为半保留复制

【正确答案】

C

【答案解析】
暂无解析。

2、在280nm波长附近具有最大光吸收峰的氨基酸是（ ）。

- A. 色氨酸
- B. 丝氨酸
- C. 精氨酸
- D. 天冬氨酸
- E. 苯丙氨酸

【正确答案】

A

3、使磷酸化胆碱酯酶复活的药物是（ ）。

- A. 阿托品
- B. 氯解磷定
- C. 毛果芸香碱
- D. 新斯的明
- E. 毒扁豆碱

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

4、在免疫应答中有免疫调节作用的分子不包括（ ）。

- A. C9
- B. IgG
- C. IL-2
- D. C3b
- E. IgA

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

5、寻常疣和尖锐湿疣的病原是（ ）。

- A. CMV
- B. HSV-2
- C. HIV
- D. HPV
- E. EBV

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

6、引起急性乳腺炎最主要的原因是（ ）。

- A. 初产妇
- B. 先天性乳头内陷
- C. 有乳腺囊性增生症病史
- D. 全身抵抗力下降
- E. 乳头皮肤破溃损伤

【正确答案】

E

【答案解析】

急性乳腺炎的病因有：乳汁淤积和细菌侵入，其中皮肤破溃导致细菌入侵引起乳腺炎是最主要的途径。虽然初产妇的哺乳经验不足可以导致皮肤损伤，身体抵抗力下降可以使发生感染的机会增加，但都不是本病的主要原因，乳腺增生本身与感染无关。

7、女性，55岁，发现右乳腺肿物1周，查右乳外上象限肿物1.5cm×1.0cm，质硬、活动度小，确诊肿物性质最可靠的方法是（ ）。

- A. 钼靶X线
- B. 针吸细胞学
- C. B超
- D. 放射性核素扫描

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

8、阿司匹林的抗血小板作用机制为（ ）。

- A. 抑制血小板中TXA₂的合成
- B. 抑制内皮细胞中TXA₂的合成
- C. 激活环氧酶
- D. 促进内皮细胞中PGI₂的合成
- E. 促进血小板中PGI₂的合成

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

9、下列有关酶的叙述，正确的是（ ）。

- A. 生物体内的无机催化剂
- B. 对底物都有绝对专一性
- C. 能显著地降低反应活化能
- D. 催化活性都需要特异的辅酶
- E. 在体内发挥催化作用时，不受任何调控

【正确答案】

C

【答案解析】

酶的催化作用是它能明显地降低反应活化能。酶是蛋白质，不是无机催化剂，它对底物具有专一性，但并非都是绝对专一性，大部分是相对专一性，有些酶是需要辅酶的，但也有很多是不要辅酶的（即不属于结合蛋白的酶），酶在体内发挥作用是受到多种调节的。

10、在破伤风的治疗措施中，下列哪项是关键？（ ）

- A. 彻底清创，引流伤口，消除毒素来源
- B. 使用破伤风抗毒素中和游离的毒素

- C. 控制和解除痉挛，预防窒息
- D. 给予大量青霉素，抑制破伤风杆菌
- E. 积极支持治疗

【正确答案】

C

【答案解析】

破伤风是一种极为严重的疾病。要采取积极的综合治疗措施。其中控制和解除痉挛是治疗过程中关键的一环。当病人发生痉挛或抽搐时，常使痰不能排出，误吸，导致肺部感染等合并症。抽搐严重者可造成病人窒息，危及生命，增高死亡率。所以治疗的关键应选C项。

11、患者，男，25岁。右侧阴囊增大不适半年。检查肿块约2.0cm×2.5cm大小，有囊性感，无压痛。平卧位不消失，透光试验阳性。双侧睾丸、附睾可清楚触及，大小位置正常。应诊断为（ ）。

- A. 睾丸鞘膜积液
- B. 睾丸肿瘤
- C. 腹股沟疝
- D. 精索鞘膜积液
- E. 阴囊象皮肿

【正确答案】

D

和附睾可清楚触及，故诊断为精索鞘膜积液。

12、病毒在体内传播可通过的途径是（ ）。

- A. 胎盘或产道传播
- B. 沿神经传播
- C. 虫媒传播
- D. 水平传播
- E. 消化道传播

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

13、与血栓形成无关的是（ ）。

- A. 心血管内膜损伤
- B. 血小板数量增多
- C. 血流缓慢
- D. 癌细胞崩解产物
- E. 纤维蛋白溶解酶增多

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

14、小脑幕裂孔疝致一侧瞳孔散大的原因是（ ）。

- A. 疝侧中脑受压
- B. 动眼神经受压
- C. 动眼神经核受压
- D. 疝侧桥脑受压
- E. 疝侧延髓受压

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

15、对于癫痫的描述不正确的是（ ）。

- A. 遗传因素和环境因素均可影响痫性发作
- B. 按照病因可分特发性癫痫和症状性癫痫
- C. 每一位癫痫患者只有一种发作类型
- D. 女性患者通常在月经期和排卵期发作频繁
- E. 癫痫的临床表现可分痫性发作和癫痫症两方面

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

16、钩端螺旋体病凝集溶解试验阳性效价是（ ）。

- A. 1: 200
- B. 1: 100
- C. 1: 300
- D. 1: 400

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

17、全血的比重的决定因素是（ ）。

- A. 渗透压的高低
- B. NaCl的浓度
- C. 白细胞的数量
- D. 红细胞的数量
- E. 血浆蛋白的含量

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

18、使用明尼苏达多项人格调查表(MMPI)对某人的性格特征测量、分析和评价,属()。

- A. 观察法
- B. 调查法
- C. 会谈法
- D. 作品分析法
- E. 以上都不是

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

19、某男,三年前患肝炎,现体检发现,颈胸部有蜘蛛痣,腹部膨隆,有移动性浊音,腹壁浅静脉曲张,出现“海蛇头”,清蛋白/球蛋白比例倒置,应该诊断为()。

- A. 中度慢性肝炎

- B. 寄生虫性肝硬化
- C. 门脉性肝硬化
- D. 色素性肝硬化
- E. 淤血性肝硬化

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

20、炎症的基本病理变化不包括()。

- A. 变质
- B. 化生
- C. 渗出
- D. 增生
- E. 增殖

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

21、急性有机磷农药中毒最主要的死因是()。

- A. 急性肾功能衰竭

- C. 中毒性心肌炎
- D. 中毒性心肌炎
- E. 脑水肿

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

22、下列哪项是对心肌收缩力抑制作用最强的钙拮抗剂？（ ）

- A. 尼群地平
- B. 尼莫地平
- C. 硝苯地平
- D. 地尔硫草
- E. 维拉帕米

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

23、29岁妇女，结婚3年不孕。基础体温曲线呈单相型，经前5天取宫颈黏液，其特征应是（ ）。

- A. 量少黏稠
- B. 量少稀薄
- C. 量多黏稠
- D. 量多稀薄
- E. 量极少，不易取出

【正确答案】

D

【答案解析】

据患者病史，患者基础体温曲线单相型，不孕，考虑为排卵障碍导致的不孕。经前5天患者体内孕激素含量一直低下，而孕激素对于宫颈粘液的作用是使其变黏稠，故患者的宫颈粘液应量多稀薄。

24、关于抗动脉粥样硬化药，下列哪一项叙述是错误的？（ ）

- A. 调血脂药包括HMG-CoA还原酶抑制剂、考来烯胺（消胆胺）、烟酸、氯贝特（安妥明）
- B. 普罗布考是抗氧化剂
- C. 多不饱和脂肪酸可抑制动脉粥样硬化斑块的形成并使之消退
- D. 保护动脉内皮药不能预防动脉粥样硬化
- E. HMG-CoA还原酶是合成胆固醇的限速酶

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

25、白假丝酵母菌不能引起的感染是（ ）。

- A. 皮肤感染
- B. 粘膜感染
- C. 内脏感染
- D. 中枢神经系统感染
- E. 真菌中毒症

【正确答案】

E

【答案解析】

26、主动脉瓣在下列哪一期关闭? ()

- A. 等容收缩期开始时
- B. 快速充盈期开始时
- C. 等容舒张期开始时
- D. 快速射血期开始时
- E. 减慢充盈期开始时

【正确答案】

C

【答案解析】

半月瓣（主动脉瓣和肺动脉瓣）在快速射血期开始时开启，在等容舒张期开始时关闭。

27、下述哪项属于III型超敏反应性疾病? ()

- A. 枯草热
- B. SLE
- C. 过敏性溶血性贫血
- D. 结核
- E. 青霉素引起的过敏性休克

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

28、下述哪项是产生毒素与噬菌体有关的细菌? ()

- A. 大肠埃希菌
- B. 霍乱弧菌

- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 产气荚膜梭菌
- E. 白喉棒状杆菌

【正确答案】

E

【答案解析】

毒性噬菌体在敏感菌中增殖，使宿主菌裂解；温和噬菌体感染细菌后不增殖，其核酸整合到细菌染色体上，可使溶原性细菌的表型改变，溶原性白喉棒状杆菌中的前噬菌体可编码产生白喉毒素。故本题答案为E项。

29、颅内压增高的重要客观体征是 ()。

- A. 视力减退
- B. 视野向心性缩小
- C. 视神经乳头水肿
- D. 双侧外展神经麻痹
- E. 视神经萎缩

【正确答案】

C

【答案解析】

典型的颅内高压可表现为剧烈头痛、喷射状呕吐和视盘水肿，其中视盘水肿是颅内压增高最重要的客观体征。

30、患者，男，32岁，发现心脏杂音10年。查体：心尖部可闻及柔和的舒张早中期杂音，胸骨左缘第3、4肋间可闻及舒张期叹气样杂音向心尖部传导。该患者典型临床表现还应该包括 ()。

- A. 脉压增大
- B. 双颊紫红

【正确答案】

A

【答案解析】

患者系青年男性，发现心脏杂音10年，心尖部及主动脉瓣第二听诊区（胸骨左缘第3、4肋间）均可闻及杂音，诊断为主动脉瓣关闭不全。A项，主动脉瓣关闭不全时由于反流，左心室容量负荷增加，致使动脉收缩压增高。由于反流，进入循环血量减少，致舒张压降低，则脉压增大。BCDE四项，双颊紫红、心腰部膨出、左肺湿啰音、咯血均为二尖瓣狭窄表现。

三、B1型题（以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。）

1、（共用备选答案）

- A.主动型
- B.被动型
- C.强制型
- D.参与型
- E.合作型

1. 儿童病人的求医行为属于（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2. 昏迷病人的求医行为属于（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2、（共用备选答案）

- A.搏出量
- B.搏功
- C.心指数
- D.射血分数
- E.心输出量

1. 一次心跳一侧心室射出的血量称为（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2. 搏出量占心室舒张末期容积的百分比称为（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

3. 每平方体表面积的心输出量称为（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

3.（共用备选答案）

- A.肩关节脱位
- B.肘关节脱位
- C.髋关节前脱位
- D.髋关节后上脱位
- E.先天性髋关节脱位

1. Dugas征阳性（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2. 下肢短缩，髋关节屈曲、内收、内旋畸形（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

3. 摇摆步态（ ）。

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

4. 患肢呈外展、外旋和屈曲畸形（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

5. 肘后三角关系失常（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

4.（共用备选答案）

- C.鸡胸
- D.“O”型腿或“X”型腿
- E.脊柱畸形

1. 一般6个月内的佝偻病患儿，主要表现为（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 一般1岁左右的佝偻病患儿，容易出现的改变是（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

3. 一般8个月左右的佝偻病患儿，主要表现为（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

4. 一般1岁后会行走时的佝偻病患儿，容易表现为（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

5.（共用备选答案）

- A.暂停执业活动3个月至6个月
- B.暂停执业活动6个月至1年
- C.给予行政处分
- D.吊销医师执业证书
- E.追究刑事责任

1. 未经患者或者患者家属同意，对患者进行实验性治疗的，由卫生行政部门给予的处理是（ ）。

【答案解析】

未经患者或者其家属同意，对患者进行实验性临床医疗的，由县级以上人民政府卫生行政部门给予警告或者责令暂停6个月以上1年以下执业活动；情节严重的，吊销其执业证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2. 不按规定使用麻醉药品、精神药物，情节严重的，由卫生行政部门给予的处理是（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

不按照规定使用麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品和放射性药品的，由县级以上人民政府卫生行政部门给予警告或者责令暂停6个月以上1年以下执业活动；情节严重的，吊销其执业证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

四、A3型题（以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据考题所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1.（共用题干）

患者，9岁，眼睑浮肿4天，近2日加重，浮肿渐及全身，尿少，今晨感觉上腹部不适，频咳、气急。查体：体温37.5℃，眼睑及下肢浮肿，血压150/100mmHg，心率116次/分，心音钝，两肺闻及水泡音，肝肋下2.0cm。尿常规：蛋白质（++），红细胞20~30个/HP，血尿素氮6mmol/L。

1. 诊断考虑为（ ）。

- A. 急性肾炎伴肾功能不全
- B. 急性肾炎伴肺炎
- C. 急性肾炎伴循环充血
- D. 急性肾炎伴高血压脑病
- E. 急性肾炎伴心肌炎

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2. 该病急性期应卧床休息至（ ）。

- A. 抗“O”恢复正常
- B. 血沉降至正常
- C. 肉眼血尿消失，血压正常
- D. 镜下血尿消失，浮肿消退
- E. 尿Addis计数正常

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

3. 该患儿应做何处置最适当？（ ）

- A. 肌内注射利血平
- B. 限制水、钠摄入
- C. 肌内注射呋塞米
- D. 快速洋地黄化
- E. 静脉滴注硝普钠

【正确答案】

暂无解析。

2、（共用题干）

8岁男孩，高热10小时伴头痛、呕吐。查：T39°C，BP 50/30mmHg，精神萎靡，颈无抵抗，全身多数瘀点、瘀斑。血WBC $28\times 10^9/L$ ，中性90%。脑脊液检查：颅内压正常，WBC $15\times 10^6/L$ ，蛋白质、糖及氯化物均正常。

1. 本病人最可能的诊断是（ ）。

- A. 败血症
- B. 流脑
- C. 暴发型流脑
- D. 中毒性痢疾
- E. 病毒性脑炎

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2. 为尽快明确诊断应检测（ ）。

- A. 血培养
- B. 脑脊液培养细菌
- C. 瘀点涂片找细菌
- D. 脑脊液特异性抗原检测
- E. 血清特异性抗体检测

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

3、（共用题干）

6个月女婴，4月份入院，发热2天。体温38.0°C，咳嗽有痰，1天来惊厥4~5次，发作时两眼上窜，四肢抽动，持续1~2min，抽后神志清。体检：一般情况好，前囟2.5cm×2.5cm，平坦，枕骨按之有乒乓球感，双肺有中、小水泡音。

1. 最可能的诊断是（ ）。

- A. 婴儿手足搐搦症，支气管肺炎
- B. 支气管肺炎并发中毒性脑病
- C. 化脓性脑膜炎，支气管肺炎
- D. 急性喉炎

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 以下哪项化验结果是直接导致患儿惊厥的原因？（ ）

- A. 血钙1.87mmol/L (7.5mg/dl)
- B. 血镁0.80mmol/L (2mg/dl)
- C. 血磷2.25mmol/L (7mg/dl)
- D. 碱性磷酸酶200U
- E. 血清钙离子0.88mmol/L (3.5mg/dl)

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

4. (共用题干)

女性，21岁，消瘦、多饮2个月，咽痛、发热3天，意识不清4小时。

1. 哪一项体征对诊断有特殊意义？（ ）

- A. 皮肤干燥、“洗衣手”
- B. 心动过速
- C. 中度昏迷
- D. 呼气有烂苹果味
- E. 血压80/60mmHg

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 最快获得诊断的检测为（ ）。

- A. 尿糖，尿酮
- B. 血浆血糖测定
- C. 血气分析
- D. 血糖，血酮
- E. 尿常规

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

5. (共用题干)

27岁初孕妇，妊娠39周，近半月头痛、眼花，今晨出现剧烈头痛并呕吐来院就诊。

1. 最有参考价值的病史是（ ）。

- A. 有高血压家族史
- B. 既往血压正常
- C. 既往无头痛史
- D. 有患病毒性肝炎史
- E. 有颈椎病病史

【正确答案】

B

【答案解析】

妊娠期高血压是指妊娠期首次出现血压 $\geq 140/90\text{mmHg}$ 并于产后12周恢复正常。故既往血压情况对妊高症的诊断最有参考价值。

2. 与慢性肾炎相鉴别，最有意义的检查结果是（ ）。

- A. 肌酐值增高
- B. 尿素氮值增高
- C. 尿酸值增高
- D. 尿蛋白增高
- E. 肌酸值增高

【正确答案】

C

【答案解析】

妊高症肾功能受损时血清肌酐、尿素氮、尿酸升高。慢性肾炎无尿酸增高。

3. 听诊胎心180次/分，此时正确的处理措施应是（ ）。

- A. 对症处理
- B. 立即静脉滴注催产素
- C. 静脉滴注硫酸镁
- D. 立即行剖宫产术
- E. 静脉快速滴注甘露醇

【正确答案】

D

【答案解析】

目前有胎儿宫内窘迫征象，应立即剖宫产。

