

重庆医科大学临床医学历年考研真题

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、轻度或中度高血压病人，术前要求血压（ ）。

- A. 降至正常
- B. 维持原水平
- C. 降至原水平低点
- D. 降至正常水平点
- E. 以上都不是

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2、有关结肠癌的描述，正确的是（ ）。

- A. 溃疡型癌多见于右半结肠，一般预后良好
- B. 肿块型癌多发生在乙状结肠，易引发肠梗阻
- C. 肿块型癌多发生在升结肠，易引发肠梗阻
- D. 浸润型癌多发生在左半结肠，易引起肠腔狭窄
- E. 患者血清CEA均增高

『正确答案』

D

『答案解析』

降结肠癌以浸润型为主，主要表现为局部症状，如频繁腹泻，一般无法触及肿物，易引起梗阻。升结肠癌以肿块型为主，主要表现为自身症状，如低热，消瘦、乏力等，一般容易触及肿块，不易引起梗阻。E项，结直肠癌的血清学诊断尚不够灵敏和特异，因此并非所有患者血清CEA均增高。

3、下述哪项是消化性溃疡的最常见合并症？（ ）

- A. 穿孔
- B. 幽门狭窄
- C. 癌变
- D. 出血
- E. 粘膜萎缩

『正确答案』

D

『答案解析』

消化性溃疡的最常见合并症是出血、幽门狭窄、穿孔和癌变。粘膜萎缩不是消化性溃疡的合并症。故本题答案为D项。

4、细胞坏死镜下主要形态表现是（ ）。

- A. 核溶解、胞浆浓缩、核膜破裂
- B. 核浓缩、核膜破裂、胞浆浓缩
- C. 核破裂、胞浆浓缩、胞核破裂
- D. 核浓缩、核碎裂、核溶解
- E. 核碎裂、胞浆浓缩、核膜破裂

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

5、面部开放性损伤，受伤后12小时来诊，局部处理宜（ ）。

- A. 作感染后处理、换药、部清创
- B. 清创后不予缝合
- C. 清创后延期缝合
- D. 清创后一期缝合
- E. 以上均不是

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

6、女，42岁，多饮、多食10年，空腹血糖经常大于 10.8mmol/L 。近两个月来眼睑及下肢轻度水肿，血压 $160/100\text{mmHg}$ ，尿蛋白（++）。最可能的诊断为（ ）。

- A. 糖尿病肾病
- B. 高血压病
- C. 糖尿病合并肾盂肾炎
- D. 肾小球肾炎
- E. 糖尿病酮症酸中毒

『正确答案』

A

『答案解析』

病人虽只有42岁，但多饮、多尿、多食病史已10年。空腹血糖经常大于 10.8mmol/L ，可见是一例1型糖尿病患者，其糖尿病10年控制不满意，因而更易发生糖尿病性慢性并发症。糖尿病性慢性并发症最常见的是糖尿病肾病和糖尿病性视网膜病变。本例病人在长期糖尿病控制不好的基础上，近2个月有眼睑及下肢轻度浮肿、血压增高为 $160/100\text{mmHg}$ ，尿蛋白（++）。病人这一段时间已有了明显肾脏损害，首先要考虑糖尿病肾病。

7、肾小球滤过率是指单位时间内（ ）。

- A. 每侧肾脏生成的原尿量
- B. 两侧肾脏生成的原尿量
- C. 每侧肾脏生成的终尿量
- D. 两侧肾脏生成的终尿量
- E. 每侧肾血浆的滤过量

『正确答案』

B

『答案解析』

肾小球滤过率是指单位时间内（通常指每分钟）两肾所生成原尿的量。正常成人安静时约为 125mL/min 。

8、对结核性腹膜炎最有价值的检查是（ ）。

- A. PPD试验
- B. 结肠镜试验
- C. 血沉
- D. 腹腔积液常规
- E. 腹腔镜+腹膜活检

『正确答案』

E

『答案解析』

一般适用于有游离腹水的患者，可见腹膜、网膜、内脏表面有散在或集聚的灰白色结节，浆膜失去正常光泽，混浊粗糙。活组织检查具有确诊价值。腹腔镜检查在腹膜有广泛粘连者属禁忌。

9、女，23岁，问她“你是哪里人？”病人快速回答说：“我是中国人，祖国在我心中，我三中毕业，到山中去，矿物局山中，我在矿山当会计……”

- A. 思维松弛
- B. 思维不连贯
- C. 思维奔逸
- D. 思维破碎
- E. 思维扩散

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

10、慢性肾衰竭按肾功能程度可分为（ ）。

- A. 代偿期、失代偿期、尿毒症期
- B. 氮质血症期、尿毒症期
- C. 氮质血症期、尿毒症前期、尿毒症期
- D. 肾贮备能力下降期、氮质血症期、肾衰竭期、尿毒症期
- E. 代偿期、氮质血症期、尿毒症期

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

11、鉴别急性出血性坏死型胰腺炎与水肿型胰腺炎有价值的实验室检查是（ ）。

- A. 血清淀粉酶
- B. 血清脂肪酶
- C. 尿淀粉酶
- D. 血清正铁白蛋白
- E. 血清胆红素

『正确答案』

D

『答案解析』

腹腔内有出血性疾病时，红细胞被破坏释放出血红素，经脂肪酸和弹力蛋白酶作用，变为正铁血红素，与白蛋白结合成正铁白蛋白。正铁白蛋白在重症胰腺炎起病72小时内常为阳性。

12、继发性腹膜炎的腹痛特点是（ ）。

- A. 阵发性全腹绞痛
- B. 逐渐加重的阵发性腹痛
- C. 剧烈、持续性全腹痛，原发部位显著
- D. 高热后全腹痛
- E. 持续阵发性刺痛

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

13、心理治疗的最终目标是（ ）。

- A. 改善患者的人格体系
- B. 改善患者的症状
- C. 改善患者的情绪
- D. 提高患者的觉悟

A

『答案解析』

暂无解析。

14、下列哪项为隐匿性抑郁症的特点？（ ）

- A. 以情绪抑郁为主
- B. 以躯体诉述为主
- C. 以思维贫乏为主
- D. 以行为迟滞为主
- E. 以记忆障碍为主

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

15、下列哪项不是应该优先抢救的急症？（ ）

- A. 心搏骤停
- B. 大出血
- C. 休克
- D. 骨折
- E. 腹部内脏脱出

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

16、以下哪项用于胃切除后引起的缺铁性贫血？（ ）

- A. 输血
- B. 切脾术
- C. 雄激素
- D. 右旋糖酐铁注射
- E. 糖皮质激素

『正确答案』

D

『答案解析』

缺铁性贫血的治疗首选口服铁剂，次选肌肉注射铁剂（副反应发生率相对较高），胃切除患者不宜经口服给药，故应选择肌肉注射铁剂，右旋糖酐铁为常用铁剂。

17、关于抗原-抗体复合物的调节作用，下列哪项是错误的（ ）。

- A. 当抗原量多而抗体量少时，APC的功能增强
- B. 抗原-抗体复合物参与调节免疫应答
- C. 反应初期，以IgM为主，形成的复合物起抑制作用
- D. 反应后期IgG增多，形成的复合物起抑制调节作用
- E. 抗体类别不同，所起的免疫作用不同

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

18、男，20岁，网球运动员，右肘关节外侧疼痛半日，持物无力，右肘关节局部性压痛。下列哪项试验最有助于诊断？（ ）

- D. Hoffmann征
- E. Mills征

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

19、麻疹合并肺炎者应隔离至（ ）。

- A. 肺炎痊愈
- B. 出疹后5天
- C. 出疹后10天
- D. 出疹后15天
- E. 出疹后3天

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

20、对医务人员进行道德评价的依据是（ ）。

- A. 动机与手段的统一
- B. 动机与效果的统一
- C. 手段与效果的统一
- D. 目的与效果的统一
- E. 动机与目的的统一

『正确答案』

B

『答案解析』

修养方面非常强调医疗实践，医德评价仍然有客观标准。评价的方式包括社会舆论、内心信念和传统习俗。

21、下述哪项是增强子的作用？（ ）

- A. 促进结构基因转录
- B. 抑制操纵基因表达
- C. 抑制阻遏蛋白
- D. 抑制结构基因转录
- E. 抑制启动子

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

22、下列不属于左向右分流型先天性心脏病共同特点的是（ ）。

- A. 差异性发绀
- B. 易患肺炎
- C. 生长发育差
- D. 哭闹后出现青紫
- E. 肺血增多

- A. NAD
- B. HS-CoA
- C. 磷酸吡哆醛
- D. TPP
- E. FAD

『正确答案』

B

『答案解析』

辅酶A (HS-CoA) 是一种含有泛酸的辅酶，在某些酶促反应中作为酰基的载体。

24、下列不符合急性白血病初诊时改变的是（ ）。

- A. 贫血
- B. 白细胞正常
- C. 白细胞增高
- D. 白细胞减少
- E. 血小板增高

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

25、新生儿化脓性脑膜炎，脑膜刺激征不明显的原因是（ ）。

- A. 脑膜炎症不如年长儿强
- B. 机体的反应能力差
- C. 颅缝及前囟未闭，对颅内压升高起缓冲作用
- D. 颈肌尚不发达
- E. 大脑处于抑制状态

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

26、患儿，男，1岁，阵发性痉挛性咳嗽20余日，出生时接种卡介苗，1:2000OT试验硬结直径20mm，胸片右肺门淋巴结增大，诊断为（ ）。

- A. 百日咳合并肺炎
- B. 原发综合征
- C. 支气管淋巴结核
- D. 百日咳
- E. 支原体肺炎

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

27、哪项是3个月以下小儿化脓性脑膜炎临床表现特点？（ ）

重庆医科大学临床医学历年考研真题

- A. 高热头痛
- B. 颅压增高症状明显
- C. 症状表现不典型
- D. 脑膜刺激征明显

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

28、患儿，8个月，腹泻4天，水样便，1日10余次。12小时无尿，呼吸深大，前囟、眼窝明显凹陷，四肢凉。血钠127mmol/L，血钾4mmol/L，血钙2.25mmol/L，CO₂CP11.2mmol/L。首批应输入下列哪一种混合液？（ ）

- A. 3:2:1液(1/2张)
- B. 4:3:2液(2/3张)
- C. 2:1等张含钠液
- D. 1:2液(1/3张)
- E. 1:1液(1/2张)

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

29、从情感范畴来看，爱国心是一种（ ）。

- A. 责任感
- B. 情操
- C. 集体感
- D. 道德感
- E. 荣誉感

『正确答案』

D

『答案解析』

道德感是人们根据一定的道德标准，在评价他人或自身言行时所产生的一种情感体验。例如，一个人做了一件好事而产生“心安理得”的情感体验，道德感直接体现了客观事物与人的道德需要之间的关系，从此角度来看，爱国心是一种道德感，故该题选D项。

30、急性肾炎时血中C3改变的规律是（ ）。

- A. 早期升高，恢复期下降
- B. 早期升高，恢复期不变
- C. 早期升高，恢复期更高
- D. 早期下降，恢复期升高
- E. 早期下降，8周恢复正常

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

31、女性，35岁，3年前开始怀疑丈夫对其不忠，时常争吵，近1年来，跟踪丈夫，搜查丈夫的文件包，常听到脑子里有一女子声音说“你可怜”、“你真蠢”之类的话，因此不愿与家人同餐，不敢喝家中水，认为饭里、水里被放了毒药，认为丈夫与外人联合起来害她，病人常常哭泣。体检及神经系统检查无异常，此病人患有精神分裂症的哪种分型？（ ）

- A. 紧张型
- B. 单纯型

重庆医科大学临床医学历年考研真题

- C. 偏执型
- D. 青春型
- E. 未分化型

『正确答案』

C

『答案解析』

32、原发性肾小球疾病的病理特点，错误的是（ ）。

- A. 膜性肾病是光镜下主要为不伴细胞增生的弥漫性肾小球毛细血管基底膜增厚
- B. 微小病变是光镜下无明显异常，电镜下可见上皮细胞肿胀、足突广泛融合
- C. 急进性肾炎主要是光镜下30%以上肾小球的肾小囊中有大新月体形成
- D. 急性链球菌感染后肾小球肾炎主要是弥漫增生性肾小球炎症（内皮与系膜细胞增生）
- E. 系膜增生性肾炎主要是系膜细胞及系膜基质不同程度的弥漫增生

『正确答案』

C

『答案解析』

50%以上的肾小球有大新月体可诊断为急进型肾小球肾炎。

33、患者伸舌偏左，右侧肢体痉挛性偏瘫，右侧Babinski征（+），以下哪项为该患者的病变部位？（ ）

- A. 左侧桥脑
- B. 左侧内囊
- C. 左侧中脑
- D. 左侧延髓
- E. 右侧延髓

『正确答案』

D

『答案解析』

周围性舌下神经瘫（伸舌偏向病灶侧、舌肌萎缩），对侧偏瘫，见于延髓受损（前部橄榄体内侧病损）。

34、以下不属于心理应激的是（ ）。

- A. 心率和呼吸加快
- B. 恐惧
- C. 抑郁
- D. 敌对与攻击
- E. 物质滥用

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

35、全血细胞减少，骨髓增生低下，造血细胞减少，这样的血象骨髓象不见于（ ）。

- A. 再障
- B. 低增生性白血病
- C. 溶血性贫血
- D. PNH
- E. 骨髓纤维化

『正确答案』

B

重庆医科大学临床医学历年考研真题

『答案解析』

暂无解析。

36、在真核生物中，经RNA聚合酶II催化产生的转录产物为（ ）。

- A. mRNA
- B. tRNA
- C. 28SrRNA
- D. 18SrRNA

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

37、骨筋膜室综合征最主要的治疗措施是（ ）。

- A. 抬高患肢，以利消肿
- B. 给予血管舒张剂，消除血管痉挛
- C. 被动按摩，以利消肿
- D. 做臂位麻醉，解除血管痉挛
- E. 解除包扎固定物，经观察不见好转，切开筋膜减压

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

38、关于幻觉的定义正确的是（ ）。

- A. 感觉性的错误
- B. 现实刺激时知觉体验
- C. 一种虚幻的知觉
- D. 一种异样的感觉
- E. 虚假的感觉

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

39、以下哪项是核酸对紫外线的最大吸收峰？（ ）

- A. 280nm
- B. 220nm
- C. 240nm
- D. 260nm
- E. 200nm

『正确答案』

D

『答案解析』

核酸对紫外线的最大吸收峰为260nm波长处；蛋白质（色氨酸、酪氨酸）对紫外线的最大吸收峰为280nm波长处。

40、下列哪项是诱导支气管平滑肌收缩主要的介质？（ ）

- A. 白三烯
- B. IL-2
- C. 激肽类物质DPG

9

重庆医科大学临床医学历年考研真题

- D. 组胺
- E. C3a

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

41、TCR-CD₃复合物中转导T细胞活化第一信号的分子是（ ）。

- A. CD₃

- D. TCR
- E. CD40

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

42、心理健康标准中不包括（ ）。

- A. 较高的个人心理效率
- B. 恰当的自我评价
- C. 良好的人际关系和心境
- D. 较高的工作学习效率
- E. 稳定的生活环境

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

43、关于成熟红细胞的说法，哪项是错误的？（ ）

- A. 能合成血红蛋白
- B. 糖酵解是获能量的唯一途径
- C. 可进行磷酸戊糖途径
- D. 能产生2, 3-二磷酸甘油酸
- E. 正常形态的维持需ATP

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

44、急性普通型病毒性肝炎，下述哪项。为其坏死的主要病变？（ ）

- A. 点状坏死
- B. 桥接坏死
- C. 碎片状坏死
- D. 大片坏死
- E. 灶性坏死

『正确答案』

A

重庆医科大学临床医学历年考研真题

『答案解析』

急性普通型肝炎可分为黄疸型和无黄疸型。病变以肝细胞变性为主，其中以肝细胞胞质疏松化和气球样变、肝细胞嗜酸性变和嗜酸性小体形成为主。坏死病变较轻，表现为肝小叶内散在的点状坏死。故本题答案为A项。

45、急性肝衰竭实验室检查一般不会出现的结果是（ ）。

- A. 转氨酶增高
- B. 胆红素增高
- C. 凝血酶原时间缩短
- D. 血肌酐增高
- E. 纤维蛋白原减少

『答案解析』

急性肝衰竭时，肝脏合成凝血因子减少，所以凝血酶原时间是延长而非缩短。

46、轻度高血压患者伴有水肿应选用（ ）。

- A. 卡托普利
- B. 可乐定
- C. 硝苯地平
- D. 哌唑嗪
- E. 氢氯噻嗪

『正确答案』

E

『答案解析』

噻嗪类利尿药是治疗高血压的常用药，可单用治疗高血压，也可与其他降压药合用治疗轻、中度高血压，因此轻度高血压患者伴有水肿选用本药为宜。

47、根据《献血法》的规定，血站对献血者每次采集的血液量为（ ）。

- A. 100毫升；150毫升
- B. 100毫升；200毫升
- C. 200毫升；300毫升
- D. 200毫升；400毫升
- E. 300毫升；400毫升

『正确答案』

D

『答案解析』

参见《献血法》第九条：血站对献血者每次采集血液量一般为200毫升，最多不得超过400毫升，两次采集间隔期不少于六个月。

48、首次取消了精神病与神经症的严格划分，取消了神经衰弱的诊断类别，肢解了神经症的诊断标准的是（ ）。

- A. DSM-III
- B. ICD-9
- C. DSM-IV
- D. ICD-10
- E. CCMD-3

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

49、胸外心脏按压的操作方法，错误的是（ ）。

重庆医科大学历年考研真题

- A. 背部垫硬板
- B. 部位在锁骨中线第4肋间
- C. 按压次数约100次/分
- D. 使胸骨下陷4~5cm
- E. 每按压30次后进行人工呼吸2次

『正确答案』

B

『答案解析』

B项，胸外心脏按压的部位是胸骨下半部，双乳头之间（男性患者约平第五肋间）。

50、患者，女，65岁。晨起出现讲话不清，右侧肢体无力，2日后病情渐加重。血压148/80mmHg，意识清，Broca失语，右侧偏瘫。完全不考虑的诊断是（ ）。

- C. 短暂脑缺血发作
- D. 脑出血
- E. 动脉粥样硬化性脑梗死

『正确答案』

C

『答案解析』

短暂性脑缺血发作表现为一过性局限症状和局灶体征，持续时间很短，24小时内症状和体征消失。本例患者48小时后症状加重，故不考虑短暂性脑缺血诊断。

51、治疗严重肝功能不全的病人宜选用（ ）。

- A. 可的松
- B. 泼尼松
- C. 泼尼松龙
- D. 醋酸可的松
- E. 氟轻松

『正确答案』

C

『答案解析』

糖皮质激素类药物主要在肝中代谢由尿排出，剂量大或肝、肾功能不全者可使半衰期延长。可的松和泼尼松在肝内分别转化为氢化可的松和泼尼松龙而生效，因此严重肝功能不全的病人只适宜应用氢化可的松和泼尼松龙。故本题答案为C项。

52、诊断反流性食管炎最准确的方法是（ ）。

- A. 食管造影
- B. 食管滴酸试验
- C. 24小时食管pH检测
- D. 食管内镜检查
- E. 食管吞钡检查

『正确答案』

D

『答案解析』

反流性食管炎诊断首选食管内镜检查。

53、患者，女，33岁，经蝶窦行垂体泌乳素瘤手术2个月，放疗后1个月，血泌乳素123μg/L，最适合的治疗是（ ）。

- A. 再次放疗
- B. 溴隐亭治疗
- C. 左旋多巴治疗

12

重庆医科大学临床医学历年考研真题

- D. 赛庚啶治疗
- E. 行经额垂体瘤手术

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

54、下列哪项是痴呆综合征的主要表现？（ ）

- A. 有意识障碍
- B. 是全面的智能减退
- C. 注意力集中
- D. 多有自杀
- E. 多有妄想

『答案解析』

痴呆综合征属于智能障碍，在判断智能障碍时首先应当除外意识障碍。常呈慢性或进行性过程，表现为记忆、理解、计算、学习和判断力的障碍，其认知、情感和意志过程，往往由于智能的影响而出现程度不等的失调，如出现消极观念、被害妄想、被偷窃妄想等。全面性痴呆可以表现为全面的智能减退，部分性痴呆主要表现为记忆力减退、理解力削弱等，但注意力可以保持集中，人格特征可以保持良好，并具有一定的判断力、自知力等。故本题答案为B项。

55、有关DNA分子碱基组成的Chargaff规则揭示中，错误的是（ ）。

- A. 腺嘌呤与胸腺嘧啶的含量相等
- B. 鸟嘌呤与胞嘧啶的含量相等
- C. 不同生物种属的DNA碱基组成不同
- D. 同一个体的肝脏和肾脏的DNA具有不同的碱基组成
- E. 同一个体的肌细胞和神经细胞的DNA具有相同的碱基组成

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

56、子宫内膜癌病理分期ⅢB是指（ ）。

- A. 癌累及宫颈黏膜腺体
- B. 癌侵犯肌层>1/2
- C. 癌侵犯浆膜和（或）附件
- D. 癌侵犯宫颈间质
- E. 癌累及阴道上1/3

『正确答案』

E

『答案解析』

子宫内膜癌ⅢB期是指肿瘤扩散至阴道。

57、一个tRNA反密码子为5' -IGC-3'，它可以识别的密码为（ ）。

- A. 5' -GCA-3'
- B. 5' -ACG-3'
- C. 5' -CCG-3'
- D. 5' -GCG-3'
- E. 5' -UCG-3'

重庆医科大学临床医学历年考研真题

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

58、关于临终关怀符合伦理学的原因，说法不正确的是（ ）。

- A. 可以减轻家庭的经济负担
- B. 提高病人的生命质量
- C. 可以缩短病人的痛苦的生命时限
- D. 客观上可以节约卫生资源
- E. 为了人类文明的进步

『正确答案』

A

『答案解析』

桑德斯开创了临终关怀事业。临终关怀的目的是使临终病人的生命质量得到提高，尽量舒适地走完生命的最后旅程，这是非常符合人性化的要求的。实施了临终关怀，客观上可以达到这样的效果，比如可以减轻家庭的经济负担，可以减轻病人的痛

59、患儿，5岁，高热2小时，反复惊厥3次，于8月20日晚6点就诊，追问病史，该患儿上午曾去公园进食玉米及葡萄等。查体：体温40.5°C，神志不清，呈抽搐状，面色发青，四肢凉，血压60/45mmHg，双瞳孔等大，光反应迟钝，心肺正常，腹软，颈强阳性，克氏征阴性。该患儿最可能诊断为（ ）。

- A. 中暑
- B. 癫痫
- C. 中毒性细菌性痢疾
- D. 病毒性脑炎
- E. 流行性乙型脑炎

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

60、支气管柱状扩张的典型X线表现是（ ）。

- A. 鼠尾征
- B. 轨道征
- C. 树芽征
- D. 残根征
- E. 蜂窝肺

『正确答案』

B

『答案解析』

支气管扩张的其他表现为气道壁增厚，主要由支气管周围的炎症所致。由于受累肺实质通气不足、萎陷，扩张的气道往往聚拢，纵切面可显示为“双轨征”，横切而显示“环形阴影”。A项，鼠尾征指支气管肺癌沿支气管的纵轴浸润蔓延，使支气管呈尾巴状狭窄且不规则的缺损。在影像学上表现呈鼠尾巴改变的现象。C项，树芽征是HRCT上细支气管周围炎，小叶中央支气管及其远端气道扩张，黏液嵌塞，在不同的截面组合在一起，形似“春天发芽”的征象。最初用于描述肺结核并支气管播散，但也见于其他疾病，最经典的是弥漫性泛细支气管炎，满肺的“树芽征”作为诊断依据之一。D项，残根征指肺动脉高压时，肺动脉段扩张明显，外周动脉纤细，对比强烈，也叫肺门截断征。E项，蜂窝肺综合征指肺内有很多肉眼可见的小囊肿样结构，其直径一般不超过10mm，均匀地分布于肺内。

二、A2型题（每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、不能用于平喘的肾上腺素受体激动药是（ ）。

- A. 肾上腺素

14

重庆医科大学临床医学历年考研真题

- B. 特布他林
- C. 沙丁胺醇
- D. 苯肾上腺素
- E. 异丙肾上腺素

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2、登革病毒的血清型数目有（ ）。

- A. 1个
- B. 2个
- C. 3个
- D. 4个
- E. 5个

『答案解析』
暂无解析。

3、属于心理测验的是（ ）。

- A. 能力测验、人格测验
- B. 神经心理测验
- C. 评定量表
- D. 职业咨询测验
- E. 以上都是

『正确答案』

E

『答案解析』

心理测验包括A、B、C、D等各种目的和功能的测验。

4、关于消化道各部分吸收功能的叙述，错误的是（ ）。

- A. 小肠是吸收的主要部位
- B. 口腔和食管基本无吸收功能
- C. 胃可吸收乙醇和少量水分
- D. 大肠主要吸收水分和盐类
- E. 大部分营养物质在回肠吸收

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

5、某人的血浆中只含有抗A凝集素，该人的血型不会是（ ）。

- A. A型
- B. AB型
- C. O型
- D. B型
- E. Rh型

『正确答案』

A

15

重庆医科大学临床医学历年考研真题

『答案解析』

暂无解析。

6、支气管肺炎与支气管炎的主要鉴别点是（ ）。

- A. 发热的高低
- B. 咳嗽的轻重
- C. 食欲的好坏
- D. 肺部是否有固定的中小水泡音
- E. 血白细胞数的高低

『正确答案』

D

『答案解析』

支气管肺炎与急性支气管炎症状有时很难鉴别，体征是肺部听诊肺炎脊柱两侧有固定的中小水泡音。

7、某人的红细胞与B型血的血清凝集，其血清与B型血的红细胞也凝集，其血型是（ ）。

- A. A型
- B. AB型
- C. O型

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

8、下列药物中，误服（ ）应禁忌洗胃。

- A. 东莨菪碱
- B. 水杨酸盐
- C. 氢氧化钠
- D. 盐酸麻黄碱
- E. 亚硝酸盐类

『正确答案』

C

『答案解析』

氢氧化钠属于强碱，是强腐蚀性毒物，误服后若插胃管洗胃有可能引起胃穿孔，故应视为禁忌，其他几种药物均可洗胃。

9、属于干性坏疽的是（ ）。

- A. 肠扭转引起的肠坏疽
- B. 化脓性感染引起的肺坏疽
- C. 坏疽性阑尾炎
- D. 糖尿病患者的下肢坏疽
- E. 坏疽性子宫内膜炎

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

10、首例艾滋病的报告时间为（ ）。

- A. 1975年
- B. 1981年
- C. 1990年

16

重庆医科大学临床医学历年考研真题

- D. 1985年
- E. 1978年

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

11、某患者尸检发现，其肺体积增大，边缘钝圆，色灰白，质软而缺乏弹性，指压后遗留压痕，此人可能死于（ ）。

- A. 肺癌
- B. 肺结核
- C. 肺气肿
- D. 硅沉着病
- E. 以上均不可能

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

12、脊髓灰质炎病毒的致病特点不包括（ ）。

- A. 常口途径传播

- C. 5岁以下幼儿易感
- D. 易侵入中枢神经系统引起肢体痉挛性瘫痪
- E. 多为隐性感染

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

13、ABO血型分类的根据是（ ）。

- A. 红细胞膜上受体的类型
- B. 红细胞膜上特异性抗原的类型
- C. 红细胞膜上特异性抗体的类型
- D. 血浆中特异性抗体的类型
- E. 血浆中特异性抗原的类型

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

14、女，39岁。呕血、黑便1天。既往肝炎病史20年。查体：贫血貌，巩膜轻度黄染，腹膨隆，脾肋下8cm，腹水征（+）。需要立即实施的措施中不包括的是（ ）。

- A. 静脉滴注血管加压素
- B. 静脉滴注生长抑素
- C. 急诊胃镜检查、止血
- D. 开腹探查止血
- E. 输血、输液

『正确答案』

D

重庆医科大学临床医学历年考研真题

『答案解析』

中年女性患者，肝硬化合并上消化道出血，有脾大、腹水及黄疸表现，不适宜立即手术治疗，手术死亡率高。急诊外科手术止血并发症多、死亡率高，应尽量避免。

15、对曾应用环丙沙星短期治疗疑诊伤寒的患者，用哪一种培养为优？（ ）

- A. 粪便培养
- B. 骨髓培养
- C. 血培养
- D. 尿培养
- E. 胆汁培养

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

16、对于超抗原的性质，哪项是恰当的？（ ）

- A. 与自身免疫无关
- B. 无需APC加工可直接与MHC-II分子结合
- C. 有严格的MHC限制性
- D. 内源性抗原存在于所有哺乳动物体内
- E. 种超抗原只可诱发少数T细胞克隆

B

『答案解析』

暂无解析。

17、关于小儿髓外造血，以下选项正确的是（ ）。

- A. 骨髓外造血是婴幼儿主要造血场所
- B. 造血需要时可恢复胎儿期造血状态
- C. 表现肝大，脾和淋巴结不大
- D. 末梢血中可出现异常淋巴细胞
- E. 贫血矫正后仍不恢复正常状态

『正确答案』

B

『答案解析』

小儿出生后主要是骨髓造血。当婴幼儿时期。出现各种原因贫血时，可出现髓外造血代偿。表现肝、脾、淋巴结肿大（恢复造血功能），外周血中出现有幼稚细胞和幼稚中性粒细胞，不出现异常淋巴细胞。当贫血病因去除后，恢复骨髓造血功能，不再需要骨髓外造血。

18、患者，男，50岁，因局部脓肿发生休克。经补足血容量，纠正酸中毒，血压、脉搏仍未好转，但无心衰现象，测中心静脉压为15cmH₂O，其下一步治疗首选（ ）。

- A. 应用血管扩张剂
- B. 应用血管收缩剂
- C. 补充高渗盐溶液
- D. 给予小剂量糖皮质激素
- E. 给予5%碳酸氢钠溶液

『正确答案』

A

『答案解析』

中心静脉压正常值为5~10cmH₂O，高于15cmH₂O为静脉压升高。现在患者无心力衰竭现象，中心静脉压升高，需应用血管扩张剂。

重庆医科大学临床医学历年考研真题

19、糖皮质激素抗休克作用与哪一因素无关？（ ）

- A. 扩张痉挛收缩的血管，加强心肌收缩力
- B. 稳定溶酶体膜，减少心肌抑制因子的释放
- C. 提高机体对细菌内毒素的耐受力
- D. 降低血管对某些缩血管物质的敏感性
- E. 中和外毒素

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

20、下列哪项是医患之间最主要的人际交往方式？（ ）

- A. 表情
- B. 人际距离
- C. 目光接触
- D. 交谈
- E. 以上都是

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

- A. 创面有无水疱
- B. 创面的肿胀程度
- C. 创面疼痛情况
- D. 创面渗出情况
- E. 创面残存上皮的有无和多少

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

22、男，43岁，吸烟20余年，右下肢疼痛，行走后加重3年。右小腿疼痛日益加重，时常出现沿表浅静脉走行的局部压痛、硬结。最有可能的诊断是（ ）。

- A. 动脉瘤
- B. 血栓闭塞性脉管炎
- C. 多发性动脉炎
- D. 雷诺综合征
- E. 动脉硬化性闭塞症

『正确答案』

B

『答案解析』

B项，患者系中年男性，既往吸烟20余年，现出现右下肢疼痛，行走后加重，结合沿表浅静脉走行的局部压痛、硬结，应考虑血栓闭塞性脉管炎。D项，雷诺病多见于女性，是由于寒冷或情绪激动引起发作性的手指（足趾）苍白、发紫，然后变为潮红的一组综合征，常为对称性双手手指发作。E项，若为老年患者，且既往有高血压、糖尿病等动脉硬化疾病，可考虑为动脉硬化性闭塞症，但其对浅静脉多无影响。

23、“冬眠合剂”通常指下述哪一组药物？（ ）

- A. 苯巴比妥+异丙嗪+吗啡
- B. 苯巴比妥+氯丙嗪+吗啡

19

重庆医科大学临床医学历年考研真题

- C. 氯丙嗪+异丙嗪+吗啡
- D. 氯丙嗪+异丙嗪+哌替啶
- E. 氯丙嗪+阿托品+哌替啶

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

24、不属于化生的是（ ）。

- A. 支气管粘膜出现鳞状上皮
- B. 胃粘膜内出现胰腺组织
- C. 胃粘膜内出现肠上皮
- D. 食管粘膜内出现胃上皮
- E. 胆囊粘膜内出现鳞状上皮

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

25、哪项为目前国内最常见的细菌性痢疾病原菌？（ ）

- A. 福氏痢疾杆菌
- B. 宋氏痢疾杆菌
- C. 鲍氏痢疾杆菌

『正确答案』

A

『答案解析』

痢疾杆菌为肠杆菌科志贺菌属，为革兰阴性无鞭毛杆菌。分为4群：痢疾志贺菌、福志贺菌、鲍志贺菌和宋内志贺菌。我国多数地区多年来一直是福志贺菌为主要流行菌群，其次为宋内志贺菌。故本题答案为A项。

26、慢性乙肝患者，化验乙肝五项指标，HBsAg (+)，抗HBc (+)，HBeAg (+)，ALP120U/L，提示（ ）。

- A. 病毒无复制，无传染性
- B. 病毒有复制，肝脏有损伤
- C. 有传染性
- D. 肝脏有损伤，无传染性
- E. 病毒有复制，有传染性，肝脏有损害

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

27、膜性肾小球病的病理变化是（ ）。

- A. 脏层上皮细胞增生
- B. 新月体形成
- C. 肾小球正常，肾小管脂质沉积
- D. 肾小球基底膜增厚，钉突形成
- E. 系膜细胞增生

『正确答案』

D

20

重庆医科大学临床医学历年考研真题

『答案解析』

暂无解析。

28、下列不属于代偿性肥大的是哪项？（ ）

- A. 经锻炼的骨骼肌肥大
- B. 高血压引起的心肌肥大
- C. 一侧肾脏切除后，另一侧肾脏的肥大
- D. 雌激素影响下的妊娠子宫
- E. 以上均不属于代偿性肥大

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

29、女，76岁。脑血管病后遗症患者，左侧肢体偏瘫，行动不便，2周前一次进餐后出现气短、咳嗽，后气短逐渐好转，但咳嗽持续存在，近2天来出现发热，咳少量黄痰。查体：左上胸廓轻度塌陷，左上肺叩诊呈浊音，语音震颤减弱，呼吸音明显减弱。造成患者上述情况最可能的原因是（ ）。

- A. 阻塞性肺炎
- B. 肺结核
- C. 支气管炎
- D. 肺动脉栓塞
- E. 气胸

『正确答案』

A

『答案解析』

患者肺体检查，首次为进餐后出现以上症状，最可能的原因是食管裂孔疝，食管扩张引起阻塞性肺炎，可出现以上症状。

- A. 初产妇
- B. 先天性乳头内陷
- C. 有乳腺囊性增生症病史
- D. 全身抵抗力下降
- E. 乳头皮肤破溃损伤

『正确答案』

E

『答案解析』

急性乳腺炎的病因有：乳汁淤积和细菌侵入，其中皮肤破溃导致细菌入侵引起乳腺炎是最主要的途径。虽然初产妇的哺乳经验不足可以导致皮肤损伤，身体抵抗力下降可以使发生感染的机会增加，但都不是本病的主要原因，乳腺增生本身与感染无关。

三、B1型题（以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。）

1、（共用备选答案）

- A. 喘憋为突出表现
- B. 咳频、喘憋、发绀
- C. 常见猩红热样或荨麻疹样皮疹
- D. 全身中毒症状明显，重者意识障碍甚至休克
- E. 刺激性咳嗽为突出表现

重庆医科大学临床医学历年考研真题

1. 腺病毒肺炎（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 肺炎支原体肺炎（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

3. 呼吸道合胞病毒肺炎（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

4. 葡萄球菌肺炎（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2、（共用备选答案）

- A. 尿红细胞>3个/HP
- B. 尿红细胞>10个/HP
- C. 尿蛋白>0.05g/(kg·d)
- D. 尿蛋白>0.5g/(kg·d)
- E. 以上均不是

1. 肾病综合征肾炎型尿红细胞应为（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 大量蛋白尿应为（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

3、(共用备选答案)

- A.辐射散热
- B.传导散热
- C.对流散热
- D.蒸发散热
- E.发汗

重庆医科大学临床医学历年考研真题

1. 穿棉衣御寒主要是降低（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 给高热患者酒精擦浴是为了增加（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

给高热患者酒精擦浴是通过酒精在皮肤表面由液态转化为气态，同时带走大量热量的一种散热方式。

3. 给高热患者用冰帽降温是通过增加（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

传导散热指机体的热量直接传给与之接触的温度较低物体的一种散热方式。给高热患者用冰帽降温即通过使冰帽直接接触机体使机体热量直接传导至冰帽达到降温目的。

4、(共用备选答案)

- A.患者血压明显升高。体检：血压200/130mmHg (26.6/16.9kPa)，眼底出血渗出、视盘水肿。实验室报告：肾功能不全
- B.患者血压明显升高，伴有剧烈头痛、呕吐、抽搐
- C.患者平日有心悸、胸痛，劳力时气促，起立或运动时眩晕。体检：胸骨左缘第3~4肋间可闻及较粗糙的喷射性收缩期杂音，屏气时杂音增强
- D.患者一周前出现发热、全身无力，现自觉心悸、胸闷。体检：心率120次/分，偶闻室性期前收缩，实验室回报CPK、AST、LDH增高
- E.患者气急、端坐呼吸。体检：心脏扩大，听诊可闻及第四心音奔马律，双下肢水肿，超声心动图示左心室明显

1. 恶性高血压（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

少数高血压患者病情急骤发展，舒张压持续 $>130\text{mmHg}$ ，并有头痛、视力模糊、眼底出血、渗出和视盘水肿，且患者肾脏损

2. 有左室流出道梗阻的肥厚型心肌病（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

肥厚型梗阻性心肌病最常见的症状是劳力性呼吸困难和乏力，体格检查可见心脏轻度增大，可闻及第四心音。流出道梗阻的患者可于胸骨左缘第3~4肋间闻及较粗糙的喷射性收缩期杂音。心尖部也常可听到收缩期杂音，系二尖瓣前叶移向室间隔导致二尖瓣关闭不全所致。

3. 病毒性心肌炎（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

病毒性心肌炎患者轻者可完全没有症状，重者甚至出现心源性休克及猝死。多数患者发病前1~3周有病毒感染前驱症状，如发热、全身倦怠感和肌肉酸痛，或恶心、呕吐等消化道症状。随后可以有心悸、胸痛、呼吸困难、水肿，甚至晕厥、猝死。病毒性心肌炎听诊可闻及第三、第四心音或奔马律，部分患者可于心尖部闻及收缩期吹风样杂音。实验室检查可见部分酶含量升高。

4. 扩张型心肌病（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

扩张型心肌病起病隐匿，早期可无症状。临床主要表现为活动时呼吸困难和活动耐量下降。随着病情加重可以出现夜间阵发性呼吸困难和端坐呼吸等左心功能不全症状，并逐渐出现食欲下降、腹胀及下肢水肿等右心功能不全症状。超声心动图常可提示左心室明显增大。

5、（共用备选答案）

23

重庆医科大学历年考研真题

- A. 大脑皮质
- B. 内囊
- C. 脑干
- D. 胸髓
- E. 腰膨大

1. 引起单瘫病变部位是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 引起交叉瘫病变部位是（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

3. 引起双下肢弛缓性瘫痪病变部位是（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

4. 引起双下肢痉挛性瘫痪病变部位是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

四、A3型题（以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据考题所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

女性，53岁，10年前出现情绪低落与情感高涨交替出现，情绪低落时表现为早醒、闷闷不乐、不思饮食，对事物失去兴趣，足不出户，轻生念头明显，持续2~3个月后，突然转为话多、兴奋、整日忙忙碌碌、四处购物、爱交际、自感精力充沛，才智过人，持续1月后，再次转为情绪低落，如此反复。体检及神经系统无异常。

重庆医科大学临床医学历年考研真题

1. 该患者诊断考虑为（ ）。

- A. 躁狂发作
- B. 抑郁发作
- C. 精神分裂症
- D. 双相情感性精神障碍
- E. 老年期抑郁症

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 如果病人处于抑郁发作期，其适宜的治疗是（ ）。

- A. 舒必利
- B. 地西泮
- C. 阿米替林
- D. 阿米替林及适量碳酸锂
- E. 碳酸锂

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

3. 当病人服用碳酸锂时，做何种检查对监测血锂浓度有一定价值？（ ）

- A. 血常规
- B. 肾功能
- C. 心电图
- D. 脑电图
- E. 血沉

『正确答案』

暂无解析。

4. 碳酸锂早期副作用表现为（ ）。

- A. 恶心呕吐，腹泻
- B. 持续多尿，烦渴
- C. 甲状腺肿大
- D. 体重增加
- E. 心电图低钾样改变

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2、（共用题干）

女，42岁，上腹疼痛8小时，伴发热，体温38.5°C，频繁呕吐。查体发现上腹部肌紧张、压痛，无移动性浊音。血白细胞 $15\times10^9/L$ 。X线检查：膈下未见游离气体。

25

重庆医科大学临床医学历年考研真题

1. 最可能的诊断是（ ）。

- A. 急性心肌梗死
- B. 急性胰腺炎
- C. 胆石症
- D. 胃溃疡穿孔
- E. 直肠癌

『正确答案』

B

『答案解析』

根据患者症状体征考虑急性胰腺炎。D项，X线检查膈下未见游离气体，可排除胃溃疡穿孔。

2. 为明确诊断，急需检查的项目是（ ）。

- A. 血淀粉酶
- B. 血常规
- C. 血清脂肪酶
- D. 尿淀粉酶
- E. AFP

『正确答案』

A

『答案解析』

急性胰腺炎患者，血清淀粉酶于起病后2~12小时开始升高，48小时开始下降，持续3~5天。血清脂肪酶于起病后24~72小时开始升高，持续7~10天。患者发病10小时，检查血淀粉酶最好。

3. 治疗的基本措施是（ ）。

- A. 急诊手术
- B. 禁食和胃肠减压
- C. 腹腔穿刺引流
- D. 胆囊造瘘
- E. 应用大量广谱抗生素

『正确答案』

B

酸可减少胰液量，缓解胰管内高压。急性胰腺炎时，有腹痛、腹胀、恶心、呕吐，胃肠减压可减轻症状。

4. 如果患者治疗期间出现上腹部包块，首先考虑的诊断是（ ）。

- A. 腹膜转移瘤
- B. 粘连肠梗阻
- C. 胰腺假性囊肿
- D. 胰腺癌
- E. 阑尾周围脓肿

『正确答案』

C

『答案解析』

胰假性囊肿多在SAP病程4周左右出现，初期为液体积聚，无明显囊壁，此后由肉芽或纤维组织构成的囊壁缺乏上皮（与真性囊肿的区别所在），囊内无菌生长，含有胰酶。根据患者病史，考虑胰腺假性囊肿。

3. （共用题干）

患者，女，55岁，因患短肠综合征，予全胃肠外营养（TPN）治疗。应用1周时病人出现昏迷，但尿内无酮体。病人既往曾有空腹血糖高（10mmol/L）。

26

重庆医科大学临床医学历年考研真题

1. 考虑此病人是（ ）。

- A. 高渗性非酮性昏迷
- B. 代谢性酸中毒
- C. 导管感染败血症
- D. 糖尿病昏迷
- E. 肝性昏迷

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 哪项符合此病的发病机制？（ ）

- A. 内源性胰岛素分泌不足
- B. 肾功能损害
- C. 输液导管细菌滋生
- D. 肝功能损害
- E. 等渗性脱水

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

3. 预防此病主要是（ ）。

- A. 开始1周内注意葡萄糖输注的浓度、速度和与胰岛素的比例
- B. 保护肾功能
- C. 加强导管护理、无菌操作
- D. 纠正水和电解质紊乱，预防酸中毒发生
- E. 加强保肝

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

重庆医科大学临床医学历年考研真题

1. 所患疾病考虑为（ ）。

- A. 精神分裂症
- B. 酒精性妄想症
- C. 人格障碍
- D. 抑郁症
- E. 反应性精神障碍

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 选择治疗方案最佳的是（ ）。

- A. 长期口服精神病药物
- B. 戒酒、适量抗精神药物
- C. 行为、心理治疗
- D. 抗抑郁药物治疗
- E. 脱离刺激环境，适量抗精神药物

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

5、（共用题干）

1岁患儿，母乳喂养未加辅食。查体：皮肤粘膜苍白，肝肋下2cm，脾肋下1cm，化验血象Hb78g/L，RBC $3.6 \times 10^{12}/L$ ，血小板 $121 \times 10^9/L$ 。

1. 贫血程度为（ ）。

- A. 轻度贫血
- B. 中度贫血
- C. 重度贫血
- D. 极重度贫血
- E. 以上都不是

『正确答案』

B

『答案解析』

2. 此患儿最可能出现的化验结果是()。

MCV (fL) MCH (Pg) MCHC (%)

- A. 80~90 28~32 32~38
- B. >9 >32 >32
- C. 80~94 >32 32~38
- D. <80 <28 32~38
- E. <80 <28 <32

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

