

全国护士资格考试

护士资格考试 历年真题及精解

《2020 年真题》

编著：易考精灵

2020 专业实务 真题

1.真题 2020-Z1 患者,女,65岁。因输尿管结石行震波碎石术后康复出院。护士叮嘱道:“您回家要多休息和按时服药,注意按规定时间来复查。您慢走”。这属于

- A. 介绍用语
- B. 解释用语
- C. 迎送用语
- D. 招呼用语
- E. 安慰用语

2.真题 2020-Z2 表示饭后的外文缩写的正确写法是

- A. ac
- B. pc
- C. qh
- D. qm
- E. qd

3.真题 2020-Z3 一健康女婴,身长68cm,体重8kg,能在床上爬行,其符合的月龄是

- A. 8个月
- B. 18个月
- C. 20个月
- D. 24个月
- E. 26个月

4.真题 2020-Z7 洗胃时每次注入的洗胃液的量常为

- A. 500~600ml
- B. 300~500ml
- C. 700~800ml
- D. 800~1000ml
- E. 200~250ml

5.真题 2020-Z8 干燥法存放无菌持物钳的有效期一般为

- A. 4h
- B. 24h
- C. 3天
- D. 5天
- E. 7天

6.真题 2020-Z9 诊断急性呼吸窘迫综合征的必要条件是

- A. $PWCP < 18\text{mmHg}$
- B. $PaO_2/FiO_2 \leq 200$
- C. $PaO_2/FiO_2 \leq 300$
- D. $PaCO_2/FiO_2 \leq 200$
- E. $PaCO_2/FiO_2 \leq 300$

7.真题 2020-Z11 扩张型心肌病病人心脏结构最基本的改变是

- A. 室间隔肥厚

B. 心室容积减少

C. 单侧或双侧心腔扩大

D. 左心室肥厚

E. 右心室流出道梗阻

8.真题 2020-Z12 奠定了中医学理论基础的著作是

- A. 伤寒杂病论
- B. 本草纲目
- C. 黄帝内经
- D. 难经
- E. 千金方

9.真题 2020-Z13 疱疹性口炎的典型症状是

- A. 口腔黏膜表面出现白色凝乳块小点
- B. 牙龈、舌、唇、颊黏膜等处出现成簇小疱疹
- C. 口腔黏膜形成大小不等的糜烂面
- D. 淋巴结不肿大
- E. 口腔黏膜有灰白色假膜


10.真题 2020-Z14 短效避孕药的主要作用是

- A. 改变子宫内膜形态和功能
- B. 改变宫颈黏液性状
- C. 阻碍受精
- D. 抑制排卵
- E. 阻碍着床

11.真题 2020-Z15 服用人参或其他滋补药物,禁用

- A. 虾
- B. 鱼
- C. 肉
- D. 蟹
- E. 萝卜

12.真题 2020-Z16 适用于如图所示接种方法的疫苗是



- A. 卡介苗

- B. 脊髓灰质炎疫苗
C. 麻疹疫苗
D. 乙型肝炎疫苗
E. 百日咳、白喉、破伤风联合疫苗
13. 真题 2020-Z18 房室结的起始部位
A. 左冠状动脉
B. 右冠状动脉
C. 主动脉
D. 前室间支
E. 后室间支
14. 真题 2020-Z19 护士可以执行医生口头医嘱的情况是医生在
A. 抢救病人时
B. 手术结束后
C. 电话告知时
D. 外出会诊时
E. 换药期间
15. 真题 2020-Z20 昏迷病人口腔护理时不需准备
A. 压舌板
B. 治疗碗
C. 弯血管钳
D. 大量杯
E. 石蜡油
16. 真题 2020-Z21 最易骨折的肋骨是
A. 第 1~2 肋
B. 第 2~3 肋
C. 第 8~10 肋
D. 第 4~7 肋
E. 第 11~12 肋
17. 真题 2020-Z22 无菌操作下导尿，一次导尿量不应超过
A. 200ml
B. 500ml
C. 1000ml
D. 2000ml
E. 以上都不对
18. 真题 2020-Z23 可以快速输注且有利尿作用的液体是
A. 20%甘露醇
B. 60%葡萄糖溶液
C. 生理盐水
D. 10%葡萄糖液
E. 15%山梨醇溶液
19. 真题 2020-Z26 小儿前囟饱满体检时候首先该查
A. 身高
B. 体重
C. 头围
D. 胸围
E. 上臂围
20. 真题 2020-Z27 以下哪种性格易发生高血压
A. A 型性格
B. B 型性格
C. C 型性格
D. D 型性格
E. E 型性格
21. 真题 2020-Z28 有机磷农药中毒瞳孔是
A. 1.5mm
B. 3mm
C. 4mm
D. 4.5mm
E. 5mm
22. 真题 2020-Z30 蜂窝织炎的主要致病菌为
A. 溶血性链球菌
B. 大肠埃希菌
C. 厌氧菌
D. 铜绿假单胞菌
E. 金黄色葡萄球菌
23. 真题 2020-Z31 类风湿关节炎引起自身免疫反应的因子是
A. 自身抗体 IgM
B. 外源性抗体
C. 自身抗体 IgA
D. 胶原蛋白
E. II 型胶原抗体
24. 真题 2020-Z32 发生一级医疗事故什么时候上报
A. 2 小时
B. 6 小时
C. 12 小时
D. 24 小时
E. 48 小时
25. 真题 2020-Z33 大便隐血试验可以吃哪种食物
A. 绿色蔬菜
B. 羊肉
C. 牛肉
D. 豆腐
E. 内脏
26. 真题 2020-Z34 留 24 小时尿标本做 17-羟类固醇检查，

为防止尿中激素被氧化，应加的防腐剂是

- A. 甲苯
- B. 浓盐酸
- C. 甲醛
- D. 高锰酸钾
- E. 乙醇

27.真题 2020-Z35 急性肺水肿病人吸氧时使用 20%~30% 乙醇湿化的目的是

- A. 促进炎症吸收
- B. 扩张支气管血管
- C. 降低肺泡内泡沫的表面张力
- D. 增加肺泡内压力
- E. 解除支气管平滑肌痉挛

28.真题 2020-Z36 有关尿培养标本采集正确的是

- A. 留取首段尿送检
- B. 标本在 1 小时内送检
- C. 用清水清洗外阴部
- D. 宜在抗生素应用后收集标本
- E. 为得到尿液鼓励病人多饮水

29.真题 2020-Z38 重度缺氧是指血氧饱和度低于

- A. 70
- B. 75
- C. 65
- D. 80
- E. 60

30.真题 2020-Z39 不符合铺床节力原则的是

- A. 备齐用物，按序放置
- B. 身体靠床沿
- C. 上身前倾，两膝直立
- D. 下肢稍分开，保持稳定性
- E. 使用肘部力量，动作轻柔

31.真题 2020-Z45 颅内动脉瘤最常见的部位是

- A. 大脑中动脉
- B. 大脑后动脉
- C. 颈内-后交通动脉
- D. 大脑前动脉
- E. 基底动脉

32.真题 2020-Z48 “后天之本”指的是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

33.真题 2020-Z49 漏斗骨盆胎头内旋转导致

- A. 持续性枕前位
- B. 持续性枕后位
- C. 持续性臀先露
- D. 持续性肩先露
- E. 子宫破裂

34.真题 2020-Z50 年龄达六十岁之后每增加一岁心排出量是

- A. 增加 1%
- B. 增加 2%
- C. 下降 1%
- D. 下降 2%
- E. 无明显变化

35.真题 2020-Z51 青霉素过敏性休克在抢救时首先采取的措施是

- A. 立即通知医生抢救
- B. 静脉注射 0.1%盐酸肾上腺素 1ml
- C. 立即停药，平卧，皮下注射 0.1%盐酸肾上腺素
- D. 立即吸氧，胸外心脏按压
- E. 氢化可的松静脉输液

36.真题 2020-Z53 根据小儿运动功能的发育，开始会爬的年龄是

- A. 3~4 个月
- B. 5~6 个月
- C. 8~9 个月
- D. 10~11 个月
- E. 11~12 个月

37.真题 2020-Z54 颅脑出血的体位

- A. 头高足低位
- B. 平卧位
- C. 头低足高位
- D. 侧卧位
- E. 中凹卧位

38.真题 2020-Z55 有机磷农药中毒的主要机制是

- A. 抑制呼吸中枢
- B. 抑制胆碱酯酶的活性
- C. 破坏肝脏解毒功能
- D. 毒物使乙酰胆碱分解
- E. 作用于中枢神经系统引起昏迷

39.真题 2020-Z56 未母乳喂养或未做到及时有效母乳喂养的产妇，通常可于产后 3~4 天因乳房血管、淋巴管极度充盈可有发热，称为

- A. 泌乳热
- B. 乳腺炎

- C. 产后热
- D. 产褥热
- E. 产褥感染

40.真题 2020-Z57 关于灌肠术, 以下说法错误的是

- A. 小量不保留灌肠用于保胎孕妇危重患者、病儿及年老体弱患者等
- B. 保留灌肠时肛管插入的长度为 15~20cm
- C. 降温灌肠时, 应保留 60 分钟后再排出
- D. 细菌性痢疾患者灌肠采取左侧卧位
- E. 伤寒患者灌肠时灌肠液容量一般不超过 500ml

41.真题 2020-Z58 重度代谢性酸中毒的表现是

- A. 呼吸深快, 口唇发绀
- B. 呼吸深快, 口唇樱红
- C. 呼吸深慢, 口唇发绀
- D. 呼吸浅快, 口唇樱红
- E. 呼吸深慢, 口唇樱红

42.真题 2020-Z60 抢救患者首先应该

- A. 确认现场环境安全
- B. 判断意识
- C. 保持气道通畅
- D. 心脏按压
- E. 人工呼吸

43.真题 2020-Z61 接种卡介苗的正确方法是

- A. 前臂掌侧下段 ID
- B. 三角肌下缘 ID
- C. 三角肌下缘 H
- D. 上臂三角肌 H
- E. 臀大肌 IM

44.真题 2020-Z64 某患者住院期间因输入不合格血液导致感染乙型肝炎, 其索赔部门应当选择

- A. 当地疾病预防控制中心
- B. 当地卫生计生行政部门
- C. 血站及医院
- D. 当地公安部门
- E. 执业输血操作的护士

45.真题 2020-Z65 护士在书写交班报告时, 首先应写

- A. 4 床, 病人甲, 上午 9 时转呼吸科
- B. 18 床, 病人乙, 上午 9 时入院
- C. 21 床, 病人丙, 上午 8 时 40 分手术
- D. 24 床, 病人丁, 下午行胸腔闭式穿刺术
- E. 25 床, 病人太, 下午行冠状动脉造影术

46.真题 2020-Z66 患者男, 32 岁。装修工人。其工作环境湿度高且通风不良, 若未采取足够防暑降温措施, 工作

环境温度超过多少易发生中暑

- A. 36°C
- B. 40°C
- C. 38°C
- D. 35°C
- E. 37°C

47.真题 2020-Z67 患者男, 60 岁。疑诊急性心肌梗死。最有诊断价值的心电图特征是

- A. T 波倒置
- B. ST 段弓背抬高
- C. P 波高尖
- D. 出现小 Q 波
- E. QRS 波群增宽

48.真题 2020-Z68 以下不属于护士权利的是

- A. 护士执业, 按规定获取工资报酬
- B. 保护患者隐私
- C. 对医疗卫生机构和卫生主管部门的工作提出意见和建议
- D. 享受专业知识能力的教育和培训
- E. 在护理工作中做出杰出贡献有获得表彰奖励的权利

49.真题 2020-Z69 十二指肠溃疡好发部位为

- A. 球部
- B. 乳头的近段降部
- C. 乳头的远段降部
- D. 十二指肠水平段
- E. 十二指肠升段

50.真题 2020-Z70 病人, 男性, 24 岁, 乐果中毒, 处于昏迷状态, 须立即进行洗胃。适宜的洗胃液是

- A. 1:15000~1:20000 高锰酸钾
- B. 50% 硫酸镁
- C. 硫酸钠
- D. 2%~4% 碳酸氢钠
- E. 过氧化氢

51.真题 2020-Z71 关于原发性胃癌的叙述, 错误的是

- A. 手术是治疗胃癌的首选方法
- B. 早期无明显症状及体征
- C. 血液转移为晚期癌最主要的转移途径
- D. 早期均出现恶心呕吐宿食及进食梗阻感
- E. 好发于胃窦部

52.真题 2020-Z72 新生儿胎龄 35 周, 出生体重 2000g, 按新生儿分类应属于

- A. 极低出生体重儿
- B. 低出生体重儿
- C. 正常体重儿

- D. 足月小样儿
E. 足月儿

53.真题 2020-Z73 关于室间隔缺损,下列错误的是

- A. 左向右分流型
B. 体循环血流量减少
C. 肺循环血流量增加
D. 肺动脉第二心音亢进
E. 胸骨左缘第 2~3 肋间可及 I~II 级收缩期喷射性杂音

54.真题 2020-Z74 属于长期医嘱的是

- A. 地塞米松 5mg iv qd
B. 奎尼丁 0.2g po q2hx5
C. B 超
D. 安定 5mg; po; sos
E. 速尿 5mg; im; St

55.真题 2020-Z75 支气管哮喘的发病机制是

- A. 遗传基因突变
B. 心肌急性缺血
C. 气道变态反应
D. 肺动脉栓塞
E. 肺泡充血水肿

56.真题 2020-Z76 病人,男性,34 岁。输液 1000ml,滴速为 50 滴/min,计划从上午 8 时 30 分开始,估计何时输完

- A. 上午 11 时 10 分
B. 中午 12 时 30 分
C. 下午 1 时 30 分
D. 下午 2 时 10 分
E. 下午 2 时 30 分

57.真题 2020-Z78 病人,女性,54 岁。呃逆、暖气、腹痛、发热、黄疸,间歇性反复发作,最可能的诊断是

- A. 急性胰腺炎
B. 消化道溃疡
C. 胆总管结石
D. 急性传染性肝炎
E. 阿米巴肝脓肿

58.真题 2020-Z79 护士指导慢性阻塞性肺疾病的患者做腹式呼吸时,吸气与呼气的比例是

- A. 1:1~2:1
B. 1:1~1.5:1
C. 1:2~1:3
D. 2:3~1:1
E. 1:1.5~2:1

59.真题 2020-Z80 患者,男性,36 岁,因咳嗽发热前来

就诊,医嘱给予青霉素 80 万 U 肌肉内注射,每日 2 次。

护士为患者首先进行青霉素皮试,操作时错误的是

- A. 在皮试盘内准备盐酸肾上腺素和注射器等急救药品
B. 皮试前详细询问用药史,过敏史,家族史
C. 因常温下易降解,所以皮试液一定要现配现用
D. 配制青霉素皮试液用注射用水进行稀释
E. 按皮内注射的要求在前臂掌侧下段注射皮试液 0.1ml

60.真题 2020-Z81 患者,女,68 岁,因心功能衰竭入院,现使用洋地黄进行治疗,患者现需要使用利尿剂,患者最可能使用的是

- A. 呋塞米
B. 布美他尼
C. 螺内酯
D. 氢氯噻嗪
E. 呋达帕胺

61.真题 2020-Z82 最常见的上消化道出血的原因

- A. 门脉高压症
B. 胆道疾病
C. 胃十二指肠溃疡
D. 出血性胃炎
E. 胃癌并发出血

62.真题 2020-Z83 下列属于压疮炎性浸润期表现的是

- A. 皮肤红肿麻木
B. 皮下有硬结产生
C. 皮肤破坏深达皮下组织和深层组织
D. 坏死组织有臭味
E. 皮肤微红,按之褪色

63.真题 2020-Z84 中毒型细菌性痢疾的常见致病菌是

- A. 宋内氏痢疾杆菌
B. 福氏痢疾杆菌
C. 鲍氏痢疾杆菌
D. 志贺氏痢疾杆菌
E. 大肠痢疾杆菌

64.真题 2020-Z85 属于不完全骨折的是

- A. 横行骨折
B. 粉碎性骨折
C. 青枝骨折
D. 斜行骨折
E. 嵌插骨折

65.真题 2020-Z86 出院病人的病历排列首页是

- A. 体温单
B. 入院记录
C. 住院病案首页
D. 病程记录

E. 出院记录

66.真题 2020-Z87 小儿在治疗营养性缺铁性贫血, 在血红蛋白达正常水平后, 铁剂服用的时间是

- A. 血红蛋白正常后停药
- B. 血红蛋白正常 2 周后停药
- C. 血红蛋白正常后 1 个月停药
- D. 血红蛋白正常后 2 个月停药
- E. 血红蛋白正常后 3 个月停药

67.真题 2020-Z88 关于髌关节脱位的叙述正确的是

- A. 前脱位多见
- B. 轻微暴力即可引起
- C. 患肢内收中立位皮牵引
- D. 髌关节屈曲内收、内旋、短缩畸形
- E. 1 个月后患肢可负重

68.真题 2020-Z89 护患关系的基本模式有

- A. 1 种
- B. 2 种
- C. 3 种
- D. 4 种
- E. 5 种

69.真题 2020-Z90 患者王某, 因服毒昏迷不醒, 被送入急诊室抢救。其家属不能准确地说出毒物的名称及性质, 观察病人双侧瞳孔缩小。洗胃时胃管插入的长度是

- A. 30~40cm
- B. 35~45cm
- C. 40~50cm
- D. 45~55cm
- E. 50~60cm

70.真题 2020-Z91 患儿, 女性, 3 岁。因上呼吸道感染入院。目前出现高热, 声音嘶哑, 犬吠样咳嗽, 吸入性喉鸣。为迅速缓解症状, 首选的处理方法是

- A. 地塞米松雾化吸入
- B. 静点抗生素
- C. 静点强的松
- D. 口服化痰药
- E. 以呼吸机行机械通气

71.真题 2020-Z92 某孕妇怀孕期间出现胎位不正, 入院后遵医嘱采取膝胸卧位矫正胎位, 该孕妇的孕周可能为

- A. 22 周
- B. 24 周
- C. 26 周
- D. 30 周
- E. 29 周

72.真题 2020-Z93 某患者心电图检查结果: 常规心电图平均 P-P 间隔为 15 小格, 护士为其计算心率为

- A. 60 次/min
- B. 75 次/min
- C. 85 次/min
- D. 90 次/min
- E. 100 次/min

73.真题 2020-Z94 以各项护理活动为中心的护理工作方法称为

- A. 个案护理
- B. 成组护理
- C. 整体护理
- D. 功能制护理
- E. 责任制护理

74.真题 2020-Z95 甲状腺功能亢进患者进行基础代谢率测定时间宜在

- A. 下午 6 点、餐后和静卧
- B. 清晨空腹和静卧
- C. 下午 4 点、静卧
- D. 午间 12 点、餐后和静卧
- E. 下午 2 点、静卧

75.真题 2020-Z96 腹股沟直疝和斜疝的最主要的鉴别之处是

- A. 疝块的形状
- B. 发病的年龄
- C. 嵌顿的程度
- D. 回纳疝块压迫内环, 增加腹压疝块是否出现
- E. 包块的位置

76.真题 2020-Z97 入院后心脏彩超检查示二尖瓣大小约为 10mm×10mm 赘生物。护士最应预防和关注的是

- A. 心力衰竭
- B. 肺部感染
- C. 动脉栓塞
- D. 出血
- E. 深静脉血栓

77.真题 2020-Z98 某病人胸廓呈桶状, 胸廓活动度减弱, 叩诊过清音, 最可能是

- A. 胸膜炎
- B. 肺气肿
- C. 肺实变
- D. 气胸
- E. 肺不张

78.真题 2020-Z99 护士化妆应该不包括

- A. 清新

- B. 自然
- C. 时尚
- D. 大方
- E. 雅致

79.真题 2020-Z100 急性心肌梗死 24 小时内应禁用的药物是

- A. 利多卡因
- B. 速尿
- C. 尿激酶
- D. 硝酸甘油
- E. 洋地黄

80.真题 2020-Z101 原发性肝癌肝区疼痛的特点是

- A. 间歇性隐痛
- B. 持续性钝痛
- C. 阵发性绞痛
- D. 刀割样疼痛
- E. 烧灼样疼痛

81.真题 2020-Z102 患者,男,45 岁。是一家证券交易所的高级分析师,因工作劳累,睡眠不佳,自觉经常头痛、头晕而就诊。测血压 150/88mmHg,护士对患者进行饮食指导时,每天摄入钠盐的标准不高于

- A. 9g
- B. 8g
- C. 7g
- D. 6g
- E. 5g

82.真题 2020-Z104 大量输注库存血后要防止发生

- A. 碱中毒和低血钾
- B. 碱中毒和高血钾
- C. 酸中毒和低血钾
- D. 酸中毒和高血钾
- E. 低血钾和低血钠

83.真题 2020-Z105 患者外阴奇痒,白带呈豆腐渣样,最可能的诊断是

- A. 念珠菌性阴道炎
- B. 滴虫性阴道炎
- C. 慢性宫颈炎
- D. 萎缩性阴道炎
- E. 前庭大腺炎

84.真题 2020-Z106 肌注伤及患者坐骨神经,致患者轻度残疾属于

- A. 不属于医疗事故
- B. 一级医疗事故
- C. 二级医疗事故

- D. 三级医疗事故
- E. 四级医疗事故

85.真题 2020-Z107 下列信息中,属于客观资料的是

- A. 头痛 2 天
- B. 感到恶心
- C. 体温 39°C
- D. 不易入睡
- E. 常有咳嗽

86.真题 2020-Z109 一岁半小孩输液首选

- A. 头皮静脉
- B. 颞浅静脉
- C. 大隐静脉
- D. 贵要静脉
- E. 手背静脉

87.真题 2020-Z110 氧的弥散能力是二氧化碳的多少倍

- A. 1/10
- B. 1/20
- C. 10 倍
- D. 20 倍
- E. 40 倍

88.真题 2020-Z111 疝的组成不包括

- A. 疝块
- B. 疝外被盖
- C. 疝内容物
- D. 疝环
- E. 疝囊

89.真题 2020-Z112 胆汁中参与消化作用的主要成分是

- A. 胆色素
- B. 胆盐
- C. 胆固醇
- D. 脂肪酶
- E. 蛋白酶

90.真题 2020-Z113 常用于铜绿假单胞菌感染的漱口溶液是

- A. 0.3%醋酸溶液
- B. 0.1%醋酸溶液
- C. 1%~4%碳酸氢钠溶液
- D. 2%~3%硼酸溶液
- E. 1%~3%过氧化氢溶液

91.真题 2020-Z114 发生医疗纠纷需要进行尸检,尸检时间应在死亡内多长时间进行

- A. 12h 内
- B. 48h 内

- C. 72h 内
- D. 24h 内
- E. 36h 内

92.真题 2020-Z115 护患关系中最重要非技术性关系是

- A. 道德关系
- B. 利益关系
- C. 工作关系
- D. 文化关系
- E. 法律关系

93.真题 2020-Z116 麻疹并发的肺炎类型是

- A. 支气管肺炎
- B. 间质性肺炎
- C. 真菌性肺炎
- D. 大叶性肺炎
- E. 支原体肺炎

94.真题 2020-Z117 人体是以什么为中心

- A. 五脏
- B. 经络系统
- C. 精、气、血、津液
- D. 六腑
- E. 五体、五官、九窍、四肢

95.真题 2020-Z118 中凹卧位需将床头及床尾抬起的角度分别为

- A. 10°~20°,30°~35°
- B. 20°~25°,20°~30°
- C. 20°~25°,30°~35°
- D. 5°~10°, 20°~30°
- E. 10°~20°,20°~30°

96.真题 2020-Z119 无菌盘在未污染的情况下有效期为

- A. 1 小时
- B. 4 小时
- C. 8 小时
- D. 12 小时
- E. 24 小时

97.真题 2020-Z120 下列哪种药物具有正性肌力的作用

- A. 硝普钠
- B. 卡托普利
- C. 吗啡
- D. 地高辛
- E. 普萘洛尔

98.丙型肝炎的主要传播途径是

- A. 粪-口传播

- B. 疫水传播
- C. 食物传播
- D. 血液传播
- E. 媒介传播


99.抢救心搏骤停患者首要的措施是

- A. 吸氧
- B. 判断意识
- C. 保持气道通畅
- D. 心脏按压
- E. 人工呼吸

100.疼痛数字评分法中“10 分”表示


- A. 无痛
- B. 轻微疼痛
- C. 中度疼痛
- D. 重度疼痛
- E. 剧烈疼痛

101.图片中所示的热型属于



- A. 稽留热
- B. 弛张热
- C. 间歇热
- D. 不规则热
- E. 波状热

102.二人搬运法护士的手应分别放置于



- A. 甲托患者头、颈、肩部, 乙托臀、腘窝

- B. 甲托患者头、颈、肩、背部，乙托腰、大腿处
- C. 甲托患者头、颈、背部，乙托腰、腘窝处
- D. 甲托患者头、颈、肩、腰部，乙托臀、腘窝处
- E. 甲托患者头、颈、肩、腰部，乙托臀、小腿处

103.患者，女，36岁。急性淋巴细胞白血病。医嘱：浓缩红细胞和血小板静脉输注。在输注浓缩红细胞过程中患者全身皮肤瘙痒伴颈部、前胸出现荨麻疹。首先考虑该患者发生了

- A. 发热反应
- B. 溶血反应
- C. 过敏反应
- D. 右心衰竭
- E. 急性肺水肿

104.患者，女，36岁。急性淋巴细胞白血病。医嘱：浓缩红细胞和血小板静脉输注。在输注浓缩红细胞过程中患者全身皮肤瘙痒伴颈部、前胸出现荨麻疹。针对上述患者发生的情况，护士首先应采取的处理措施是

- A. 密切监测体温。局部涂抹止痒药膏
- B. 减慢输液速度并遵医嘱给予抗过敏药等
- C. 停止输注浓缩红细胞并保留血袋、余血及输血器送检
- D. 停止输注浓缩红细胞并重新采集血标本进行交叉配血
- E. 停止输注浓缩红细胞并待患者情况好转后重新输血

105.患者，女，36岁。急性淋巴细胞白血病。医嘱：浓缩红细胞和血小板静脉输注。在输注浓缩红细胞过程中患者全身皮肤瘙痒伴颈部、前胸出现荨麻疹。护士在执行输注血小板的过程中，错误的是

- A. 采用双人核对法
- B. 输注前不可摇晃血袋
- C. 直接缓慢输注血小板
- D. 血液内不能加入其他药物
- E. 记录输注时间及血型、血量

106.患者，男，35岁。因头部外伤急诊入院。现处于浅昏迷，CT示颅内血肿，脑挫裂伤，在全身麻醉下行颅内血肿清除术。患者术后返回病房，正确的体位是

- A. 侧卧位
- B. 去枕仰卧位，头偏向一侧
- C. 头高足低位
- D. 头低足高位
- E. 中凹卧位

107.患者，男，35岁。因头部外伤急诊入院。现处于浅昏迷，CT示颅内血肿，脑挫裂伤，在全身麻醉下行颅内血肿清除术。术后第2天，患者应采取的体位是

- A. 头高足低位
- B. 平卧位
- C. 头低足高位

- D. 中凹卧位
- E. 俯卧位

108.患者，男，35岁。因头部外伤急诊入院。现处于浅昏迷，CT示颅内血肿，脑挫裂伤，在全身麻醉下行颅内血肿清除术。术后第2天采取上述卧位的目的是

- A. 促进排痰
- B. 利于呼吸
- C. 便于观察瞳孔
- D. 促进引流
- E. 预防脑水肿

109.患者，男，35岁。因头部外伤急诊入院。现处于浅昏迷，CT示颅内血肿，脑挫裂伤，在全身麻醉下行颅内血肿清除术。若患者出现躁动，使用约束带时护士需要重点观察

- A. 呼吸情况
- B. 血压情况
- C. 约束时间
- D. 末梢血液循环
- E. 伤口渗血情况

110.患者，男，24岁。1天前淋雨后突发寒战、高热，咳嗽、胸痛、气急，咳铁锈色痰。听诊左下肺有实变体征及湿啰音。首选的治疗用药是

- A. 青霉素
- B. 地塞米松
- C. 红霉素
- D. 沐舒坦
- E. 氨茶碱

111.患者，男，24岁。1天前淋雨后突发寒战、高热，咳嗽、胸痛、气急，咳铁锈色痰。听诊左下肺有实变体征及湿啰音。患者经抗炎及对症治疗，病情未明显好转。为防止病情恶化，护士应重点观察

- A. 体温变化
- B. 血压变化
- C. 心率变化
- D. 呼吸节律的变化
- E. 痰液性状的变化

112.护理专业应届毕业生甲已经完成了国务院教育主管部门和卫生主管规定的全日制4年护理专业课程学习，本人拟申请护理执业资格注册。不属于申请护理执业资格注册条件的是

- A. 年龄18周岁及以上
- B. 护理专业学历证书
- C. 健康证明
- D. 护士执业资格考试成绩合格证明
- E. 户籍证明

113. 护理专业应届毕业生甲已经完成了国务院教育主管部门和卫生主管闭门规定的全日制 4 年护理专业课程学习, 本人拟申请护理执业资格注册。从事护理活动唯一合法的凭证是

- A. 在校成绩单
- B. 实习证明
- C. 护理专业学历证书
- D. 护士执业资格考试成绩合格证明
- E. 护士执业资格证明

114. 真题 2020-Z5 当某责任护士得知自己所护理的患者是一位退休老师时, 由于从小对老师就很尊敬, 很喜欢老师, 便根据自己对老师的了解和交往经验, 以热情亲切的态度和方式与她沟通, 并得到较好的效果。护士遵医嘱为该患者进行静脉滴注治疗, 穿刺三次均失败, 但是患者没有责怪护士, 说: 没事没事, 接着再打。此护士较好地应用了认知效应中的

- A. 首因效应
- B. 刻板印象
- C. 晕轮效应
- D. 先礼效应
- E. 免疫效应

115. 真题 2020-Z6 当某责任护士得知自己所护理的患者是一位退休老师时, 由于从小对老师就很尊敬, 很喜欢老师, 便根据自己对老师的了解和交往经验, 以热情亲切的态度和方式与她沟通, 并得到较好的效果。护士遵医嘱为该患者进行静脉滴注治疗, 穿刺三次均失败, 但是患者没有责怪护士, 说: 没事没事, 接着再打。此护士较好地体现了认知效应中的

- A. 首因效应
- B. 刻板印象
- C. 晕轮效应
- D. 先礼效应
- E. 免疫效应

116. 真题 2020-Z41 患者, 女, 81 岁。退休干部。冠心病住院治疗, 住院前 3 天与护士们关系融洽。第 4 天, 年轻护士张某在为其进行静脉输液时, 静脉穿刺 3 次失败, 更换李护士后方成功。患者非常不满。某女儿向护士长进行抱怨。从此患者拒绝张护士为其护理。护患关系冲突的主要责任人是

- A. 患者
- B. 张护士
- C. 李护士
- D. 护士长
- E. 患者女儿

117. 真题 2020-Z42 患者, 女, 81 岁。退休干部。冠心病

住院治疗, 住院前 3 天与护士们关系融洽。第 4 天, 年轻护士张某在为其进行静脉输液时, 静脉穿刺 3 次失败, 更换李护士后方成功。患者非常不满。某女儿向护士长进行抱怨。从此患者拒绝张护士为其护理。针对此患者的特点, 最佳护患关系模式为

- A. 指导型
- B. 被动型
- C. 共同参与型
- D. 指导-合作型
- E. 主动-被动型

118. 真题 2020-Z43 患者, 女, 81 岁。退休干部。冠心病住院治疗, 住院前 3 天与护士们关系融洽。第 4 天, 年轻护士张某在为其进行静脉输液时, 静脉穿刺 3 次失败, 更换李护士后方成功。患者非常不满。某女儿向护士长进行抱怨。从此患者拒绝张护士为其护理。护患关系冲突的主要因素是

- A. 角色压力
- B. 责任不明
- C. 角色模糊
- D. 信任危机
- E. 理解差异

2020 实践能力 真题

1. 真题 2020-S1 下列哪项不是痔形成的因素

- A. 静脉壁本身薄弱
- B. 久站、久坐
- C. 长期排便困难
- D. 门静脉高压
- E. 长期腹泻

2. 真题 2020-S2 护理程序的第一步且贯穿护理程序全过程的是

- A. 评估
- B. 诊断
- C. 计划
- D. 实施
- E. 评价

3. 真题 2020-S3 患儿 8 个月, 因肺炎并发急性心力衰竭, 现用强心苷药物治疗, 当出现下列哪种情况时, 应及时停止用强心苷药物 (争议题)

- A. 小于 60 次/分
- B. 小于 70 次/分
- C. 小于 80 次/分
- D. 小于 90 次/分
- E. 小于 100 次/分

4. 真题 2020-S4 新生儿破伤风细菌入侵的途径是

- A. 脐部
- B. 呼吸道
- C. 消化道
- D. 皮肤
- E. 胎盘

5.真题 2020-S5 患者李某,因腹部疼痛来医院就诊,确诊为急性阑尾炎,图示其疼痛的压痛点在



- A. A
- B. B
- C. C
- D. D
- E. E

6.真题 2020-S6 柳氮磺胺吡啶治疗溃疡性结肠炎的机制是(争议题)

- A. 抑制炎症反应
- B. 促进肠上皮细胞再生
- C. 降低肠腔酸度,促进溃疡愈合
- D. 抑制细菌生长
- E. 免疫抑制作用

7.真题 2020-S7 治疗急性细菌性痢疾的首选药物是

- A. 青霉素
- B. 氯霉素
- C. 链霉素
- D. 诺氟沙星
- E. 复方磺胺甲唑

8.真题 2020-S8 火焰烧伤现场急救时,下列哪项是错误的

- A. 就地翻滚
- B. 跳入水池
- C. 用毛毯覆盖灭火
- D. 奔跑呼叫并用手打火
- E. 使用灭火器灭火

9.真题 2020-S9 患者男,30岁,四肢、躯干烧伤,面积70%,伤口有绿色脓液流出,最可能感染的病原菌为

- A. 链球菌
- B. 铜绿假单胞菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 溶血性链球菌

E. 梭状芽胞杆菌

10.真题 2020-S10 骨质疏松患者常见的症状是

- A. 疼痛
- B. 身高缩短
- C. 驼背
- D. 呼吸困难
- E. 骨折

11.真题 2020-S11 患者,男,34岁。因十二指肠溃疡行毕式手术。术后8天进食,进食后出现上腹部饱胀感,后出现呕吐,呕吐物为食物和胆汁。护士根据患者的情况,考虑其出现了

- A. 幽门梗阻
- B. 吻合口梗阻
- C. 输入段梗阻
- D. 输出段梗阻
- E. 十二指肠溃疡复发

12.真题 2020-S12 患者,男,48岁。上腹部疼痛不适伴进行性加重的黄疸,诊断为胰腺癌。患者术前需补充的维生素是

- A. 维生素 A
- B. 维生素 B
- C. 维生素 C
- D. 维生素 D
- E. 维生素 K

13.真题 2020-S13 肝硬化腹水病人,每日进水量限制在

- A. 1500ml
- B. 1000ml
- C. 800ml
- D. 500ml
- E. 300ml

14.真题 2020-S14 有机磷中毒病人其瞳孔表现为

- A. 双侧瞳孔缩小
- B. 双侧瞳孔扩大
- C. 双侧瞳孔大小不等,忽大忽小
- D. 双侧瞳孔同向偏斜
- E. 单侧瞳孔扩大、固定

15.真题 2020-S15 小儿肺炎链球菌感染的化脓性脑膜炎,首选

- A. 氯霉素
- B. 红霉素
- C. 青霉素
- D. 克林霉素
- E. 庆大霉素

16.真题 2020-S16 肝硬化伴大量腹水取半卧位的原因是

- A. 有利于腹水消退
- B. 增加回心血量
- C. 减轻心脏负荷
- D. 减轻呼吸困难
- E. 降低腹内压力

17.真题 2020-S17 脊柱骨折急救搬运的基本原则是

- A. 始终保持脊柱中立位
- B. 始终卧硬板转运
- C. 不可背驮运送
- D. 不可抱持运送
- E. 不可坐位检查和运送

18.真题 2020-S18 支气管哮喘的典型表现为发作性伴有哮鸣音的

- A. 呼气性呼吸困难
- B. 吸气性呼吸困难
- C. 混合性呼吸困难
- D. 一过性呼吸困难
- E. 进行性呼吸困难

19.真题 2020-S19 患儿面色蜡黄，手有震颤，血红细胞 $3 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白 $80g/L$ ，血片中红细胞形态大小不等，以大红细胞为多，首先考虑

- A. 营养性缺铁性贫血
- B. 营养性巨幼红细胞性贫血
- C. 营养性混合性贫血
- D. 生理性贫血
- E. 溶血性贫血

20.真题 2020-S20 治疗支气管哮喘时，快速静注氨茶碱的主要不良反应有

- A. 口干和皮疹
- B. 心律失常和低血压
- C. 腹绞痛和腹泻
- D. 耳鸣和高血压
- E. 红斑和视力模糊

21.真题 2020-S21 目前控制支气管哮喘急性发作的首选药物是

- A. 沙丁胺醇
- B. 氨茶碱
- C. 倍氯米松
- D. 色苷酸钠
- E. 糖皮质激素

22.真题 2020-S22 最早从耳后发际开始出现皮疹的疾病是

- A. 麻疹

B. 水痘

- C. 幼儿急疹
- D. 猩红热
- E. 风疹

23.真题 2020-S23 夏柯三联征是指

- A. 腹痛、寒战与高热、黄疸
- B. 休克、腹痛、精神症状、黄疸
- C. 寒战与高热、休克
- D. 腹痛、精神症状、黄疸
- E. 腹痛、黄疸、休克

24.真题 2020-S24 产后在腹部扪不到宫底的时间是

- A. 产后 2~3 天
- B. 产后 3~5 天
- C. 产后 1 周左右
- D. 产后 10 天左右
- E. 产后 2 周

25.真题 2020-S25 初产妇，妊娠 37 周。规律宫缩，宫口开全 5 小时，胎儿仍未娩出，属于（2022 大纲变动）

- A. 潜伏期延长
- B. 活跃期停滞
- C. 活跃期延长
- D. 第二产程延长
- E. 第二产程停滞

26.真题 2020-S26 烟碱样症状表现为肌纤维颤动，常先出现在

- A. 腹肌
- B. 呼吸肌
- C. 肱二头肌
- D. 全身肌肉
- E. 眼睑、舌肌

27.真题 2020-S27 患儿，男，10 岁。突发剑突下钻顶样剧烈疼痛而入院，自诉疼痛呈间歇性，发作时疼痛剧烈，辗转不安，大汗淋漓，可突然自行缓解，缓解期无任何症状。体检示剑突下有轻度深压痛， $WBC 11.5 \times 10^9/L$ 。根据该患者的临床表现，应考虑为

- A. 急性胆囊炎
- B. 急性胆管炎
- C. 胆囊穿孔
- D. 胆道蛔虫症
- E. 慢性胆囊炎

28.真题 2020-S28 患儿男，10 岁。突发剑突下钻顶样剧烈疼痛而入院，自诉疼痛呈间歇性，发作时疼痛剧烈，辗转不安，大汗淋漓，可突然自行解，缓解期无任何症状。体检示剑突下有轻度深压痛， $WBC 11.5 \times 10^9/L$ 。应采取哪

项处理方案

- A. 急诊手术
- B. 择期手术
- C. ERCP 术
- D. 中药治疗
- E. 非手术治疗

29.真题 2020-S29 患者,女,63岁。心力衰竭,卧床2个月,近日骶尾部皮肤破溃,护士观察后认为是压疮的炎性浸润期。该护士解释他的判断是因为患者压疮的表现符合炎性浸润期的典型表现,包括

- A. 骶尾部皮肤呈紫色,有皮下硬结,并出现水疱
- B. 表皮有感染发生,形成溃疡
- C. 局部坏死组织侵入真皮下层,颜色变黑
- D. 患者主诉骶尾部疼痛麻木感
- E. 表皮水疱破溃,并有黄色液体渗出

30.真题 2020-S30 患者,女,63岁。心力衰竭,卧床2个月,近日骶尾部皮肤破溃,护士观察后认为是压疮的炎性浸润期。该护士认为患者的饮食护理应采用

- A. 高维生素、高蛋白、低盐
- B. 高维生素、高脂肪、低蛋白
- C. 高热量、低蛋白、低盐
- D. 高维生素、高蛋白、低脂肪
- E. 高维生素、高蛋白、高糖类

31.真题 2020-S31 冠心病最常见的病因

- A. 重度主动脉瓣病变
- B. 冠状动脉栓塞
- C. 冠状动脉粥样硬化
- D. 肥厚型心肌病
- E. 冠状动脉痉挛

32.真题 2020-S32 病人,女性,50岁,G4P2。因腰骶部酸痛伴下坠感6个月入院。查体:宫颈已达处女膜缘,阴道可见子宫颈。该患者子宫脱垂的程度是

- A. I度轻型
- B. I度重型
- C. II度轻型
- D. II度重型
- E. III度

33.真题 2020-S33 足底忌用冷疗是防止

- A. 一过性冠状动脉收缩
- B. 末梢循环障碍
- C. 局部组织坏死
- D. 体温骤降
- E. 心律异常

34.真题 2020-S34 慢性阻塞性肺疾病呼吸衰竭的类型及

给氧方式

- A. II型呼吸衰竭,低流量低浓度持续吸氧
- B. II型呼吸衰竭,低浓度间断吸氧
- C. II型呼吸衰竭,高浓度持续吸氧
- D. I型呼吸衰竭,低浓度吸氧
- E. II型呼吸衰竭,低浓度持续吸氧

35.真题 2020-S35 患者女,45岁,胃溃疡5年,溃疡直径4cm,最佳的治疗方式是

- A. 手术治疗
- B. 保守+饮食控制
- C. 保守治疗
- D. 根除HP
- E. 抑酸治疗

36.真题 2020-S36 患者,男,68岁,肺癌,行右上肺叶切除术,医嘱:全血200ml ivgtt。输血过程中患者面部出现荨麻疹,眼睑、口唇出现水肿,BP80/60mmHg,P120次/分,R25次/分。目前首选的措施是

- A. 立即停止输血
- B. 减慢输血速度
- C. 吸氧
- D. 遵医嘱建立静脉通路
- E. 气管切开

37.真题 2020-S37 护士在执行输注血小板的过程中,错误的是

- A. 采用双人核对法
- B. 输注前轻摇晃血袋
- C. 直接缓慢输注血小板
- D. 血液内不能加入其他药物
- E. 记录输血的时间及血型、血量

38.真题 2020-S38 治疗慢性再生障碍性贫血的首选药物是

- A. 糖皮质激素
- B. 免疫抑制剂
- C. 造血因子
- D. 雄激素
- E. 雌激素

39.真题 2020-S39 秋季腹泻最常见的病原体是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 大肠杆菌
- C. 耶尔森菌
- D. 轮状病毒
- E. 柯萨奇病毒

40.真题 2020-S40 某护士在抽吸药液过程中,不慎被掰开的安剖瓶划伤手指,不妥的处理方法是

- A. 用 0.5%碘伏消毒伤口，并包扎
- B. 用 75%乙醇消毒伤口，并包扎
- C. 从伤口的远心端向近心端挤压
- D. 及时填写锐器伤登记表
- E. 用肥皂水彻底清洗伤口

41.真题 2020-S41 降低颅内压使用的甘露醇浓度是

- A. 15%
- B. 25%
- C. 20%
- D. 10%
- E. 5%

42.真题 2020-S42 患者，女，36 岁。急性淋巴细胞白血病。医嘱浓缩红细胞和血小板输注。在首先输注浓缩红细胞过程中患者出现全身皮肤瘙痒伴颈部、前胸出现荨麻疹。首先考虑该患者发生了

- A. 发热反应
- B. 溶血反应
- C. 过敏反应
- D. 超敏反应
- E. 急性肺水肿

43.真题 2020-S43 患者，女，36 岁。急性淋巴细胞白血病。医嘱浓缩红细胞和血小板输注。在首先输注浓缩红细胞过程中患者出现全身皮肤瘙痒伴颈部、前胸出现荨麻疹。针对上述患者发生的情况，护士应该首先采取的处理是

- A. 密切观察体温，局部涂抹止痒药膏
- B. 减慢输液速度并按医嘱给予抗过敏药等
- C. 停止输注浓缩红细胞并保留血袋、余血及输血器送检
- D. 停止输注浓缩红细胞并重新采集血标本进行交叉配血
- E. 停止输注浓缩红细胞并待患者情况好转后重新输血

44.真题 2020-S44 患者，女，23 岁。风湿性心脏瓣膜病史 3 年。近 1 月余不明原因持续低热，抗生素治疗无效，现收住入院。心脏彩超提示二尖瓣有一大小约为 12mmX12mm 赘生物。该患者首选用药

- A. 青霉素
- B. 阿奇霉素
- C. 阿昔洛韦
- D. 甲硝唑
- E. 卡那霉素

45.真题 2020-S45 病人男，48 岁，患肝硬化 4 年，近来胸闷加重，呼吸困难，经心脏彩超检查发现有大量心包积液，为缓解病人呼吸困难，应采取

- A. 端坐卧位
- B. 仰卧位
- C. 半坐卧位
- D. 膝胸卧位

E. 头低脚高位

46.真题 2020-S46 患者，女，41 岁，患有肥厚型心肌病，因胸痛 1 小时急诊入院。首要的护理措施是

- A. 绝对卧床
- B. 氧气吸入
- C. 安慰病人，解除紧张情绪
- D. 遵医嘱使用钙通道阻滞剂
- E. 病情观察

47.真题 2020-S47 患者男，56 岁。肝硬化 3 年，因肝性脑病入院。为了防止患者病情加重，应给予

- A. 低脂肪饮食
- B. 低嘌呤饮食
- C. 低胆固醇饮食
- D. 低蛋白饮食
- E. 低盐饮食

48.真题 2020-S48 患者，女性，25 岁。前额及眶部被车撞伤，眼睑青肿，结膜下出血，鼻部不断流出血性液体，考虑是

- A. 颅顶骨折
- B. 颧骨骨折
- C. 颅前窝骨折
- D. 鼻骨骨折
- E. 面部挫伤

49.真题 2020-S49 采集不同血标本，注入容器的先后顺序是（2022 大纲变动）

- A. 抗凝管-干燥管-血培养瓶
- B. 干燥管-血培养瓶-抗凝管
- C. 干燥管-抗凝管-血培养瓶
- D. 血培养瓶-干燥管-抗凝管
- E. 血培养瓶-抗凝管-干燥管

50.真题 2020-S50 我国献血法的制度是

- A. 自愿献血
- B. 无偿献血
- C. 有偿献血
- D. 义务献血
- E. 互助献血

51.真题 2020-S51 注射部位在表皮与真皮之间，注射方法为

- A. 皮内注射
- B. 皮下注射
- C. 肌肉注射
- D. 静脉注射
- E. 动脉注射

52.真题 2020-S52 下列属于口服药的缩写

- A. hs
- B. dc
- C. pc
- D. st
- E. po

53.真题 2020-S53 麻疹减毒活疫苗的接种时间

- A. 出生时
- B. 2 个月
- C. 3 个月
- D. 8 个月
- E. 1 岁半

54.真题 2020-S54 鉴别轻型腹泻和重型腹泻的区别主要为

- A. 发热
- B. 粪便水分很多
- C. 食欲低下、呕吐
- D. 每天大便 10 余次
- E. 有水电解质紊乱

55.真题 2020-S55 患者男, 风心病房颤入院, 查体心率脉率不一致, 心律不齐。这是什么脉搏

- A. 洪脉
- B. 细脉
- C. 奇脉
- D. 丝脉
- E. 绀脉

56.真题 2020-S56 异位妊娠的主要原因

- A. 输卵管发育不良
- B. 内分泌失调
- C. 输卵管炎症
- D. 输卵管功能异常
- E. 畸形

57.真题 2020-S57 泡奶粉试温度在何处试

- A. 手腕内侧
- B. 手腕背侧
- C. 手心
- D. 手指腹
- E. 嘴里

58.真题 2020-S58 关于阴茎套的说法, 正确的是

- A. 使用后高压蒸汽灭菌消毒后再用
- B. 可降低疾病的传播
- C. 使用后洗净晾晒, 涂上滑石粉后可再用
- D. 用双层阴茎套可增加安全度
- E. 使用后吹气检查是否漏气

59.真题 2020-S59 中医认为, 有保护作用的气是

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 原气

60.真题 2020-S60 男, 78 岁。3 日前受凉后出现鼻塞、流涕, 伴有咳嗽、咳白痰, 痰量较多。体温 37.2°C。听诊呼吸音粗。患者既往为慢支病史 7 年, 无其他基础疾病及药物食物过敏史。以下药物不合理的是

- A. 糖皮质激素
- B. 盐酸氨溴索
- C. 盐酸可待因
- D. 喹诺酮
- E. 氨茶碱

61.真题 2020-S61 急性胰腺炎患者可以应用的药物是

- A. 氢氯噻嗪
- B. 糖皮质激素
- C. 吗啡
- D. 生长抑素
- E. 西米替丁

62.真题 2020-S62 肌内注射臀大肌注射定位

- A. 髂后上棘与尾骨连线外上 1/2 处
- B. 髂前上棘与尾骨连线内上 1/2 处
- C. 髂前上棘与尾骨连线外上 1/3 处
- D. 髂后上棘与尾骨连线内上 1/3 处
- E. 髂前上棘与尾骨连线内下 1/3 处

63.真题 2020-S63 属于长期使用硝苯地平的不良反应是

- A. 眩晕头痛
- B. 牙龈增生
- C. 共济失调
- D. 低血压反应
- E. 踝关节水肿

64.真题 2020-S64 急性阑尾炎术后, 采用半坐卧位的目的是

- A. 缓解呼吸困难
- B. 减少静脉回心血, 减轻心脏负担
- C. 有利于腹腔引流, 使感染局限化
- D. 减轻腹壁伤口的疼痛
- E. 减少局部出血

65.真题 2020-S65 华法林的作用

- A. 在体内有抗凝血作用
- B. 扩张血管

- C. 增强心肌收缩力
D. 抗心律失常
E. 促进凝血作用
66. 真题 2020-S66 患者, 女, 25 岁。不慎被浓硫酸烧伤颜面部, 最佳的紧急处理措施
A. 立即前往医院就诊
B. 立即取碱性液体冲洗伤处
C. 立即拨打 110
D. 立即冰敷伤处
E. 立即取大量清水冲洗伤处
67. 真题 2020-S67 最常见的异常胎方位是
A. 枕左前
B. 枕右前
C. 枕左横
D. 枕右前横
E. 臀位
68. 真题 2020-S68 胎膜破裂在正常分娩发生的时间是
A. 临产前
B. 无固定时间
C. 第一产程
D. 第二产程
E. 第三产程
69. 真题 2020-S69 患者男性, 65 岁, 间断胸闷 1 周, 1 天前于夜间突然被迫坐起, 频繁咳嗽, 严重气急, 咳大量粉红色泡沫痰, 既往患冠心病十年。考虑该患者发生了左心衰、急性肺水肿, 给氧方式应采用
A. 高流量, 20%~30%乙醇湿化
B. 低流量, 30%~50%乙醇湿化
C. 高流量, 10%~20%乙醇湿化
D. 低流量, 10%~20%乙醇湿化
E. 持续低流量给氧
70. 真题 2020-S70 主动脉狭窄是压力最高的是哪个
A. 左心房
B. 左心室
C. 右心房
D. 右心室
E. 肺静脉
71. 真题 2020-S71 患儿女, 早产儿, 胎龄 32 周, 出生后 6 天, 近 3 日患儿哭声减弱, 活动减少, 拒乳、反应低下。体温 30°C, 双面颊、肩部、臀部、下腹部、大腿及小腿外侧皮肤发硬, 硬肿范围大于 60%, 按之如橡皮样, 属重度新生儿寒冷损伤综合征。恢复正常体温需要时间是
A. 1~2 小时
B. 2~4 小时
C. 4~8 小时
D. 8~10 小时
E. 12~24 小时
72. 真题 2020-S72 “肾在志”中为
A. 怒
B. 喜
C. 悲
D. 思
E. 恐
73. 真题 2020-S73 20%甘露醇 250ml 静脉滴注, 一般应在多长时间内滴完
A. 10 分钟
B. 30 分钟
C. 50 分钟
D. 60 分钟
E. 70 分钟
74. 真题 2020-S74 在 ARDS 治疗和抢救中的最关键的措施是
A. 抗感染
B. 营养支持
C. 维持有效循环
D. 积极治疗原发疾病
E. 纠正低氧血症和酸中毒
75. 真题 2020-S75 李某, 女性, 停经 52 天, B 超证实为宫内妊娠。患者需要终止妊娠, 首选的方法是
A. 药物流产
B. 人工流产吸宫术
C. 人工流产钳刮术
D. 乳酸依沙吖啶引产
E. 缩宫素静脉滴
76. 真题 2020-S76 尿闭是指 24 小时尿量少于
A. 100ml
B. 200ml
C. 300ml
D. 400ml
E. 500ml
77. 真题 2020-S77 测定尿蛋白定量应加入哪种防腐剂
A. 甲醛
B. 甲苯
C. 浓盐酸
D. 稀盐酸
E. 硫酸
78. 真题 2020-S78 患儿 1 岁发热、咳嗽流涕 3 天入院,

入院后体温持续不退，达 40°C，呕吐、谵妄，抽搐 2 次，体检：胸、腹部、四肢皮肤有瘀斑，前囟隆起，双肺呼吸音粗糙，可闻及少许干啰音，腹软，脑脊液外观浑浊。该患儿可能发生的疾病是

- A. 败血症
- B. 急性感染性多发性神经根神经炎
- C. 支气管肺炎
- D. 癫痫
- E. 化脓性脑膜炎

79.真题 2020-S79 疝内容物不包括以下哪项

- A. 大网膜
- B. 小肠
- C. 盲肠
- D. 阑尾
- E. 疝块

80.真题 2020-S80 阿尔茨海默症最先出现的是

- A. 近记忆下降
- B. 远记忆下降
- C. 认知障碍
- D. 癫痫发作
- E. 动作缓慢

81.真题 2020-S81 导致早产最常见的因素

- A. 宫内感染
- B. 双胞胎妊娠
- C. 胎膜早破
- D. 羊水过多
- E. 羊水过少

82.真题 2020-S82 慢性宫颈炎的主要病理表现

- A. 宫颈糜烂
- B. 疼痛
- C. 白带增多
- D. 膀胱炎
- E. 盆腔沉重感

83.真题 2020-S83 五脏主要生理功能其在志对应正确的是

- A. 喜伤心
- B. 怒伤肺
- C. 忧伤脾
- D. 思伤肾
- E. 恐伤脾

84.真题 2020-S84 无菌包被无菌生理盐水浸湿后，应立即

- A. 晾干后使用
- B. 烘干后使用

C. 迅速将包内用物用完

D. 4 小时内用完

E. 重新灭菌

85.真题 2020-S85 患儿男，7 岁。因火灾造成全身大面积烧伤，护士提供的护理级别是

- A. 特级护理
- B. 一级护理
- C. 二级护理
- D. 三级护理
- E. 四级护理

86.真题 2020-S86 可使血压测量值偏高的因素是

- A. 肢体位置过高
- B. 袖带过紧
- C. 袖带过宽
- D. 袖带过松
- E. 水银不足

87.真题 2020-S87 病人，女性，35 岁。在静脉注射过程中，诉注射部位疼痛，护士检查见注射部位局部肿胀，抽吸有回血，应考虑为

- A. 针头阻塞
- B. 针头滑出血管外
- C. 针头斜面部分在血管外
- D. 针头斜面穿透对侧血管壁
- E. 静脉痉挛

88.真题 2020-S88 某新生儿出生时全身青紫，四肢伸展，呼吸浅表、哭声轻，心率 90 次/min，用洗耳球插鼻有皱眉动作。该患儿 Apgar 评分为

- A. 0 分
- B. 1 分
- C. 2 分
- D. 3 分
- E. 4 分

89.真题 2020-S89 某患儿，因皮疹入院。体格检查皮疹部位如下图所示，皮肤针尖大小的充血性皮疹，压之褪色，触之有砂纸感，该患儿考虑可能是



- A. 猩红热
- B. 水痘

- C. 麻疹
D. 荨麻疹
E. 玫瑰疹
- 90.真题 2020-S90 流行性腮腺炎应隔离至
A. 体温恢复正常
B. 腮腺完全消退, 再观察 3 天
C. 腮腺完全消退, 再观察 7 天
D. 腮腺完全消退, 再观察
E. 发病后 3 周
- 91.真题 2020-S91 患者, 男性, 30 岁, 患慢性肾炎。护士对该患者进行饮食指导, 正确的是
A. 高蛋白、低磷
B. 低蛋白、低磷
C. 高蛋白、高维生素
D. 高糖、高脂、高蛋白
E. 高蛋白、高脂、高维生素
- 92.真题 2020-S92 患者, 男, 16 岁口服地西洋自杀, 家人发现时已昏迷, 急诊来院。以下护理措施不正确的是
A. 活性炭导泻
B. 5%碳酸氢钠碱化尿液
C. 硫酸镁导泻
D. 0.9%生理盐水洗胃
E. 血压监测
- 93.真题 2020-S93 患者, 男, 42 岁, 平素喜食面食, 饮食清淡, 爱吃咸菜, 护士给予患者的饮食指导是
A. 低脂饮食
B. 低胆固醇饮食
C. 低钠饮食
D. 低热量饮食
E. 少渣饮食
- 94.真题 2020-S94 患者, 男性, 71 岁。因晚餐时情绪激动。饭后自感咽部及下额有“紧缩性发闷”, 并放射至颈部, 来院急诊前自含硝酸甘油后憋闷感逐渐缓解。应考虑为
A. 脑供血不足
B. 颈椎病
C. 咽喉炎
D. 心绞痛
E. 心功能不全
- 95.真题 2020-S95 患者男, 28 岁, 患十二指肠溃疡病多年。于饱餐后突然出现上腹剧烈疼痛。腹肌紧张。首先应考虑并发了
A. 幽门梗阻
B. 急性胃穿孔
C. 急性胰腺炎
D. 急性胆囊炎
E. 慢性胃穿孔
- 96.真题 2020-S96 患儿女, 2 岁, 诊断为水痘, 在家隔离治疗, 因皮疹痒, 哭闹不安, 护士给予家长正确的指导是
A. 局部涂 2%碘酊
B. 局部涂液体石蜡
C. 局部涂地塞米松霜
D. 局部涂炉甘石洗剂
E. 局部涂金霉素鱼肝油
- 97.真题 2020-S97 固定痰液里的癌细胞需要用哪种溶液
A. 10%草酸钾
B. 5%石碳酸
C. 95%乙醇
D. 40%甲醛
E. 75%乙醇
- 98.真题 2020-S98 患者, 女性, 34 岁。发热 3 天, 腹痛伴尿急、尿频、尿痛。查尿白细胞 30 个/HP。护士所采取的护理措施中, 属于预防泌尿系统感染的主要措施是
A. 注意保持会阴部卫生
B. 经常运动
C. 定期服抗生素
D. 加强营养
E. 保证睡眠
- 99.真题 2020-S99 细菌性肝脓肿最常见的早期症状是
A. 恶心
B. 黄疸
C. 贫血
D. 右上腹肌紧张, 局部触痛明显
E. 寒战、高热
- 100.真题 2020-S100 患者, 女, 22 岁。患系统性红斑狼疮 2 年, 鼻梁及面颊两侧呈蝶形水肿性红斑。针对该患者的护理措施是
A. 病人床位安置在阳光直射的地方
B. 有条件可以常进行日光浴
C. 适当使用化妆品掩饰红斑
D. 忌用碱性肥皂清洗面部
E. 使用普鲁卡因酰胺等药物保证睡眠
- 101.真题 2020-S101 6 个月小儿, 已添加菜汁、米汤。母亲带其到儿保门诊进行健康咨询, 此时应指导家长给该小儿的辅食是
A. 米粉
B. 馒头
C. 肉末
D. 饼干

E. 软饭

102.真题 2020-S102 医生开错医嘱护士照样执行,造成病人死亡,谁需要负责

- A. 医生
- B. 护士
- C. 医院
- D. 医生和护士
- E. 医院、医生和护士

103.真题 2020-S103 生物反馈治疗针对哪种精神类疾病

- A. 强迫症
- B. 焦虑症
- C. 精神分裂症
- D. 多动症
- E. 躁狂症

104.真题 2020-S104 原发性腹膜炎最常见的致病菌

- A. 大肠杆菌
- B. 溶血性链球菌
- C. 铜绿假单胞菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 破伤风杆菌

105.真题 2020-S105 乳腺癌最易发生于乳腺的



- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

106.真题 2020-S106 某新生儿,生后 5 天,其家人在尿布上发现有血迹,检查发现新生儿饮食可,精神佳,无其他异常。其家长十分焦虑,询问责任护士,该护士解释该现象

- A. 月经
- B. 尿路感染
- C. 假月经
- D. 外阴损伤
- E. 肾病综合征

107.真题 2020-S107 患者,男,50 岁。诊断为梗阻性肥厚型心肌病入院,护士应指导患者避免使用

- A. 氢氯噻嗪
- B. 硝酸甘油
- C. 阿替洛尔
- D. 美托洛尔
- E. 硝苯地平

108.真题 2020-S108 肝硬化患者并发上消化道出血时首选的药物是

- A. 垂体后叶素
- B. 奥美拉唑
- C. 生长抑素
- D. 气囊管压迫止血
- E. 法莫替丁

109.真题 2020-S109 患者女,49 岁。子宫肌瘤术后 1 天,采取半坐卧位的主要目的是

- A. 促进患者舒适
- B. 减轻腹部切口张力
- C. 利于引流
- D. 方便患者进食
- E. 预防下肢静脉曲张

110.真题 2020-S110 孕妇,28 岁,妊娠合并心脏病,最易发生心力衰竭的时间是

- A. 22~24 周
- B. 32~34 周
- C. 34~36 周
- D. 26~28 周
- E. 36~38 周

111.真题 2020-S111 灌肠过程中病人出现面色苍白,出冷汗,剧烈腹痛,脉速,护士应

- A. 立即停止灌肠
- B. 稍转动并挤压肠管
- C. 嘱病人深呼吸
- D. 适当放低灌肠桶
- E. 变化体位再灌入

112.真题 2020-S112 患者男,52 岁,胃大部分切除术后(毕 II 式)2 周,常于进食后 10~20 分钟出现心悸,心动过速、出汗、无力,并有恶心、呕吐、腹泻等症状。正确的处理措施是

- A. 胃肠减压
- B. 及早手术治疗
- C. 以流质饮食为主
- D. 餐后平卧 10~20 分钟
- E. 禁食、补液

113.真题 2020-S113 患者男,73 岁。良性前列腺增生,反复尿潴留,尿道口不断有尿液流出。该患者的尿失禁属

于


- A. 真性尿失禁
- B. 完全性尿失禁
- C. 急迫性尿失禁
- D. 压力性尿失禁
- E. 充溢性尿失禁

114.真题 2020-S114 为成人进行心肺复苏（CPR），心脏按压的按压点应位于图示的



- A. A
- B. B
- C. C
- D. D
- E. E

115.真题 2020-S115 患儿，男，2 岁，由于喂养不当导致出现营养不良，其皮下脂肪最先消耗的部位是



- A. A
- B. B
- C. C
- D. D
- E. E

116.真题 2020-S116 青霉素皮试液的浓度是

- A. 150U/ml
- B. 0.75mg/ml
- C. 5mg/ml
- D. 2500U/ml
- E. 500U/ml

117.真题 2020-S117 地西洋不具有的不良反应是

- A. 共济失调
- B. 白细胞减少
- C. 中枢麻醉
- D. 呼吸抑制
- E. 嗜睡、乏力

118.真题 2020-S118 患者，男，25 岁。护士在为其输血的过程中突然发生脉搏细速，面色苍白，首先采取的措施是

- A. 停止输血，保留余血
- B. 静脉注射碳酸氢钠
- C. 给与吸氧
- D. 减慢输血速度
- E. 输入葡萄糖酸钙溶液

119.真题 2020-S119 患者，男性，58 岁，急性心肌梗死并发心房纤颤。该患者的脉搏可能出现

- A. 脉细速
- B. 二联律
- C. 三联律
- D. 脉搏短绌
- E. 洪脉

120.真题 2020-S120 主要用于预防支气管哮喘的药物是

- A. 氨茶碱
- B. 肾上腺素
- C. 特布他林
- D. 色甘酸钠
- E. 异丙肾上腺素