

全国护士资格考试

# 护士资格考试 历年真题及精解

《2015 年真题》

编著：易考精灵

## 2015 专业实务 真题

1. (真题 2015-Z1) 癔症病人抽搐发作时, 紧急处理常用的药物是
- 地西洋
  - 氯氮平
  - 奋乃静
  - 百忧解
  - 丙咪嗪
2. (真题 2015-Z2) 属于传染病预防措施的是
- 计划免疫
  - 封锁疫区
  - 环境消毒
  - 限制集会
  - 停工停课
3. (真题 2015-Z3) 以假小叶形成为主要病理改变的疾病是
- 慢性肝淤血
  - 弥漫型肝癌
  - 急性重型肝炎
  - 肝硬化
  - 亚急性重型肝炎
4. (真题 2015-Z4) 有机磷中毒时, 代谢失常的神经递质是
- 多巴胺
  - 乙酰胆碱
  - 5-羟色胺
  - 肾上腺素
  - 去甲肾上腺素
5. (真题 2015-Z5) 人体的热能营养素是
- 糖类、维生素、矿物质
  - 糖类、脂肪、蛋白质
  - 脂肪、糖类、维生素
  - 蛋白质、脂肪、维生素
  - 蛋白质、糖类、微量元素
6. (真题 2015-Z6) 预防室性心律失常的最佳方法是
- 适宜的锻炼
  - 保持情绪稳定
  - 良好的饮食习惯
  - 经常进行健康体检
  - 控制器质性心脏病病情
7. (真题 2015-Z7) 服用磺胺类药物治疗尿路感染时, 加服碳酸氢钠的作用是
- 抗炎
  - 增加尿量
  - 碱化尿液
  - 保护尿路黏膜
  - 增加肾血流量
8. (真题 2015-Z8) 组成胎膜的是
- 真蜕膜和羊膜
  - 底蜕膜和羊膜
  - 绒毛膜和羊膜
  - 包蜕膜和羊膜
  - 绒毛膜和底蜕膜
9. (真题 2015-Z9) 丙型肝炎的主要传播途径是
- 粪-口传播
  - 水传播
  - 食物传播
  - 血液传播
  - 媒介传播
10. (真题 2015-Z10) PDCA 循环中的“D”代表
- 管理
  - 计划
  - 实施
  - 检查
  - 处理
11. (真题 2015-Z11) 检测红细胞沉降率应使用的容器是
- 干燥试管
  - 抗凝试管
  - 血培养瓶
  - 乳酸钠试管
  - 液状石蜡试管
12. (真题 2015-Z12) 治疗风湿性二尖瓣狭窄药物中, 苄星青霉素的作用是防止
- 风湿热
  - 心力衰竭
  - 动脉栓塞
  - 心律失常
  - 心绞痛
13. (真题 2015-Z13) 对患者进行健康教育属于
- 独立性护理措施
  - 非独立性护理措施
  - 协作性护理措施
  - 依赖性护理措施
  - 辅助性护理措施
14. (真题 2015-Z14) 服用胃黏膜保护剂硫糖铝后最常

见的不良反应是

- A. 头晕
- B. 皮疹
- C. 乏力
- D. 便秘
- E. 口干

15. (真题 2015-Z15) 患者男, 28 岁。主诉腹痛、腹泻 2 天, 以急性胃肠炎收入院, 护士遵医嘱为其进行静脉输液, 操作过程中护士运用的主要非语言沟通形式是

- A. 触摸
- B. 眼神
- C. 仪表
- D. 手势
- E. 表情

16. (真题 2015-Z16) 护士可以执行医生口头医嘱的情况是医生在

- A. 抢救病人时
- B. 手术过程中
- C. 电话告知时
- D. 外出会诊时
- E. 换药期间

17. (真题 2015-Z17) 患者: “我每天都要喝一点酒。” 护士: “请问您每天具体喝多少?” 护士使用的沟通技巧是

★ (2022-Z8)

- A. 叙述
- B. 重复
- C. 澄清
- D. 反映
- E. 反馈

18. (真题 2015-Z18) 患者女, 50 岁, 工人, 高中文化, 有听力障碍。护士在病室与其沟通时, 不妥的方式是

- A. 核实信息
- B. 倾听时身体位置与患者同高
- C. 用手势和表情加强信息传递
- D. 提高讲话声音与其交流
- E. 可适当使用文字交流

19. (真题 2015-Z19) 值班护士在听到呼叫器传来呼救: “XX 床的患者突然昏迷了”。此时护士去病室的行姿应为

- A. 慢步走
- B. 快步走
- C. 跑步
- D. 小跑步
- E. 快速跑步

20. (真题 2015-Z20) 尿路感染女性发病率高于男性,

是因为女性尿道较男性尿道

- A. 短而宽
- B. 长而窄
- C. 扁而平
- D. 宽而长
- E. 短而窄

21. (真题 2015-Z21) 患者女, 37 岁, G2P1。3 天前发现“性生活后阴道有血性白带”。子宫颈刮片细胞学检查结果为巴氏Ⅲ级。患者询问检查结果的意义, 正确的解释是

- A. 轻度炎症
- B. 重度炎症
- C. 可疑癌症
- D. 高度可疑癌症
- E. 癌症

22. (真题 2015-Z22) 某患者因慢性肾衰竭接受了肾移植手术, 术后恢复良好, 心怀感激, 多次向责任护士打听捐肾者家庭住址, 想登门致谢, 面对患者的请求, 责任护士正确的做法是

- A. 建议电话致谢
- B. 婉拒患者的请求
- C. 建议给予经济补偿
- D. 宣传捐献者事迹
- E. 与患者一道登门致谢

23. (真题 2015-Z23) 患者男, 55 岁。因“食欲不佳, 胃部不适”来门诊就诊。候诊时患者突然感到腹痛难忍, 头冒冷汗, 四肢冰冷, 呼吸急促。门诊护士应

- A. 协助患者平卧候诊
- B. 安抚患者, 劝其耐心等待
- C. 安排患者提前就诊
- D. 给予患者镇痛剂缓解疼痛
- E. 请医生加速诊治前面患者

24. (真题 2015-Z24) 支气管扩张的早期病理改变是

- A. 柱状扩张
- B. 气管扭曲
- C. 气管坏死
- D. 气管穿孔
- E. 空洞形成

25. (真题 2015-Z25) 做碘过敏试验的时间应在碘化物造影检查前

- A. 2 周
- B. 1 周
- C. 3~5 天
- D. 2~3 天
- E. 1~2 天

26. (真题 2015-Z26) 某患儿因“新生儿硬肿症”入院, 家长可能出现的心理反应中不包括(争议题)

- A. 焦虑不安
- B. 否认疾病
- C. 角色紊乱
- D. 害怕担忧
- E. 自我责怪

27. (真题 2015-Z27) 开放性脑损伤的主要表现不包括

- A. 硬脑膜破裂
- B. 头皮裂伤
- C. 脑积水
- D. 脑脊液漏
- E. 颅骨骨折

28. (真题 2015-Z28) 患者女, 28 岁。咽炎, 医嘱: 复方新诺明 1.0g, po bid, 护士指导患者服药时间, 正确的是

- A. 8am
- B. 8pm
- C. 8am-4pm
- D. 8am-12n-4pm
- E. 8am-12n-4pm-8pm

29. (真题 2015-Z29) 患者男, 60 岁。车祸致颅脑损伤, 下肢粉碎性骨折, 深昏迷, 营养状况差, 轻度水肿。评估见骶尾部皮肤紫红色, 有皮下硬结, 并有小水疱。患者目前皮肤状况处于

- A. 正常
- B. 压疮淤血红润期
- C. 压疮炎性浸润期
- D. 压疮浅度溃疡期
- E. 压疮坏死溃疡期

30. (真题 2015-Z30) 患儿男, 3 岁。奔跑时摔倒, 诊断为左前臂闭合骨折。患儿在急诊科留观期间哭闹不止, 护士提供正确的心理护理措施是

- A. 安慰, 解释治疗的重要性
- B. 请患儿妈妈进入留观室陪伴
- C. 让患儿听舒缓的音乐
- D. 询问患儿需求, 给予满足
- E. 请主治医师与患儿交谈

31. (真题 2015-Z31) 患儿女, 10 岁。剑突下突发阵发性“钻顶样”剧烈腹痛 3 小时, 呕出一条蛔虫, 患儿立即全身发抖, 双目紧闭, 面色苍白, 查体不配合。患儿的主要心理反应为

- A. 焦虑
- B. 自卑
- C. 孤独

- D. 恐惧
- E. 绝望

32. (真题 2015-Z32) 患者男, 35 岁。胃肠道术后第 1 天尚未排气, 但患者感觉饥饿要求进食, 护士首先应采取的措施是

- A. 直接拒绝患者请求
- B. 询问患者想进食的食物
- C. 告知其不能进食的原因
- D. 告知可进食的食物种类
- E. 直接将此情况报告医生

33. (真题 2015-Z33) 急性淋巴管炎患者首选的抗生素是

- A. 庆大霉素
- B. 青霉素
- C. 头孢菌素
- D. 卡那霉素
- E. 氨苄西林

34. (真题 2015-Z34) “120”接诊了一名车祸致昏迷的患者, 脑部 CT 提示颅内大量出血, 需立刻行开颅手术。患者无亲属陪伴, 也无证实其身份和联系人的信息, 依据《侵权责任法》的规定, 术前正确的做法是

- A. 通知手术室准备手术
- B. 报告派出所寻找家属
- C. 报告科室负责人获批
- D. 报告医院负责人获批
- E. 报告卫生行政部门负责人获批

35. (真题 2015-Z35) 糖皮质激素用于治疗哮喘的主要作用是

- A. 降低痰液黏稠度
- B. 抑制气道炎症反应
- C. 舒张支气管平滑肌
- D. 抑制咳嗽中枢
- E. 兴奋呼吸中枢

36. (真题 2015-Z36) 临终患者最后丧失的感觉是

- A. 视觉
- B. 嗅觉
- C. 味觉
- D. 听觉
- E. 触觉

37. (真题 2015-Z37) 孕妇 29 岁, 孕 37 周, G2P0, 前置胎盘入院。现有少量阴道流血, 孕妇担心胎儿安危会产生的心理问题是

- A. 无助感
- B. 恐惧

- C. 悲哀  
D. 自尊低下  
E. 倦怠
38. (真题 2015-Z38) 护士在体温单上绘制肛温的符号为★ (真题 2022-Z49)  
A. ⊙ (蓝色)  
B. ○ (蓝色)  
C. ● (红色)  
D. × (蓝色)  
E. ● (蓝色)
39. (真题 2015-Z39) 患者女, 25 岁。右小腿有 250px×125px 的肉芽组织水肿创面。换药时应选用的湿敷药液是  
A. 等渗盐水  
B. 0.02%呋喃西林溶液  
C. 0.1%依沙吖啶溶液  
D. 含氯石灰硼酸溶液  
E. 5%氯化钠溶液
40. (真题 2015-Z40) 某肝癌晚期患者住院期间情绪激动, 常常指责或挑剔家属和医护人员, 护士正确的护理措施是  
A. 给患者正确的死亡观和人生观教育  
B. 让患者尽可能的一个人独处  
C. 认真倾听患者的心理感受  
D. 诚恳地指出患者的不恰当做法  
E. 减少和患者的语言交流
41. (真题 2015-Z41) 患者男, 65 岁。护士在巡视候诊大厅时发现该患者独自就诊, 持续咳嗽, 呼吸急促, 面色潮红, 经询问患者主诉发烧 2 天。护士首先应  
A. 立即扶患者坐下  
B. 将患者带至发热门诊  
C. 详细询问患者病史  
D. 向医务科汇报  
E. 通知患者家属来院
42. (真题 2015-Z42) 属于长期医嘱的是  
A. 地塞米松 5mg iv qd  
B. 奎尼丁 0.2gpo q2h×5  
C. B 超  
D. 安定 5mg po sos  
E. 速尿 5mg im st
43. (真题 2015-Z43) 患者男, 36 岁。农民, 尿毒症晚期, 因无法承担高额的治疗费用欲放弃治疗, 护士长发动全体护士为其捐款, 此举动护士承担的主要角色是  
A. 决策者  
B. 协调者  
C. 照顾者  
D. 帮助者  
E. 管理者
44. (真题 2015-Z44) 属于氨中毒引起肝性脑病的主要机制是  
A. 氨导致蛋白质代谢障碍  
B. 氨干扰脑的能量代谢  
C. 氨取代正常神经递质  
D. 氨引起神经传导异常  
E. 氨使氨基酸代谢不平衡
45. (真题 2015-Z45) 有助于维护和修复小儿肠道黏膜屏障功能的药物是  
A. 青霉素  
B. 黄连素  
C. 制霉菌素  
D. 蒙脱石散  
E. 双歧杆菌
46. (真题 2015-Z46) 患者女, 45 岁。反复不规则发热 6 个月, 半个月前出现左下肢酸痛, 行走困难, 伴胸闷, 心悸, 被诊断为“亚急性感染性心内膜炎, 二尖瓣脱垂伴关闭不全”, 建议手术治疗。患者对手术非常担心, 适宜的护理措施是  
A. 建议患者转院  
B. 告知患者手术已经安排, 无法更改  
C. 向患者介绍手术成功的例子  
D. 告诉患者手术很简单  
E. 建议患者签字放弃治疗
47. (真题 2015-Z47) 关于衰老表现的叙述, 正确的是  
A. 老年人的体重随年龄的增加而增加  
B. 老年人的血压随年龄的增加而降低  
C. 老年人的心率随年龄的增加而增加  
D. 老年人生活自理能力随增龄而降低  
E. 老年人眼睛近视程度随增龄而增加
48. (真题 2015-Z48) 护士为患者分发口服药后将一次性药杯收回, 正确的处理方法是  
A. 直接丢弃  
B. 消毒后销毁  
C. 清洗后销毁  
D. 消毒后备用  
E. 清洗后备用
49. (真题 2015-Z49) 以“病人为中心”的优质护理工作模式是  
A. 分组制护理

- B. 分级制护理
- C. 分层制护理
- D. 功能制护理
- E. 责任制整体护理

50. (真题 2015-Z50) 某护士为一患儿进行输液治疗, 输液 30 分钟后患儿出现严重的不良反应并休克, 经抢救病情好转并转入 ICU 继续治疗。对此, 患儿家长反应强烈, 质疑护士输液有误, 护士应首先进行的重要工作是

- A. 向护士长汇报抢救经过
- B. 与医生一起分析患儿病情
- C. 继续与患儿家属沟通, 做好解释
- D. 帮助患儿家长完成抢救用药的缴费
- E. 按照规定封存未输完的液体

51. (真题 2015-Z51) 青春期心理与行为最突出的特点是

- A. 身心发展的矛盾性
- B. 形成新的同伴关系
- C. 思维方式成熟
- D. 情绪状态稳定
- E. 有强烈独立自主的意识

52. (真题 2015-Z52) 低钾性碱中毒最可能出现于

- A. 尿毒症
- B. 胃手术后
- C. 大量输血
- D. 术后少尿
- E. 严重创伤

53. (真题 2015-Z53) 患者女, 42 岁。白血病入院化疗 3 个周期后出现足趾麻木、腱反射消失等外周神经炎的表现, 引起此副作用的化疗药物为

- A. 长春新碱
- B. 泼尼松
- C. 柔红霉素
- D. 阿霉素
- E. 甲氨蝶呤

54. (真题 2015-Z54) 意识完全丧失, 对各种刺激均无反应及生命体征不稳定属于意识状态的

- A. 嗜睡
- B. 意识模糊
- C. 昏睡
- D. 浅昏迷
- E. 深昏迷

55. (真题 2015-Z55) 患者女, 28 岁。分娩时行会阴侧切, 分娩后用 25%硫酸镁湿敷, 护士在操作过程中应特别注意的是★ (真题 2022-S49)

- A. 热敷局部皮肤涂凡士林
- B. 保持合适的水温
- C. 敷料拧至不滴水为止
- D. 严格执行无菌操作
- E. 操作完毕后及时更换敷料

56. (真题 2015-Z56) 护士为某患者发口服药时恰逢其外出, 此时正确的做法是

- A. 等候患者
- B. 将药交给陪护
- C. 将药置于床头柜上
- D. 暂缓发药
- E. 交给患者同室病友

57. (真题 2015-Z57) 患者男, 23 岁。直肠肛管周围脓肿切开引流术后 3 天, 在饮食指导中错误的是

- A. 多喝水
- B. 均衡饮食
- C. 少吃水果蔬菜
- D. 避免辛辣食物
- E. 避免油炸食物

58. (真题 2015-Z58) 在治疗性沟通的交谈阶段, 护士提出问题时应注意的是

- A. 最好一次把所有的问题都提出
- B. 问题要符合患者的职业、年龄和文化程度
- C. 为准确表达, 应多使用专业术语
- D. 为了简洁, 尽可能使用医学名词的简称或英文缩写
- E. 只需使用闭合式提问

59. (真题 2015-Z59) 患者女, 44 岁, 敏感多疑, 怀疑单位同事有意和她作对, 故意给其工作和生活设置障碍, 近期经常听到耳边有人说话, 对其行为进行评论, 护士对其心理护理中, 正确的是

- A. 经常与患者讨论单位同事对她的评价
- B. 明确告诉患者没有人陷害她
- C. 与患者争辩其说话的对象不存在
- D. 耐心倾听患者诉说, 尽量满足患者合理要求
- E. 在患者面前应低声交谈, 以免引起患者猜疑

60. (真题 2015-Z60) 凝血因子缺乏患者最适合输入的血液制品是

- A. 新鲜血浆
- B. 冰冻血浆
- C. 干燥血浆
- D. 红细胞悬液
- E. 血小板浓缩悬液

61. (真题 2015-Z61) 中医在自然界中“五色”是指

- A. 青、赤、紫、橙、黑

- B. 青、赤、黄、白、黑
- C. 赤、橙、黄、绿、紫
- D. 蓝、绿、紫、橙、黑
- E. 红、黄、蓝、白、黑

62. (真题 2015-Z62) 某新生儿, 日龄 5 天, 出生体重 3kg, 目前体重 2.8kg, 妈妈很担心孩子的体重会继续下降, 护士向妈妈解释孩子的体重将恢复正常, 下列解释正确的是

- A. 产后 1 天内恢复正常
- B. 产后 7 天内恢复正常
- C. 产后 10 天内恢复正常
- D. 产后 2 周内恢复正常
- E. 产后 3 周内恢复正常

63. (真题 2015-Z63) 患儿女, 6 岁, 诊断“喉头异物”入院, 查体, 面色青紫, 呼吸费力, 伴明显的三凹征, 其呼吸类型属于

- A. 深度呼吸
- B. 潮式呼吸
- C. 吸气性呼吸困难
- D. 呼气性呼吸困难
- E. 混合性呼吸困难

64. (真题 2015-Z64) 通过增加外周组织对葡萄糖摄取、抑制糖异生, 从而降低血糖的药物是

- A. 格列波脲
- B. 格列本脲
- C. 二甲双胍
- D. 噻唑烷二酮
- E.  $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂

65. (真题 2015-Z65) 可能发生呼吸肌无力引起呼吸衰竭的疾病是

- A. 慢性阻塞性肺疾病
- B. 重症支气管疾病
- C. 重症肺炎
- D. 肺栓塞
- E. 重症肌无力

66. (真题 2015-Z66) 引起细菌性扁桃体炎最多见的病原体是

- A. 溶血性链球菌
- B. 流感嗜血杆菌
- C. 肺炎链球菌
- D. 葡萄球菌
- E. 克雷白杆菌

67. (真题 2015-Z67) 中医饮食上五味指的是

- A. 酸、苦、甘、辛、咸
- B. 酸、苦、甘、甜、涩

- C. 酸、苦、麻、辣、涩
- D. 甜、辣、苦、涩、咸
- E. 甜、辣、苦、酸、辛

68. (真题 2015-Z68) 24 小时尿标本检查需要加入甲醛作为防腐剂的检查项目是

- A. 艾迪计数
- B. 17-酮类固醇
- C. 尿糖定量
- D. 尿蛋白定量
- E. 肌酐定量

69. (真题 2015-Z69) 患者男, 25 岁。在硬膜外麻醉下行左腹股沟斜疝修补术。恰当的术后饮食护理是

- A. 术后应禁食 48 小时
- B. 术后即进普通饮食
- C. 术后应胃肠减压
- D. 术后应静脉供给营养 3 天
- E. 若术后 6 小时无恶心即可进流质饮食

70. (真题 2015-Z70) 治疗支原体肺炎的首选抗生素是

- A. 大环内酯类
- B.  $\beta$ -内酰胺类
- C. 氨基糖苷类
- D. 喹诺酮类
- E. 磺胺类

71. (真题 2015-Z71) 患者女, 26 岁。停经 52 天, 阴道点滴流血 2 天, 伴轻度下腹阵发性疼痛, 尿妊娠试验(+). 查体: 宫口闭, 子宫如孕 7 周大小。最可能的诊断是

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 不全流产
- D. 稽留流产
- E. 习惯性流产

72. (真题 2015-Z72) 患者男, 56 岁, III 度烧伤面积大于 60%, 入院后的护理级别是

- A. 重症护理
- B. 特级护理
- C. 一级护理
- D. 二级护理
- E. 三级护理

73. (真题 2015-Z73) 关于先心病儿童的个性心理特征表现, 错误的叙述是

- A. 性格内向
- B. 情绪不稳
- C. 依赖心理增强
- D. 明显的恐惧感

E. 记忆力强

74. (真题 2015-Z74) 患者男, 65 岁。心脏瓣膜置换术后并发急性呼吸窘迫综合征。需使用呼吸机治疗。患者家庭经济负担大, 其家属很担心费用问题, 询问护士是否可以不使用呼吸机, 护士最佳的做法是 (争议题)

- A. 强调使用呼吸机的重要性
- B. 告知使用呼吸机的费用
- C. 让其直接去问医生
- D. 告诉其若放弃治疗则后果自负
- E. 与医生讨论是否使用其他治疗方法

75. (真题 2015-Z75) 腰椎间盘突出好发于腰 4-5 及腰 5~骶 1, 是因为该部位

- A. 椎间盘较厚
- B. 韧带松弛
- C. 血供差
- D. 活动度大
- E. 肌肉松弛

76. (真题 2015-Z76) 患者女, 62 岁, 因肠梗阻入院治疗, 责任护士来到其床边询问病史, 此时她们的关系处于护患关系的

- A. 准备期
- B. 初始期
- C. 工作期
- D. 结束期
- E. 延续期

77. (真题 2015-Z77) 不符合特级护理内容的是

- A. 24 小时专人护理
- B. 严密观察病情及生命体征变化
- C. 做好基础护理, 严防并发症
- D. 给予卫生保健指导
- E. 填写危重病人护理记录单

78. (真题 2015-Z78) 关于急性肾小球肾炎的叙述, 正确的是

- A. 女性多见
- B. 蛋白尿多见
- C. 镜下血尿少见
- D. 血压明显升高
- E. 常发生于感染后 1 周

79. (真题 2015-Z79) 患儿女, 1 岁。因淋巴结核住院, 医嘱肌内注射数种药物。护士为该患儿肌内注射时, 不恰当的操作是

- A. 宜选用肌肉肥厚的臀大肌
- B. 注射时应固定好肢体, 防止折针
- C. 注意药物的配伍禁忌

D. 注意经常更换注射部位

E. 切勿将针梗全部刺入

80. (真题 2015-Z80) 肋骨骨折多见于

- A. 第 1~3 肋骨
- B. 第 4~7 肋骨
- C. 第 7~9 肋骨
- D. 第 8~10 肋骨
- E. 第 11~12 肋骨

81. (真题 2015-Z81) 患者男, 19 岁。尿道损伤后出现排尿困难。护士遵医嘱为其置尿管。患者表情紧张问: “会不会很疼呀?” 下列回答较妥当的是

- A. “放心, 一点儿也不疼!”
- B. “当然会疼, 谁让你受伤了呢!”
- C. “不太清楚。”
- D. “为了治病, 疼也得忍着!”
- E. “会有一些疼痛, 我会尽量帮你减轻痛苦。”

82. (真题 2015-Z82) 患者男, 60 岁。因“COPD 并发自发性气胸”入院。住院期间出现 T38.5°C, 考虑合并细菌感染。最常见的致病菌是

- A. 葡萄球菌
- B. 结核杆菌
- C. 卡他莫拉菌
- D. 肺炎链球菌
- E. 流感嗜血杆菌

83. (真题 2015-Z83) 患者男, 65 岁。急性心肌梗死冠脉支架术后半年, 在家休养, 心情低落, 少与人交流, 对周围事物不感兴趣。其最可能的心理问题是

- A. 谵妄
- B. 抑郁
- C. 焦虑
- D. 恐惧
- E. 愤怒

84. (真题 2015-Z84) 患者男, 48 岁。因患胰腺癌入院拟行手术治疗, 现空腹血糖 7.8mmol/L。术前给予注射胰岛素, 其作用是

- A. 促进蛋白质合成
- B. 利于吻合口愈合
- C. 抑制胰腺分泌
- D. 抑制胰酶活性
- E. 控制血糖

85. (真题 2015-Z85) 某慢性呼吸衰竭痰多的患者, 在使用哪种药物后可能因为痰液黏稠度增加而使排痰困难加重

- A. 泼尼松

- B. 沙丁胺醇  
C. 呋塞米  
D. 氨茶碱  
E. 盐酸氨溴索
86. (真题 2015-Z86) 肺源性心脏病肺动脉高压形成的最主要因素是  
A. 缺氧  
B. 血容量增加  
C. 血液黏稠度增加  
D. 继发性红细胞增多  
E. 肺部毛细血管微小栓子形成
87. (真题 2015-Z87) 脊髓灰质炎疫苗(糖丸)属于  
A. 灭活疫苗  
B. 减毒活疫苗  
C. 类毒素疫苗  
D. 组分疫苗  
E. 基因工程疫苗
88. (真题 2015-Z88) 扩张型心肌病病人心脏结构最基本的改变是  
A. 室间隔肥厚  
B. 心室容积减少  
C. 单侧或双侧心腔扩大  
D. 左心室肥厚  
E. 右心室流出道梗阻
89. (真题 2015-Z89) 患者女, 37 岁。因剧烈腹痛, 独自到急诊科就诊, 经检查确诊为宫外孕大出血。因其无监护人签字且没带够手术费用, 值班医生未及时进行手术, 而是让其在急诊科输液留观, 当患者家属接到消息赶到医院付款时, 错过了最佳手术时机。本案例侵犯了病人的  
A. 自主权  
B. 知情同意权  
C. 参与治疗权  
D. 基本医疗权  
E. 保密和隐私权
90. (真题 2015-Z90) 建立良好医护关系的原则是双方应相互  
A. 依存  
B. 独立  
C. 监督  
D. 尊重  
E. 补充
91. (真题 2015-Z91) 属于健康性护理诊断的是  
A. 语言沟通障碍  
B. 清理呼吸道无效  
C. 有室息的危险  
D. 母乳喂养有效  
E. 活动无耐力
92. (真题 2015-Z92) 不需记录患者出入量的情况是  
A. 心衰伴下肢水肿  
B. 大面积烧伤  
C. 大叶性肺炎  
D. 肝硬化伴腹水  
E. 肾功能不全
93. (真题 2015-Z93) 某膀胱癌患者行保留膀胱术, 术后应用膀胱灌注法治疗预防肿瘤复发。常用的灌注药物为  
A. 新洁尔灭  
B. 硼酸水  
C. 卡介苗  
D. 干扰素  
E. 抗菌药
94. (真题 2015-Z94) 护士执业过程中要求定期进行健康体检, 目的是享有  
A. 人身安全不受侵犯的权利  
B. 履行职责相关的权利  
C. 安全执业的权利  
D. 获得报酬的权利  
E. 培训的权利
95. (真题 2015-Z95) 患者男, 80 岁。原发性高血压 10 年。长期服用排钾利尿剂控制血压, 现因低血钾收入院, 护士在患者右手背进行静脉穿刺滴入含钾溶液, 4 小时后遵医嘱抽血复查血钾。不宜选择的采血部位是  
A. 右肘正中静脉  
B. 右股静脉  
C. 左手背静脉  
D. 左肘正中静脉  
E. 左股静脉
96. (真题 2015-Z96) 拟行胆总管结石切除术的某患者感到焦虑, 对于减轻焦虑最为合适的护理措施是  
A. 告知患者手术是常规治疗方法  
B. 为患者提供其想知道的有关术后信息  
C. 告知患者转移注意力以减轻焦虑  
D. 强调术后遵从医嘱的重要性  
E. 强调术前情绪稳定的重要性
97. (真题 2015-Z97) 使用冰槽时, 为防止冻伤需保护的部位是  
A. 前额  
B. 颞部  
C. 头顶

- D. 耳部
- E. 面颊

98. (真题 2015-Z98) 护士甲因为孩子患病最近经常请假, 护士长认为其影响了工作而不满。护士甲则认为护士长对她不体谅、缺乏人情味, 两人关系比较紧张。影响她们关系的主要原因是

- A. 经济压力过重
- B. 期望值差异
- C. 角色压力过重
- D. 角色权利争议
- E. 角色责任模糊

99. (真题 2015-Z99) 可以使用肛温测量患者体温的情况是

- A. 阿米巴痢疾
- B. 痔疮术后
- C. 肝昏迷
- D. 心肌梗死
- E. 直肠术后

100. (真题 2015-Z100) 特殊口腔护理的适应证不包括

- A. 禁食
- B. 高热
- C. 鼻饲
- D. 昏迷
- E. 腹泻

101. (真题 2015-Z101) 某医院将组织全院党团员义务献血活动, 急诊科年轻护士甲、乙、丙均积极报名参加。献血前错误的准备是

- A. 不能服药
- B. 不能饮酒
- C. 保证充足睡眠
- D. 进食高脂食物
- E. 适当休息

102. (真题 2015-Z102) 某医院将组织全院党团员义务献血活动, 急诊科年轻护士甲、乙、丙均积极报名参加。顺利完成自愿献血后的正确做法是

- A. 绝对卧床休息 1 周
- B. 采血侧肢体可以抬举重物
- C. 献血完毕按住止血棉球 1 分钟以免皮下血肿
- D. 保护穿刺部位, 至少 8 小时内勿被水浸湿
- E. 可以正常工作, 避免通宵娱乐和剧烈运动

103. (真题 2015-Z103) 患者男, 35 岁。因“头部外伤”急诊入院。现浅昏迷, CT 提示颅内血肿, 脑挫裂伤, 在全麻下行颅内血肿清除术。患者术后返回病房, 正确的体位是

- A. 侧卧位
- B. 去枕仰卧位, 头偏向一侧
- C. 头高足低位
- D. 头低足高位
- E. 中凹卧位

104. (真题 2015-Z104) 患者男, 35 岁。因“头部外伤”急诊入院。现浅昏迷, CT 提示颅内血肿, 脑挫裂伤, 在全麻下行颅内血肿清除术。术后第 2 天, 患者应采取的体位是

- A. 头高足低位
- B. 半坐卧位
- C. 头低足高位
- D. 中凹卧位
- E. 俯卧位

105. (真题 2015-Z105) 患者男, 35 岁。因“头部外伤”急诊入院。现浅昏迷, CT 提示颅内血肿, 脑挫裂伤, 在全麻下行颅内血肿清除术。术后第 2 天采取头高足低位的目的是

- A. 促进排痰
- B. 利于呼吸
- C. 便于观察瞳孔
- D. 促进引流
- E. 预防脑水肿

106. (真题 2015-Z106) 患者男, 35 岁。因“头部外伤”急诊入院。现浅昏迷, CT 提示颅内血肿, 脑挫裂伤, 在全麻下行颅内血肿清除术。患者出现躁动, 使用约束带时护士需重点观察

- A. 呼吸情况
- B. 血压情况
- C. 约束时间
- D. 末梢血液循环
- E. 伤口渗血情况

107. (真题 2015-Z107) 患者男, 31 岁。主诉因“近日高热、咳嗽伴有头痛、全身酸痛、不适、乏力等”就诊, 经检查确诊为非典型肺炎并收住院治疗。应将患者安置于

- A. 隔离病房
- B. 手术室
- C. 普通病房
- D. ICU 病房
- E. 抢救室

108. (真题 2015-Z108) 患者男, 31 岁。主诉因“近日高热、咳嗽伴有头痛、全身酸痛、不适、乏力等”就诊, 经检查确诊为非典型肺炎并收住院治疗。应对患者采取

- A. 接触隔离
- B. 保护性隔离

- C. 呼吸道隔离
- D. 消化道隔离
- E. 严密隔离

109. (真题 2015-Z109) 患者男, 31 岁。主诉因“近日高热、咳嗽伴有头痛、全身酸痛、不适、乏力等”就诊, 经检查确诊为非典型肺炎并收住院治疗。在隔离过程中, 错误的护理措施是

- A. 住双人房间
- B. 护士进入病室穿隔离衣
- C. 排泄物需严格消毒处理
- D. 病室空气消毒每天一次
- E. 拒绝家属探视

110. (真题 2015-Z110) 患者男, 31 岁。主诉因“近日高热、咳嗽伴有头痛、全身酸痛、不适、乏力等”就诊, 经检查确诊为非典型肺炎并收住院治疗。患者病情进一步加重, 对其行气管切开术, 污染敷料应

- A. 紫外线照射
- B. 高压灭菌
- C. 焚烧
- D. 煮沸
- E. 浸泡

111. (真题 2015-Z111) 患者男, 31 岁。主诉因“近日高热、咳嗽伴有头痛、全身酸痛、不适、乏力等”就诊, 经检查确诊为非典型肺炎并收住院治疗。患者病情进一步恶化后死亡, 护士应为其进行

- A. 一般消毒处理
- B. 保护性处理
- C. 院外消毒处理
- D. 终末消毒处理
- E. 太平间美容处理

112. (真题 2015-Z112) 患者女, 21 岁。在校大学生。因急性腹痛就诊, 诊断为异位妊娠破裂出血, 拟急诊手术。术前护理人员向患者介绍病情及预后, 体现了护理人员的

- A. 保证患者权益的义务
- B. 及时救治患者的义务
- C. 维护患者治疗安全的义务
- D. 保护患者隐私义务
- E. 认真执行医嘱的义务

113. (真题 2015-Z113) 患者女, 21 岁。在校大学生。因急性腹痛就诊, 诊断为异位妊娠破裂出血, 拟急诊手术。患者要求医护人员不要将真实情况告知同学, 体现了患者的

- A. 知情权
- B. 回避权
- C. 服务选择权

- D. 隐私权
- E. 公平权

114. (真题 2015-Z114) 患者女, 21 岁。在校大学生。因急性腹痛就诊, 诊断为异位妊娠破裂出血, 拟急诊手术。患者在了解病情后签字同意手术治疗, 体现了伦理学的

- A. 自主原则
- B. 不伤害原则
- C. 公平原则
- D. 行善原则
- E. 有利原则

115. (真题 2015-Z115) 护理专业应届毕业生甲已经完成了国务院教育主管部门和卫生主管部门规定的全日制 4 年护理专业课程学习, 本人拟申请护士执业注册。不属于申请护士执业注册的条件是

- A. 年龄 18 周岁以上
- B. 护理专业学历证书
- C. 健康证明
- D. 护士执业资格考试成绩合格证明
- E. 户籍证明

116. (真题 2015-Z116) 护理专业应届毕业生甲已经完成了国务院教育主管部门和卫生主管部门规定的全日制 4 年护理专业课程学习, 本人拟申请护士执业注册。从事护理活动唯一合法的凭证是

- A. 在校成绩单
- B. 实习证明
- C. 护理专业学历证书
- D. 护士执业资格考试成绩合格证明
- E. 护士执业资格证书

117. (真题 2015-Z117) 患者女, 56 岁。卵巢癌术后, 拔出尿管后 7 小时未能自行排尿。查体: 耻骨上部膨隆, 叩诊呈实音, 有压痛, 考虑尿潴留。为患者提供的护理措施中, 维护其自尊的是

- A. 教育其养成良好的排尿习惯
- B. 耐心解释并提供隐蔽的排尿环境
- C. 调整体位以协助排尿
- D. 按摩其下腹部, 使尿液排出
- E. 温水冲洗会阴以诱导排尿

118. (真题 2015-Z118) 患者女, 56 岁。卵巢癌术后, 拔出尿管后 7 小时未能自行排尿。查体: 耻骨上部膨隆, 叩诊呈实音, 有压痛, 考虑尿潴留。为患者实施导尿时, 第 2 次消毒的顺序是 (争议题)

- A. 自上而下, 由外向内
- B. 自下而上, 由外向内
- C. 自下而上, 由内向外
- D. 自上而下, 由内向外

E. 自上而下, 由外向内再向外

119. (真题 2015-Z119) 患者女, 56 岁。卵巢癌术后, 拔出尿管后 7 小时未能自行排尿。查体: 耻骨上部膨隆, 叩诊呈实音, 有压痛, 考虑尿潴留。首次导出尿液不应超过

- A. 1000ml
- B. 1200ml
- C. 1500ml
- D. 1700ml
- E. 2000ml

120. (真题 2015-Z120) 患者女, 56 岁。卵巢癌术后, 拔出尿管后 7 小时未能自行排尿。查体: 耻骨上部膨隆, 叩诊呈实音, 有压痛, 考虑尿潴留。如果首次导尿过多, 将会发生

- A. 膀胱挛缩
- B. 加重不舒适感
- C. 血尿和虚脱
- D. 诱发膀胱感染
- E. 膀胱反射功能恢复减慢

## 2015 实践能力 真题

1. (真题 2015-S1) 正常情况下, 产妇顺产后需继续留在产房观察的时间是

- A. 1 小时
- B. 2 小时
- C. 3 小时
- D. 4 小时
- E. 5 小时

2. (真题 2015-S2) 根据乳腺癌淋巴转移的主要途径, 护理评估应重点关注的部位是

- A. 腹股沟
- B. 颌下
- C. 颈后
- D. 颈前
- E. 腋窝

3. (真题 2015-S3) 表示肺癌已有全身转移的表现是

- A. 痰中带血
- B. 持续性胸痛
- C. 股骨局部破坏
- D. 间歇性高热
- E. 持续性胸水

4. (真题 2015-S4) 关于社区开展预防一氧化碳中毒的健康教育, 正确的叙述是

- A. 关闭门窗

B. 煤气淋浴器安装在浴室里

- C. 定期检查管道安全
- D. 使用不带有自动熄火装置的煤灶
- E. 通气开关可长期开放

5. (真题 2015-S5) 肝硬化失代偿期患者最常见的并发症是

- A. 电解质紊乱
- B. 肝性脑病
- C. 原发性肝癌
- D. 肝肾综合征
- E. 上消化道出血

6. (真题 2015-S6) 为减少支气管扩张患者肺部继发感染和全身中毒症状, 最关键的措施是

- A. 加强痰液引流
- B. 选择广谱抗生素
- C. 使用呼吸兴奋剂
- D. 使用支气管扩张剂
- E. 注射流感疫苗

7. (真题 2015-S7) 慢性便秘患者最主要的临床表现是

- A. 缺乏便意、排便艰难
- B. 腹痛
- C. 里急后重感
- D. 恶心、呕吐
- E. 腹部下坠感

8. (真题 2015-S8) 急性上呼吸道感染最常见的病原体是

- A. 细菌
- B. 病毒
- C. 支原体
- D. 衣原体
- E. 幽门螺杆菌

9. (真题 2015-S9) 心室颤动患者的脉搏特征是

- A. 快而规则
- B. 慢而规则
- C. 快而不规则
- D. 慢而不规则
- E. 摸不到

10. (真题 2015-S10) 老年患者随着年龄的增加, 记忆能力逐步减退。在询问病史时最容易出现的是

- A. 表述不清
- B. 症状隐瞒
- C. 记忆不确切
- D. 反应迟钝
- E. 答非所问

11. (真题 2015-S11) 患者女, 48 岁。哮喘持续发作, 呼吸 36 次/分, 吸气时脉搏明显减弱, 此时该患者的脉搏属于

- A. 奇脉
- B. 短绌脉
- C. 洪脉
- D. 交替脉
- E. 水冲脉

12. (真题 2015-S12) 患者女, 19 岁。主诉因“怕脏反复洗手, 双手变得粗糙皴裂, 明知没必要却无法控制”来就诊。最佳治疗方案是

- A. 药物治疗+心理治疗
- B. 抗精神病药物治疗
- C. 工娱治疗
- D. 电休克治疗
- E. 精神分析治疗

13. (真题 2015-S13) 患者男, 20 岁。因“饮酒后昏迷, 抽搐 3 小时”急诊入院。患者于 3 小时前饮白酒 800ml 后逐渐胡言乱语, 昏睡, 继之昏迷, 伴有剧烈抽搐, 口吐白沫, 无双眼上翻, 未咬破舌头。最可能的诊断是

- A. 癫痫
- B. 中风
- C. 脑水肿
- D. 酒精中毒
- E. 食物中毒

14. (真题 2015-S14) 患者男, 52 岁。肾癌行肾部分切除术后 2 天。护士告知患者要绝对卧床休息, 其主要目的是

- A. 防止出血
- B. 防止感染
- C. 防止肿瘤扩散
- D. 防止静脉血栓形成
- E. 有利于肾功能恢复

15. (真题 2015-S15) 患者男, 35 岁。急性髓系白血病, 应用高三尖杉酯做化疗。静脉滴注该药物时的最佳滴数是低于

- A. 20 滴/分钟
- B. 40 滴/分钟
- C. 50 滴/分钟
- D. 60 滴/分钟
- E. 70 滴/分钟

16. (真题 2015-S16) 患者女, 70 岁。糖尿病病史 20 余年, 诉视物不清, 胸闷憋气, 双腿及足底刺痛, 夜间难以入睡多年, 近来足趾渐变黑, 护士在接诊后立即对其进行

评估, 发现该患者的并发症不包括

- A. 视网膜病变
- B. 冠心病
- C. 神经病变
- D. 肢端坏疽
- E. 足部感染

17. (真题 2015-S17) 患者, 男, 41 岁。近期出现头晕、乏力, 连续 3 天血压 140~150/90~96mmHg。患者的血压属于

- A. 正常值
- B. 正常高值
- C. I 级高血压
- D. II 级高血压
- E. III 级高血压

18. (真题 2015-S18) 患儿女, 1.5 岁。疱疹性口腔炎。护士在口腔涂药后应协助患儿闭口

- A. 5 分钟
- B. 10 分钟
- C. 15 分钟
- D. 20 分钟
- E. 25 分钟

19. (真题 2015-S19) 护士指导梗阻性肥厚型心肌病患者避免屏气的主要目的是

- A. 避免心衰
- B. 避免出血
- C. 防止晕厥
- D. 防止栓塞
- E. 防止抽搐

20. (真题 2015-S20) 慢性肺源性心脏病患者肺、心功能失代偿期最突出的表现是

- A. 呼吸困难加重, 夜间更甚
- B. 疲倦乏力, 头晕心悸
- C. 贫血
- D. 多食多饮
- E. 多尿

21. (真题 2015-S21) 产检项目中能够反映胎儿生长发育状况最重要的指标是

- A. 孕妇体重
- B. 胎方位
- C. 宫高与腹围
- D. 胎动
- E. 胎心率

22. (真题 2015-S22) 麻疹患者在出疹期首先出现皮疹的部位是 (2022 大纲变动)

- A. 前额、面、颈
- B. 耳后、发际
- C. 胸、背
- D. 胸、腹
- E. 四肢

23. (真题 2015-S23) 胸部 X 线检查心影呈梨形提示

- A. 心包积液
- B. 三尖瓣关闭不全
- C. 二尖瓣关闭不全
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 主动脉瓣狭窄

24. (真题 2015-S24) 听诊时为清楚的听到急性心包炎患者的心包摩擦音, 患者应采取的体位是

- A. 端坐位
- B. 坐位且身体后仰
- C. 坐位且身体前倾
- D. 右侧卧位
- E. 左侧卧位

25. (真题 2015-S25) 患者男, 30 岁, 因外伤致骨盆骨折, 直肠损伤, 行切开复位内固定及结肠造口术。不正确的术后护理措施是

- A. 多食含粗纤维的食物
- B. 置气垫床
- C. 平卧位和患侧卧位相互交替
- D. 保持造口周围皮肤清洁
- E. 进行上肢伸展运动

26. (真题 2015-S26) 患者女, 28 岁, 乳腺癌扩大根治术后咨询护士可以妊娠的时间是术后

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 4 年
- E. 5 年

27. (真题 2015-S27) 患者女, 45 岁。因“继发性痛经逐渐加重 10 年”就诊。双侧卵巢囊性增大, 考虑为子宫内膜异位症。既能诊断又能治疗该疾病的最佳方法是

- A. 双合诊
- B. 三合诊
- C. 腹腔镜
- D. CA125
- E. 盆腔 B 超

28. (真题 2015-S28) 可以动态监测产妇产程进展和识别难产的重要手段是

- A. 胎儿监护

- B. 多普勒听胎心
- C. 产程图
- D. 阴道检查
- E. 肛门检查

29. (真题 2015-S29) 患者女, 21 岁。因研究生入学考试压力大, 近几个月来出现入睡困难, 睡眠表浅, 多梦早醒, 醒后不易入睡, 最可能出现了

- A. 嗜睡症
- B. 夜惊症
- C. 睡行症
- D. 梦魇症
- E. 失眠症

30. (真题 2015-S30) 口服避孕药的禁忌症不包括

- A. 患严重心血管疾病病人
- B. 糖尿病病人
- C. 甲状腺功能亢进者
- D. 精神病生活不能自理者
- E. 产后 8 个月妇女

31. (真题 2015-S31) 患者女, 35 岁, 已婚。主诉近日白带增多, 外阴瘙痒伴灼痛 1 周。妇科检查: 阴道内多量灰白泡沫状分泌物, 阴道壁散在红斑点。有助于诊断的检查是

- A. 阴道分泌物涂片检查
- B. 宫颈刮片
- C. 盆腔 B 超
- D. 诊断性刮宫
- E. 阴道镜检查

32. (真题 2015-S32) 为慢性心力衰竭患者进行输液治疗时, 输液速度宜控制在

- A. 10~20 滴/分钟
- B. 20~30 滴/分钟
- C. 30~40 滴/分钟
- D. 40~50 滴/分钟
- E. 50~60 滴/分钟

33. (真题 2015-S33) 窦性心动过速是指心率大于

- A. 80 次/分钟
- B. 100 次/分钟
- C. 120 次/分钟
- D. 160 次/分钟
- E. 180 次/分钟

34. (真题 2015-S34) 急性细菌性咽-扁桃体炎有别于其他上呼吸道感染的突出表现是

- A. 起病急
- B. 发热

C. 咽痛明显

D. 鼻黏膜充血肿胀

E. 颌下淋巴结肿大

35. (真题 2015-S35) 某患者, 3 岁。出生 4 个月后发现发绀, 剧烈哭闹时有抽搐史。发育比同龄儿童稍差, 平时经常感冒。查体: 杵状指, 嘴唇发绀明显; 心前区闻及Ⅲ级收缩期喷射样杂音。X 线胸片提示肺血少, 右心室增大。最可能的临床诊断是

A. 房间隔缺损

B. 室间隔缺损

C. 动脉导管未闭

D. 法洛三联症

E. 肺动脉狭窄

36. (真题 2015-S36) 某新生儿, 出生 5 天。面部黄染, 血清胆红素 5mg/dl, 吃奶好, 大小便正常。家属询问出现黄疸的原因, 护士正确的回答是

A. 生理性黄疸

B. 新生儿肝炎

C. 新生儿败血症

D. 新生儿溶血症

E. 新生儿胆道闭锁

37. (真题 2015-S37) 患儿女, 1 岁。细菌性肺炎入院, 目前患儿烦躁不安、呼吸困难。医嘱: 吸氧。适宜该患儿的吸氧方式为

A. 单侧鼻导管法

B. 面罩法

C. 鼻塞法

D. 漏斗法

E. 头罩法

38. (真题 2015-S38) 某早产儿, 胎龄 34 周。生后 2 小时出现呼吸困难、呻吟。X 线胸片提示肺透明膜变早期。应首先给予的处理措施是

A. 地塞米松

B. 氧气枕吸氧

C. 纠正酸中毒

D. 气管插管, 机械通气

E. 持续气道正压通气

39. (真题 2015-S39) 患者女, 32 岁。因再生障碍性贫血接受丙酸睾酮注射治疗 1 个月余。护士每次在为患者进行肌内注射前应首先检查

A. 注射部位是否存在硬块

B. 面部有无痤疮

C. 有无毛发增多

D. 有无皮肤黏膜出血

E. 口唇、甲床的苍白程度

40. (真题 2015-S40) 患者男, 70 岁。高血压 10 年。今在服用降压药物后出现头晕、恶心、乏力。查体: 血压 110/70mmHg, 脉搏 106 次/分。目前最主要的处理措施是

A. 吸氧

B. 肌注止吐剂

C. 心电监护

D. 加服降压药物

E. 安置头低足高位

41. (真题 2015-S41) 某产妇, 29 岁。G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>, 孕 39 周。因胎儿畸形分娩时子宫破裂行子宫修补术。该患者术后再次妊娠至少需要

A. 3 个月

B. 6 个月

C. 1 年

D. 2 年

E. 3 年

42. (真题 2015-S42) 关于脓性指头炎切开引流的叙述, 正确的是

A. 在波动最明显处切开

B. 在患指侧面横形切开

C. 在患指侧面纵形切开

D. 在患指背侧切开

E. 在患指掌侧切开

43. (真题 2015-S43) 某患者因急性胰腺炎拟行急诊手术, 下列护理措施不妥的是

A. 将备用床改为麻醉床

B. 测量生命体征

C. 通知医生协助体检

D. 口渴时少量饮水

E. 评估患者收集资料

44. (真题 2015-S44) 采集血气分析标本时, 错误的操作是

A. 使用 2ml 无菌干燥注射器

B. 抽取经过稀释的肝素溶液, 充盈注射器后弃去

C. 无菌操作下抽取动脉血 1ml

D. 将血迅速注入无菌试管内并用软木塞塞住

E. 立即送检

45. (真题 2015-S45) 某患者接受冠状动脉造影术后回到病房, 医嘱沙袋压迫股动脉穿刺点 6h。为防止局部出血和栓塞护士应重点观察

A. 呼吸

B. 心率

C. 血压

D. 足背动脉搏动

## E. 肌力

46. (真题 2015-S46) 患者女, 80 岁。慢性阻塞性肺疾病 20 余年。今因“咳嗽, 咳痰加重”住院, 夜间因烦躁难以入眠, 自服地西洋 5mg 后入睡, 晨起呼之不应, 呼吸浅促。出现上述表现的最可能原因是

- A. 地西洋的镇静作用
- B. 地西洋过敏
- C. 地西洋抑制呼吸中枢
- D. 地西洋中毒
- E. 地西洋的镇咳作用

47. (真题 2015-S47) 患者男, 38 岁。感染性心内膜炎。患者住院期间突然出现失语, 吞咽困难、瞳孔大小不等, 神志模糊, 最可能出现的并发症是

- A. 脑栓塞
- B. 肾栓塞
- C. 肺栓塞
- D. 脾栓塞
- E. 肝栓塞

48. (真题 2015-S48) 患者男, 65 岁, 因“反复头痛, 呕吐 2 个月”入院, 经检查诊断为脑星形细胞瘤, 为降低颅内压, 最佳的治疗方法是

- A. 脱水治疗
- B. 激素治疗
- C. 冬眠低温疗法
- D. 脑脊液外引流
- E. 手术切除肿瘤

49. (真题 2015-S49) 常规治疗焦虑症的药物不包括

- A. 地西洋
- B. 咪达唑仑
- C. 阿普唑仑
- D. 劳拉西泮
- E. 奋乃静

50. (真题 2015-S50) 某新生儿出生时全身青紫, 四肢伸展, 无呼吸, 心率 80 次/分, 用洗耳球插鼻有皱眉动作, 该新生儿 Apgar 评分是

- A. 0 分
- B. 1 分
- C. 2 分
- D. 3 分
- E. 4 分

51. (真题 2015-S51) 抑郁症患者情绪低落的表现一天中的规律是

- A. 晨轻夜重
- B. 晨重夜轻

C. 晨轻夜轻

D. 晨重夜重

E. 无规律

52. (真题 2015-S52) 患者男, 70 岁。慢性阻塞性肺疾病, 出院后拟进行长期家庭氧疗, 护士应告知患者每日吸氧的时间是不少于 (争议题)

- A. 5 小时
- B. 8 小时
- C. 10 小时
- D. 12 小时
- E. 15 小时

53. (真题 2015-S53) 患者男, 53 岁, 饮酒时发生语言不清, 呕吐, 随即昏迷, 右侧肢体瘫痪 血压 230/120mmHg, 诊断为“脑出血”, 为防止出血加重, 应首先采取的措施是

- A. 控制血压
- B. 保护性约束
- C. 降低颅内压
- D. 止血处理
- E. 肢体制动

54. (真题 2015-S54) 纯母乳喂养多长时间最好

- A. 2 个月
- B. 4 个月
- C. 6 个月
- D. 9 个月
- E. 12 个月

55. (真题 2015-S55) 患者女, 30 岁, 近 3 年来出现情绪低落, 食欲、性欲减退, 觉得自己患了不治之症, 给家人带来许多麻烦, 生不如死。近 2 周症状加重, 诊断为抑郁症, 对该患者进行健康评估的重点是

- A. 抑郁心境评估
- B. 自杀行为评估
- C. 认知行为评估
- D. 意志活动评估
- E. 睡眠质量评估

56. (真题 2015-S56) 某社区护士拟向社区居民宣传乙脑的预防知识, 在强调接种乙脑疫苗的同时, 还应动员社区居民做好

- A. 家禽管理
- B. 家畜管理
- C. 灭蝇工作
- D. 灭蚊工作
- E. 灭鼠工作

57. (真题 2015-S57) 患者女, 25 岁, 因“白带增多 7 天”就诊。妇产检查: 外阴阴道正常, 宫颈糜烂, 糜烂面积占

宫颈面积的 1/2，护士评估该患者宫颈糜烂的程度是

- A. 轻度
- B. 中度
- C. 中重度
- D. 重度
- E. 特重度

58. (真题 2015-S58) 患者女, 26 岁, 半年前开始出现反复发作的腹泻、腹痛、排黏液脓便, 疑诊溃疡性结肠炎, 拟行肠镜检查, 门诊护士告知患者应在行肠镜检查的

- A. 前 4 小时可进食
- B. 前 1 天晚餐后禁食
- C. 前 2 天停用铁剂
- D. 前 2 天清洁灌肠
- E. 前 3 天停用阿司匹林类药物

59. (真题 2015-S59) 患者女, 45 岁。行宫颈癌根治术后第 12 天。护士在拔尿管前开始夹闭尿管, 定期开放, 以训练膀胱功能, 开放尿管的时间为

- A. 每 1 小时 1 次
- B. 每 2 小时 1 次
- C. 每 3 小时 1 次
- D. 每 5 小时 1 次
- E. 每 6 小时 1 次

60. (真题 2015-S60) 急性胎儿窘迫最早出现的症状是

- A. 胎动减少
- B. 胎动消失
- C. 胎心率加快
- D. 胎儿生长受限
- E. 胎盘功能减退

61. (真题 2015-S61) 患者女, 44 岁。患心肌梗死住院治疗。首次静脉泵入硝酸甘油时, 在 30 分钟内应特别注意的是

- A. 尿量
- B. 中心静脉压
- C. 血氧饱和度
- D. 心率
- E. 血压

62. (真题 2015-S62) 患者男, 28 岁。精神分裂症。第 2 次复发住院治疗后拟于明日出院。护士在对患者进行出院指导时, 应首先重点强调的是

- A. 规律生活
- B. 锻炼身体
- C. 加强营养
- D. 维持药物治疗
- E. 参与社会工作

63. (真题 2015-S63) 使用呼吸机的患者常常用手势和表情与护士传递交流信息, 此时的非语言行为对语言具有

- A. 补充作用
- B. 替代作用
- C. 驳斥作用
- D. 调整作用
- E. 修饰作用

64. (真题 2015-S64) 某 9 个月男婴, 腹泻 2 天, 大便每日 15~16 次, 蛋花汤样。判断患儿脱水程度的评估指标不包括

- A. 精神状态
- B. 尿量
- C. 肠鸣音
- D. 皮肤弹性
- E. 前囟

65. (真题 2015-S65) 佝偻病初期患儿的临床表现是

- A. 颅骨软化
- B. 下肢畸形
- C. 有郝氏沟
- D. 出现枕秃
- E. 形成鸡胸

66. (真题 2015-S66) 患者女, 60 岁, 近 2 天出现尿频、尿急、尿痛、耻骨弓上不适, 且有肉眼血尿, 初诊为急性膀胱炎, 最适宜的口服药物是

- A. 红霉素
- B. 氧氟沙星
- C. 甲硝唑
- D. 氨苄西林
- E. 碳酸氢钠

67. (真题 2015-S67) 患者男, 65 岁, 因“呼吸衰竭”入院, 住院期间应用呼吸兴奋剂。患者出现了何种情况时提示药物过量

- A. 烦躁不安
- B. 面色苍白
- C. 呼吸深快
- D. 四肢湿冷
- E. 高热不退

68. (真题 2015-S68) 高钾血症引起心律失常时, 静脉注射应首选的药物是 (2022 大纲改动)

- A. 10%硫酸镁溶液
- B. 5%碳酸氢钠溶液
- C. 10%葡萄糖酸钙+等量 25%葡萄糖溶液
- D. 利尿剂
- E. 5%葡萄糖溶液+胰岛素

69. (真题 2015-S69) 猩红热患儿特有的体征是

- A. 口周苍白圈
- B. 躯干糠皮样脱屑
- C. 皮疹多在发热 2 天后出现
- D. 疹间无正常皮肤
- E. 多为持续性高热

70. (真题 2015-S70) 某 8 岁患儿, 被诊断为“胆道蛔虫病”, 经非手术治疗后症状缓解。医嘱给予患儿驱虫药治疗(每天 1 次)。该患儿服用驱虫药的时间应是

- A. 早餐后
- B. 午餐前
- C. 午餐后
- D. 晚餐后
- E. 晚上睡前

71. (真题 2015-S71) 某孕妇, 30 岁, G1P0, 孕 37 周, 羊水过多行羊膜腔穿刺术后为该孕妇腹部放置沙袋的目的是

- A. 减轻疼痛
- B. 减少出血
- C. 预防休克
- D. 预防血栓形成
- E. 预防感染

72. (真题 2015-S72) 一般认为心脏骤停多长时间后会出现脑水肿

- A. 1 分钟
- B. 2 分钟
- C. 3 分钟
- D. 10 分钟
- E. 15 分钟

73. (真题 2015-S73) 某急性白血病患者, 因“乏力、食欲减退、消瘦 1 个月余, 伴发热 1 周”收入院。行化疗后出现恶心, 但无呕吐。血常规检查: 白细胞  $2 \times 10^9/L$ , 血小板  $150 \times 10^9/L$ 。该患者的护理问题不包括

- A. 潜在的感染
- B. 营养失调: 低于机体需要量
- C. 活动无耐力
- D. 舒适的改变: 发热、恶心
- E. 潜在的颅内出血

74. (真题 2015-S74) 患者女, 48 岁。类风湿关节炎 5 年, 双侧腕、指关节肿胀畸形, 为保持关节的功能, 正确的做法是

- A. 腕关节背伸、指关节背伸
- B. 腕关节背伸、指关节掌曲
- C. 腕关节掌曲、指关节侧曲
- D. 腕关节掌曲、指关节背伸

E. 腕关节侧曲、指关节掌曲

75. (真题 2015-S75) 患者男, 75 岁, 因“发热、反复咳嗽并伴有脓性痰液 2 周”入院, 诊断为急性支气管炎。易加重病情的药物是

- A. 可待因
- B. 必嗽平
- C. 复方甘草合剂
- D. 复方氯化铵
- E. 沐舒坦

76. (真题 2015-S76) 患者男, 43 岁, 踢球时突感左臂及心前区剧痛, 有濒死感, 就地休息 30 分钟未缓解, 伴烦躁不安、恶心、出冷汗, 急送至急诊科。心电监护示多导联 ST 段弓背状抬高, T 波倒置, 可见异常深宽 Q 波, 最可能发生了

- A. 稳定型心绞痛
- B. 急性心包炎
- C. 急性心肌梗死
- D. 心脏神经官能症
- E. 急性主动脉夹层动脉瘤

77. (真题 2015-S77) 患者女, 65 岁, 慢性阻塞性肺疾病病史。近年来多次在冬季发生肺炎, 为减少患病几率, 可以嘱患者在易发病季节(争议题, 家人们, A、B 两个选项存在争议, 我们这里给出答案也是认真考究后得出的, 不用太纠结! 了解一下直接跳过, 每年都有争议题!)

- A. 注射免疫球蛋白
- B. 接种卡介苗
- C. 接种流感疫苗
- D. 服用抗生素
- E. 在家中不要外出

78. (真题 2015-S78) 月经初潮后女性的一级预防保健重点是

- A. 避孕指导
- B. 经期卫生指导
- C. 婚前检查指导
- D. 孕前优生指导
- E. 月经病治疗指导

79. (真题 2015-S79) 患者女, 31 岁, 车祸造成损伤性血胸, 来院后立即为其行胸腔闭式引流术, 现有引流一处, 在术后观察中, 引流量(血量)为多少时护士应立即报告医生提示患者有进行性血胸的可能

- A. 30ml/h
- B. 50ml/h
- C. 100ml/h
- D. 150ml/h
- E. 200ml/h

80. (真题 2015-S80) 治疗糖尿病药物拜糖平正确的服药时间是
- 空腹服用
  - 饭前 1 小时服用
  - 饭后 1 小时服用
  - 餐时服用
  - 睡前服用
81. (真题 2015-S81) 患者男, 56 岁, 肝硬化腹水, 在放腹水的过程中突然出现昏迷, 首先采取的措施是
- 吸氧
  - 头部降温
  - 停止放腹水
  - 补充血容量
  - 保持呼吸道通畅
82. (真题 2015-S82) 执行慢性胃炎患者的医嘱时, 使用前应着重与医生进行沟通的药物是
- 消胆胺
  - 山莨菪碱
  - 雷尼替丁
  - 强的松
  - 多潘立酮
83. (真题 2015-S83) 患者男, 26 岁, 血友病 16 年, 胃大部分切除术后 2 小时出现烦躁不安, 术口敷料渗血, 值班护士首先应采取的措施是
- 监测血糖变化
  - 监测生命体征
  - 观察皮肤受压情况
  - 查看患者病历
  - 查看四肢活动情况
84. (真题 2015-S84) 患儿女, 3 个月, 轻型腹泻, 家长主诉给患儿清洁臀部时哭闹明显。护士进行健康教育评估时要特别注意患儿的
- 体温
  - 呼吸
  - 尿量
  - 肛周皮肤
  - 每日大便次数
85. (真题 2015-S85) 提示左心衰的临床表现是
- 奇脉
  - 平脉
  - 水冲脉
  - 脉搏短绌
  - 交替脉
86. (真题 2015-S86) 某孕妇, 28 岁, 孕 34 周。因“头晕、头痛”就诊。查体: 血压 160/115mmHg, 实验室检查, 水肿 (+), 尿蛋白定量 5.5g/24h, 临床诊断为重度子痫前期。首选的解痉药物是
- 安定
  - 阿托品
  - 硫酸镁
  - 冬眠合剂
  - 卡托普利
87. (真题 2015-S87) 细菌性肝脓肿最常见的早期症状是
- 恶心
  - 黄疸
  - 贫血
  - 右上腹肌紧张, 局部触痛明显
  - 寒战、高热
88. (真题 2015-S88) 患儿男, 10 个月, 今晨家长发现其眼眶周围密集针尖大小的出血点, 经实验室检查诊断为特发性(急性型)血小板减少性紫癜, 为及早识别颅内出血的发生, 应重点监测患儿的
- 骨髓象巨核细胞比例
  - 血小板计数
  - 红细胞计数
  - 白细胞计数
  - 血红蛋白含量
89. (真题 2015-S89) 某患儿, 3 个月。因哭闹时脐部隆起就医, 诊断为脐疝。患儿家长很是担心。护士对家长进行健康教育, 不妥的是
- 解释脐疝的发病原因及临床特点
  - 嘱其保持患儿大便通畅, 防止便秘
  - 疝块还纳后局部可用大于脐环并外包纱布的硬币压迫
  - 建议尽早手术治疗
  - 定期来院复查
90. (真题 2015-S90) 风湿性心脏病二尖瓣狭窄发生栓塞时最常累及的部位是
- 脑
  - 肾
  - 肠
  - 肺
  - 肝
91. (真题 2015-S91) 患者男, 22 岁。HIV 阳性, 因患风湿性心脏病住院。护士巡视病房时发现患者面色苍白, 呼之不应, 立即呼救, 触摸颈动脉无搏动。护士首要采取的措施是
- 心脏按压

- B. 开放气道
- C. 人工呼吸
- D. 通知医生
- E. 建立静脉通路

92. (真题 2015-S92) 患者男, 22 岁。HIV 阳性, 因患风湿性心脏病住院。护士巡视病房时发现患者面色苍白, 呼之不应, 立即呼救, 触摸颈动脉无搏动。如该患者出现呼吸骤停, 此时最适宜的辅助呼吸方法是

- A. 鼻导管给氧
- B. 口对口人工呼吸
- C. 配合医生气管插管
- D. 配合医生气管切开
- E. 简易呼吸器辅助呼吸

93. (真题 2015-S93) 患者男, 48 岁, 支气管肺癌。病理组织报告为“鳞状细胞癌”。按解剖学部位分类, 该癌肿最常见的类型是

- A. 周围型
- B. 混合型
- C. 边缘型
- D. 中央型
- E. 巨块型

94. (真题 2015-S94) 患者男, 48 岁, 支气管肺癌。病理组织报告为“鳞状细胞癌”。患者进行肿瘤切除术后, 需要进行化疗, 输注化疗药前与患者沟通, 最重要的注意事项是

- A. 健康教育
- B. 评估血管
- C. 保护血管
- D. 血液检验指标正常
- E. 告知患者, 并要求签署化疗同意书

95. (真题 2015-S95) 患者男, 48 岁, 支气管肺癌。病理组织报告为“鳞状细胞癌”。患者在输注化疗药过程中, 突然感觉静脉穿刺处疼痛, 紧急处理措施是

- A. 安慰患者
- B. 检查有无回血, 如有回血继续输注
- C. 拔掉液体
- D. 立即停止输液, 做进一步处理
- E. 通知医生

96. (真题 2015-S96) 患者男, 48 岁, 支气管肺癌。病理组织报告为“鳞状细胞癌”。患者治疗过程中, 白细胞低于多少时应停止化疗或减量

- A.  $6.5 \times 10^9/L$
- B.  $5.5 \times 10^9/L$
- C.  $4.5 \times 10^9/L$
- D.  $3.5 \times 10^9/L$

E.  $2.5 \times 10^9/L$

97. (真题 2015-S97) 患儿男, 14 个月, 因“发热、流涕 2 天”就诊。查体:  $T39.7^\circ C$ , P135 次/分; 神志清, 咽部充血, 心肺检查无异常, 查体时患儿突然双眼上翻, 四肢强直性、阵挛性抽搐。引起患儿病情变化的原因, 最可能是

- A. 癫痫
- B. 低血糖症
- C. 高热惊厥
- D. 病毒性脑炎
- E. 化脓性脑膜炎

98. (真题 2015-S98) 患儿男, 14 个月, 因“发热、流涕 2 天”就诊。查体:  $T39.7^\circ C$ , P135 次/分; 神志清, 咽部充血, 心肺检查无异常, 查体时患儿突然双眼上翻, 四肢强直性、阵挛性抽搐。按医嘱静脉注射地西洋 2mg (1ml 含 10mg 地西洋), 应抽取药液的量是

- A. 0.2ml
- B. 0.4ml
- C. 0.6ml
- D. 0.8ml
- E. 1ml

99. (真题 2015-S99) 患儿男, 14 个月, 因“发热、流涕 2 天”就诊。查体:  $T39.7^\circ C$ , P135 次/分; 神志清, 咽部充血, 心肺检查无异常, 查体时患儿突然双眼上翻, 四肢强直性、阵挛性抽搐。为防止患儿外伤, 错误的做法是

- A. 床边设置防护栏
- B. 用约束带束缚四肢
- C. 移开床上一切硬物
- D. 将纱布放在患儿的手中
- E. 压舌板裹纱布置于上下磨牙间

100. (真题 2015-S100) 患者男, 65 岁, 支气管扩张。今日劳作后出现恶心、胸闷, 反复咯血, 24 小时出血量约 800ml。该患者的咯血程度属于

- A. 痰中带血丝
- B. 微量咯血
- C. 小量咯血
- D. 中等量咯血
- E. 大量咯血

101. (真题 2015-S101) 患者男, 65 岁, 支气管扩张。今日劳作后出现恶心、胸闷, 反复咯血, 24 小时出血量约 800ml。目前患者饮食应

- A. 禁食
- B. 流质饮食
- C. 半流质饮食
- D. 软质饮食
- E. 普通饮食

102. (真题 2015-S102) 患者女, 16 岁。因煤气泄漏爆炸致头面部、双上肢烧伤入院。查体: 烧伤部位有大量水疱, 痛觉迟钝。采用中国新九分法估计该患者的烧伤面积约为

- A. 0.18
- B. 0.21
- C. 0.24
- D. 0.27
- E. 0.54

103. (真题 2015-S103) 患者女, 16 岁。因煤气泄漏爆炸致头面部、双上肢烧伤入院。查体: 烧伤部位有大量水疱, 痛觉迟钝。患者的烧伤严重程度是

- A. 轻度
- B. 中度
- C. 中重度
- D. 重度
- E. 特重度

104. (真题 2015-S104) 患者女, 16 岁。因煤气泄漏爆炸致头面部、双上肢烧伤入院。查体: 烧伤部位有大量水疱, 痛觉迟钝。根据患者烧伤部位的特点, 护士应重点观察

- A. 呼吸功能
- B. 上肢血液循环
- C. 意识
- D. 疼痛程度
- E. 血压

105. (真题 2015-S105) 患者女, 16 岁。因煤气泄漏爆炸致头面部、双上肢烧伤入院。查体: 烧伤部位有大量水疱, 痛觉迟钝。不正确的补液方案是

- A. 尽早开始
- B. 见尿补钾
- C. 先晶后胶
- D. 先糖后盐
- E. 先快后慢

106. (真题 2015-S106) 患者女, 16 岁。因煤气泄漏爆炸致头面部、双上肢烧伤入院。查体: 烧伤部位有大量水疱, 痛觉迟钝。患者入院第 5 天出现发热, 体温 39.2°C, 创面有黄绿色分泌物伴有恶臭味, 引起感染的细菌考虑为

- A. 溶血性链球菌
- B. 大肠杆菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 梭形芽胞杆菌

107. (真题 2015-S107) 患者女, 16 岁。因煤气泄漏爆

炸致头面部、双上肢烧伤入院。查体: 烧伤部位有大量水疱, 痛觉迟钝。患者经 1 个月的治疗拟于近日出院, 由于烧伤部位瘢痕较严重, 患者自觉不愿见人, 不想离开医院。对其采取护理措施不妥的是

- A. 理解患者病倾听其诉说
- B. 动员尽快出院
- C. 介绍后期整形美容治疗方法
- D. 鼓励自理, 增强独立性
- E. 不回避问题, 尽量稳定情绪

108. (真题 2015-S108) 患者男, 52 岁, 因“胸骨后压榨性疼痛半日”急诊入院。心电图: 急性广泛前壁心肌梗死。升高最早也是恢复最早的心肌损伤标记物是

- A. 门冬氨酸转移酶
- B. 乳酸脱氢酶
- C. 肌酸磷酸激酶
- D. 碱性磷酸酶
- E. 谷氨酸转移酶

109. (真题 2015-S109) 患者男, 52 岁, 因“胸骨后压榨性疼痛半日”急诊入院。心电图: 急性广泛前壁心肌梗死。为减轻患者疼痛, 首选的药物是

- A. 安定
- B. 阿司匹林
- C. 吗啡
- D. 硝酸甘油
- E. 心痛定

110. (真题 2015-S110) 患者男, 52 岁, 因“胸骨后压榨性疼痛半日”急诊入院。心电图: 急性广泛前壁心肌梗死。最有可能导致患者 24 小时内死亡的原因是

- A. 右心衰竭
- B. 心源性休克
- C. 室颤
- D. 心脏破裂
- E. 感染

111. (真题 2015-S111) 患者男, 51 岁, 反复出现排便后肛门疼痛, 时有瘙痒 4 年余, 站立或行走过久时肿胀感, 昨日突发便后肛门剧烈疼痛, 咳嗽时疼痛加剧。查体见肛门处有一紫红色肿块, 有触痛感, 直径约 2cm。最可能的诊断是

- A. 直肠息肉脱出
- B. 血栓性外痔
- C. 肛管周围脓肿
- D. 内痔并发感染
- E. 肛裂

112. (真题 2015-S112) 患者男, 51 岁, 反复出现排便后肛门疼痛, 时有瘙痒 4 年余, 站立或行走过久时肿胀感,

昨日突发便后肛门剧烈疼痛,咳嗽时疼痛加剧。查体见肛门处有一紫红色肿块,有触痛感,直径约 2cm。患者行手术治疗,术后正确的护理措施是

- A. 术后 48 小时内控制排便
- B. 术后当天下床活动
- C. 术后当天可进普食
- D. 术后尽量减少或不使用镇痛剂
- E. 术后每天用 1:500 的高锰酸钾溶液坐浴

113. (真题 2015-S113) 患者男, 51 岁, 反复出现排便后肛门疼痛, 时有瘙痒 4 年余, 站立或行走过久时肿胀感, 昨日突发便后肛门剧烈疼痛, 咳嗽时疼痛加剧。查体见肛门处有一紫红色肿块, 有触痛感, 直径约 2cm。患者术后不会出现的情况是

- A. 伤口出血
- B. 尿潴留
- C. 肛门疼痛
- D. 伤口渗血
- E. 肠粘连

114. (真题 2015-S114) 患者女, 30 岁。因“无明显诱因出现乏力伴胸闷、气急, 活动后症状加重 3 周”就诊, 实验室检查: Hb77g/L, WBC $61.8 \times 10^9/L$ , PLT $183 \times 10^9/L$ , 异常细胞 88%。为进一步诊治收入血液科病房。为明确诊断, 需行骨髓穿刺术。护士对患者解释穿刺的注意事项时, 错误的内容是

- A. 目的是帮助明确诊断
- B. 穿刺时需采取膝胸卧位
- C. 穿刺后可能会有酸胀的感觉
- D. 穿刺后 2~3 天内不宜洗澡
- E. 可以正常活动, 不影响生活规律

115. (真题 2015-S115) 患者女, 30 岁。因“无明显诱因出现乏力伴胸闷、气急, 活动后症状加重 3 周”就诊, 实验室检查: Hb77g/L, WBC $61.8 \times 10^9/L$ , PLT $183 \times 10^9/L$ , 异常细胞 88%。为进一步诊治收入血液科病房。患者被确诊为急性单核细胞白血病, 即予 DAH 方案化疗 (D-柔红霉素、A-阿糖胞苷、H-三尖杉酯碱)。应用化疗药物后, 护士应重点观察的是

- A. 心脏毒性表现
- B. 骨髓抑制表现
- C. 注射部位局部表现
- D. 膀胱毒性表现
- E. 神经毒性表现

116. (真题 2015-S116) 患者女, 30 岁。因“无明显诱因出现乏力伴胸闷、气急, 活动后症状加重 3 周”就诊, 实验室检查: Hb77g/L, WBC $61.8 \times 10^9/L$ , PLT $183 \times 10^9/L$ , 异常细胞 88%。为进一步诊治收入血液科病房。患者病情缓解拟于近日出院, 护士为其进行健康教育, 告知注意监测

血常规指标, 血小板开始低于多少时应限制活动

- A.  $<300 \times 10^9/L$
- B.  $<100 \times 10^9/L$
- C.  $<50 \times 10^9/L$
- D.  $<20 \times 10^9/L$
- E.  $<10 \times 10^9/L$

117. (真题 2015-S117) 患者男, 45 岁。汽车修理工。间断咳嗽 3 个月, 无痰。近 20 天出现咳嗽加剧, 痰中带血, 无发热、寒战等症状。查体: T $36.7^{\circ}C$ , P78 次/分, R19 次/分, BP110/70mmHg。浅表未扪及淋巴结。高度怀疑肺癌。在收集患者病史资料时, 不能遗漏的重要信息是

- A. 吸烟史
- B. 服药史
- C. 婚姻状况
- D. 营养状况
- E. 心理状态

118. (真题 2015-S118) 患者男, 45 岁。汽车修理工。间断咳嗽 3 个月, 无痰。近 20 天出现咳嗽加剧, 痰中带血, 无发热、寒战等症状。查体: T $36.7^{\circ}C$ , P78 次/分, R19 次/分, BP110/70mmHg。浅表未扪及淋巴结。高度怀疑肺癌。患者确诊为肺癌, 给予化疗, 输注化疗药物需要建立静脉通道, 首选的液体为

- A. 5%葡萄糖溶液
- B. 10%葡萄糖溶液
- C. 5%葡萄糖盐水
- D. 生理盐水
- E. 林格液 (复方氯化钠溶液)

119. (真题 2015-S119) 患者女, 25 岁, 孕 8 周, 先天性心脏病, 妊娠后表现为一般体力活动受限制, 活动后感觉心悸、轻度气短, 休息时无症状。患者现在很紧张, 询问是否能继续妊娠。护士应告诉她做决定的依据主要是

- A. 年龄
- B. 心功能分级
- C. 胎儿大小
- D. 心脏病种类
- E. 病变发生部位

120. (真题 2015-S120) 患者女, 25 岁, 孕 8 周, 先天性心脏病, 妊娠后表现为一般体力活动受限制, 活动后感觉心悸、轻度气短, 休息时无症状。患者整个妊娠期心脏负担最重的时期是

- A. 孕 12 周内
- B. 孕 24~26 周
- C. 孕 28~30 周
- D. 孕 32~34 周
- E. 孕 36~38 周

