

全国护士资格考试

护士资格考试 历年真题及精解

《2013 年真题》

编著：易考精灵

2013 专业实务 真题

1. (真题 2013-Z1) 体温单底栏的填写内容是

- A. 体温
- B. 脉搏
- C. 呼吸
- D. 住院天数
- E. 胃液引流量

2. (真题 2013-Z2) 在传染病区中属于污染区的是

- A. 走廊
- B. 病室
- C. 护士站
- D. 治疗室
- E. 值班室

3. (真题 2013-Z3) 在临床护理的质量标准中, 对无菌物品合格率的规定是

- A. 1
- B. 0.95
- C. 0.9
- D. 0.85
- E. 0.8

4. (真题 2013-Z4) 新生儿出生后进行 Apgar 评分的评价指标不包括

- A. 皮肤颜色
- B. 角膜反射
- C. 心率
- D. 呼吸
- E. 肌张力

5. (真题 2013-Z5) 对青春期孩子实施心理行为指导的重点是

- A. 对学校生活适应性的培养
- B. 加强品德教育
- C. 预防疾病和意外教育
- D. 性心理教育
- E. 社会适应性的培养

6. (真题 2013-Z6) 不属于中医急重症的是

- A. 高热
- B. 神昏
- C. 痉症
- D. 痿症
- E. 血症

7. (真题 2013-Z7) 食管癌最主要的转移途径是

- A. 血行转移
- B. 淋巴转移

C. 直接扩散

D. 种植转移

E. 消化道转移

8. (真题 2013-Z8) 急性白血病患者出血的主要原因是

- A. 反复感染
- B. 弥散性血管内凝血
- C. 血小板质和量的异常
- D. 白血病细胞浸润
- E. 感染毒素对血管的损伤

9. (真题 2013-Z9) 破伤风抗毒素皮试液的标准是每 1mL 皮试液含破伤风抗毒素

- A. 50IU
- B. 100IU
- C. 150IU
- D. 1500IU
- E. 15000IU

10. (真题 2013-Z10) 幼儿期是指

- A. 从出生~1 岁
- B. 从出生~2 岁
- C. 1~3 岁
- D. 3~5 岁
- E. 4~6 岁

11. (真题 2013-Z11) 泌尿系肿瘤患者排尿的特点是

- A. 无痛性全程肉眼血尿
- B. 终末血尿伴膀胱刺激征
- C. 初始血尿
- D. 疼痛伴血尿
- E. 血红蛋白尿

12. (真题 2013-Z12) 心动过缓是指安静状态下成人脉率每分钟少于

- A. 40 次
- B. 50 次
- C. 60 次
- D. 70 次
- E. 80 次

13. (真题 2013-Z13) 老年科室的适宜温度是

- A. 18~20°C
- B. 20~22°C
- C. 22~24°C
- D. 24~26°C
- E. 26~28°C

14. (真题 2013-Z14) 对血糖在正常范围者没有降血糖作用的药物是

- A. 胰岛素
- B. 优降糖
- C. 格列吡嗪
- D. 格列喹酮
- E. 二甲双胍

15. (真题 2013-Z15) 正常情况下, 胰液进入十二指肠, 在肠激酶的作用下首先激活的是

- A. 糜蛋白酶原
- B. 激肽释放酶原
- C. 前磷脂酶
- D. 前弹力蛋白酶
- E. 胰蛋白酶原

16. (真题 2013-Z16) 患者, 男, 28 岁。在大排档聚餐后出现高热, 腹泻, 诊断为细菌性痢疾。对该患者采取的护理措施中, 不正确的是

- A. 给予胃肠道隔离
- B. 给予高蛋白饮食
- C. 酌情给予流质或半流质食物
- D. 记录排便的性状、次数
- E. 留取大便标本送检

17. (真题 2013-Z17) 患者, 男, 17 岁。因车祸致颅脑损伤急诊入院, 经医护人员全力抢救无效死亡。其家属情绪激动。对医护人员说: “这么年轻的小伙子, 进医院还能呼吸, 怎么就死了? 你们怎么治的? 我家就这么一个孩子!” 此时影响家属心理状态的主要因素是

- A. 医院抢救设备陈旧
- B. 护士和家属交流受阻
- C. 家属对结果无法接受
- D. 医护人员技术水平欠佳
- E. 家属缺乏对护士的信任

18. (真题 2013-Z18) 患者, 男, 65 岁, 脑梗死入院, 意识模糊 2 天, 身体虚弱, 生命体征尚平稳, 四肢发冷。护士用热水袋为其进行保温, 正确的方法是

- A. 袋内水温为 60°C
- B. 热水袋外裹毛巾
- C. 热水袋置于腹部
- D. 热水袋水温与室温相同后, 撤走热水袋
- E. 叮嘱家属随时更换热水袋内热水

19. (真题 2013-Z19) 患者, 男, 68 岁。脑出血急诊入院, 医嘱一级护理, 给予心电监护, 接诊护士在给患者女儿做入院介绍时, 遭到了家属的强烈拒绝, 最可能的原因是

- A. 正在对患者进行抢救
- B. 护士着装不整
- C. 护士介绍不到位

- D. 护士表情不自然
- E. 病房环境嘈杂

20. (真题 2013-Z20) 护士遵医嘱为患者行 10%葡萄糖酸钙 10ml 缓慢静脉推注, 推注约 5ml 后, 护士发现推注稍有阻力, 局部略肿胀, 抽无回血, 发生上述情况的原因可能是 (争议题)

- A. 静脉痉挛
- B. 针刺入过深, 冲破对侧管壁血
- C. 针头斜面一半在血管外
- D. 针头斜面紧贴血管内壁
- E. 针头刺入皮下

21. (真题 2013-Z21) 患者, 男, 29 岁。因外伤致昏迷, 需鼻饲。护士在晨晚间护理期间为其进行口腔护理目的不包括

- A. 保持口腔清洁
- B. 清除口腔内一切细菌
- C. 清除口臭、口垢
- D. 观察口腔黏膜
- E. 预防并发症

22. (真题 2013-Z22) 年轻男性患者因车祸昏迷送来急诊, 初步诊断颅骨骨折, 盆骨骨折, 医嘱开放静脉通道, 急行 X 线检查, 护士护送患者时, 不妥的做法是

- A. 选用平车推送
- B. 护士站在患者头侧
- C. 护送时注意保暖
- D. 检查时护士暂时离开照相室
- E. 运送期间暂时停止输液

23. (真题 2013-Z23) 患者, 女, 40 岁。上午拟行子宫切除术。术前需留置导尿管, 护士在导尿操作中应为患者安置的体位是

- A. 去枕仰卧位
- B. 头高足低位
- C. 侧卧位
- D. 屈膝仰卧位
- E. 截石位

24. (真题 2013-Z24) 在隔离病区工作护士的下列行为正确的是

- A. 掀页撕取避污纸
- B. 把口罩挂在胸前
- C. 身着隔离衣进入治疗室
- D. 为患者翻身用手整理口罩
- E. 护理结核患者后立即洗手更换口罩

25. (真题 2013-Z25) 青春期女孩的第二性征表现不包括

- A. 智齿萌出

- B. 月经初潮
- C. 骨盆变宽
- D. 脂肪丰满
- E. 出现阴毛

26. (真题 2013-Z26) 慢性肺源性心脏病的形态改变的主要是

- A. 左心室肥厚
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 肺动脉瓣狭窄
- D. 主动脉扩大
- E. 右心室扩大

27. (真题 2013-Z27) 患者, 女, 17 岁。行破伤风抗毒素过敏试验, 20 分钟后结果: 局部皮丘红肿, 硬结大于 1.5cm, 红晕大于 4cm, 自述有痒感, 应采取的措施是

- A. 将抗毒素分成 4 等份, 分次注射
- B. 在对侧手臂做对照试验后再注射
- C. 将抗毒素稀释, 分 2 次注射
- D. 待患者痒感消失后再全量注射
- E. 将抗毒素分 4 次逐渐增加剂量注射

28. (真题 2013-Z28) 糖皮质激素治疗系统性红斑狼疮的主要机制是

- A. 抗休克, 改善循环
- B. 抑制过敏反应
- C. 控制炎症, 抑制免疫反应
- D. 降低毒素反应
- E. 抑菌、避免继发感染

29. (真题 2013-Z29) 患者, 女, 38 岁, 大面积烧伤后 5 小时入院, 心率 120 次/分, 血压 70/50mmHg, 尿少, 发生上述状况最可能的原因是

- A. 大量红细胞丧失造成肺换气障碍
- B. 大量水分蒸发造成脱水
- C. 疼痛导致的生理反应
- D. 大量体液从血管内渗出引起低血容量休克
- E. 创面细菌感染造成感染性休克

30. (真题 2013-Z30) 高血压病的治疗药物卡托普利最常见的副作用是

- A. 头痛
- B. 乏力
- C. 心率增快
- D. 心率减慢
- E. 刺激性干咳

31. (真题 2013-Z31) 患者, 男, 67 岁。因食管癌入院准备手术, 患者自述目前能进食米粥之类的食物, 护士应指导患者饮食为

- A. 高热量、高蛋白、高脂肪半流食
- B. 低热量、低蛋白、低脂肪流食
- C. 高热量、高蛋白、高维生素半流食
- D. 高热量、低蛋白、高维生素半流食
- E. 高热量、高蛋白、高维生素普食

32. (真题 2013-Z32) 引起肛瘘最常见的原发病是

- A. 痔疮
- B. 直肠息肉
- C. 肛裂
- D. 直肠肛管周围脓肿
- E. 直肠癌

33. (真题 2013-Z33) 患者在诊疗过程中受到损害, 医疗机构及其医务人员有过错的承担赔偿责任的是

- A. 医务人员
- B. 医疗机构
- C. 医疗机构负责人
- D. 医务人员和医疗机构
- E. 医务人员及其家属

34. (真题 2013-Z34) 初产妇, 正常阴道分娩, 第二产程时宫缩频繁, 疼痛难忍, 痛苦呻吟, 此时护士最恰当的沟通方式是

- A. 劝其忍耐
- B. 默默陪伴
- C. 抚摸腹部
- D. 紧握产妇的手
- E. 投以关注的目光

35. (真题 2013-Z35) 某新生儿确诊为低钙血症, 医嘱: 静脉注射 10%葡萄糖酸钙, 护士要注意观察的是

- A. 防止心动过缓, 保持心率>80 次/分
- B. 防止心动过缓, 保持心率>90 次/分
- C. 防止心动过缓, 保持心率>100 次/分
- D. 防止心动过速, 保持心率<80 次/分
- E. 防止心动过速, 保持心率<100 次/分

36. (真题 2013-Z36) 患者, 男, 79 岁。因患 ARDS 入住 ICU, 病情缓解后, 患者对护士说: “我见不到孩子、老伴, 心里不舒服啊”, 这表明该患者本存在

- A. 生理需要
- B. 安全需要
- C. 爱与归属的需要
- D. 尊敬与被尊敬的需要
- E. 自我价值实现的需要

37. (真题 2013-Z37) 右心功能不全为主要临床症状出现的病理生理基础是

- A. 肺循环淤血

- B. 体循环淤血
- C. 心肌损害
- D. 心室重构
- E. 血流动力学改变

38. (真题 2013-Z38) 拔除胸腔闭式引流管时应嘱患者

- A. 深吸气后屏气
- B. 深呼气后屏气
- C. 正常呼吸
- D. 浅呼气后屏气
- E. 浅吸气后屏气

39. (真题 2013-Z39) 法洛四联症患者缺氧发作, 使用普萘洛尔(心得安)的目的

- A. 增强心肌收缩力
- B. 减慢心率
- C. 减少心肌耗氧量
- D. 降低血压
- E. 抗焦虑

40. (真题 2013-Z40) 患者, 男, 如厕时忽然晕倒, 瞳孔散大, 心搏骤停, 呼吸消失立即采取的措施是

- A. 立即呼救, 等待救援
- B. 大呼患者
- C. 心肺复苏
- D. 使劲摇晃患者
- E. 立即将患者送往医院

41. (真题 2013-Z41) 下面属虚证临床症状的是

- A. 体质多壮实
- B. 精神萎缩, 虚证者低息微
- C. 声高气粗
- D. 胸腹按之疼痛, 胀满不减
- E. 脉象有力

42. (真题 2013-Z42) 类风湿关节炎患者关节的典型特点是

- A. 关节肿胀
- B. 关节疼痛
- C. 关节晨僵
- D. 关节呈对称性改变
- E. 关节摩擦音

43. (真题 2013-Z43) 患者, 男, 73 岁。慢性肾功能不全尿毒症患者, 需进行维持性血液透析治疗。常抱怨家属照顾欠周到, 今天早上对护士说“你们治来治去, 怎么也治不好, 我不治了!”下列护士的答复中, 最恰当的是

- A. “您的心情我理解, 我们也在努力, 需要您的配合”
- B. “要是不治疗, 你的病情比现在更严重多了”
- C. “尿毒症是终末期疾病, 治愈是不可能的”

- D. “您觉得治疗效果不理想, 可以找别的治疗途径”
- E. “您这样扰乱了病房的秩序, 影响了我的工作”

44. (真题 2013-Z44) 预防肠扭转最重要的措施是避免

- A. 进食过饱
- B. 进食油腻食物
- C. 进餐后平躺
- D. 进食过多粗纤维食物
- E. 饱餐后剧烈运动

45. (真题 2013-Z45) 老人慎用吗啡, 是因为吗啡容易引起

- A. 恶心呕吐
- B. 呼吸抑制
- C. 心率减慢
- D. 喉头痉挛
- E. 血压下降

46. (真题 2013-Z46) 属于开放式提问的是

- A. “您今天感觉怎么样?”
- B. “伤口还疼吗?”
- C. “用餐了吗?”
- D. “昨晚睡眠好吗?”
- E. “降糖药吃了没?”

47. (真题 2013-Z47) 患者, 女, 51 岁, 发热、头痛 1 天。医生要为她做腰穿检查, 有恐惧感。从伦理要求考虑, 临床应向患者做的主要工作是

- A. 要得到患者知情同意
- B. 告知做腰穿的必要性
- C. 告知做腰穿时的注意事项
- D. 因诊断需要, 先动员, 后检查
- E. 动员家属做患者思想工作

48. (真题 2013-Z48) 患者, 女, 20 岁, 因车祸挤压伤住院, 第 2 天自感头痛、头晕, 呼吸费力, 尿量每小时少于 17ml, 应考虑其危险是

- A. ARDS
- B. ARF
- C. 血容量不足
- D. MODS
- E. 心功能不全

49. (真题 2013-Z49) 患者, 女, 39 岁, 行右侧乳腺癌切除术, 伤口处不可包扎过紧, 原因是

- A. 防止皮瓣脱落
- B. 以免影响引流
- C. 防止皮瓣坏死
- D. 以免伤口渗血
- E. 防止发生气胸

50. (真题 2013-Z50) 属于乙类传染病, 但按甲类处理的疾病是
- 艾滋病
 - 病毒性肝炎
 - 肺结核
 - 霍乱
 - 传染性非典型肺炎
51. (真题 2013-Z51) 以下哪种药物抑制胃酸分泌最强
- 奥美拉唑
 - 法莫替丁
 - 氢氧化铝镁
 - 枸橼酸铋钾
 - 硫糖铝
52. (真题 2013-Z52) 肺结核的化疗原则不包括
- 早期
 - 规律
 - 全程
 - 足量
 - 联合
53. (真题 2013-Z53) 患者, 女, 35 岁。车祸后并发血气胸, 进行手术治疗后医嘱常规行沐舒坦(盐酸氨溴索)雾化吸入, 用该药物的目的是
- 解痉
 - 平喘
 - 镇痛
 - 抑制腺体分泌
 - 稀释痰液, 促进排出
54. (真题 2013-Z54) 某创伤性休克的晚期患者, 出现咯血、呕血, 护士抽血化验时发现皮肤上出现瘀点和瘀斑。收缩压 60mmHg, 血小板 $30 \times 10^9/L$, 纤维蛋白原 1.0g/L, 凝血酶原时间延长。该患者可诊断为
- 弥散性血管内凝血
 - 急性呼吸衰竭
 - 急性肾衰竭
 - 休克
 - 肝性脑病
55. (真题 2013-Z55) 过期妊娠是指孕妇妊娠期达到或超过
- 38 周
 - 39 周
 - 40 周
 - 42 周
 - 44 周
56. (真题 2013-Z56) 护士为破伤风患者处理伤口后, 换下的敷料应该
- 统一填埋
 - 高压灭菌
 - 集中焚烧
 - 日光暴晒
 - 浸泡消毒
57. (真题 2013-Z57) 患儿, 5 岁, 1 岁时出现活动后气促、乏力、口唇及指(趾)端发绀, 喜欢下蹲位, 可见杵状指。首先应考虑的疾病是
- 室间隔缺损
 - 房间隔缺损
 - 动脉导管未闭
 - 法洛四联症
 - 风湿性心脏病
58. (真题 2013-Z58) 护理工作中, 护士观察患者病情的最佳方法是
- 观察法
 - 经常与患者交谈, 了解患者需要
 - 翻阅病例
 - 查看会诊记录
 - 稀释痰液, 促进排出
59. (真题 2013-Z59) 患者, 男, 25 岁。因脑挫裂伤入院, 医生给予应用肾上腺皮质激素治疗, 其目的是
- 减轻炎症反应
 - 减轻脑水肿
 - 减轻出血
 - 减轻疼痛
 - 促进伤口愈合
60. (真题 2013-Z60) 患者, 女, 30 岁, 妊娠 35 周, 阴道出血, 诊断前置胎盘, 拟急行剖宫产, 首先要做的是
- 灌肠
 - 交叉配血、备血
 - 检查阴道出血
 - 皮肤准备
 - 做好家属心理工作
61. (真题 2013-Z61) 引起慢性肾衰患者贫血最重要的原因是
- 铁的摄入减少
 - 血液透析失血及频繁抽血化验导致失血
 - 红细胞生存周期缩短
 - 叶酸缺乏
 - 肾产生促红细胞生成素减少
62. (真题 2013-Z62) 早产儿, 生后 2 天, 全身皮肤黄

染,诊断为新生儿溶血病。患儿出现拒食、嗜睡、肌张力减退。考虑患儿并发了

- A. 败血症
- B. 颅内出血
- C. 胆红素脑病
- D. 病毒性脑炎
- E. 缺血缺氧性脑病

63. (真题 2013-Z63) 护士了解到病房内的一位患者曾有吸毒史,患者要求其保密。她可以向谁提及此事

- A. 护理部干事
- B. 医务处处长
- C. 患者的主治医师
- D. 患者的上级领导
- E. 患者的配偶和儿女

64. (真题 2013-Z64) 关于婴儿呼吸系统生理特点的叙述,错误的是

- A. 婴儿的呼吸频率较快是正常的
- B. 婴儿呼吸节律很规整、若不齐就有严重问题
- C. 婴儿呈腹式呼吸
- D. 婴儿没有什么呼吸储备,容易出现呼吸衰竭
- E. 婴儿气道管径小,容易阻塞

65. (真题 2013-Z65) 患者,男,33岁。干咳、胸痛,以自发性气胸入院,经积极治疗后已痊愈准备出院,护士告诉患者为预防复发最重要的是

- A. 戒烟
- B. 清淡饮食
- C. 避免屏气用力
- D. 积极锻炼身体
- E. 保持情绪稳定

66. (真题 2013-Z66) 预防甲状腺大部分切除手术后出现甲状腺危象最重要的措施是

- A. 充分做好术前准备
- B. 防止损伤甲状旁腺
- C. 尽量多地保留甲状腺
- D. 保证残余甲状腺的血液供应
- E. 手术中尽量少挤压甲状腺

67. (真题 2013-Z67) 肝硬化失代偿期最突出的表现是

- A. 脾大
- B. 腹水
- C. 肝掌
- D. 贫血
- E. 出血

68. (真题 2013-Z68) 门静脉系与腔静脉系之间最主要的交通支是

- A. 直肠下段、肛管交通支
- B. 前腹壁交通支
- C. 腹膜后交通支
- D. 胃底、食管下段交通支
- E. 肠系膜交通支

69. (真题 2013-Z69) 系统性红斑狼疮典型的皮损是

- A. 盘形红斑
- B. 蝶形红斑
- C. 斑丘疹
- D. 紫斑
- E. 荨麻疹

70. (真题 2013-Z70) 在使用胰岛素的过程中,老年糖尿病患者更易发生低血糖的主要原因是

- A. 对胰岛素敏感导致血糖降低
- B. 肾糖阈降低导致尿糖排出过多
- C. 胃肠功能差导致碳水化合物摄入量减少
- D. 进食不规律导致碳水化合物摄入量减少
- E. 肝功能减退导致对胰岛素灭活能力降低

71. (真题 2013-Z71) 治疗外阴炎,医嘱高锰酸钾坐浴,高锰酸钾的作用是

- A. 杀菌
- B. 减轻疼痛
- C. 消除肿胀
- D. 缓解瘙痒
- E. 清洁外阴

72. (真题 2013-Z72) 女性,17岁,因车祸致腹部开放性损伤,伴少量肠管脱出,正确的紧急处理措施是

- A. 敞开伤口,急诊手术
- B. 用消毒棉垫加压包扎
- C. 迅速将肠管还纳入腹腔
- D. 用凡士林纱布覆盖,腹带加压包扎
- E. 等渗盐水无菌纱布覆盖并妥善保存

73. (真题 2013-Z73) 患儿,6岁,双下肢烫伤,其烫伤面积为

- A. 0.25
- B. 0.3
- C. 0.35
- D. 0.4
- E. 0.45

74. (真题 2013-Z74) 患者因心绞痛入院,护士认为医嘱存在错误,护士的做法不妥的是

- A. 暂不执行
- B. 与医生核对
- C. 按医嘱执行

- D. 找医生重开
- E. 报告科室领导

75. (真题 2013-Z75) 患者高热急诊入院, 退温措施正确的是

- A. 脚底冷敷
- B. 前额冷敷
- C. 腹部冷敷
- D. 心前区冷敷
- E. 热水擦浴

76. (真题 2013-Z76) 支气管扩张患者出现反复咯血, 有窒息的危险, 患者最可能出现的心理反应是

- A. 抑郁
- B. 悲伤
- C. 恐惧
- D. 愤怒
- E. 震惊

77. (真题 2013-Z77) 《艾滋病防治条例》规定, 艾滋病病毒感染者和艾滋病病人应当将其感染或者发病的事实如实告知

- A. 朋友
- B. 同学
- C. 亲属
- D. 同事
- E. 与其有性关系者

78. (真题 2013-Z78) 患者, 女, 60 岁。因脑出血入院 2 周, 目前患者意识不清, 骶尾部皮肤发红, 大小为 3cmx3cm, 未破损, 患者的压疮处于

- A. 淤血红润期
- B. 炎性浸润期
- C. 浅度溃疡期
- D. 深度溃疡期
- E. 坏死溃疡期

79. (真题 2013-Z79) 患者, 女, 36 岁。长期吸烟, 患有滴虫性阴道炎, 近来月经不规律, 前来咨询避孕措施, 护士应指导选用

- A. 口服避孕药
- B. 长效避孕针
- C. 安全期避孕
- D. 阴茎套
- E. 宫内节育器

80. (真题 2013-Z80) 患者, 女, 42 岁, 右侧乳腺发现一无痛性肿块, 生长速度快, 质硬, 周围分界不清, 同侧腋窝淋巴结肿大。应首先考虑为

- A. 急性乳腺炎

- B. 乳腺癌
- C. 乳腺囊性增生病
- D. 乳腺纤维腺瘤
- E. 乳管内乳头状瘤

81. (真题 2013-Z81) 患者, 男, 30 岁, 大面积烧伤合并血红蛋白尿, 输液时每小时尿量至少应在

- A. 10ml 以上
- B. 20ml 以上
- C. 30ml 以上
- D. 40ml 以上
- E. 50ml 以上

82. (真题 2013-Z82) 患者, 男, 30 岁, 饱餐后突发上腹持续性疼痛 4 小时, 体检全腹有压痛, 腹肌紧张, 肝浊音界消失。对其诊断最有价值的检查是

- A. 血常规检查
- B. 腹部 CT 检查
- C. 立位腹部平片
- D. 血淀粉酶测定
- E. 纤维胃镜检查

83. (真题 2013-Z83) 患者, 女, 30 岁, 风心病病史 8 年。晨起右侧肢体活动不便, 不能下床, 口角歪斜, 言语不清。应首先考虑为

- A. 脑出血
- B. 脑栓塞
- C. 脑血栓形成
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 严重心力衰竭

84. (真题 2013-Z84) 患者, 男, 42 岁, 因“急性梗阻性化脓性胆管炎”急诊入院。寒战, 体温骤升至 41°C, 脉搏 112 次/分, 血压 85/65mmHg, 其休克类型为

- A. 感染性休克
- B. 低血容量性休克
- C. 心源性休克
- D. 神经源性休克
- E. 过敏性休克

85. (真题 2013-Z85) 需避光输注的药物是

- A. 卡托普利
- B. 地尔硫草
- C. 硝普钠
- D. 呋塞米
- E. 利血平

86. (真题 2013-Z86) 胎儿娩出后立即按摩子宫协助胎盘娩出, 可导致的后果是

- A. 产后出血

- B. 胎盘嵌顿
- C. 胎盘残留
- D. 胎盘粘连
- E. 胎盘剥离不全

87. (真题 2013-Z87) 患者, 男, 50 岁, 1 个月来大便带少量鲜血和黏液, 排便习惯改变。对该患者简单而重要的检查是

- A. 直肠镜
- B. 肛门镜
- C. 直肠指检
- D. 纤维结肠镜
- E. X 线钡灌肠造影

88. (真题 2013-Z88) 患者, 女, 外伤 1 小时入院, 多处软组织肿胀, 正确的处理是

- A. 按摩
- B. 冷敷
- C. 热敷
- D. 包扎
- E. 无需处理

89. (真题 2013-Z89) 地高辛治疗心力衰竭的药理作用是

- A. 加快心率
- B. 增加心肌收缩力
- C. 增加心脏搏出量
- D. 加快心脏传导
- E. 延长心房有效不应期

90. (真题 2013-Z90) 某护士在某二甲医院实习, 表现良好, 未通过资格证考试, 医院聘用该护士违反了

- A. 《护士条例》
- B. 《医疗事故处理条例》
- C. 《医疗机构管理条例》
- D. 《医院工作制度》
- E. 《执业医师法》

91. (真题 2013-Z91) 急腹症在未明确诊断时, 可对没有休克的患者采取的措施是

- A. 给予流质饮食
- B. 给予镇痛药
- C. 实施胃肠减压
- D. 便秘者行低压灌肠
- E. 可服用少量石蜡油

92. (真题 2013-Z92) 骨折与脱位共有的特征性表现是

- A. 疼痛
- B. 肿胀
- C. 畸形

- D. 异常活动
- E. 骨擦音

93. (真题 2013-Z93) 可导致经络气血壅塞的致病因素是

- A. 过饱
- B. 过劳
- C. 六淫
- D. 痰饮
- E. 疫伤

94. (真题 2013-Z94) 敌百虫 (美曲磷酯) 中毒患者进行洗胃时, 禁用的洗胃液是

- A. 温开水
- B. 生理盐水
- C. 蛋清水
- D. 高锰酸钾溶液
- E. 碳酸氢钠溶液

95. (真题 2013-Z95) 护士在给患者做口腔护理, 发现其口腔黏膜充血糜烂, 有假膜, 应给予哪种溶液漱口★ (真题 2022-Z62)

- A. 氯化钠溶液
- B. 朵贝尔液
- C. 复方硼酸溶液
- D. 0.1%醋酸溶液
- E. 3%碳酸氢钠溶液

96. (真题 2013-Z96) 护士甲与护士乙同在一个病房工作, 两人性格各异, 乙觉得甲做事风风火火, 不够稳重, 甲觉得乙做事慢条斯理, 拖拖拉拉, 所以俩人经常会产生些矛盾, 造成护际关系紧张的主要因素是

- A. 职位因素
- B. 年龄因素
- C. 学历因素
- D. 收入因素
- E. 心理因素

97. (真题 2013-Z97) 患者, 75 岁, 间断上腹痛十余年, 表现为餐后半小时上腹胀痛, 持续 2~3 小时, 自行缓解, 入院诊断为胃溃疡, 胃溃疡的好发部位是

- A. 胃小弯
- B. 胃大弯
- C. 胃底
- D. 胃贲门部
- E. 胃幽门部

98. (真题 2013-Z98) 风湿性疾病最常见的症状是

- A. 关节痛
- B. 肌肉痛

C. 软组织痛

D. 神经痛

E. 关节致残

99. (真题 2013-Z99) 肺气肿患者胸部叩诊音为

A. 清音

B. 鼓音

C. 实音

D. 浊音

E. 过清音

100. (真题 2013-Z100) 通过解除紧张情绪可以缓解的心率失常是

A. 房室传导阻滞

B. 心室颤动

C. 房性心动过速

D. 室性期前收缩

E. 心房扑动

101. (真题 2013-Z101) 关于人体器官移植叙述正确的是

A. 可直接在死者身上直接摘取

B. 可直接在死囚身上摘取

C. 活体器官的捐献与接收需经过伦理委员会的审核

D. 所有医生均可以参与摘取器官

E. 以上都不对

102. (真题 2013-Z102) 最容易发生骨肉瘤转移的脏器是

A. 心脏

B. 肺

C. 脑

D. 肾

E. 肝

103. (真题 2013-Z103) 急性胰腺炎起病后升高最早的酶是

A. 血清淀粉酶

B. 尿淀粉酶

C. 血清脂肪酶

D. 单胺氧化酶

E. 碱性磷酸酶

104. (真题 2013-Z104) 在对纤维胃镜进行消毒时, 应选择哪种消毒剂

A. 70%的乙醇

B. 2%戊二醛溶液

C. 2%碘酊溶液

D. 0.2%过氧乙酸

E. 20%戊二醛溶液

105. (真题 2013-Z105) 患者, 女, 50 岁, 高血压, 不利于控制高血压的食物是

A. 猪肉

B. 青菜

C. 水果

D. 豆浆

E. 鱼肉

106. (真题 2013-Z106) 患儿, 男, 1 岁, 因畏食来院求医, 护士应首先为其检查

A. 前囟

B. 体重

C. 坐高

D. 牙齿

E. 骨骼发育

107. (真题 2013-Z107) 患者, 男, 65 岁, 被诊断为肾癌晚期, 患者对家属的照顾和护士工作不满, 要求停止治疗。此患者的心理反应属于

A. 否认期

B. 愤怒期

C. 协议期

D. 忧郁期

E. 接受期

108. (真题 2013-Z108) 最容易引起听神经损害的药物是

A. 异烟肼

B. 利福平

C. 链霉素

D. 乙氨丁醇

E. 吡嗪酰胺

109. (真题 2013-Z109) 患者, 男, 29 岁, 心力衰竭入院, 入院后呼吸规律不整, 先浅慢后深快, 继而又浅慢, 属于哪种呼吸形式

A. 潮式呼吸

B. 间断呼吸

C. 呼吸过缓

D. 呼吸过速

E. 呼吸困难

110. (真题 2013-Z110) 患者在甲状腺大部切除手术后一回到病房, 护士就要求其回答问题, 目的是为了评估患者有无

A. 意识障碍

B. 神经损伤

C. 麻醉清醒

D. 记忆受损

E. 痰液阻塞

111. (真题 2013-Z111) 观察铁剂治疗效果最早的化验指标是

- A. 红细胞数上升
- B. 血清铁含量上升
- C. 血红蛋白量上升
- D. 红细胞体积增大
- E. 网织红细胞数上升

112. (真题 2013-Z112) 患者, 女, 34 岁, 因急性胃肠炎入院, 医嘱输注抗生素, 护士在做输液准备时, 不宜采用的沟通方式是

- A. “输液时间有点长, 您要先去卫生间吗?”
- B. “您快点去卫生间, 回来给您输液。”
- C. “您去卫生间方面吗, 要不要我帮忙?”
- D. “您要是不方便, 我可以帮您拿便盆。”
- E. “准备好了吗, 我该给您输液了。”

113. (真题 2013-Z113) 关于输血的叙述错误的是

- A. 输血前应做交叉配血试验
- B. 取血时应做好“三查八对”
- C. 取血时不可剧烈摇晃
- D. 输血完毕应再输入少量生理盐水
- E. 输血完毕后及时将输血管、血袋等进行消毒、分类弃用

114. (真题 2013-Z114) 便秘患者应用液状石蜡导泻, 其作用机制是

- A. 促进肠蠕动
- B. 润滑肠壁, 软化大便
- C. 阻止肠内水分吸收
- D. 增强排便反射
- E. 增加纤维素含量

115. (真题 2013-Z115) 急性阑尾炎腹痛起始于脐周或上腹的原因是

- A. 胃肠功能紊乱
- B. 内脏神经反射
- C. 躯体神经反射
- D. 阑尾位置不固定
- E. 阑尾管壁痉挛

116. (真题 2013-Z116) 患者, 男, 33 岁, 腹部撞伤后 1 小时, 烦躁不安, 面色苍白, 血压 80/60mmHg, 脉率 120 次/分, 腹部叩诊有移动性浊音, 为明确诊断简单而可靠的检查是

- A. 血常规
- B. 腹部 B 超
- C. 腹腔穿刺

D. 血尿淀粉酶

E. X 线胸腹联合透视

117. (真题 2013-Z117) 有机磷农药中毒尿液有

- A. 蒜臭味
- B. 腥臭味
- C. 鼠尿味
- D. 烂苹果味
- E. 氨臭味

118. (真题 2013-Z118) 治疗厌氧菌性急性盆腔炎, 首选的抗生素是

- A. 青霉素
- B. 甲硝唑
- C. 红霉素
- D. 头孢拉定
- E. 阿莫西林

119. (真题 2013-Z119) 患者, 女, 65 岁, 诊断为 2 型糖尿病, “三多一少”症状不明显, 血糖偏高, 长期采用饮食控制、休息、口服降糖药, 但血糖仍高。入院后医嘱给予: 胰岛素 18 单位 H Tid。H 译成中文是

- A. 皮内注射
- B. 皮下注射
- C. 肌肉注射
- D. 静脉注射
- E. 静脉滴注

120. (真题 2013-Z120) 患者, 女, 65 岁, 诊断为 2 型糖尿病, “三多一少”症状不明显, 血糖偏高, 长期采用饮食控制、休息、口服降糖药, 但血糖仍高。入院后医嘱给予: 胰岛素 18 单位 H Tid。医嘱给予: 胰岛素 18 单位 H Tid, “Tid”是给药次数为

- A. 每日 1 次
- B. 隔日 1 次
- C. 每日 3 次
- D. 每日 2 次
- E. 饭后给药

121. (真题 2013-Z121) 患者, 女, 65 岁, 诊断为 2 型糖尿病, “三多一少”症状不明显, 血糖偏高, 长期采用饮食控制、休息、口服降糖药, 但血糖仍高。入院后医嘱给予: 胰岛素 18 单位 H Tid。医嘱给予胰岛素治疗, 合适的注射部位是

- A. 腹部
- B. 前臂
- C. 大腿内侧
- D. 腰部
- E. 大腿外侧

122. (真题 2013-Z122) 患者, 男, 19 岁, 因车祸急诊入院。检查: 血压测不到、脉搏细速、面色苍白, 全身多处骨折, 大腿处出血不止, 经急诊科抢救无效死亡。护士应在抢救结束后多久补记所有内容

- A. 2 小时内
- B. 4 小时内
- C. 6 小时内
- D. 8 小时内
- E. 12 小时内

123. (真题 2013-Z123) 患者, 男, 19 岁, 因车祸急诊入院。检查: 血压测不到、脉搏细数、面色苍白, 全身多处骨折, 大腿处出血不止, 经急诊科抢救无效死亡。患者家属需要复印病历, 其无权复印哪种记录单

- A. 体温单
- B. 长期医嘱单
- C. 临时医嘱单
- D. 会诊记录
- E. 护理记录单

124. (真题 2013-Z124) 患者, 男, 22 岁, 患者因淋雨出现寒战、高热、肌肉酸痛半日来诊, 右胸放射至右肩, 呼吸时加重。查体: 体温 39.5°C, 血压 90/60mmHg, 脉搏 95 次/分; 右下肺语音震颤增强, 呼吸音粗, 可闻及湿啰音。该患者 24 小时体温波动在 39.0°C~39.8°C (之间), 发热的热型是

- A. 弛张热
- B. 间歇热
- C. 稽留热
- D. 回归热
- E. 波状热

125. (真题 2013-Z125) 患者, 男, 22 岁, 患者因淋雨出现寒战、高热、肌肉酸痛半日来诊, 右胸放射至右肩, 呼吸时加重。查体: 体温 39.5°C, 血压 90/60mmHg, 脉搏 95 次/分; 右下肺语音震颤增强, 呼吸音粗, 可闻及湿啰音。为明确诊断, 遵医嘱检查血常规及血沉, 血沉检查应选择的试管是

- A. 干燥试管
- B. 血培养瓶
- C. 普通试管
- D. 抗凝试管
- E. 真空试管

126. (真题 2013-Z126) 患者, 男, 22 岁, 患者因淋雨出现寒战、高热、肌肉酸痛半日来诊, 右胸放射至右肩, 呼吸时加重。查体: 体温 39.5°C, 血压 90/60mmHg, 脉搏 95 次/分; 右下肺语音震颤增强, 呼吸音粗, 可闻及湿啰音。采集上述血标本后, 注入试管的顺序是 (2022 大纲有变动)

- A. 干燥管—抗凝管—血培养瓶
- B. 干燥管—血培养瓶—抗凝管
- C. 抗凝管—血培养瓶—干燥管
- D. 血培养瓶—干燥管—抗凝管
- E. 血培养瓶—抗凝管—干燥管

127. (真题 2013-Z127) 患者, 男, 60 岁, 结肠癌入院, 拟手术治疗, 术前准备医嘱给予大量不保留灌肠。灌肠时, 护士应协助患者取

- A. 屈膝仰卧位
- B. 膝胸卧位
- C. 俯卧位
- D. 左侧卧位
- E. 截石位

128. (真题 2013-Z128) 患者, 男, 60 岁, 结肠癌入院, 拟手术治疗, 术前准备医嘱给予大量不保留灌肠。灌肠结束后, 保留时间为

- A. 1 小时以上
- B. 30 分钟~1 小时
- C. 15~30 分钟
- D. 5~10 分钟
- E. 5 分钟内

129. (真题 2013-Z129) 患者, 男, 67 岁, 因冠心病入院, 在静脉输液过程中出现胸闷、呼吸困难、咳嗽、咳粉红色泡沫样痰。该患者发生了

- A. 发热反应
- B. 急性肺水肿
- C. 静脉炎
- D. 空气栓塞
- E. 过敏反应

130. (真题 2013-Z130) 患者, 男, 67 岁, 因冠心病入院, 在静脉输液过程中出现胸闷、呼吸困难、咳嗽、咳粉红色泡沫样痰。此时护士应为患者采取的卧位是

- A. 去枕仰卧位
- B. 左侧卧位
- C. 端坐位, 两腿下垂
- D. 休克卧位
- E. 头低足高位

131. (真题 2013-Z131) 患者, 男, 67 岁, 因冠心病入院, 在静脉输液过程中出现胸闷、呼吸困难、咳嗽、咳粉红色泡沫样痰。给氧时, 应选择的吸氧流量为

- A. 1~2L/min
- B. 3~4L/min
- C. 5~6L/min
- D. 6~8L/min
- E. 9~10L/min

132. (真题 2013-Z132) 患者, 女, 78 岁, 因脑血栓导致左侧肢体偏瘫入院。病情稳定, 医嘱二级护理。次日清晨 1 时, 患者坠床, 造成颅内出血, 虽经全力抢救, 终因伤势过重死亡。造成该事件的最主要原因是

- A. 病房环境过于昏暗
- B. 护士没有升起床挡
- C. 护士没有进行健康教育
- D. 没有安排家属陪护
- E. 没有安排专人 24 小时陪护

133. (真题 2013-Z133) 患者, 女, 78 岁, 因脑血栓导致左侧肢体偏瘫入院。病情稳定, 医嘱二级护理。次日清晨 1 时, 患者坠床, 造成颅内出血, 虽经全力抢救, 终因伤势过重死亡。根据对患者的伤害程度, 该事故属于

- A. 医嘱差错
- B. 一级医疗事故
- C. 二级医疗事故
- D. 三级医疗事故
- E. 护理差错

134. (真题 2013-Z134) 产妇剖宫产后要求出院, 医生同意其出院但未开具出院医嘱, 该产妇家属表示先带产妇及孩子回家, 明天来医院结账。而护士考虑到住院费用没有结清, 有漏账风险, 故没有同意家属的要求, 但家属不听护士的劝阻并准备离开。这时, 护士借口为孩子洗浴把孩子抱走了, 产妇知情后大哭。该护士的行为违反了

- A. 自主原则
- B. 不伤害原则
- C. 公正原则
- D. 行善原则
- E. 公平原则

135. (真题 2013-Z135) 产妇剖宫产后要求出院, 医生同意其出院但未开具出院医嘱, 该产妇家属表示先带产妇及孩子回家, 明天来医院结账。而护士考虑到住院费用没有结清, 有漏账风险, 故没有同意家属的要求, 但家属不听护士的劝阻并准备离开。这时, 护士借口为孩子洗浴把孩子抱走了, 产妇知情后大哭。该家属的行为没有履行

- A. 积极配合医疗护理的义务
- B. 自觉遵守医院规章制度的义务
- C. 自觉维护医院秩序的义务
- D. 保持和恢复健康的义务
- E. 公民的义务

2013 实践能力 真题

1. (真题 2013-S1) 滴虫性阴道炎分泌物的典型特点是

- A. 黄色脓性
- B. 豆渣样

C. 稀薄泡沫状

- D. 血性
- E. 白色黏稠

2. (真题 2013-S2) 最能反映婴儿营养状况的体格发育是

- A. 胸围
- B. 牙齿数量
- C. 身长
- D. 体重
- E. 脂肪厚度

3. (真题 2013-S3) 肠梗阻患者的临床表现不包括

- A. 腹痛
- B. 腹胀
- C. 腹泻
- D. 呕吐
- E. 停止排气排便

4. (真题 2013-S4) 骨质疏松患者常见的症状是

- A. 疼痛
- B. 身高缩短
- C. 驼背
- D. 呼吸困难
- E. 骨折

5. (真题 2013-S5) 小儿卡介苗接种的时间是在出生后

- A. 2~3 天
- B. 7~10 天
- C. 1 个月
- D. 3 个月
- E. 6 个月

6. (真题 2013-S6) III 级高血压是指血压的范围为

- A. 收缩压 160~180mmHg, 舒张压 90~100mmHg
- B. 收缩压 160~180mmHg, 舒张压 100~110mmHg
- C. 收缩压 ≥ 180 mmHg, 舒张压 90~100mmHg
- D. 收缩压 ≥ 180 mmHg, 舒张压 100~110mmHg
- E. 收缩压 ≥ 180 mmHg, 舒张压 ≥ 110 mmHg

7. (真题 2013-S7) 焦虑性神经症发作有两种, 一种为广泛性焦虑障碍, 另一种为

- A. 恐惧症
- B. 惊恐发作
- C. 强迫症
- D. 疑病症
- E. 癔症

8. (真题 2013-S8) 属于青紫型先天性心脏病的是

- A. 法洛四联症

- B. 室间隔缺损
C. 动脉导管未闭
D. 房间隔缺损
E. 主动脉狭窄
9. (真题 2013-S9) 强迫人格患者的主要特点为
A. 犹豫不决, 追求完美
B. 自我中心, 富于想象
C. 情感体验肤浅, 易感情用事
D. 违法乱纪, 冷酷无情
E. 情绪不稳, 易激动
10. (真题 2013-S10) 胎儿娩出后, 护士首先进行的护理措施是
A. 保暖
B. 擦干羊水
C. 结扎脐带
D. 清理呼吸道
E. 新生儿 Apgar 评分
11. (真题 2013-S11) 风湿性心脏病二尖瓣狭窄患者, 最常见的心律失常是
A. 室性早搏
B. 心房颤动
C. 窦性心动过速
D. 房室传导阻滞
E. 室上性心动过速
12. (真题 2013-S12) 患者, 男, 45 岁, 输血 10ml 左右出现头疼、四肢麻木、腰背酸痛, 伴寒战、高热、呼吸急促等症状。下列措施不正确的是
A. 立即停止输血, 保留余血送检
B. 静脉推注碳酸氢钠
C. 双侧腰部冷敷封闭, 保护肾脏
D. 重做血型鉴定和交叉配血
E. 注意观察生命体征和尿量
13. (真题 2013-S13) 患者, 男, 45 岁。胸部被撞伤 1 小时入院, 自觉左胸痛, 面色紫绀, 呼吸急促, 左胸部出现反常呼吸运动, 最重要的护理评估内容是
A. 血压
B. 体温
C. 呼吸
D. 脉搏
E. 意识
14. (真题 2013-S14) 自发性气胸的治疗措施中首要的是
A. 消除病因
B. 预防感染
C. 预防复发
D. 预防并发症
E. 使肺尽早复张
15. (真题 2013-S15) 阿尔茨海默症患者首发的症状是
A. 妄想
B. 人格改变
C. 记忆障碍
D. 语音功能障碍
E. 视空间机能障碍
16. (真题 2013-S16) 患者, 女, 65 岁。患有 COPD。患者进行腹式呼吸锻炼时, 护士应予纠正的动作是
A. 吸气时腹部尽量挺出
B. 呼气时腹部尽力收缩
C. 鼻吸口呼
D. 慢吸气
E. 快呼气
17. (真题 2013-S17) 患者, 男, 62 岁。支气管肺癌手术后 3 天, 目前一般情况尚可, 但有痰不易咳出, 最适宜采取的排痰措施是
A. 指导深呼吸咳嗽
B. 给予叩背
C. 给予机械震荡
D. 给予体位引流
E. 给予吸痰
18. (真题 2013-S18) 患者, 女, 52 岁。诊断为高血压急症, 医嘱速尿 20mg, iv。执行后患者出现乏力、腹胀、肠鸣音减弱的症状, 该患者可能发生了
A. 高钾血症
B. 低钾血症
C. 高钠血症
D. 低钠血症
E. 低氯血症
19. (真题 2013-S19) 患者, 男, 60 岁。肝硬化 10 年, 近 2 日嗜睡, 今晨测体温时呼之不应, 但压迫其眶上神经有痛苦表情, 该患者的意识状态是
A. 深昏迷
B. 昏睡
C. 嗜睡
D. 浅昏迷
E. 意识模糊
20. (真题 2013-S20) 直肠癌的早期症状是
A. 黏液血便
B. 排便困难、便条变细
C. 里急后重

- D. 排便习惯改变
E. 腹胀、腹痛

21. (真题 2013-S21) 患者, 男, 50 岁。因前列腺增生症入院, 行经尿道前列腺电切术治疗, 术后健康教育措施中, 错误的是

- A. 进食高纤维食物
B. 多饮水
C. 尽早锻炼如跑步等
D. 进行盆底肌肉锻炼
E. 1 个月内禁止性生活

22. (真题 2013-S22) 患儿, 男, 3 个月。因多汗、烦躁易惊、睡眠不安半月余, 诊断为佝偻病初期, 护士指导患儿正确的日光照射方法是

- A. 每天在室内关窗晒太阳 1 小时
B. 每天在室内关窗晒太阳 2 小时
C. 每日保证 30 分钟户外活动
D. 每天要保证 1-2 小时户外活动
E. 每天要保证 8 小时户外活动

23. (真题 2013-S23) 早产儿出生后最重要的护理措施是

- A. 保暖
B. 防止窒息
C. 提早喂养
D. 预防感染
E. 预防出血

24. (真题 2013-S24) 进入第二产程的标志

- A. 宫口开全
B. 胎头拔露
C. 胎头着冠
D. 胎膜已破
E. 外阴膨隆

25. (真题 2013-S25) 患者, 女, 30 岁。分娩后 2 周发生阴道大量出血入院, 护士对患者进行健康评估时, 与病情最不相关的是

- A. 了解患者的分娩史
B. 评估患者的血压脉搏、呼吸、神志情况
C. 观察患者阴道出血量
D. 了解宫底大小及有无压痛
E. 母乳喂养情况

26. (真题 2013-S26) 慢性心功能衰竭患者经保守治疗, 病情好转出院。患者做出以下哪项陈述, 表明其还没有充分了解出院指导

- A. “如果我睡不好觉, 只能坐起来才能睡着, 我应当来复诊。”

- B. “如果我呼吸越来越短, 越来越急, 我应当来复诊。”
C. “如果我饮食没有变化, 但体重越来越重, 我应当来复诊。”

D. “如果我把开的药都吃完了, 病情没什么变化, 就来复诊继续开药。”

- E. “如果我咳嗽、发烧, 应当先把剩下的抗生素吃掉, 然后来复诊。”

27. (真题 2013-S27) 患者, 女, 54 岁, 测口腔温度时不慎咬碎体温计, 护士应立即

- A. 让患者服用韭菜
B. 让患者口服蛋清
C. 清除患者口腔内玻璃碎屑
D. 催吐
E. 洗胃

28. (真题 2013-S28) 护士查房时观察到某急性胰腺炎患者偶有阵发性的肌肉抽搐, 最可能的原因是

- A. 低钙反应
B. 疼痛反应
C. 营养失调导致
D. 精神高度紧张
E. 使用哌替啶后的正常反应

29. (真题 2013-S29) 患者, 男, 45 岁。以胰腺癌收入院, 查体皮肤巩膜黄染, 患者诉全身瘙痒, 给予的护理措施不包括

- A. 协助患者抓挠减轻瘙痒
B. 涂抹止痒药物用温水毛巾擦拭
C. 用温水毛巾擦拭
D. 剪除患者指甲
E. 注意观察患者皮肤情况

30. (真题 2013-S30) 急性有机磷农药中毒患者使用胆碱酯酶复能剂的原则, 正确的是

- A. 应该尽量地少用
B. 应该尽早地使用
C. 不与阿托品合用
D. 只用于轻度中毒
E. 只用于重度中毒

31. (真题 2013-S31) 患儿, 男, 5 岁。摔倒后左肘关节着地送来急诊。分诊护士判断该患儿是否发生骨折的最重要依据是

- A. 左上臂疼痛
B. 局部肿胀
C. 左上臂畸形
D. 局部压痛
E. 肘关节活动度减小

32. (真题 2013-S32) 10 岁男孩, 因误吸笔帽入院, 术前患儿活动时突然剧烈咳嗽, 口唇及颜面紫绀明显, 护士应立即采取的措施是
- 通知医生
 - 吸氧
 - 将患儿扶回病床
 - 用力叩击患儿背部
 - 进行心电监测
33. (真题 2013-S33) 健康足月新生儿生后第 2 天, 对其脐部的护理错误的是 (2022 大纲变动)
- 勤换尿布, 衣物柔软
 - 脐部保持清洁、干燥
 - 接触新生儿前后要洗手
 - 不必严格执行无菌操作技术
 - 用 3%过氧化氢液清洗脐部
34. (真题 2013-S34) 患者, 女, 63 岁。因右下肢静脉曲张行大隐静脉高位结扎剥脱术, 术后护士指导其使用弹力绷带的正确方法是
- 包扎前应下垂患肢
 - 手术部位的弹力绷带应缠绕的更紧
 - 两圈弹力绷带之间不能重叠
 - 由近心端向远心端包扎
 - 包扎后应能扪及足背动脉搏动
35. (真题 2013-S35) 支气管哮喘的临床表现是
- 吸气性呼吸困难伴三凹征
 - 发作性呼吸困难伴窒息感
 - 反复发作带哮鸣音的呼气性呼吸困难
 - 带哮鸣音的混合性呼吸困难
 - 呼吸困难伴哮鸣音
36. (真题 2013-S36) 某呼吸衰竭患者, 在应用辅助呼吸和呼吸兴奋剂过程中出现恶心、呕吐、烦躁、面颊潮红、肌肉颤动等现象, 考虑为
- 肺性脑病先兆
 - 呼吸兴奋剂过量
 - 痰液阻塞
 - 通气量不足
 - 呼吸性碱中毒
37. (真题 2013-S37) 男患者, 48 岁。诊断为颅内肿瘤入院。患者有颅内压增高症状, 护士给予患者床头抬高 $15^{\circ}\sim 30^{\circ}$, 其主要目的是
- 有利于改善心脏功能
 - 有利于改善呼吸功能
 - 有利于颅内静脉回流
 - 有利于鼻饲
 - 防止呕吐物误入呼吸道

38. (真题 2013-S38) 患者, 男, 36 岁。胃溃疡 5 年, 规律用药但是依然反复发作。护士在搜集资料时发现患者饮食极不规律, 常暴饮暴食, 每日饮酒量约 500mL。在进行健康指导时应着重给患者讲解的是
- 药物的不良反应
 - 胃溃疡的并发症
 - 合理饮食的重要性
 - 胃溃疡的发病机制
 - 保持情绪稳定的重要性
39. (真题 2013-S39) 患者, 男, 80 岁。慢性阻塞性肺疾病并发感染住院, 患者出现下列哪种表现提示为肺性脑病先兆
- 瞳孔不等大
 - 心率加快, 血压升高
 - 呼吸急促
 - 烦躁、嗜睡
 - 尿量减少
40. (真题 2013-S40) 新生儿室的室温应保持在
- $18^{\circ}\sim 20^{\circ}\text{C}$
 - $20^{\circ}\sim 22^{\circ}\text{C}$
 - $22^{\circ}\sim 24^{\circ}\text{C}$
 - $24^{\circ}\sim 26^{\circ}\text{C}$
 - $28^{\circ}\sim 30^{\circ}\text{C}$
41. (真题 2013-S41) 患者, 女, 28 岁。乏力、心悸、头晕 2 月就诊。患者面色苍白, 皮肤干燥。医嘱血常规检查。护士在解释该检查目的时的正确说法是
- 检查是否有感染
 - 检查是否有出凝血功能障碍
 - 检查是否有贫血及其程度
 - 检查肝脏功能是否有损害
 - 检查肾脏功能是否有损害
42. (真题 2013-S42) 消化性溃疡患者服用铝碳酸镁片的正确方法是
- 温水吞服
 - 空腹服用
 - 餐后 1 小时服用
 - 餐前服用
 - 餐中服用
43. (真题 2013-S43) 对于无并发症的急性腮腺炎患儿正确的隔离方式是
- 保护性隔离
 - 接触隔离
 - 血液隔离
 - 消化道隔离

E. 家中隔离

44. (真题 2013-S44) 患者, 男, 62 岁。2 年前行“人工瓣膜置换术”, 术后遵医嘱服用华法林。护士建议该患者日常生活中使用电动剃须刀剃须, 主要的目的是

- A. 避免出血
- B. 避免损伤皮肤引发感染性心内膜炎
- C. 避免交叉感染
- D. 方便老年人使用
- E. 经济实用

45. (真题 2013-S45) 36 岁孕妇, 产前检查漏斗骨盆, 现足月妊娠, 胎膜早破来诊。查体: 胎头入盆。医嘱: 入院行各项检查, 拟次日行剖宫产术, 护士对其进行健康教育, 不正确的内容是

- A. 讲明产道异常对母儿的影响
- B. 说明剖宫产的必要性
- C. 解释剖宫产术前、术后注意事项
- D. 嘱其保持会阴清洁
- E. 鼓励术前适当下床活动

46. (真题 2013-S46) 28 岁产妇, 2 天前经阴道分娩一女婴, 今日查房发现其乳头皲裂, 为了减轻母乳喂养时的不适, 正确的护理措施是

- A. 先在损伤较重的一侧乳房哺乳
- B. 为减轻疼痛应减少哺乳次数
- C. 哺乳前用毛巾和肥皂水清洁乳头和乳晕
- D. 哺乳后挤出少量乳汁涂在乳头和乳晕上
- E. 哺乳时让婴儿含吮乳即可

47. (真题 2013-S47) 患者, 男, 32 岁。车祸后右肱骨骨折, 行内固定术后 2 周拆线出院, 对该患者的出院宣教, 错误的是

- A. 锻炼需贯穿骨折恢复的全过程
- B. 活动范围需从小到大
- C. 活动强度应由弱到强
- D. 活动量应固定, 始终一致
- E. 主动和被动活动相结合

48. (真题 2013-S48) 孕妇产前检查发现胎儿臀位, 需要给予胎位矫正, 护士应告知最佳干预时间是

- A. 孕 8 周
- B. 孕 16 周
- C. 孕 24 周
- D. 孕 30 周
- E. 孕 36 周

49. (真题 2013-S49) 脓性指头炎典型的临床表现是

- A. 手指发麻
- B. 搏动性跳痛

C. 寒战、发热

D. 晚期疼痛加剧

E. 晚期指头明显发红, 肿胀

50. (真题 2013-S50) 患者, 男, 62 岁。诊断 2 型糖尿病 5 年, 坚持口服降糖药治疗, 血糖控制效果较好。患者拟计划春游出发前测得空腹血糖低于哪个值时应注意低血糖发生

- A. 3.9mmol/L
- B. 4.9mmol/L
- C. 5.9mmol/L
- D. 6.9mmol/L
- E. 7.9mmol/L

51. (真题 2013-S51) 肝硬化腹水患者氯化钠的每日摄入量宜控制在

- A. 1.2~2.0g
- B. 2.5~3.0g
- C. 3.5~4.0g
- D. 4.5~5.0g
- E. 5.0~7.5g

52. (真题 2013-S52) 患者, 男, 38 岁。阑尾穿孔合并腹膜炎手术后第 7 天, 体温 39°C, 伤口无红肿, 大便次数增多, 混有黏液, 伴里急后重, 该患者可能并发了

- A. 肠炎
- B. 肠粘连
- C. 盆腔脓肿
- D. 膈下脓肿
- E. 腹腔脓肿

53. (真题 2013-S53) 患者因焦虑症入院, 每天晚上总是躺在床上翻来覆去睡不着觉, 患者的表现属于睡眠障碍的哪一种

- A. 入睡困难
- B. 时醒时睡
- C. 睡眠规律倒置
- D. 彻夜不眠
- E. 浅睡眠

54. (真题 2013-S54) 孕妇, 30 周, 臀先露, 为矫正胎位, 可采取的体位是

- A. 膝胸卧位
- B. 半卧位
- C. 左侧卧位
- D. 膀胱截石位
- E. 俯卧位

55. (真题 2013-S55) 8 个月男婴, 在社区准备接种麻疹疫苗。护士在消毒时, 应采用的消毒剂是

- A. 2%碘酊
- B. 0.5%碘伏
- C. 0.9%生理盐水
- D. 75%乙醇
- E. 90%乙醇

56. (真题 2013-S56) 乳腺癌特征性的乳腺体征是

- A. 肿块
- B. 酒窝征
- C. 乳头内陷
- D. 乳头溢乳
- E. 红肿热痛

57. (真题 2013-S57) 患者, 男, 68 岁。患支气管扩张症间断咯血。近日来因受凉咳大量黄色脓痰入院治疗。医院体位引流, 护士引导患者做体位引流时错误的是

- A. 在饭后 30 分钟进行
- B. 引流前用生理盐水超声雾化吸入
- C. 引流同时作胸部叩击
- D. 引流后可给予治疗性雾化吸入
- E. 每次引流 15~20 分钟

58. (真题 2013-S58) 患者, 女, 29 岁。口服安定 100 片, 被家人发现时呼之不应, 意识昏迷, 急诊入院, 错误的护理措施是

- A. 立即洗胃
- B. 立即催吐
- C. 硫酸镁导泻
- D. 0.9%生理盐水洗胃
- E. 测量生命体征

59. (真题 2013-S59) 患儿, 5 岁。在门诊诊断为“房间隔缺损”, 拟择期手术治疗。门诊护士对家属的健康教育要点, 错误的是

- A. 本病为一种先天性心脏病
- B. 经过治疗, 大多数情况下预后良好
- C. 治疗方案以手术为主
- D. 术前最重要的是防止皮肤破损
- E. 术前注意保暖, 避免着凉、感冒

60. (真题 2013-S60) 溃疡性结肠炎的好发部位

- A. 升结肠
- B. 横结肠
- C. 降结肠
- D. 乙状结肠
- E. 盲肠

61. (真题 2013-S61) 患者, 女, 32 岁, 因“乏力、纳差 5 天, 尿黄 1 天”来诊, 经实验室检查诊断为急性病毒性肝炎(甲型)。对于其 5 岁的儿子, 适宜的做法是(争议

题)

- A. 不需要任何措施
- B. 预防性服用抗病毒药物
- C. 进行相关检查, 若感染可不做处理
- D. 进行相关检查, 若未感染, 可注射人丙种球蛋白
- E. 进行相关检查, 若未感染可注射高价特异性免疫球蛋白

62. (真题 2013-S62) 患者, 男, 46 岁, 因肝硬化伴食管-胃底静脉曲张破裂出血入院。患者性格出现改变、行为异常, 有扑翼样震颤。应考虑该患者出现了下列哪种并发症

- A. 功能性肾衰竭
- B. 感染
- C. 胆汁淤积
- D. 肝性脑病
- E. 上消化道出血

63. (真题 2013-S63) 患儿, 女, 2 岁, 因腹泻 2 天入院, 入院后护士遵医嘱给予补液 200ml, 该液体中最多可加入 10%氯化钾

- A. 6ml
- B. 8ml
- C. 10ml
- D. 12ml
- E. 14ml

64. (真题 2013-S64) 患儿, 男, 8 个月, 支气管肺炎, 半天来突然烦躁不安, 口周发绀, 有鼻扇及三凹征。体检: 呼吸 60 次/分, 心率 180 次/分, 心音低钝, 两肺闻及大量细湿啰音, 肝肋下 3.0cm, 护士判断该患儿最可能并发了

- A. 脓胸
- B. 肺不张
- C. 气胸
- D. 肺大疱
- E. 急性心力衰竭

65. (真题 2013-S65) 患者, 女, 16 岁, 支气管哮喘发作 1 小时, 烦躁, 发绀, 呼吸 26 次/分, 心率 120 次/分, 律齐, 以下哪项措施不当

- A. 协助患者采取舒适的坐位
- B. 给予吸氧 2L/min
- C. 守候患者床旁, 按摩患者背部
- D. 忌用普萘洛尔
- E. 禁用氨茶碱

66. (真题 2013-S66) 某消化性溃疡患者, 酒后不久出现上腹部剧烈疼痛, 面色苍白。查体: 腹肌紧张, 全腹明显压痛, 反跳痛, 血压 90/60mmHg, 首要的护理措施是

- A. 服镇静剂
- B. 立即输血
- C. 吸氧
- D. 禁食、胃肠减压
- E. 给镇痛剂

67. (真题 2013-S67) 某女青年反复出现皮肤瘀点, 并有鼻出血、月经过多, 近来出现贫血、脾大, 血小板 $30 \times 10^9/L$, 错误的护理措施是

- A. 适当限制活动
- B. 预防各种创伤
- C. 尽量减少肌肉注射
- D. 鼻腔内血痂应剥去
- E. 给予高蛋白、高维生素低渣饮食

68. (真题 2013-S68) 患者, 女, 60 岁, 肝硬化 10 年, 大量腹水, 深昏迷急诊平车入院, 该患者应该选择的体位是(争议题)

- A. 中凹卧位, 头偏向一侧
- B. 平卧位, 头下加枕
- C. 侧卧位, 膝下给枕
- D. 左侧卧位, 头下加枕
- E. 仰卧位, 头偏向一侧

69. (真题 2013-S69) 患者, 男, 62 岁。心绞痛 2 年。4 小时前出现胸骨中段剧烈疼痛, 舌下含服硝酸甘油不能缓解。查体: 心率增快, 心尖部可闻及舒张期奔马律。心电图 ST 段抬高。该患者的检查结果最可能出现

- A. 血糖降低
- B. 白细胞减少
- C. 血清心肌酶升高
- D. C 反应蛋白降低
- E. 红细胞沉降率降低

70. (真题 2013-S70) 子宫内膜异位症患者的典型症状是

- A. 撕裂样疼痛
- B. 转移性腹痛
- C. 继发性渐进性痛经
- D. 脐周疼痛
- E. 牵拉性疼痛

71. (真题 2013-S71) 患者, 女, 72 岁。患帕金森病 5 年。随诊中患者表示现在多以碎步、前冲动作行走, 并对此感到害怕。患者进行行走训练时, 护士应提醒患者避免

- A. 思想尽量放松
- B. 尽量跨大步
- C. 脚尽量抬高
- D. 双臂尽量摆动
- E. 将注意力集中于地面

72. (真题 2013-S72) 可能造成睡眠障碍的因素不包括

- A. 急性应激反应
- B. 饮用浓咖啡
- C. 过度担心失眠
- D. 睡前进食过多
- E. 安静环境

73. (真题 2013-S73) 患儿, 女, 10 个月。因发热、咳嗽 3 天, 病情加重来诊。查体: 患儿烦躁不安, 气促, 口唇发绀。T39°C, P180 次/分, R50 次/分。肺部可闻及较多细湿啰音, 心音低钝, 肝肋下 3cm。对该患儿的护理错误的是

- A. 面罩给氧
- B. 置患儿于半卧位
- C. 避免各种刺激
- D. 加快输液速度
- E. 备好抢救用品

74. (真题 2013-S74) 患者, 女, 17 岁。面部“危险三角区”长了一个疖, 因怕影响形象而自行挤破清除。护士告诉患者这样做的主要危险是可能导致

- A. 面部蜂窝织炎
- B. 眼球内感染
- C. 上颌骨骨髓炎
- D. 海绵状静脉窦炎
- E. 脑脓肿

75. (真题 2013-S75) 患者, 男, 45 岁。无诱因突发四肢抽搐, 呼吸急促、面色发绀、两眼上翻、口吐白沫、呼之不应。症状持续约 3 分钟后, 抽搐停止但仍昏迷。家属急来医院救治, 医生查体时患者再次出现类似发作, 此时不应当

- A. 解开患者的衣领、衣扣和腰带
- B. 将患者的头部侧向一边
- C. 在患者的上下臼齿间放压舌板
- D. 按压患者的肢体以制止抽搐
- E. 遵医嘱给予安定静脉推注

76. (真题 2013-S76) 患者, 女, 28 岁, 停经 50 天, 1 天前出现少量阴道出血, 2 小时前突感下腹剧痛, 伴肛门坠胀感, 晕厥一次。入院查体: 面色苍白, 血压 70/50mmHg, 脉搏 120 次/分, 下腹明显压痛, 反跳痛。妇科检查见阴道后穹窿饱满。有宫颈抬举痛, 子宫略大稍软。该患者最可能的诊断是

- A. 前置胎盘
- B. 异位妊娠
- C. 难免流产
- D. 先兆流产
- E. 急性盆腔炎

77. (真题 2013-S77) 胰腺癌的好发部位是

- A. 胰头
- B. 胰尾
- C. 胰体
- D. 全胰腺
- E. 胰体尾部

78. (真题 2013-S78) 流行性腮腺炎的潜伏期平均为

- A. 6 天
- B. 9 天
- C. 12 天
- D. 15 天
- E. 18 天

79. (真题 2013-S79) 关于新生儿黄疸健康教育的叙述, 错误的是

- A. 保持患儿衣物时勿放樟脑丸
- B. 保持患儿大便通畅
- C. 母乳性黄疸的患儿须中断母乳喂养
- D. 红细胞 G6PD 缺陷的患儿, 忌食蚕豆
- E. 有后遗症的患儿, 给予健康治疗和功能锻炼

80. (真题 2013-S80) 心肺复苏时首选的给药途径是

- A. 中心静脉输注
- B. 气管内注射
- C. 心内注射
- D. 外周静脉输注
- E. 骨髓腔注射

81. (真题 2013-S81) 患者, 女, 66 岁。高血压病史多年。曾多次发生短时间肢体麻木或眩晕, 持续几分钟后恢复正常, 发作时曾有跌倒现象。目前最重要的护理措施是

- A. 给予低脂、低盐、低胆固醇饮食
- B. 向患者讲解疾病相关知识
- C. 安抚患者情绪
- D. 指导患者配合, 进行有效安全防护
- E. 嘱患者戒烟限酒

82. (真题 2013-S82) 关于心绞痛胸痛特点的叙述, 下列错误的是

- A. 阵发性前胸、胸骨后部疼痛
- B. 劳累或情绪激动时发作
- C. 可放射至心前区与左上肢
- D. 持续时间长, 像针扎一样痛
- E. 持续数分钟, 为压榨性疼痛

83. (真题 2013-S83) 患者, 男, 37 岁, 因胆石症入院行胆囊切除术、胆总管切开术, 术中放置 T 管。护士向患者家属解释时, 应说明使用 T 管的首要目的是

- A. 引流胆汁和减压
- B. 促进伤口引流
- C. 提供冲洗胆道的途径
- D. 阻止胆汁进入腹膜腔
- E. 将胆汁进入十二指肠的量减至最少

84. (真题 2013-S84) 3 岁幼儿, 未患过水痘。现该幼儿班级里出现水痘患儿, 该幼儿应在家隔离观察的时间是

- A. 1 周
- B. 2 周
- C. 3 周
- D. 4 周
- E. 5 周

85. (真题 2013-S85) 患儿, 男, 3 岁。因化脓性脑膜炎入院, 脑脊液细菌培养显示为脑膜炎双球菌感染, 进行抗菌治疗首选的抗菌素是

- A. 青霉素
- B. 阿奇霉素
- C. 庆大霉素
- D. 氯霉素
- E. 链霉素

86. (真题 2013-S86) 患者, 男, 68 岁。行胰头十二指肠切除术 (Whipple 术) 后 4 小时, 患者变换卧位后 30 分钟内, 腹腔引流管突然引流出 200ml 鲜红色血性液体, 正确的措施是

- A. 恢复原卧位
- B. 加大吸引负压, 促进引流
- C. 严密观察生命体征, 报告医生
- D. 加快输液输血速度
- E. 夹闭引流管, 暂停引流

87. (真题 2013-S87) 患儿腰椎穿刺术后, 去枕平卧 6 小时的目的是防止出现

- A. 休克
- B. 脑疝
- C. 头痛
- D. 惊厥
- E. 呕吐

88. (真题 2013-S88) 扩张型心肌病的主要体征是

- A. 听诊心脏杂音
- B. 叩诊心界扩大
- C. 咳粉红色泡沫痰
- D. 心率增快
- E. 出现心律失常

89. (真题 2013-S89) 慢性左心功能不全患者最主要的临床表现是

- A. 咳嗽
- B. 心悸
- C. 下肢水肿
- D. 肝脏肿大
- E. 呼吸困难

90. (真题 2013-S90) 患者, 男, 40 岁。因脑外伤住院, 院后患者出现脑疝症状, 立即输入 20%甘露醇治疗, 其目的是

- A. 降低血压
- B. 升高血压
- C. 降低颅内压
- D. 增加血容量
- E. 升高颅内压

91. (真题 2013-S91) 患者, 男, 19 岁。车祸致伤, 来院急诊, 神智朦胧, 咯血、口鼻均有泥沙夹血外溢, 呼吸困难, 烦躁不安, 左胸侧严重擦伤, 肿胀, 心律 98 次/分, 血压 120/90mmHg, 左大腿中度肿胀, 有瘀斑和严重擦伤, 此时最紧迫的抢救措施是

- A. 请胸外科医师会诊处理
- B. 清除上呼吸道异物, 保持呼吸道通畅
- C. 开放静脉通道, 输血
- D. 鼻导管低流量吸氧
- E. 左下肢夹板固定

92. (真题 2013-S92) 心包炎患者做出下列哪项表述时, 护士应对其加强饮食教育

- A. “医院的饭太淡, 我自己带了几个咸鸭蛋。”
- B. “我的身体正在恢复, 要每天吃点肉和鱼。”
- C. “每天饭菜量必须足够, 不能饿着。”
- D. “我每天都要吃一些新鲜水果。”
- E. “要多吃蔬菜不然会便秘。”

93. (真题 2013-S93) 患者, 女, 42 岁。诊断为急性胰腺炎, 经治疗后腹痛、呕吐基本消失, 开始进食时应给予

- A. 普食
- B. 低脂、低蛋白流质饮食
- C. 高脂、高蛋白流质饮食
- D. 高脂、低蛋白流质饮食
- E. 低脂、高蛋白饮食

94. (真题 2013-S94) 患者, 男, 55 岁。肛门常有瘙痒不适, 少量便血。护士指导其温水坐浴的水温是

- A. 32~35°C
- B. 37~39°C
- C. 43~46°C
- D. 45~49°C
- E. 50~56°C

95. (真题 2013-S95) 患者, 女, 68 岁。有慢性哮喘史 15 年。近日感冒后病情加重, 夜间咳嗽频繁, 痰量多, 以急性呼吸衰竭入院治疗。经治疗后病情缓解, 准备出院, 但 PaO₂ 仍低 (55mmHg)。为防止心脏进一步受累, 最有效的措施是

- A. 作腹式呼吸加强膈肌运动
- B. 避免吸入有害气体
- C. 保持室内清洁
- D. 进行家庭氧疗
- E. 坚持步行或慢跑等全身运动

96. (真题 2013-S96) 患者, 女, 26 岁。反复发生皮肤黏膜淤点、淤斑入院, 诊断为特发性血小板减少性紫癜。住院期间护士发现患者出现脉搏增快、视力模糊、瞳孔大小不等, 患者最可能出现了

- A. 心力衰竭
- B. 眼部疾病
- C. 颅内出血
- D. 消化道出血
- E. 呼吸道出血

97. (真题 2013-S97) 护士配合医生进行心包穿刺操作时, 正确的是

- A. 术前嘱患者禁食 2~3 小时
- B. 术前准备阿托品
- C. 第一次可抽液 350mL 以上
- D. 抽液中禁止夹闭胶管
- E. 术后待心包引流液小于 50mL/天时可拔管

98. (真题 2013-S98) 患者, 男, 45 岁。直肠癌行根治术 (Miles 术) 后, 造口周围皮肤保护的健康指导不包括

- A. 擦干后涂上锌氧油
- B. 注意有无红肿、破溃
- C. 及时清洁皮肤
- D. 常规使用乙醇清洁
- E. 防止粪水浸渍

99. (真题 2013-S99) 26 岁孕妇, 妊娠足月, 入院待产。夜间呼唤护士, 自述感觉胎动过频。此时最不恰当的处理是

- A. 立即听胎心音
- B. 通知值班医生
- C. 吸氧
- D. 左侧卧位
- E. 立即做剖腹产准备

100. (真题 2013-S100) 患儿 7 个月, 腹泻, 排黄绿色稀水样便 2 天, 每日 4~5 次, 精神状态好。为预防脱水给口服补液盐 (ORS, 不计葡萄糖渗透压), 其张力是

- A. 1/5 张

- B. 1/4 张
- C. 1/3 张
- D. 1/2 张
- E. 2/3 张

101. (真题 2013-S101) 脊柱骨折急救搬运的基本原则是

- A. 始终保持脊柱中立位
- B. 始终卧硬板转运
- C. 不可背驮运送
- D. 不可抱持运送
- E. 不可坐位检查和运送

102. (真题 2013-S102) 对尿路感染患者的健康教育中, 错误的是

- A. 鼓励患者多饮水
- B. 长期预防性服用抗生素
- C. 及时治疗尿路结石
- D. 及时治疗尿路损伤
- E. 保持会阴部清洁

103. (真题 2013-S103) 使用硫酸镁治疗妊娠高血压综合征时要注意

- A. 使用前应测体温、脉搏
- B. 尿量每日>360mL, 每小时>15mL
- C. 呼吸每分钟不少于 16 次
- D. 膝反射增强提示中毒
- E. 严格控制滴注速度, 以 2 克/小时为宜

104. (真题 2013-S104) 患者, 男, 45 岁。患有支气管哮喘史 20 余年, 每年急性发作数次, 经用药治疗后可以缓解。患者在与护士交流时询问由于自觉症状消失后即停止服药, 因此下次发作时是否可以先自行服用上次剩余药物护士首先要向患者重点说明的是

- A. 应该每天定时口服支气管扩张剂
- B. 需认识到要长期规范治疗哮喘, 不得自行停药
- C. 鼓励多做运动锻炼身体
- D. 应当寻求医生帮助, 及时解决用药问题
- E. 应当寻找发病原因避免复发, 以减少用药

105. (真题 2013-S105) 怀疑急性胰腺炎时, 首选的检查项目是

- A. 血钾
- B. 血肌酐
- C. 血淀粉酶
- D. 血尿酸
- E. 血白细胞计数

106. (真题 2013-S106) 第三产程的处理错误的是

- A. 胎儿娩出后应立即挤压子宫, 促使胎盘娩出

- B. 胎盘娩出后详细检查胎盘、胎膜是否完整
- C. 检查阴道、会阴有无裂伤
- D. 第三产程结束后, 产妇在产房观察 2 小时
- E. 产后 2 小时情况良好, 护送到病房

107. (真题 2013-S107) 预防风湿性心瓣膜病的根本措施是

- A. 长期服用抗风湿药物
- B. 积极预防链球菌感染
- C. 防止复发, 卧床休息
- D. 增加营养, 避免过劳
- E. 居室要防寒避湿

108. (真题 2013-S108) 患者, 女, 54 岁。因近半年内进食吞咽困难就诊, 身高 160cm, 体重 40kg。由此判断患者

- A. 肥胖
- B. 超重
- C. 消瘦
- D. 明显消瘦
- E. 正常

109. (真题 2013-S109) 护理法洛四联症患者时, 给患儿补充充足水分的主要目的是

- A. 预防形成脑血栓
- B. 预防并发肺感染
- C. 预防并发亚急性细菌感染
- D. 预防心力衰竭
- E. 预防中枢性神经系统感染

110. (真题 2013-S110) 患者, 男, 20 岁。因工程塌方被石板压迫 4 小时, 伤肢严重肿胀, 组织广泛坏死。该损伤属于

- A. 扭伤
- B. 挤压伤
- C. 摔伤
- D. 冲击伤
- E. 撕裂伤

111. (真题 2013-S111) 患者, 男, 68 岁, 被人搀扶步入医院, 分诊护士见其面色苍白, 呼吸困难, 家属称其“冠心病”又发作, 护士对其正确的处理是

- A. 为患者挂号
- B. 不做处理, 等待医生到来
- C. 吸氧, 测量血压
- D. 扣背
- E. 让患者去枕平卧于平车上

112. (真题 2013-S112) 葡萄胎患者清宫术后, 护士对其健康教育, 错误的是

- A. 定期复查 hCG
- B. 注意月经是否规则
- C. 观察有无阴道流血
- D. 注意有无咳嗽、咯血等转移症状
- E. 行安全期避孕

113. (真题 2013-S113) 患者, 男, 58 岁, 行动不便, 3 天来反复上腹痛, 进餐后发作或加重, 伴反酸暖气, 电话咨询社区护士其应该进行哪项检查, 社区护士的建议是

- A. 腹部平片
- B. B 超
- C. CT
- D. 胃镜
- E. MRI

114. (真题 2013-S114) 护士准备按医嘱给患者注射西地兰 0.1mg, 西地兰针剂的剂型是 0.4mg/2mL, 护士应该注射的毫升数是

- A. 0.1mL
- B. 0.2mL
- C. 0.3mL
- D. 0.4mL
- E. 0.5mL

115. (真题 2013-S115) 患者, 男, 30 岁。因慢性肾小球肾炎收入院。目前主要临床表现为眼睑及双下肢轻度水肿。血压 150/110mmHg。护士在观察病情中应重点关注

- A. 精神状态
- B. 水肿状态
- C. 血压变化
- D. 心率变化
- E. 营养状态

116. (真题 2013-S116) 新生儿, 女, 出生第 5 天, 因全身冰冷、拒奶 24 小时入院。查体: T35°C, 反应差, 皮肤呈暗红色, 心音低顿, 双小腿皮肤如硬橡皮样, 脐带已脱落。最可能的诊断是

- A. 新生儿水肿
- B. 新生儿红斑
- C. 新生儿寒冷损伤综合征
- D. 新生儿败血症
- E. 新生儿皮下坏疽

117. (真题 2013-S117) 新生儿, 女, 出生第 5 天, 因全身冰冷、拒奶 24 小时入院。查体: T35°C, 反应差, 皮肤呈暗红色, 心音低顿, 双小腿皮肤如硬橡皮样, 脐带已脱落。应首先采取的护理措施是

- A. 指导母乳喂养
- B. 复温
- C. 加强脐部护理

- D. 给氧气吸入
- E. 遵医嘱用抗生素

118. (真题 2013-S118) 患者, 男, 50 岁。因神志不清、行为异常 5 天, 昏迷 1 天入院, 既往有肝硬化病史 8 年。入院查体: 呼之不应, 压眶反射无反应, 皮肤可见蜘蛛痣。实验室检查血氨 145 μ g/dL, 脑电图显示 δ 波每秒 3 次。诊断为肝硬化、肝性脑病。患者入院后制定的护理措施不恰当的是

- A. 取仰卧位, 头偏向一侧
- B. 鼻饲 25%葡萄糖供给热量
- C. 如有便秘及时用肥皂水灌肠
- D. 每日入液量以尿量加 1000mL 为标准
- E. 必要时使用约束带

119. (真题 2013-S119) 患者, 男, 50 岁。因神志不清、行为异常 5 天, 昏迷 1 天入院, 既往有肝硬化病史 8 年。入院查体: 呼之不应, 压眶反射无反应, 皮肤可见蜘蛛痣。实验室检查血氨 145 μ g/dL, 脑电图显示 δ 波每秒 3 次。诊断为肝硬化、肝性脑病。患者经积极治疗后好转, 神志清醒, 此时适宜的饮食是

- A. 绝对禁食蛋白质饮食
- B. 限制碳水化合物的摄入
- C. 逐步增加蛋白质饮食, 以植物蛋白为主
- D. 增加脂肪的摄入, 以保证热量的供应
- E. 含维生素 B6 丰富的食物

120. (真题 2013-S120) 患者, 男, 36 岁, 患糖尿病 10 年。昨天因高热, 咳嗽, 咳黄痰, 突然感到极度口渴、厌食、恶心、呼吸加速, 呼气有烂苹果味, 晚上出现四肢厥冷、脉细速、血压下降, 随即意识不清, 紧急送医院。该患者可能出现了

- A. 低血糖反应
- B. 酮症酸中毒
- C. 乳酸酸中毒
- D. 急性脑血管意外
- E. 低血容量性休克

121. (真题 2013-S121) 患者, 男, 36 岁, 患糖尿病 10 年。昨天因高热, 咳嗽, 咳黄痰, 突然感到极度口渴、厌食、恶心、呼吸加速, 呼气有烂苹果味, 晚上出现四肢厥冷、脉细速、血压下降, 随即意识不清, 紧急送医院。应首先给予该患者的处理措施是

- A. 静脉补充生理盐水
- B. 静脉应用呼吸兴奋剂
- C. 加大口服降糖药剂量
- D. 静脉注射 5%葡萄糖溶液
- E. 静脉注射 10%葡萄糖溶液

122. (真题 2013-S122) 患者, 男, 35 岁, 因失眠、乏

力、少语 3 个月，加重 2 周就诊。查体：意识清楚，精神疲倦，消瘦，语音低，情绪低落，主诉“不想活了”。诊断为抑郁症。护理该患者时首先要注意的问题是

- A. 机体的营养状况
- B. 认知与感知状况
- C. 有无自伤自杀行为
- D. 睡眠与休息状况
- E. 注意安慰开导

123. (真题 2013-S123) 患者，男，35 岁，因失眠、乏力、少语 3 个月，加重 2 周就诊。查体：意识清楚，精神疲倦，消瘦，语音低，情绪低落，主诉“不想活了”。诊断为抑郁症。该患者首要的心理护理是

- A. 允许患者抒发自己的内心情感
- B. 患者积极情绪
- C. 患者学习新的应对技巧
- D. 建立良好的护患关系
- E. 劝阻患者的自杀想法

124. (真题 2013-S124) 患者，女，38 岁，身高 160cm，体重 45kg。因肺结核咯血收入院。夜班护士查房时发现该患者咯血约 200ml 后突然中断，呼吸极度困难，喉部有痰鸣音，表情恐怖，两手乱抓，眼球上翻，发绀。护士应判断患者最可能发生了

- A. 出血性休克
- B. 窒息
- C. 肺不张
- D. 肺部感染
- E. 贫血

125. (真题 2013-S125) 患者，女，38 岁，身高 160cm，体重 45kg。因肺结核咯血收入院。夜班护士查房时发现该患者咯血约 200ml 后突然中断，呼吸极度困难，喉部有痰鸣音，表情恐怖，两手乱抓，眼球上翻，发绀。此时护士最恰当的处理措施是

- A. 立即通知医师
- B. 立即气管插管
- C. 清除呼吸道积血
- D. 给予高流量氧气吸入
- E. 应用呼吸兴奋剂

126. (真题 2013-S126) 患者，女，38 岁，身高 160cm，体重 45kg。因肺结核咯血收入院。夜班护士查房时发现该患者咯血约 200ml 后突然中断，呼吸极度困难，喉部有痰鸣音，表情恐怖，两手乱抓，眼球上翻，发绀。护士针对该患者营养失调的护理措施，正确的是

- A. 控制蛋白质的摄入量
- B. 少吃牛奶、豆浆、鸡蛋等
- C. 控制水的摄入量
- D. 给予高蛋白、高热量饮食

E. 减少维生素 B 和维生素 C 的摄入

127. (真题 2013-S127) 患者，男，41 岁。体重 82kg，因车祸致 L3-4 骨折。四肢瘫痪，呼吸困难，对自己的病情非常担心。导致呼吸困难的最主要原因是

- A. 腹胀导致膈肌上移
- B. 肺栓塞
- C. 呼吸肌麻痹
- D. 痰液分泌过多堵塞气道
- E. 血块压迫气道

128. (真题 2013-S128) 患者，男，41 岁。体重 82kg，因车祸致 T3-4 骨折。四肢瘫痪，呼吸困难，对自己的病情非常担心。搬运该患者的方法是

- A. 单人背起患者搬运
- B. 单人抱起患者搬运
- C. 二人搬运，其中一人抬上身，一人抬脚
- D. 三人搬运，其中二人平托患者躯干，一人抬脚
- E. 四人搬运，其中三人将患者平托到平板上

129. (真题 2013-S129) 患者，男，41 岁。体重 82kg，因车祸致 T3-4 骨折。四肢瘫痪，呼吸困难，对自己的病情非常担心。在与患者沟通中，会对患者的心理产生不良影响的是

- A. 向患者介绍脊髓损伤的手术并发症
- B. 指导患者功能锻炼
- C. 安排康复较好的患者与其交流
- D. 建议患者听柔和的音乐放松心情
- E. 与患者共同探讨缓减症状的护理方法

130. (真题 2013-S130) 患者，男，70 岁。有高血压病史 10 年，2 小时前大用力后，突然出现头痛、喷射状呕吐、言语不清，跌倒在地，急诊就诊。分诊护士最恰当的处理是

- A. 优先心血管内科急诊
- B. 优先神经外科急诊
- C. 优先普外科急诊
- D. 优先骨科急诊
- E. 进一步询问病史

131. (真题 2013-S131) 患者，男，70 岁。有高血压病史 10 年，2 小时前大用力后，突然出现头痛、喷射状呕吐、言语不清，跌倒在地，急诊就诊。接诊护士在配合医生体检时，不正确的做法是

- A. 扶患者坐起，听双肺呼吸音
- B. 测量生命体征，观察瞳孔与意识
- C. 迅速建立静脉通道
- D. 头部放置冰袋
- E. 禁食禁水

132. (真题 2013-S132) 患者, 男, 72 岁。1 个月前因急性脑梗塞致左侧肢体偏瘫入院, 2 周前出院。社区护士对其进行访视, 发现患者目前意识清晰, 血压维持在 145/95mmHg 左右。左侧肢体偏瘫, 右侧肢体肌力好。皮肤完整性好。语言表达部分障碍。目前久卧在床, 可在床上独立进餐。现由老伴照顾。社区护士对该患者及家属进行健康教育时, 目前教育内容的侧重点是

- A. 家庭消毒隔离知识
- B. 脑栓塞的预防
- C. 传染性疾病及老年常见病的预防
- D. 患肢康复锻炼
- E. 死亡教育

133. (真题 2013-S133) 患者, 男, 72 岁。1 个月前因急性脑梗塞致左侧肢体偏瘫入院, 2 周前出院。社区护士对其进行访视, 发现患者目前意识清晰, 血压维持在 145/95mmHg 左右。左侧肢体偏瘫, 右侧肢体肌力好。皮肤完整性好。语言表达部分障碍。目前久卧在床, 可在床上独立进餐。现由老伴照顾。首选的健康教育形式是

- A. 发放视频教育光盘
- B. 推荐相关健康教育网站
- C. 组织社区病友座谈会
- D. 对其进行个别教育
- E. 提供宣传册

134. (真题 2013-S134) 患者, 女, 25 岁, 患风湿性心脏瓣膜病。不明原因持续发热 1 月余, 体温波动在 37.5~38.5°C 之间, 应用多种抗生素治疗无效, 今晨以“感染性心内膜炎”收住入院。现遵医嘱行血培养检查, 抽取血培养标本的时间选择, 正确的是

- A. 第 1 日间隔 1 小时采血, 共 3 次, 体温升高时采血
- B. 第 1 日间隔 1 小时采血, 共 3 次, 应在体温升高时采血
- C. 第 1 日间隔 1 小时采血, 共 3 次, 高热寒战时采血
- D. 入院 3 小时内采血, 间隔 1 小时/次
- E. 停用抗生素 2~7 天后采血, 无需在体温升高时采血

135. (真题 2013-S135) 患者, 女, 25 岁, 患风湿性心脏瓣膜病。不明原因持续发热 1 月余, 体温波动在 37.5~38.5°C 之间, 应用多种抗生素治疗无效, 今晨以“感染性心内膜炎”收住入院。入院后心脏彩超检查示二尖瓣大小约为 10mm×10mm 赘生物。护士最应预防和关注的是

- A. 心力衰竭
- B. 肺部感染
- C. 动脉栓塞
- D. 出血
- E. 深静脉血栓